





L. Hinegro 1878



ZOOLOGISCHE

BEYTRÄGE

FÜR

XIII. AUSGABE

DES LINNÉISCHEN

NATURSYSTEMS

VON

JOHANN AUGUST DONNBRATT

ZWEYTER THEIL

IN FERTIGUNG

ZOOLOGISCHE
BEYTRÄGE

ZUR

XIII. AUSGABE

DES LINNEISCHEN

NATURSYSTEMS

VON

JOHANN AUGUST DONNDORFF.

ZWEYTEN BANDES ZWEYTER THEIL
HÜHNER- UND SPERLINGSARTIGE VÖGEL.

Leipzig,
in der Weidmannischen Buchhandlung.

1795.

ORNITHOLOGISCHE
BEYTRÄGE

ZUR

XIII. AUSGABE

DES LINNEISCHEN

NATURSYSTEMS

VON

JOHANN AUGUST DONNDORFF.

B. U. H.



ZWEYTER BAND

HÜHNER- UND SPERLINGSARTIGE VÖGEL.

KGL. CHIR. ACAD.

Leipzig,

in der Weidmannischen Buchhandlung.

1795

LIBRARIES

ORNITHOLOGISCHE

BEYTRÄGE

ZUR

KILIAUSGABE

DES LINNÄISCHEN

NATURSYSTEMS

VON

JOHANN AUGUST DORNDOFF



ZWEYTER BAND

LEIPZIG VERLAG VON C. F. W. BUCHHOLDT UND SOHN 1845



QL
352
D66
1792
B02.T.2
SCHRB



FÜNFTE ORDNUNG
GALLINAE. (*Hühnerartige Vögel.*)

95. GESCHLECHT. OTIS. *Der Trappe.*
Müller, Natur syst. II. p. 441. Gen. XCV.
Leske, Naturgesch. p. 218. Gen. II.
Borowsky, Thierreich III. p. 114. Gen. LIX.
Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 207. Gen. XLVIII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 453. Gen. LIV.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 277. Gen. XXXIII.
Halle, Vögel, p. 94. Gen. III.
Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 107.
Onomat. hist. nat. V. p. 815.
Klein, av. p. 17. Gen. III.
Briffon, ornith. II. p. 216. Gen. LXVI.
Batsch, Thiere, I. p. 402. Gen. CIV.
Latham, Syst. ornith. II. p. 658. Gen. LIX.
Hermann, tab. affin. anim. p. 138.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 313. Gen. LXI.

1. TARDA. *Der gemeine Trappe.* (1)
Müller, Natur syst. II. p. 441. n. 1. *der Trappe.*
Leske, Naturgesch. II. p. 218. n. 1. *der gemeine Trappe.*

Borowsky.

(1) Flügelweite 6. Fufs. Gewicht an 30 Pfund. Ein scheuer, furchtsamer und vorsichtiger Vogel. Ausser einem dumpfen Knurren und Brummen im Zorn, und zur Falzzeit, hört man
11. Band 11. Th. A keine

217e43
14340 Reptiles

Borowsky, Thierreich, III. p. 115. n. 1. *der Trappe*.
Tab. 59.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 208. n. 1. Otis
(Tarda) maris capite iuguloque utrinque cristato; *der Trappe*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 454. n. 1. *der große Trappe*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 278. n. 1.
der große Trappe, p. 288. *gemeiner Trappe*;
Trappgans; *Ackertrappe*.

Funke, Naturgesch. I. p. 284. *der Trappe*.

Ebert, Naturl. II. p. 104. *der gemeine Trappe*.

Halle, Vögel, p. 94. n. 4. *die gemeine Trappe*.
Fig. 3.

Meyer, Thiere, I. p. 19. Tab. 18. 19.

Beckmann, Naturhist. p. 48. n. 5. *der Trappe*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 299. ad n. 102. *der große Trappe*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 181. n.
170. *die Trappe*.

Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 107. *Trappe*.

Onomat. hist. nat. V. p. 819. *die gemeine Trappe*.

Handb. der Naturgesch. II. p. 43. *die Trappe*.

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 113. *der Trappe*.

Klein, av. p. 18. n. 1. *Tarda simpliciter*.

Klein, Vorbereit. p. 33. n. 1. *Ackertrappe oder Trappgans*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 18. n. 1. *Ackertrappe*.

Klein,

keine Stimme von ihm. Lebt bis zur Falzzeit, die gegen das Ende des Märztes fällt, in Gesellschaft, dann aber beißen die Männchen einander ab, und jeder sucht sich zum Besitzer von 2. bis zu 6. Hennen zu machen. In Deutschland sind die Trappen nicht Zug-, sondern höchstens Strichvögel, denn man findet sie zu allen Jahreszeiten. Das Weibchen brütet 30 Tage, verläßt aber die Eyer, so bald sie ein Mensch berührt hat. Die Hähne bekommen erst nach dem ersten Mausern die Bartfedern.

- Klein*, Stemmat. av. p. 3 tab. 2. fig. 1—3.
Klein, Vögeleyer, p. 16. tab. 3. fig. 1.
Briffon, ornith. II. p. 216. n. 1. Outarde.
Büffon, Vögel, III. p. 5. der Trappe, m. e. Fig.
Gesner, Vögelb. p. 221. Trappe. fig. p. 222.
Batsch, Thiere, I. p. 403. der gemeine Trappe.
Latham, Syst. ornith. II. p. 658. n. 1. Otis (Tarda) nigro rufoque undulato-maculata, subtus albida, capite (maris) iuguloque utrinque cristato.
Seligmann, Vögel, III. Tab. 41. der Trapphahn.
Seligmann, Vögel, III. Tab. 43. die Trapphenne.
Frisch, Vögel, Suppl. p. 106. der Trapphahn.
 Tab. 106. ist ein altes Weibchen.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 51 n. 1. der gemeine Trappe.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 367. der Trappe.
Fischer, Livl. p. 88. n. 117. Ackertrappe.
Taube, Slavon. p. 22. Trappen.
Leem, Finam. p. 130 ** Trappen.
Pallas, Reis. III. p. 220. Trappe.
Ryttschkow, orenb. Topogr. p. 243. Drachwa, Dudak, Tudak.
Lepetchin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 309. Trappen.
Pallas, nord. Beytr. III. p. 16. die Trappen.
Pennant, britt. Zool. (von Murr) p. 91. tab. 43.
Günther, Nest. u. Ey. tab. 43.
Perrault, Charras u. Dodart, Abh. a. d. N. G. II. p. 45. anatomische Beschreib. von 6. Trappen. tab. 52. der Trappe. tab. 53. die Zergliederung.
Naturforsch. XIII. p. 221. n. 137. der Trappe.
Grillo: Naturforsch. XXII. p. 130. Trappe.
Götz, Naturgesch. einig. Vögel, p. 25. der Trappe.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 46. Trappe.
Naumann, Vogelfteller, p. 174. Trappe.

- Anweis. Vögel zu fang. p. 561. *der Trappe.*
 Oekonom. Zool. p. 79. n. 21. *der gemeine Trappe.*
Beckmann, Besch. d. Kurmark, I. p. 809.
Eberhard, Thiergesch. p. 109. *der Trappe.*
Göze, Nat. Menschenl. u. Vorseh. V. p. 531. *der Trappe.*
 Hist. phys. u. geogr. Mancherley, II. p. 156.
Bechstein, Must. schäd. Thiere, p. 132. n. 1. *der Trappe.*
Husly v. Rassynya: ungarisch. Magaz. I. p. 466. m. e. ill. Fig.
Jablowsky, allgem. Lex. p. 1226. *Trappe.*
Beckmann, phys. oekonom. Bibl. VI. p. 379. *der Trappe.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 127. n. 159. *der Ackertrappe.*
Loniceri, Kräuterb. p. 659. *Trapp.*
Lemmery, Materiallex. p. 804.
Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 97.
Geoffroy, mater. med. VII. p. 565. *der Trappe.*
 Onomatol. forestal. III. p. 702.
 Gothaisch. Hofkalender, 1780. p. 60.
Frisch, seltsam. Geschicht. II. p. 727.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Tarda.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. Tarda.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 154. n. 1. Otis (Tarda) iugulo utrinque cristato.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 355. Tarda Recent. *Trappe.*
Charleton, onom. zoic. p. 73. n. 8. Otis, Tarda et Bistarda.
Charleton, exercitat. p. 82. n. 8.
Moehring, av. gen. p. 58. n. 58. Otis.
Rzaczyński, hist. nat. Polon. p. 289. Otis feu Tarda Isidori et Aldrovandi, Bistarda Alberti magni.

Rzac. auct. histor. nat. Polon. p. 401. Anser Trappa.

Sibbald, Scot. illustr. P. II. L. 3. c. 16. Otis, Tarda.

Barrere, ornith. Cl. III. gen. 9. sp. 1. Tarda pyrenaica fulva, maxillis nigricantibus, marginibus pennarum roseis.

Belon, hist. des ois. p. 236. portr. des ois. p. 56.

Jonston, av. p. 63. Otis sive Tarda.

Hermann, tab. affin. anim. p. 138. Otis Tarda.

Raji, catal. plantar. Cantabrig. p. 34.

Aristot. histor. anim. II. c. 16. *OTIS*.

Athen. Deipnosoph. L. IX. c. 10. p. 330.

Aelian. de nat. anim. L. V. c. 24. *OTIS*.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 22. Aves tardae; Otides.

Schaefer, element. ornithol. tab. 51.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 314. n. 1. *der gemeine Trappe*.

β. Otis tectricibus alarum albis. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. 288.

3. ARABS. *Der arabische Trappe*.

Müller, Naturyst. II. p. 444. n. 2. *die arabische Trappe*.

Leske, Naturgesch. p. 219. n. 2. *der arabische Trappe*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 120. *der Arabische Trappe; der Lohong*.

Ebert, Naturl. II. p. 105. *der arabische Trappe*.

Halle, Vögel, p. 98. n. 6. *die Arabische Trappe*.

Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 119. n. 2. *arabische Trappe*.

Onomat. hist. nat. V. p. 818. *die Arabische Trappe*.

Klein, av. p. 18. n. 3. Tarda Mechaensis, Arabica.

Klein, Vorbereit. p. 34. n. 3. *der Araber*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 18. n. 3. *Arabische Trappe*.

Briffon, ornith. II. p. 219. n. 3. Outarde d'Arabie.

Batsch, Thiere, I. p. 404. *der Lohong*.

Büffon, Vögel, IV. p. 63. *der Afrikanische geschöpfte Trappe*. m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 659. n. 4. Otis (Arabs) rufescens, nigricante striata, subtus alba, auribus erecto-cristatis.

Latham, syn. suppl. p. 226. Arabian Bustard.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 23. *der arabische Trappe*.

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 309. *arabische Trappen*; russ. *Strepet*.

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 154. n. 2. Otis (Arabs) auribus erecto-cristatis.

3. TETRAX. *Der Trappenzwerg*.

Müller, Natur Syst. II. p. 444. n. 3. *die kleine Trappe*.

Leske, Naturgesch. p. 219. n. 3. *der Zwergtrappe*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 118. n. 2 *der Trappenzwerg*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 455. n. 2. *der kleine Trappe*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 288. n. 2. *der kleine Trappe*, p. 292. *Zwergtrappe*; *Trappenzwerg*; *Trieltrappe*; *Gristtrappe*.

Ebert, Naturl. II. p. 105. *der kleine Trappe*; *Feldente*.

Halle, Vögel, p. 97. n. 5. *der Trappenzwerg*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 185. n. 171. *der Trappenzwerg*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 299. A. *der kleinere Trappe*.

Neuer Schaupl. der Nat. IX. p. 119. n. 3. *kleine Trappe*.

Onomat. hist. nat. V. p. 823. *die kleine Trappe*.

Klein, av. p. 18. n. 2. *Tarda nana*.

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 34. n. 2. *Trieltrappe*; *Grielder kleine Trappe*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 18. n. 2. *Trieltrappe*.

Briffon, ornith. II. p. 218. n. 2. petite Outarde, appelée vulgairement Canne-petiere.

Büffon, Vögel, IV. p. 48. *der Trappenzwerg*, in. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 404. *der Trappenzwerg*.

Latham, Syn. Suppl. p. 226. Little Bustard.

Latham, Syst. ornith. II. p. 659. n. 3. Otis (Tetrax) nigro rufo alboque variegata, subtus alba, capite iuguloque laevi.

Beseke, Vögel Kurl. p. 68. n. 143. *die kleine Trappe*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 53. n. 2. *der Zwergtrappe*.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 41. *der kleine Trappe*.

Bock, N. G. v. Preuss. IV. p. 371. *der kleine Trappe*.

Cetti, Sardin. II. p. 119. *der Trappenzwerg*.

Pallas, Reif. Ausz. III. p. 474. *kleine Trappen*.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *das Steppenhuhn*.

Pontoppidan, Dänneim. p. 171. n. 1. *Trappegaas*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 139. *Trappegids*.

Adanson, Senegal. p. 63. Gros-Yeux?

Leem, Finnm. p. 130. ** Otides Tetraces.

Linné, Abhandl. II. p. 295. n. 89. *der Trappenzwerg*.

Naturforsch. XIII. p. 223. n. 138. *die kleine Trappe*.

Bechstein, Must. schädl. Th. p. 132. n. 2. *kleine Trappe*.

Beckmann, Bibl. VI. p. 384. *der kleine Trapp*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. 154. n. 3. Otis (Tetrax) capite iuguloque laevi.

Müller, zool. dan. prodr. p. 27. n. 200. Otis (Tetrax) capite iuguloque laevi.

Charleton, exerc. p. 83. n. 9. Anas campestris.

Charleton, onom. zoic. p. 74. n. 9. *Anas campestris*; Canne-petiere.

Jonston, av. p. 64. *Anas campestris Bellonii*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 138. Otis Tetrax.

Salerne, ornithol. p. 155.

Dict. des anim. I. p. 390. Canard de Pré de France.

Anas pratensis Galliae, p. 403. Canne-petiere.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 314. n. 2. der Trappenzwerg.

4. AFRA. Der afrikanische Trappe.

Müller, Naturyst. II. p. 445. n. 4. die aethiopische Trappe. Tab. 18. Fig. 1.

Borowsky, Thierreich, III. p. 120. n. 4. der aethiopische Trappe.

Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 119. n. 4. Aethiopische Trappe.

Onomat. histor. nat. V. p. 817. die Aethiopische Trappe.

Büsson, Vögel. IV. p. 66. der Aethiopische oder Afrikanische Trappe.

Batsch, Thiere, I. p. 404. der aethiopische Trappe.

Latham, Syn. Suppl. p. 227. White-eared Bustard.

Latham, Syst. ornith. II. p. 659. n. 5. Otis (Afra) nigra, dorso cinereo-undulato, auribus albis.

Sparrmann, Reif. p. 148. Korrhahn, oder Knorrhahn.

Adanson, Seneg. p. 244. fliegende Strauß?

Voy. de le Moine aux Isles Canaries, Cap verd, Senegall etc. à Par. 1695. p. 106. Autruche volante?

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 315. n. 3. der afrikanische Trappe.

5. BENGALENSIS. Der Churge.

Klein, verbeß. Vögelhistor. p. 162. Indianische Trappe.

Briffon,

Briffon, ornith. II. p. 231. n. 13. grand Pluvier de Bengale.

Büffon, Vögel, IV. p. 69. *der Indianische mittlere Trappe*. *Der Churge*, m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 228. Indian Bustard.

Latham, Syst. ornith. II. p. 660. n. 6. Otis (Bengalensis) nigra, subtus fulvo-fusca, dorso maculis, cauda fasciis nigris, tectricibus alarum albis.

Seligmann, Vögel. VII. Tab. 40. *der indianische Trappe*.

Adanson, Seneg. p. 63. Gros-yeux, *Grossaugen?*

Hermann, tab. affin. anim. p. 130. Otis indica.

6. HOUBARA. *Der Hubara*.

Büffon, Vögel, IV. p. 73. *der kleine Afrikanische gehäubte Trappe mit der Halskrause, oder Hubara*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 121. n. 5. *der Trappe mit der Halskrause*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 660. n. 8. Otis (Houbara) flavescens, fusco-maculata, collo pennis elongatis, albidis, rachibus nigris, remigibus nigris, medio macula alba.

Shaw, Reise, p. 162. *der Houbaara, oder Houbaary*, Tab. II.

Gentl. Magaz. XIX. tab. p. 499.

Voy. en Barbarie, I. p. 267.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 315. n. 4. *der Hubara*.

7. RHAAD. *Der Rhaad*.

Büffon, Vögel, IV. p. 76. *der kleine gehäubte Afrikanische Trappe, ohne Halskrause*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 660. n. 9. Otis (Rhaad) cristata flavescens, fusco maculata, subtus alba, capite nigro, cauda fusca, fasciis nigris.

Shaw, Reif. p. 163. *der Rhaad oder Saf-saf*,
tab. II.

Voy. en Barbar. p. 267.

8. INDICA. *Der indianische Trappe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 661. n. 10. Otis (Indica) fusca, nigro-undulata, subtus fusco-albida, gula alba, vertice nigro, lateribus capitis fascia nigra.

9. CHILENSIS. *Der chinesische Trappe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 658. n. 2. Otis (Chilensis) capite iuguloque laevi, corpore albo, vertice rectricibusque cinereis, remigibus primoribus nigris.

Vidaure, Chile, p. 71. *der Pinquen.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit fünf Gattungen vermehrt. In der XII. Edition war dies Geschlecht unter den *Grallis*.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der indianische geöhrte Trappe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 228. Passarage Bustard.

Latham, Syst. ornith. II. p. 660. n. 7. Otis (Aurita) nigra, corpore supra fusco-reticulato, occipite pennis utrinque 4. capillaribus apice rhombeis, macula alarum auriumque alba.

96. GESCHLECHT. STRUTHIO. *Der Strauß.*

Müller, Naturyst. II. p. 446. Gen. XCVI.

Leske, Naturgesch. p. 217. Gen. I.

Borowsky, Thierreich, III. p. 121. Gen. LX.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 208. Gen. XLIX.

Bechstein,

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 448. Gen. LIII.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 186. Gen.
 LXIV.
Onomat. hist. nat. VII. p. 354.
Brissou, ornith. II. p. 209. Gen. LXII. p. 211.
 Gen. LXIII. p. 212. Gen. LXIV.
Batsch, Thiere, I. p. 402. Gen. CV.
Latham, Syst. ornith. II. p. 663. Gen. LXI. p.
 664. Gen. LXII. p. 665. Gen. LXIII.
Hermann, tab. affin. anim. p. 131. 136.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 315. Gen.
 LXII.

I. CAMELUS. *Der gemeine Strauß.* (2)

- Müller*, Natursyst. II. p. 446. n. 1. *der Kameel-*
strauß.
Leske, Naturgesch. p. 217. n. 1. *der gemeine Strauß.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 122. n. 1. *der Ka-*
meelstrauß, tab. 60.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 208. Struthio
 (Camelus) pedibus didactylis, digito exteriori
 parvo mutico, spinis alarum binis; *der Strauß.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 448. n. 1. *der gemeine*
Strauß.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 186. *der*
gemeine Strauß.
Funke, Naturgesch. I. p. 307. *der Strauß.*
Ebert, Naturl. II. p. 106. *der eigentlich so genann-*
te Strauß, tab. 27.
Halle, Vögel, p. 85. n. 1. *der Strauß; Kameel-*
vogel.
Meyer, Thiere, I. Tab. 60. *der Strauß*, Tab. 61.
das Gerippe.

Gatterer,

(2) *Latham* hat mit *Brissou* aus dieser, und den beyden folgen-
 den Gattungen, drey besondere Geschlechter gemacht.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 227.
n. 225. *der Strauß*, *Straußvogel*; *Kameel-*
strauß; *Kameelvogel*; *Struß*; *Struz*.

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 660. *Strauß*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 354. *der Strauß*, *Ca-*
meelstrauß.

Handb. d. N. G. II. p. 153. *der Strauß*.

Klein, Av. p. 16. Struthio. Struthio - Camelus au-
torum.

Klein, Vorbereit. p. 30. *der Strauß oder Strutz*.

Klein, verb. Vögelh. p. 16. *Strauß*.

Klein, Stemmat. av. p. 1. tab. 1. fig. 1. 2.

Klein, Vögeleyer, p. 15. tab. 1.

Gesner, Vögelb. p. 496. *Strauß*, fig. p. 497. mit-
telm.

Briffon, ornith. II. p. 209. n. 1. Autruche.

Büffon, Vögel, III. p. 124. *der Strauß*, tab. 77.

Batsch, Thiere, I. p. 405. *der gemeine Strauß*.

Beckmann, Naturhist. p. 48. *der Strauß*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 663. Struthio Camelus.

Fermin, Surin. II. p. 123. *der Strauß*.

Niebuhr, Besch. von Arabien, p. 168. *Strauß*.

Shaw, Reise, p. 386. *der Strauß*. (Naamah.)

Le Vaillant, Reis. n. Afr. II. p. 209. 334. *Strauß*.

Sparrmann, Reis. p. 126. 429. *Strauß*.

Byron, Reis. um d. Welt, p. 182. *die Straußen*.

Ludolf, Aethiop. I. c. 12. n. 1. II. p. 161. n. 89.

Struthio.

Kolbe, Vorgeh. der guten H. edit. in 4. p. 389.
Strauß.

Pokock, Besch. des Morgenl. I. p. 311.

Allgem. Reis. II. p. 289. 493. III. p. 96. V. p. 79.
202. XI. p. 201.

Adanson, Senegall. p. 70. *Straußvögel*.

Leon. Afr. descrip. Afr. p. 765. Struthioca-
melus.

Perrault,

Perrault, Charras u. Dodart, Abh. a. der N. G. II. p. 61. anatom. Besch. von 8 Straußen Tab. 54. bis 57.

Guyons Reif. n. Ostind. p. 192.

De la Porte, Reif. I. p. 165.

Valentin, mus. museor. I. p. 460. Struthio, m. e. fig.

Hamb. Magaz. X. p. 442. XX. p. 140. XII. p. 66. 147.

Goeze, nützl. All. I. p. 148. *der Strauß*.

Mannigfalt. II. p. 620. — Neue Mannigfalt. I. p. 362.

Hamb. Journ. II. p. 734.

Dresd. Magaz. II. p. 778.

Beckmann, Bibl. IV. p. 433. VI. p. 59. XVI. p. 87. 415.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 128. n. 160. *gemeiner afrik. Strauß*.

Willich, obs. de Struthio-Camelo, Fref. 1587. 8. Oekonomisch. Zool. p. 80. n. 1. *der afrikanische Strauß*.

Ludovici, Kaufmannslex. II. p. 1503. IV. p. 2233.

Eberhard, Thiergesch. p. 110. *der Strauß*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 490. 706.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1150. *Strauß*.

Loniceri, Kräuterb. p. 660. *Strauß*.

Merklein, Thierreich, p. 381. *Strauß*.

Bern. Gallegaris Lo Struccero, Venez. 1646. 8.

Scaliger, de Struthiocamelo; exercit. 230. p. 723.

Erreurs populaires, I. L. 3. c. 22. p. 356. Autruche.

Acta erud. suppl. I. p. 250. — *Manget* bibl. I. P. I. p. 479.

Phil. transact. XXXIII. p. 223. XXXIV. p. 113. XXXV. p. 275.

Vallisnieri, notom. dello Struzzo; in Oper. T. I. p. 239, c. f.

Velfchius,

Velschius, de pulvere metallico nigro ex ventriculo Struthionis. — Eph. nat. cur. Dec. I. an. 3. obs. 37. p. 52.

Amman, dissert. Σιθνοπεψια Struthionis, Lipf. 1657. 4.

Cardau, de subtil. L. 10. p. 335. Struthiocamelus.

Mem. de l'acad. d. Sc. 1735. p. 146.

Thvenot, voyages, I. p. 313. Ed. germ. Fcf. a. M. 1693. p. 223.

Derham, Physicotheol. p. 578.

Marmol, descr. de l'Afrique, I. p. 64.

Voy. du Fr. Philippe, Carme-dechauffé, p. 379.

Chefeld, Anatom. c. 5. (Scelet.)

Geoffroy, mater. med. VII. p. 673. der Strauß.

Linne, Syst. Nat. Edit. II. p. 55. Struthio-Camelus.

Linne, Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. Struthio-Camelus.

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 155. n. 1. Struthio (Camelus) pedibus didactylis.

Kramer, Austr. p. 354. n. 1. Struthio-Camelus, Strauß.

Charleton, onom. zoic. p. 71. n. 10. Struthio; Struthio-camelus.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 350. Struthiocamelus, Strausvogel.

Mochring, av. gen. p. 56. n. 54. Struthio.

Knorr, delic. natur. II. Tab. I. 1. p. 81.

Barrere, orn. Cl. III. gen. 40. Struthio.

Hermann, tab. affin. anim. p. 131. 136. Struthio-Camelus.

Gerin, ornithol. II. p. 29. tab. 137. 138. 139.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 3. L. 11. c. 37. L. 29. c. 5. Struthiocamelus.

Alien, de nat. anim. L. 2. c. 27. Στρουθιος.

Aristot.

Aristot. hist. anim. L. 4. c. 14. L. 9. c. 32. Στρου-
δος ὁ λιβυκος.

Jes. XIII. v. 21. — Jerem. Klagl. IV. v. 3. —
Mich. I. v. 8. — 3. Mos. XI. v. 16. — 5. Mos.
XIV. v. 15. — Hiob. XXXIX. v. 18. 19.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 315. n. 1.
der gemeine Strauß.

2. CASUARIUS. *Der Casuar.* (3)

Müller, Naturfyft. II. p. 450. n. 2. *der Casuar.*

Leske, Naturgesch. p. 217. n. 2. *der Kasuar.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 128. n. 3. *der Kasuar.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 209. n. 2. Stru-
thio (Casuarius) pedibus tridactylis, galea pa-
learibusque nudis, remigibus spinosis; *der Ca-
suar*, Emeu.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 451. n. 2. *der Kasuar.*

Funke, Naturgesch. I. p. 311. *der Kasuar.*

Ebert, Naturl. II. p. 107. *der Casuar.*

Halle, Vögel, p. 91. n. 3. *der Kasuar.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 236. n.
237. *der Kasuar.*

Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 59. *Casuar.*

Onomat. hist. nat. II. p. 660. *Casuar.*

Beckmann, Naturhist. p. 48. n. 6. b. *der Casuar.*

Handb. d. N. G. II. p. 156. *der Casuar.*

Klein, av. p. 17. Casuarius, Casuaris, Emeu,
Eme.

Klein, Vorbereit. p. 32. *Casuar.*

Klein, verb. Vögelh. p. 17. *Casuar.*

Klein, Stemmat. av. p. 2. c. fig.

Klein, Vögeleyer, tab. 2.

Brissou, ornith. II. p. 212. n. 1. *Casuar.*

Buffon, Vögel, III. p. 209. *der Kasuar.* tab. 76.

Batsch, Thiere, I. p. 407. *der Kasuar*, Eme.

Latham,

(3) Ist vor dem Jahre 1597. nicht in Europa gesehen.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 664. n. 1. *Casuarus* (Emeu) niger, vertice galeato, corpore setoso, capite colloque supremo nudis.

Sparrmann, Reif. p. 434. *der Kasuar*.

Guyon, Ostind. p. 202.

Keyßler, Reif. p. 23. Tab. 13. fig. 2.

Allgem. Reif. VIII. p. 52. *Eme*.

Franzisci ost- u. westind. Lustgarten, p. 315.

Verricht. d. niederl. ostind. Gesellsch. 2te Gefand-
sch. p. 48. fig. p. 49.

Valentin, mus. museor. I. p. 460. *Casuarus*, c. f. Mus. Wormian. p. 292. *Emeu*.

Perrault, *Charras*, u. *Dodart*, Abh. a. d. N. G. II. p. III. anatomische Besch. von 4. *Casua-*
ren, tab. 57. *der Casuel*, tab. 58. die Zerglie-
derung.

Mannigfalt. III. p. 145. *der Kasuar*, fig. p. 176.

Eberhard, Thiergesch. p. 108. *Emeu*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 212. *Casuar*.

Beckmann, Bibl. VI. p. 60. *der Casuar*.

Mem. pour serv. à l'hist. des anim. II. p. 157.

Linne, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. *Emeu*.

Linne, Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. *Emeu*.

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 155. n. 2. *Struthio* (*Casuarus*) pedibus tridactylis, vertice paleari-
busque nudis.

Kramer, Aust. p. 354. n. 1. *Casuarus*.

Charleton, onom. zoic. p. 71. n. 1. *Emeu*.

Moehring, av. gen. p. 57. n. 56. *Cela*.

Barrere, ornith. gen. 38. *Emeu* pennis setosis, ni-
gricantibus, crassa cervice.

Ludolf, Aethiop. L. 10. c. 12. n. 2. II. p. 162. n.
39. *Casuarus*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 131. 132. Str. *Casua-*
rius.

Gerin, ornithol. II. p. 28. tab. 136.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 316. n. 2.
der Kasuar.

3. RHEA. *Der amerikanische Strauß.*

Müller, Naturfyst. II. p. 452. n. 3. *der amerikani-
sche Strauß.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 127. *der amerika-
nische Strauß.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 209. *Suri, Tuju.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 453. n. 3. der Strauß-
kasuar.*

Ebert, Naturl. II. p. 108. *der Straußbastard.*

Halle, Vögel, p. 89. n. 2. *Strauskasuar; unge-
schwänzter Strauß.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 235. n.
226. *der Straußkasuar.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 668. *Straußba-
stard; grauer Kasuar mit Straußenschnabel;
Ohnschwanz.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 823. *der amerikanische
Strauß.*

Klein, av. p. 17. Struthio nothus.

Klein, Vorbereit. p. 31. *Strausbastard.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 17. *Straußbastard,
Ohnschwanz.*

Briffon, ornith. II. p. 211. n. 1. Thouyou.

Büffon, ornith. I. p. 452. Touyou.

Büffon, Vögel, III. p. 195. *der Südamerikanische,
Okzidentalische, Magellanische oder Guianische
Strauß.*

Batsch, Thiere, I. p. 407. *der amerikanische
Strauß.*

Latham, Syn. III. 1. p. 23. *

Latham, Syst. ornith. II. p. 665. n. 1. *Rhea Ame-
ricana.*

Vidaure, Chile, p. 71. *Straußvogel.*

Molina, l. c. der *Chouque* oder *amerikanische Strauß*.

Eberhard, Thiergesch. p. 108. der *amerikanische Strauß*.

Beckmann, Bibl. VI. p. 60. der *Touyou*.

Goeze, Allerl. III. p. 124. n. 8. der *Strauß*.

Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorf. V. p. 345. der *Touionion?*

Samml. zur Physf. u. N. G. II. p. 613. der *Touioniou?*

Allgem. Reisf. XVI. p. 296. *Salian*.

La Maine, navigations austr. p. 129.

Hist. des Incas. Tom. II. p. 274.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 155. n. 3. *Struthio* (*Americanus*) digito postico rotundato mutico.

Meehring, av. Gen. p. 57. n. 55. *Rhea*.

De Laet nov. orb. p. 616. *Yandou*.

Barrere, Franc. equinox. p. 133. *Grus cinerea ferrivora*.

Jonston, av. p. 186. *Nhanduguacu*.

Charleton, onom. zoic. p. 115. n. 20. *Jandou*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 317. n. 3. der *amerikanische Strauß*.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

In der XII. Edition stand dies Geschlecht unter den *Grallis*.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der neuholländische Kasuar.*

Phillips Reisf. n. Botany-Bay, p. 170. tab. 7.

White, Reisf. n. Neu Süd Wallis; in dem Magaz. merkw. Reisebeschr. V. p. 124. in. e. Fig.

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 665. n. 2. *Casuarius* (N. Hollandiae) nigricans, vertice plano, corpore setoso, capite colloque pennaceis, tibiis postice ferratis.

97. GESCHLECHT. DIDUS. *Der Straußka-
suar.*

Müller, Naturyst. II. p. 455. Gen. XCVII.

Leske, Naturgesch. p. 219. Gen. III.

Borowsky, Thierreich, II. p. 160. Gen. XXV.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 209. Gen. L.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 456. Gen. LV.

Brissou, ornith. II. p. 214. Gen. LXV. *Raphus*.

Batsch, Thiere, I. p. 402. Gen. CVI.

Latham, Syst. ornith. II. p. 662. Gen. LX.

Hermann, tab. affin. anim. p. 132. 163.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 317. Gen. LXIII.

I. INEPTUS. *Der Dronte.* (†)

Müller, Naturyst. II. p. 455. *der Tölpel*.

Leske, Naturgesch. p. 219. *der Dronte*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 161. *der Dronte*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 209. n. 1. *Didus* (Ineptus) pedibus ambulatoriis, cauda brevissima, pennis incurvis; *der Dudu*, *Dronte*, *Walghvogel*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 456. *der Tölpel*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 186. *der Tölpel*.

Funke, Naturgesch. I. p. 326. *der Dronte*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 236. n.

228. *der Dronte*, *Ebelvogel*, *Mönchschwan*.

Onomat. hist. nat. III. p. 663. *Dronte*.

B 2

Handb.

(4) Soll, nach dem Bericht neuerer Reisenden, jetzt gar nicht mehr existiren, cf. *Blumenb.* I. c.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 158. *der Dronte.*

Briffon, ornith. II. p. 214. n. 1. *Dronte.*

Büffon, Vögel, III. p. 230. *der Dronte.* tab. 77.

Batsch, Thiere, I. p. 409. *der Dronte.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 662. n. 1. *Didus* (Ineptus) griseus, remigibus rectricibusque flavo-cinereis, capite cucullato.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 84. *der Dodo.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 60. *der Dronte.*

Neue Mannigfalt. III. p. 1. fig. p. 16.

Charleton, onom. zoic. p. 113. n. 15. *Dodo Lusitanorum*; *Cygnus cucullatus.*

Moehring, av. Gen. p. 58. n. 57. *Raphus.*

Bont. Ind. orient. p. 30. tab. 70. *Dronte.*

Jonston, av. p. 176. *Cygnus cucullatus*, f. *gallus gallinaceus peregrinus Clusii.*

Voy. des Holland. aux Ind. orient. II. p. 214.

Hermann, tab. affin. anim. p. 132. 163. *Didus ineptus.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 317. *der Dronte.*

2. SOLITARIUS. *Der Einsiedler.* (5)

Borowsky, Thierreich, II. p. 162. *der Einsiedler.*

Batsch, Thiere, I. p. 408. *der Einsiedler.*

Büffon, Vögel, III. p. 238. *der Einsiedler.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 662. n. 2. *Didus* (Solitarius) griseo fuscoque varius, alis abbreviatis, alulis gibbosis.

Beckmann, Bibl. VI. p. 61. *der Einsiedler.*

Allgem. Reif. X. p. 3. *der Einsiedler.*

3. NAZA-

(5) Soll, nach *Büffon*, 45 Pfund schwer seyn, und das Eine Ey, welches das Weibchen legt, 7 Wochen bebrütet werden; auch das Fleisch der Jungen schmackhaft seyn.

3. NAZARENUS. *Der Vogel von Nazareth.* (6)

Borowsky, Thierreich, II. p. 162. *der Nazarovogel.*

Batsch, Thiere, I. p. 409. *der Nazarovogel.*

Büffon, Vögel, III. p. 247. *der Vogel von Nazareth.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 663. n. 3. *Didus* (Nazarenus) toto corpore tomentoso nigro.

Beckmann, Bibl. VI. p. 61. *der Vogel von Nazare.*

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit zwey Gattungen vermehrt.

98. GESCHLECHT. PAVO. *Der Pfau.*

Müller, Naturyst. II. p. 457. Gen. XCVIII.

Leske, Naturgesch. p. 221. Gen. IV.

Borowsky, Thierreich, II. p. 163. Gen. XXVI.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 207. Gen. XLVII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 457. Gen. LVI.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 293. Gen. XXXVII.

Onomat. hist. nat. VI. p. 216.

Batsch, Thiere, I. p. 411. Gen. CXII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 616. Gen. XLIX.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 318. Gen. LXIV.

(6) *Beckmann* vermuthet, daß so wohl diese, als die vorhergehende Gattung mit dem Dronte wohl einerley seyn mögen.

I. CRISTATUS. *Der gemeine Pfau.* (7)

Müller, Natursyft. II. p. 457. n. 1. *der gemeine Pfau.*

Leske, Naturgesch. p. 221. n. 1. *der gemeine Pfau.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 164. n. 2. *der gemeine Pfau.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 207. n. 1. Pavo (Cristatus) capite crista compressa, calcaribus solitariis. *Der Pfau, Pageluhn.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 457. n. 1. *der gemeine Pfau.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 293. n. 1. *der gemeine Pfau.* p. 304. *Phau; Paw; Pagelun, Pawelun, Junovogel, Pau.*

Funke, Naturgesch. I. p. 218. *der Pfau.*

Ebert, Naturl. II. p. 112. *der Pfau.*

Halle, Vögel, p. 429. n. 449. *der Pfau.*

Meyer, Thiere, II. p. 1. tab. 1. *der Pfau.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 237. n. 229. *der Pfau.*

Beckmann, Naturhist. p. 49. n. 1. *der Pfau.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VI. p. 445. *Pfau.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 217. *der gemeine Pfau.*

Handb. d. N. G. II. p. 50. *der Pfau.*

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 113. *der Pfau; Pacheluhn.*

Klein, av. p. 112. B. Pavo.

Klein, Vorbereit. p. 208. B. *Pfan, Paw.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 115. *Pfau.*

Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 14. fig. 1. 2.

Gesner, Vögelb. p. 396. *Pfaw.* M. e. zieml. guten Fig.

Siemssen,

(7) Ist erst zu Alexanders des Großen Zeiten in Europa bekannt geworden. Das Männchen wird wohl 25. Jahr alt. Soll sich mit Truthühnern begatten.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 238. n. 1. *der gemeine Pfau*.

Briffon, ornith. p. I. p. 79. n. 7. *Paon*.

Rüffon, Vögel, V. p. 144. *der Pfau*. M. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 424. *der gemeine Pfau*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 616. n. 1. *Pavo* (Cristatus) capite crista compressa, calcaribus solitariis.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 372. *der Pfau*.

Wolf, Ceyl. II. p. 135. *der Pfau*.

Kolbe, Vorgeb. der guten H. Ed. in 4. p. 388. *Pfauen*.

Knox, Ceyl. p. 57. *die Pfauen*.

Valentin. mus. museor. I. p. 462. *Pavo*. M. e. Fig.

Allgem. Reis. IV. p. 528. V. p. 79. *Pfauen*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 149. *Pfau*.

Beckmann, Bibl. VI. p. 396. *der Pfau*.

Eberhard, Thiergesch. p. 65. *der Pfau*.

Meidinger, Vorles. I. p. 139. n. 1. *der gemeine Pfau*.

Oekonom. Zool. p. 82. n. 23. *der gemeine Pfau*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 17. 18. 506. 605.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 130. n. 162. *der gemeine Pfau*.

Anweis. Vögel zu fang. etc. p. 423. *der Pfau*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 799. *Pfau*.

Geoffroy, mat. med. VII. p. 609. *der Pfau*.

Allgem. Magaz. VII. p. 352. *Pfau*.

Naturforsch. XVII. p. 66. n. 139. *der gemeine Pfau*.

Neue Mannigfaltigk. III. p. 290.

Mannigfaltigk. IV. p. 529.

Merklein, Thierreich, p. 324. *Pfau*.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 42.

Ludovici, Kaufmannslex. p. 626 ff.

Gothaisch. Hofkalend. 1776. N. G. des Pfaues.

Lemmercy, Materiallex. p. 846.

Hannöv. Magaz. 1769. p. 704.

Bücholz, Abhandl. vom Federvieh, p. 18.

Loniceri, Kräuterb. p. 661. *Pfau*.

Allgem. Haushalt. und Landwiffensch. I. p. 861.

Pfau.

Borkhausen, Magaz. I. p. 212. n. 89.

Sperling, diss. de Pavone, Witteb. 1643. 4.

Friederici, diss. de avium pulcherrima, Pavone,
Lips. 1676. 4.

Bartholin. obs. ex anatome pavonis, Act. Haffn.
I. obs. 114. p. 285.

Scaliger, exercitat. 238. p. 735.

Paullini, zeitverkürz. erbaul. Lust, III. n. 64.
p. 421.

Aldrovand. pavonis elogium; in Dornav. Amphith. I. p. 436.

Libavii pavonis elogium; in Oper. Tom. II.
p. 713.

Mandeslo, voy. aux Indes, Tom. II. Liv. I. p.
147.

Therrenot, voy. au Levant, III. p. 18.

Tavernier, voy. Tom. III. L. I. p. 57.

Pyrard, voyag. Tom. I. p. 426.

Lintscot, navigatio in Orientem, p. 39.

Second. voyag. de Siam. p. 75.

Gemelli Careri, voy. autour du monde, V. p. 270.

Hist. des Incas, Tom. II. p. 329.

Charlevoix, hist. de St. Domingue, I. p. 28—32.

Brüyer, de re cibaria, L. 15. c. 28.

Augustin. de civitat. Dei, L. 21. c. 4.

Mem. de l'Acad. des Inscript. XX. p. 636.

Menestrier, traité des Tournois, p. 40.

Linne, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Pavo.

Linne, Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. Pavo cauda
longa.

Linne,

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 156. n. 1. Pavo (Cristatus) capite crista erecta.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 325. Pavo. *Pfau*; *Paw*.

Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 1. Pavo.

Belon, hist. des oiseaux, p. 233. Paon.

Mus. Wormian. p. 297. Pavo.

Moehring, av. gen. p. 50. n. 45. Pavo.

Rzaczyusk. hist. nat. Polon. p. 243. Pavo f. Pavus; Avis medica Varroni, Iunonia avis Ovidio.

Dict. des animaux, III. p. 324. Paon.

Bomare, dict. Tom. VII. p. 487. VIII. p. 205.

Paon, oiseau de Junon, ou de Medie ou de Perse.

Encykl. oeconom. XI. p. 401. *Paon*.

Cours d'hist. nat. III. p. 80. Paon.

Zinnar. Uov. p. 25. tab. 1. Pavone.

Gerin. ornithol. II. p. 73. tab. 217.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. Pavo cristatus.

Aristot. hist. animal. L. 6. c. 2. n. 28. *Tæws*.

Aelian. de nat. anim. L. 5. c. 32. L. II. c. 33.

L. 13. c. 18. L. 16. c. 2. *Tæws*.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 20. L. II. c. 37. L. 29. c. 6.

Pavo.

Sueton. Vitell. c. 13. Pavo.

Palladius, de re rust. L. 1. c. 28. Pavones.

Varro, de re rust. L. 3. c. 6. Pavo.

Gellii noct. attic. L. 7. c. 16. Pavones.

Columella, de re rust. L. 8. c. II. Pavones.

Athenaei Deipnosoph. L. 23. c. 13.

Donadorff, Handb. d. Thiergesch. p. 318. n. 1. der gemeine *Pfau*.

β. PAVO VARIUS. Der bunte *Pfau*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 116. a. der bunte *Pfau*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 305. n. 2.
der bunte Pfau.

Briffon, ornith. I. p. 81. A. Paon panaché.

Büffon, Vögel, V. p. 200. der bunte Pfau, m.
e. Fig.

Latham, Syn. II. i. p. 671.

Latham, Syst. ornith. II. p. 816. β . Pavo varius.

Merklein, Thierreich, p. 326.

γ. PAVO ALBUS. Der weiße Pfau.

Borowsky, Thierreich, II. p. 167. b. der weiße
Pfau.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 304. n. 1.
der weiße Pfau.

Briffon, ornith. I. p. 81. B. Paon blanc.

Büffon, Vögel, V. p. 195. der weiße Pfau, m.
e. Fig.

Merklein, Thierreich, p. 325. schneeweiße Pfauen.

Büchoz, Abhandl. vom Federvieh, p. 16.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 618.

Klein, Vögeleyer, p. 32. weißer Pfau.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 327. Pavo candidus.

Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 1. Pavo albus.

Aldrovand. ornithol. p. 32. Pavo albus.

Linné, fn. Suec. II. p. 71. n. 197. β . Pavo colore
albo.

Latham, Syn. II. i. p. 672.

Latham, Syst. ornith. II. p. 617. β Pavo albus.

Gerin. ornithol. II. p. 74. tab. 218.

Zinnan. Uov. p. 26. tab. 1. fig. 1. Pavone bianco.

Diction. des animaux, III. p. 327.

Jonston, av. p. 58. Pavo albus.

2. BICALCARATUS. Der doppelt gespornte Pfau.

Müller, Naturfyst. II. p. 459. n. 2. der chinesische
Doppelsporn.

Leske,

- Leske*, Naturgesch. p. 221. n. 2. *der Pfau mit doppelten Sporen.*
- Borowsky*, Thierreich, II. p. 163. n. 1. *der doppelt gespornte Pfau*, tab. 26.
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 458. n. 2. *der Pfaufasan.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 113. *ein Pfau in China, der zwey Sporen über einander hat.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 277. *der Pfaufasan.*
- Onomat. hist. nat. VI. p. 218. der Chinesische Pfaufasan.*
- Klein*, av. p. 114. n. 5. *Phasianus pavonius.*
- Klein*, Vorbereit. p. 212. n. 5. *Pfaufasan.*
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 118. *Fasan mit blauen Flecken, Pfaufasan.*
- Klein*, av. p. 114. n. 6. *Phasianus fuscus.*
- Klein*, Vorbereit. p. 212. n. 6. *der braune Fasan.*
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 118. n. 6. *schwarzbrauner Fasan.*
- Briffon*, ornithol. I. p. 82. n. 9. *Paon de la Chine.*
- Büffon*, Vögel, V. p. 275. *der chinesische Pfauenfasan; Spornvogel*, m. 2. figg.
- Batsch*, Thiere, I. p. 424. *Pfauenfasan.*
- Latham*, Syst. ornith. II. p. 617. n. 3. *Pavo (Bicalcaratus) capite subcristato, calcaribus binis.*
- Seligmann*, Vögel, III. tab. 29. *der chinesische Phasanenpfau.*
- Seligmann*, Vögel, III. tab. 33. *die Henne des Phasanenpfauen aus China.*
- Sonnerat*, Reif. n. Ostind. II. p. 135. tab. 99. *der kleine Pfau aus Malacca.*
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 156. n. 2. *Pavo (Bicalcaratus) capite laevi, calcaribus duobus.*
- Bomare*, Dictionn. IV. p. 349.
- Dictionn. des animaux*, II. p. 151.

Hermann,

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. Pavo bicalcaratus.

Doundorff, Handb. d. Thiergesch. p. 319. n. 2. der doppelt gespornte Pfau.

4. TIBETANUS. *Der tibetische Pfau.*

Müller, Naturfyst. II. p. 459. ad n. 2. *Chin-Tchien-Khi*, tab. 19. fig. 1.

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 121. n. 4. der *Chinquis*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 219. *Chin-Tchien-Khi*.

Briffon, ornith. I. p. 83. n. 10. Paon de Tibet.

Büffon, Vögel, V. p. 269. der *Chinquis* oder *Tibetische Pfau*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 617. n. 4. Pavo (Tibetanus) dorso superiore tectricibusque caudae maculis splendide caeruleis, calcaribus binis.

Linne', Syst. Nat. Ed. XII. I. p. 268. n. 2. β Pavo tibetanus.

3. MUTICUS. *Der Pfau ohne Sporen.*

Müller, Naturfyst. II. p. 460. n. 3. der japanische Pfau, tab. 24. fig. 2.

Leske, Naturgesch. p. 221. n. 3. der Pfau ohne Sporen.

Borowsky, Thierreich, p. 167. n. 3. der Japanische Pfau.

Ebert, Naturl. II. p. 113. der japanische Pfau.

Halle, Vögel, p. 430. n. 450. der geschuppte Pfau, mit Livrestreifen.

Onomat. hist. nat. VI. p. 219. der Japanische Pfau.

Briffon, ornith. I. p. 81. n. 8. Paon du Japon.

Büffon, Vögel V. p. 272. der Japanische geschuppte Pfau; der Aehrenträger.

Batsch, Thiere, I. p. 424. der japanische Pfau.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 617. n. 2. Pavo (Muticus) capite crista subulata, calcaribus nullis.

Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 2. Pavo Japonensis.

Diction. des animaux, III. p. 328.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 319. n. 3. der Pfau ohne Sporen.

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 268. n. 2. β Pavo tibetanus. p. 731. n. 4. Pavo tibetanus.

Das Geschlecht ist also mit *einer* Gattung vermehrt, welche vorher als Spielart von der zweyten angenommen wurde.

99. GESCHLECHT. MELEAGRIS. Das Truthuhn.

Müller, Naturfyst. II. p. 461. Gen. XCIX.

Leske, Naturgesch. p. 222. Gen. V.

Borowsky, Thierreich, II. p. 167. Gen. XXVII.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 206. Gen. XI.VI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 459. Gen. LVII.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 306. Gen. XXXVIII.

Briffon, ornith. I. p. 41. Gen. II. Gallo-pavo.

Batsch, Thiere, I. p. 410. Gen. CVIII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 618. Gen. L.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 319. Gen. LXV.

I. GALLOPAVO. *Der Puter.* (8)

Müller, Naturfyst. II. p. 463. *der wilde Truthahn aus Neuengland.*

Leske, Naturgesch. p. 222. n. 1. *das Puterhuhn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 207. n. 1. *Meleagris (Gallopavo) maris pectore barbato; der Kalekuter; Truthahn; Puder.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 169. *die wilden Puter.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 330. n. 1. *das wilde Truthuhn.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 273. n. 94. *das wilde Puterhuhn.*

Ebert, Naturl. II. p. 113. *die Truthühner.*

Halle, Vögel, p. 433. n. 451. *das Indianische Huhn.*

Meyer, Thiere, II. p. 1. tab. 3.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 242. n. 230. *der Kalekuter.*

Neuer Schaupl. der Nat. IV. p. 351. *Kalekutischer Hahn.*

Onomat. hist. nat. V. p. 135. *der welsche Hahn.*

Klein, av. p. 112. n. 1. *Meleagris vulgaris.*

Klein, Vorbereit. p. 208. n. 1. *gemeiner Kalekut.*

Klein, verb. Vögelh. p. 116. n. 1. *gemeiner Kalekuter.*

Klein,

- (8) Ist 1520. zuerst nach Deutschland gebracht. — Die erste genaue Beschreibung von diesem Vogel hat *Oviedo* ums Jahr 1525. gegeben — Im wilden Zustande, wo sie in Herden von 500. angetroffen werden, steigen sie bis auf den Gipfel der höchsten Bäume, und werden von dem Genuß der kleinen rothen Eicheln so fett, daß sie nur noch eine kurze Strecke fliegen können, und bald von einem Reuter überjagt werden. Sie sollen alsdenn oft an 40. Pfund schwer werden. Das Weibchen brütet 26—27. Tage. — In den bewohnten Gegenden von Amerika sind die *wilden Puter* außerordentlich selten geworden, und finden sich nur haufenweise an den entferntesten und unbefuchtesten Oertern.

Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 13. fig. 4.

Briffon, ornith. I. p. 43. B. Dindon sauvage.

Büffon, Vögel, IV. p. 224. die wilden Puter.

Batsch, Thiere, I. p. 418. gemeine Puter.

Latham, Syst. ornith. II. p. 618. n. 1. Meleagris
(Gallopavo) capite caruncula frontali gularique,
maris pectore barbato.

Linne', Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Gallopavo.

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. Gallopavo.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 156. n. 1. Melea-
gris (Gallopavo) capite caruncula frontali, cri-
staque gulari, maris pectore barbato.

Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 2. Gallopavo;
Gallus Indicus, Meleagris.

Moehring, av. gen. p. 51. n. 47. Cenchramus.

Schaefer, element. ornithol. tab. 37.

Zinn, Uov. p. 27. Gallina indiana.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. Meleagris Gal-
lopavo.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 319. der
Puter.

β. Der zahme Puter.

Müller, Naturyst. II. p. 461. n. 1. der kalekutsche
Hahn. tab. 24. fig. 3.

Borowsky, Thierreich, II. p. 168. n. 2. der kale-
kutsche Hahn.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 459. das Truthuhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 306. n. 1.
das gemeine Truthuhn. p. 330. Puterhuhn; Ka-
lekuter; kalekutischer Hahn; gemeiner Kalekut;
Truthuhn; Puter; Puder; wälscher Hahn;
türkischer Hahn; Kuhnahn; indianischer
Hahn; Puthe; Kalkun; Kuurre; Putchen;
Pipe.

Funke, Naturgesch. I. p. 203. das Trut'uhn.

Briffon,

Briffon, ornith. I. p. I. n. I. Dindon.

Büffon, Vögel, IV. p. 190. *der kalekutische Hahn, oder Puter*. Tab. 95. 96.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 240. n. I. *der gemeine Kuhnahn*.

Eberhard, Thiergesch. p. 63. *der welsche Hahn*.

Meidinger, Vorles. I. p. 140. n. I. *das Puterhuhn*. Handb. d. N. G. II. p. 38. *der Kalekuter*.

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 114. *Puterhahn*.

Beckmann, Naturhist. p. 49. n. 2. *der Kalekutische Hahn*.

Gesner, Vögelb. p. 218. *Indianisch Hun*. fig. p. 219. zieml. gut.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 373. *der Kalkaun; Truthahn*.

Cetti, Sardin. II. p. 109. *das Puterhuhn*.

Molina, Chil. p. 210. *Puter*.

Wolf, Zeil. p. 160. *der kalekutische Hahn*.

Taube, Slavon. u. Sym. I. p. 4. *wälsche Hühner*.

Georgi, Russl. p. 442. *welsche Hühner*.

Fermin, Surin. II. p. 143. *der Puter*.

Kolbe, Vorgeb. d. g. H. ed. in 4. p. 388. *Indianische Hühner*.

Knox, Ceyl. p. 57. *calecutische Hähne*.

Adanson, Senegall. p. 250. *kalekutische Hähne*.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. *Kalkon; Truthahn*. Naturforsch. XVII. p. 66. n. 140. *der kalekutische Hahn*.

Neue schwed. Abhandl. X. p. 221. 224.

Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. II. 1. p. 234. *das kalekutische Huhn*.

Lichtenb. u. Voigt, Magaz. VII. 2. p. 154. *calecutischer Hahn*.

Andre u. Bechstein, Spazierg. III. p. 268. 273. *Puter*.

Olla potrida. 1786. 2. St. p. 87.

Beckmann,

Beckmann, Bibl. V. p. 505. VI. p. 391. *der kalekutische Hahn*.

Oekonom. Zool. p. 83. *der kalekutische Hahn*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1332. *Truthahn*.

Loniceri, Kräuterb. p. 643. *Indianischer Hahn*.

Dan. Beckherr, preuß. Messerschlucker, 1636. p. 22. f.

Beckmann, Beytr. zur Gesch. d. Erfind. III. p. 244. *Kalekuter*.

Kramer, Austr. p. 355. n. 1. Meleagris; *Indianisch Piphun*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 279. Gallopavus; *Calecutisch Hun*.

Du Tertre, hist. des Antill. II. p. 265. Poule d'Inde.

Salerne, ornithol. p. 132.

De Lery, voyag. au Brésil. p. 171.

Lawson, hist. Carol. p. 27. und 149.

Du Pratz, Louisian. II. p. 85.

Ruffel, Alepp. p. 63.

Tavernier, voyag. p. 146.

Purchas, Pilgr. III. p. 995.

Dampier, voyag. Vol. III. P. II. p. 65. 85. 114.

De Laet, descr. Ind. p. 74. 83. 91. 491.

Lopez de Gomara, Hist. de Mexico. p. 343. *Galipavos*.

Anderson, Gesch. des Handels, III. p. 518. IV. p. 131. 189.

Borkhausen, Magazin, I. p. 213. n. 90.

Bomare, Diction. III. p. 313. Coq d'Inde.

Encycl. Oeconom. VI. p. 329. Coq et Poule d'Inde; Paon d'Inde.

Cours d'hist. nat. III. p. 58. Coq d'Inde.

Diction. des animaux I. p. 699.

Chardin, voyag. III. c. 9. p. 38.

Gerin, ornithol. II. p. 75. tab. 222 — 226.



Hannöv. Magaz. 1777. p. 1246. hartes Leben eines Truthahns.

Petit, descript. anatomique de l'Oeil du Coq d'Inde. Mem. de l'Acad. de Par. 1735. p. 163. Mit Abbild.

Gahrliap, de ovo Gallo-pavi, ut raro sic monstroso. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. 5. et 6. obs. 164. p. 374.

Zink: Leipzig. Samml. VIII. p. 959. von welschen Hühnern.

Hannöv. Magaz. 1776. p. 767. u. 1470. vom Brüten des Puterhahns.

Nachr. d. Schles. patriot. Gesellsch. I. p. 306. III. p. 4. von Erziehung der Puter.

Journ. Encycl. 1768. V. 2. p. 129. — Berlin. Samml. IV. p. 574. Schwedische Art, die jungen Puter zu erziehen.

Stutg. ökonom. physf. Ausz. II. p. 529. vom Mästen der welschen Hühner.

Physik. ökonom. Patriot. III. p. 314.

Allgem. Haushalt. u. Landwissensch. I. p. 837. ff.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 91.

Allgem. Harzmagaz. I. p. 33. ff. 103. ff.

Preuss. Sammler, I. p. 152.

γ. Der gehäubte Puter.

Müller, Naturyst. II. p. 464. b. der Haubentruthhahn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 332. n. 5. das Puterhuhn mit dem Federbusche.

Halle, Vögel, p. 433. n. 452. das Indianische Huhn, mit weißem frisirten Federbusche auf dem Kopfe.

Klein, av. p. 113. n. 2. Meleagris, Gallo-pavo cristatus.

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 210. n. 10. *Kurre mit Straußfedern.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 117. n. 2. *Kurre mit Straußfedern.*

Briffon, ornith. I. p. 43. A. Dindon hupé.

Büffon, Vögel, IV. p. 225. *der gehäubte Puter.*

Wöchentl. Danzig. Erfahrungen, 1746.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 157. γ. *Gallopavo cristatus.*

δ. *Der kupferfarbene Puter.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 331. n. 4. *das kupferfarbene Truthuhn.*

ε. *Der weiße Puter.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 331. n. 3. *das weiße Truthuhn mit rothem Kopfe und schwarzem Haarbüschel auf der Brust.*

ζ. *Das Bastardtruthuhn. **

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 332. n. 6.

η. *Eine eigene Spielart von zahmen schwarzen, verwilderten Truthühnern. **

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 331. n. 2.

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 269. n. 2. Meleagris Cristata p. 733. n. 2. Penelope Cristata.

p. 269. n. 3. Meleagris Satyra. p. 733. n. 1. Penelope Satyra.

In der XII. Edit. bestand dies Geschlecht aus drey Gattungen; da aber die beyden letztern in der XIII. zum folgenden Geschlechte gezählt worden sind, so hat ersteres nun um so viel weniger. Bey der ersten Gattung sind die Varietäten δ und ε hinzugekommen.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.

PENELOPE. *Die Penelope.**Bechstein*, Naturgesch. I. p. 461. Gen. I. VIII.*Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 187. Gen. LXVIII.*Latham*, Syst. ornith. II. p. 619. Gen. LI.*Donnerhoff*, Handb. der Thiergesch. p. 320. Gen. LXVIII.I. SATYRA. *Der Napaul.**Müller*, Naturyst. II. p. 464. n. 3. *der bengalische Truthahn.**Leske*, Naturgesch. p. 222. n. 3. *der gehörnte Truthan; der Napol.**Borowsky*, Thierreich, II. p. 168. n. 2. *das gehörnte Truthuhn*, Tab. 27.*Bechstein*, Naturgesch. I. p. 461. *Napol.**Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 187. *der Napol.**Ebert*, Naturl. II. p. 112. *der gehörnte indianische Fasan.*Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 769. n. 7. *gehörnter Fasan.*Onomat. hist. nat. V. p. 139. *der gehörnte Fasan.**Klein*, verbess. Vögelhistor. p. 118. n. 7. *gehörnter Fasan.**Briffon*, ornith. I. p. 86. n. 17. *Faisan cornu de Bengale.**Büffon*, Vögel, V. p. 259. *der gehörnte Fasan oder Napaul*, m. e. Fig*Batsch*, Thiere, I. p. 418. *das gehörnte Truthuhn.**Latham*, Syn. Suppl. p. 203. *Horned Turkey.**Latham*, Syst. ornithol. II. p. 619. n. 2. *Meleagris (Satyra) capite cornibus geminis, corpore rubro, punctis ocellatis.*

Seligmann, Vögel, V. tab. 2. *der gehörnte indische Fasan.*

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 157. n. 3. Meleagris (Satyra) capite cornibus duobus, corpore rubro, punctis nigris, albo foetis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 169. Meleagris Satyra.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 320. n. 1. *der gehörnte Fasan.*

2. CRISTATA. *Der Quan.* (9)

Müller, Naturfyst. II. p. 464. n. 2. *der brasiliensche Truthahn.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 122. n. 2.

Leske, Naturgesch. p. 222. n. 2. *das brasiliensche Truthuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 170. n. 3. *das Brasilianische Truthuhn.*

Halle, Vögel, p. 435. n. 454. *der dunkelbraune Fasan; Jacupema.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 96. *Guan; der dunkelbraune Fasan.*

Klein, av. p. 112. n. 4. Alektor Brasilienfis, Guan f. Guan Indis.

Klein, Vorbereit. p. 207. n. 4. *brasilianischer Hahn.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 115. n. 4. *Brasilianer.*

Klein, av. p. 114 n. 2. Phasianus fuscus brasiliensis.

Klein, Vorbereit. p. 211. n. 2. *der braune Brasilianische.*

Klein, verb. Vögelh. p. 118. n. 2. *brauner Brasilianer.*

Briffon, ornith. I. p. 43. n. 2. Dindon du Brésil.

Büffon, Vögel, V. p. 302. 304. *der Guan oder Quan.*

Batsch, Thiere, I. p. 418. *das brasilianische Trut-*
huhn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 619. n. 1. Penelope
(Cristata) capite pennis erectis cristato, tempo-
ribus violaceis.

Seligmann, Vögel, I. tab. 25. *der in Westindien*
so genannte Quan, oder Guan; der brasiliani-
sche Fasan.

Schlözer, Erdbeschr. von Amer. p. 685. *der Quan.*
Linneé, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 157. n. 2. Meleagris
(Cristata) capite pennis erectis cristato, tempo-
ribus violaceis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. Meleagris Cri-
stata.

Jonston, av. p. 194. Jacupema.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 321. n. 2.
der brasilianische Fasan.

3. CUMANENSIS. *Der Jaku.*

Büffon, Vögel, V. p. 300. *der Jaku*, m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 620. n. 3. Penelope
(Cumanensis) nigricans, capite cristato, tempo-
ribus gulaque caeruleo-nigricantibus.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 603. Jaku, Cu-
jovit.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 321. n. 3.
der weißgehaubte Fasan.

4. PIPILE. *Die schwarzbäuchige Penelope.*

Latham, Syn. Suppl. p. 205. Piping Curassow.

Latham, Syst. ornith. II. p. 620. n. 2. Penelope
(Pipile) caruncula gulari caerulea, ventre atro,
dorso fusco atro maculato.

5. MARAIL. *Der Maraye.* (10)

Müller, Naturphys. Suppl. p. 125. n. 10. Marail.

Büffon,

(10) *Büffon* vermuthet, er sey das Weibchen oder eine Abände-
rung vom *Jaku*. (Cr. Cumanensis.)

Büffon, Vögel, V. p. 306. *der Marail, oder grünliche Kayennische Fasan*, m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 620. n. 4. *Penelope* (Marail) capite subcristato, temporibus gulaeque incarnatis carunculatis.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 602. *der Maraye. Fermin*, Surin. p. 129. *Maray*.

Barrere, Fr. equinox. p. 139. *Phasianus niger*, aburus, viridi rostro.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 321. n. 4. *der grünliche cayennische Fasan*.

6. VOCIFERUS. *Der Schreyvogel.*

Büffon, Vögel, V. p. 312. *der Schakamel oder Chakamel*.

Onomat. histor. nat. II. p. 802. *Chachalacametl*, p. 802. *Schreyvogel*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 625. n. 5. *Crax* (Vociferans) fusca, rostro pedibusque cyaneis, abdomine albido.

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das ganze Geschlecht ist hier neu. Die erste und zweyte Gattung sind aus dem vorhergehenden Geschlechte hieher versetzt; die übrigen vier sind neu hinzugekommen.

100. GESCHLECHT. CRAX. *Der Hoko. (Buschhuhn.)*

Müller, Naturyst. II. p. 465. Gen. C.

Leske, Naturgesch. p. 223. Gen. VI.

Borowsky, Thierreich, II. p. 170. Gen. XXVIII.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 206. Gen.

XLV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 461. Gen. LIX.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 187. Gen. LXIX.

Onomat. hist. nat. III. p. 458.

Latham, Syst. ornith. II. p. 622. Gen. LIII.

Batsch, Thiere, I. p. 411. Gen. CXI.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. 169.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 322. Gen. LXVII.

I. ALECTOR. *Der Curaffo.*

Müller, Natur Syst. II. p. 464. n. 1. *der guajanische Pauweis.*

Leske, Naturgesch. p. 223. n. 1. *der Hoko von Guiana.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 170. n. 1. *der guianische Hokko*, tab. 28.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 206. n. 1. Crax (Alector) cera flava, corpore nigro, ventre albo; *der Curaffo.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 462. *der guianische Hoko.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. I. p. 187. *der guianische Hoko.*

Onomat. hist. nat. III. p. 460. Crax Gujanensis.

Halle, Vögel, p. 424. n. 445. *das schwarze dünnleibige Huhn aus Indien.*

Klein, av. p. 111. n. 3. Alector Curassaus? Mitu-poranga.

Klein, Vorbereit. p. 206. n. 3. *Indianischer Hahn.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 115. n. 3. *Kurassauer.*

Briffon, ornithol. I. p. 84. n. 12. Hocco de la Guiane.

Büffon, Vögel, V. p. 281. *der eigentlich so genannte Hokko.* M. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 423. *der guianische Hokko.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 622. Crax (Alector)
cera flava, corpore nigro, ventre albo. (*mas*).

Bankroft, N. G. von Guian. p. 104. *der Pfauen-
fasan von Guiana.*

Schlözer, Erdbeschr. von Amer. p. 228. Curasoe.

Schneider, zool. Abh. p. 139. *indianische Hahn.*

Perrault, *Charias u. Dodart*, Abhandl. a. d. N.

G. I. p. 259. anatomische Beschr. dreyer india-
nischer Hähne, tab. 34. *der indianische Hahn*;
tab. 35. die Zergliederung.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 131. n. 163. *der
schwarze indianische Hahn.*

Neue Mannigfalt. III. p. 608. *Kurassovogel*, *Ku-
rassavische Pfauenfasan*, *Kuskovogel*, fig. p.
624.

Linne, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Crax.

Linne, Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. Crax niger,
corolla albo nigroque varia.

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 157. n. 1. Crax (Ni-
gra) nigra.

Moehring, av. gen. p. 51. n. 46. Crax.

Jonston, av. p. 191. Mituporanga.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 322. n. 1.
Der Curasso.

ß. MITU. *Der brasilianische Hoko.*

Müller, Natur Syst. II. p. 466. n. 3. *der brasiliani-
sche Pauwis.*

Onomat. hist. nat. III. p. 458. *der brasilianische
Nachtwächter.*

Klein, av. p. 112. Alector Mitu vel Mutu.

Klein, Vorbereit. p. 207. *Mitu oder Mutu.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 115. *Mitu.*

Briffon, ornith. I. p. 83. n. 11. Hocco du Brésil.

Büffon, Vögel, V. p. 285. *brasilianischer Hokko*,
p. 286. *Mitu.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 623. β . Cr. cera rubra, corpore nigro, abdomine fusco.

Latham, Syn. II. 2. p. 691. Var. A.

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 3. Crax niger corolla atra, rostro rubro.

Barrere, ornithol. p. 83. Crax niger, crista tota atra, rostro cinnabrino.

Forster, av. p. 180. Mutu.

γ . Der Curasso mit weißer Schwanzspitze.

Latham, Syn. II. 2. p. 692. Var. B.

Latham, Syst. ornith. II. p. 623. γ .

δ . Der Curasso mit weißem, schwarz gespitztem Federbusch.

Latham, Syn. II. 2. p. 692. Var. C.

Latham, Syst. ornith. II. p. 623. δ . Cr. cera flava, corpore nigro, crista alba, apice nigra, collo albo nigroque fasciato.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 131. α .

b. RUBRA. Der (so genannte) peruvianische Hoko.

Müller, Naturfyst. II. p. 466. n. 2. der Peruviansche Pameis.

Halle, Vögel, p. 426. n. 446. das rothe Huhn aus Indien.

Klein, av. p. 112. ed. n. 4. Albin Gallina.

Briffon, ornith. I. p. 86. n. 16. Hocco du Perou.

Büffon, Vögel, V. p. 283. peruanische Hokko.

Latham, Syn. II. 2. p. 693.

Latham, Syst. ornith. II. p. 623. n. 1. Crax (Alektor) rubra, capite caerulecente, crista alba, apice nigra. (femina.)

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 157. n. 2. Crax (Rubra) rubro capite caerulecente.

Gerini, ornithol. II. p. 77. tab. 227. Gallopavo brasiliensis.

e. *Latham*,

ε. *Latham*, Syn. II. 2. p. 693. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 624. β. Cr. corpore rubro, collo albo nigroque annulato, abdomine albo, cauda fusca.

ζ. *Latham*, Syn. II. 2. p. 693. Var. B.

Latham, Syst. ornith. II. p. 624. γ. Cr. corpore toto fusco rubro, lutescenteque fasciato.

η. *Latham*, Syn. II. 2. p. 693. Var. C.

Latham, Syst. ornith. II. p. 624. δ. Cr. corpore fusco rubro, collo albo nigroque annulato, cauda fasciis novem luteis nigro marginatis.

4. GLOBICERA. *Der schwarzbläuliche Curaffo, mit kirschförmiger Kugel auf dem Stirnbein.* (1)

Müller, Naturyst. II. p. 467. n. 4. *der Curassauische Pauwis.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 171. n. 2. *der Curassauische Hokko.*

Onomat. hist. nat. III. p. 459. *Crax curassavicus.*

Klein, av. p. III. ad n. 3. *Gallus alius indicus.* p. 112. *Gallina indica.*

Klein, Vorbereit. p. 207. *Die indische Henne.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 115. ad n. 3. *Gallus indicus.* *Gallina indica.*

Brisson, ornith. I. p. 85. n. 13. *Hocco de Curassow.*

Büffon, Vögel, V. p. 282. 285. 291.

Batsch,

- (1) Mit diesem Vogel scheint es noch nicht so ganz aufs Reine zu seyn, ob er wirklich eine eigene Gattung ausmache oder nicht. *Brisson* und *Büffon*, u. a. m. halten ihn dem Bedenken mit dem *Alector* für einerley; und *Edwards* sagt selbst, daß sein *Curassow Bird* der *Mitaporanga* des *Marcgr.* sey. Auch finde ich bey *Seligmann*, *Dodart* mem. III. p. 223. als Synonym citirt. Hiezu kommt, daß, wie *Edw.* sagt, der Knopf auf dem Schnabel erst nach dem ersten Jahre erscheint, und *Fernandez* an seinem *Tepetotoil* ebenfalls einen Höker auf dem Schnabel wahrgenommen, der vielleicht eben diesen in der ersten Bildung begriffnen Knopf vorstellte.

Batsch, Thiere, I. p. 423. *der Kurassische Hokko.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 624. n. 2. Crax (Globicera) flava, narium gibbere globoso, corpore nigro-caerulescente, abdomine imo albo.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 85. *der Curassovogel.*

Scopoli, Bern. a. d. N. G. I. p. 132. b. *das indianische Huhn.*

Jonston, av. p. 84. Gallus indicus alter.

Gerin. ornithol. II. p. 79. tab. 229.

5. PAUXI. *Der Pauxi.*

Müller, Naturfyst. II. p. 468. n. 5. *der mexicanische Pauwis.*

Leske, Naturgesch. p. 223. n. 2. *der Pauxi, Kusko.*

Borowky, Thierreich, II. p. 172. n. 3. *der Mexikanische Hokko.*

Onomat. hist. nat. III. p. 460. *der Hocco-Vogel von Mexico.*

Klein, av. p. 112. Pauxi Nierenbergii.

Klein, Vorbereit. p. 207. *der Pauxi.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 115. ad n. 3. *Pauxi.*

Briffon, ornith. I. p. 85. n. 14. Hocco du Mexique.

Büffon, Vögel, V. p. 293. *der Pauxi, Kusko, Steinvogel von Kayenne.* M. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 423. *Kusko.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 624. n. 3. Crax (Pauxi) cera caerulea, narium gibbere cristato, corpore nigricante, abdomine apiceque caudae albis.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 85. *der Cusco.*

Murr, Reis. d. Missionar. p. 230. *der Pauxi.*

Neue Mannigfalt. II. p. 601. *der Kuskusvogel, oder mexikanische P/auenfasan.* M. e. Fig.

Jonston, av. p. 84. Gallina indica altera.

Donn.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 322. n. 2.
der Pauxi.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 270. n. 2. Crax rubra. p. 736. b. Cr. Alektor. Femina.

p. 270. n. 3. Crax Mitu. p. 736. β. Cr. Alektor. Var.

Auf diese Art hat das Geschlecht jetzt drey Gattungen weniger, als vorhin. Bey der ersten sind die Var. β. bis η. hinzugekommen.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Hoko mit hornartigem Gewächs auf dem Scheitel.*

Briffon, ornith. I. p. 87. n. 18. Crax vertice cono corneo onusto, *Hocco à tête calleuse*.

Latham, Syn. Suppl. p. 206. Galeated Curassow.

Latham, Syst. ornith. II. p. 624. n. 4. Crax (Galeata) vertice corneo, corpore nigro, crisso albo.

101. GESCHLECHT. PHASIANUS. *Der Fasan.*

Müller, Naturfyst. II. p. 469. Gen. CI.

Leske, Naturgesch. p. 223. Gen. VII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 173. Gen. XXIX.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 204. Gen. XLIV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 463. Gen. LXI.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 333. Gen. XXXIX.

Onomat. hist. nat. VI. p. 431.

Briffon, ornith. I. p. 44. Gen III.

Batsch,

Batsch, Thiere, I. p. 410. Gen. CX.

Latham, Syst. ornith. II. p. 625. Gen. LIV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 322. Gen. LXVIII.

I. GALLUS. *Der Hahn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 625. n. 1. *Phasianus* (Gallus) caruncula compressa verticis geminaque gulae, auribus nudis, cauda compressa adscendente, pennis colli linearibus elongatis, apice membranaceis.

Sonnerat, Reif. nach Ostind. u. China. II. p. 116.

der wilde Hahn und die wilde Henne. tab. 94. 95.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 395. *der wilde Hahn.*

β. DOMESTICUS. *Der gemeine Haushahn; gemeine Huhn.*

Müller, Naturfyf. II. p. 469. n. 1. *der Haushahn.*

Leske, Naturgesch. p. 224. n. 1. *das gemeine Huhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 177. n. 5. *der Haushahn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 204. n. 1. *Phasianus* (Gallus) caruncula compressa verticis geminaque gulae, auribus nudis, cauda compressa adscendente.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 463. n. 1. *das gemeine Huhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 334. n. 1. *das gemeine Haushuhn.*

Funke, Naturgesch. I. p. 194. *das Huhn.*

Halle, Vögel, p. 418. n. 437. *das Haushuhn.*

Meyer, Thiere, I. Tab. 75. *das Huhn*, — tab.

76. *das Gerippe von Färberröthe roth*, — tab.

77. *Gerippe weiß von einem vierfüßigen Huhn*,

— tab. 78. *dreyfüßige Hähn mit dem Gerippe.*

Gatterer,

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 244. n. 233. *der Haushahn*.

Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 622. *Hahn*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 437. *der Haushahn*.

Beckmann, Naturhist. p. 49. n. 3. a. *der gemeine Haushahn*.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 27. *der Hahn*.

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 114. *der Haushahn; Gockel, Geker*.

Sander, oekon. Naturgesch. II. p. 14. *der Haushahn*.

Walther, oekon. N. G. Deutshl. p. 135. *Haus-Hahn*.

Klein, av. p. III. A. 1. Alector.

Klein, Vorbereit. p. 206. n. 1. *Nachtwächter*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 114. n. 1. *Haushahn; Kräher*.

Klein, Vögeleyer, p. 31. tab. 13. fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 160. *Han*, fig. p. 161. gut. p. 177. *Capaun, oder Caphan*. M. e. gut. Fig. p. 180. *Henne*. M. e. gut. Abbild.

Briffon, ornith. I. p. 45. n. 1. Le coq et la Poule.

Büffon, Vögel, IV. p. 78. *der Haushahn und die Henne*. M. 2. Figg.

Batsch, Thiere, I. p. 420. *der gemeine Hahn*.

Latham, Syn. II. 2. p. 700. Domestic Cock,

Latham, Syst. ornith. II. p. 626. n. 1. β . Gallus domesticus, caruncula compressa verticis geminaque gulae, auribus nudis, cauda compressa adscendente, pennis colli linearibus elongatis.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 379. *das zahme Huhn*.

Cetti, Sardin. II. p. 101. *das Huhn*.

Molina, Chili, p. 209. *die Haushühner*.

Niebuhr, Besch. von Arab. p. 168. *Hüner*.

Wolf,

Wolf, Ceyl. p. 137. *der Hahn*.

Olaassen, Isl. I. p. 118. *Hüner*.

Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffn. Ed. in 4. p. 388.

Hahnen und Hühner.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 1. *Hane*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 148. *Höns*.

Fermin, Surin. II. p. 138. *Haushuhn*.

Taube, Slavon. I. p. 40. *Hennen*.

Adanson, Senegall. p. 250. *Hühner*.

Allgem. Reif. IV. p. 265. 388.

Bosmann, Reif. n. Guinea, p. 240.

Borkhausen, Magaz. I. p. 213. n. 91.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 240. n. 1. *der Haushahn*.

Eberhard, Thiergesch. p. 63. n. 1. *der Haushahn*.

Merklein, Thierreich, p. 283. *Hänne*.

Meidinger, Vorles. p. 141. n. 1. *das gemeine Huhn*.

Naturforsch. XVII. p. 68. *der Haushahn*.

Krünitz, ökonom. Encykl. XXVI. p. 1. *Huhn*.

Oekonom. Zool. p. 84. n. 25. *der Haushahn*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 424. *Hahn*.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 133. n. 164. *der Haushahn*.

Beckmann, Bibl. VI. p. 385. *der Haus-Hahn*.

Allgem. Haushalt. u. Landwissensch. I. p. 824.

Beckmann, deutsche Landwirthsch. p. 471.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Gallina*.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 1. *Gallus gallinaceus*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. n. 1. *Phasianus* (*Gallus*) *cauda compressa ascendente*.

Kramer, Austr. p. 355. n. 1. *Gallus cauda compressa ascendente*. *Han*.

Charleton, onom. zoic. p. 75. n. 17. *Gallus Gallinaceus*.

Charles.

Charleton, exercit. p. 84. *Gallus Gallinaceus*.

Belon, hist. nat. des Ois. p. 242. Coc, Coq, Gau,
Geau, Gal, Gog.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 264. *Gallus domesticus*.

Han. p. 266. *Gallina villatica*; *Henne*, Hun.

Moehring, av. gen. p. 52. n. 49. *Gallus*.

Rzaczyński, hist. nat. Polon. p. 432. *Gallus gallina-*
ceus.

Jonston, av. p. 72. *Gallus gallinaceus*.

Schäfer, element. ornithol. tab. 38.

Gerini, ornithol. II. tab. 207. 208.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 1. n. 58. c. 2. n. 1. 28.

c. 3. n. 39. 45. c. 4. n. 49. *Αλεκτοριδες*.

Aelian. de nat. anim. L. 4. c. 29. *Αλεκτεων*. L.

3. c. 38. L. 4. c. 16. *Αλεκτοριδες*.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 21. c. 50. c. 56. *Gallus*;
Gallina.

Varro, de re rust. L. 3. c. 9. *Gallinae villaticae*.

Columella, de re rust. L. 8. c. 2. *Gallina rustica*.

Palladius, de re rust. L. 1. c. 27. *Gallina*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 323. n. 1.
der Haushahn.

γ. CRISTATUS. *Das Haubenhuhn.*

Müller, Naturyst. II. p. 470. a. *Haubenhuhn*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 178. a. *der Hauben-*
hahn; *geschopfte Hahn*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 398. n. 2.
das Haubenhuhn.

Briffon, ornith. I. p. 45. A. Coq hupé.

Büffon, Vögel, IV. p. 154. *der Haubenhahn*, oder
die gehäubte Henne. tab. 86.

Latham, Syn. II. 2. p. 703. Crested Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 626. n. 1. γ. *Gallus*
domest. cristatus, crista in vertice plumosa den-
fissima.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. II. n. 2. *Haubenhahn*,
Buschhahn.

Siemssen, meklenb. Vögel. p. 243. a. *der Hauben-*
hahn.

Onomat. hist. nat. VI. p. 440. n. 1. *die gehaubte Henne*.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. *Tophöns*.

Borkhausen, Magaz. I. p. 214. *ß*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. *ß*. *Gallus cri-*
status, crista in vertice plumosa densissima.

Linné, fn. Suec. II. p. 72. *ß*. *Gallina* crista in
vertice plumosa densissima, et undequaque dif-
fusa spectabilis.

Gerin. ornithol. II. tab. 216.

- a. *Das weiße Huhn mit schwarzem Federbusche.* *
 - b. *Das schwarze Huhn mit weißem Federbusche.* *
 - c. *Das goldfarbige Goldlackhuhn.* *
 - d. *Das silberfarbige Silberlackhuhn.* *
 - e. *Das achat- oder chamoifarbige.* *
 - f. *Das schieferblaue.* *
 - g. *Das geschuppte oder hermelinartige.* *
 - h. *Die Wittwe, mit kleinen weißen Perlen auf bräun-*
lichem Grunde. *
 - i. *Das feuerfarbige.* *
 - k. *Das steinfarbige Huhn.* *
 - l. *Das weiße Huhn mit dem großen Barte.* *
- Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 401. 402.

δ. PENTADACTYLUS. *Das fünfzehige Huhn.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 410. n. II.
das fünfzehige Huhn.

Briffon, ornith. I. p. 46. B. Coq à cinq doigts.

Büffon, Vögel, IV. p. 169. *das fünfzeigige Huhn.*

Latham, Syn. II. 2. p. 703. *Darking Cock*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 626. n. 1. δ. *Gallus*
pentadactylus, domesticus, quinque digitis in
utroque pede.

Krünitz,

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 17. n. 17. *das fünfzehige Huhn.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 214. γ.

ε. CRISPUS. *Das Strupphuhn.* (2)

Müller, Naturyst. II. p. 470. e. *das Kraushuhn.*

Borowsky, Thierreich. II. p. 180. f. *der Straubhahn.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 205. c. *das krause Huhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 405. n. 5. *das Strupphuhn, Straubhahn, Krullhahn, frisirter Hahn, türkischer Hahn; frißländischer Hahn mit krausen lockigen Federn.*

Halle, Vögel, p. 422. n. 443. *das krause Huhn mit umgekehrten Federn.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 441. n. 8. *das Kraushuhn.*

Gesner, Thierb. p. 220. *Hüner, so da Wollen tragen, m. e. mittelm. Fig.*

Eberhard, Thiergesch. p. 63. n. 3. *die straubige Henne.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 243. β. *der Strupphahn.*

Briffon, ornith. I. p. 46. n. 3. *Coq frisé.*

Büffon, Vögel, IV. p. 163. *der Straubhahn, Kraußhahn, tab. 87.*

Latham, Syn. II. 2. p. 704. *Crisped Cock.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 626. n. 1. ε. *Gallus crispus, pennis sursum reflexis.*

Pontoppidan, Dännem. p. 172. *Purrhöns.*

Cetti, Sardin. II. p. 101. *das Straubhuhn.*

Bankroft, Guian. p. 106. *Hüner mit schuppichten und ungleichen Federn.*

Neue Mannigfaltigk. III. p. 308. *Hüner mit gekräuselten Federn.*

D 2

Linné,

(2) Nach Briffon eine eigene Gattung.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. ♂. Gallus crispus.

Linne', fn. Suec. II. p. 72. ♂. Gallina crispa, nostratibus Frislandica, pennis reflexis caput versus et velut inversis, *Krullhaena*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 269. Gallina lanigera?

Gerin. ornithol. II. p. 71. tab. 215. Gallus cincinnatus.

♂. **ECAUDATUS.** *Das Kluthuhn.* (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 470. b. das ungeschwänzte Huhn.

Borowsky, Thierreich, II. p. 181. n. 1. der Kluthuhn.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 505. b. der Kluthuhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 402. n. 3. das Kluthuhn; ungeschwänzte Huhn; Kaularsch; persische und virginische Huhn.

Halle, Vögel, p. 421. n. 439. das ungeschwänzte Huhn.

Onomat. hist. nat. VI. p. 441. n. 5. das ungeschwänzte oder persische Huhn.

Briffon, ornithol. I. p. 48. n. 5. Coq sans croupion, ou de Perse.

Büffon, Vögel, IV. p. 167. der Kluthuhn, tab. 91.

Latham, Syn. II. 2. p. 705. Rumpless or persian Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 627. ♂. Gallus ecaudatus, cauda seu uropygio carens.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 16. n. 16. der Kluthuhn.

Siemsen, meklenb. Vögel, p. 243. γ. der Kluthuhn, *Bollhes*.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. Gomphön.

Borkhausen, Magaz. I. p. 215. ε. Gumbert.

Linne',

(3) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. γ. Gallus ecaudatus.

Linne', fn. Suec. II. p. 72. γ. Gallina cauda five uropygio carens, *Gumphöns*.

η. PUMILIO. *Das Zwerghuhn*. (4)

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 123. d. das Kriechhuhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 403. n. 4. das Zwerghuhn; holländische Hühnchen; Canishühnchen.

Briffon, ornith. I. p. 46. n. 2. Coq nain.

Büffon, Vögel, IV. p. 157. das kleine Javanische Zwerghuhn.

Latham, Syn. II. 2. p. 705. Dwarf Cock.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 627. η. Gallus pumilio, pedibus brevissimis.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 12. n. 5. das kleine Javanische Zwerghuhn.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 243. δ. der Zwerghahn; Krüper.

Borkhausen, Magazin, I. p. 215. ξ. Kruphahn.

Gerin. ornithol. II. p. 70. tab. 214.

θ. PUSILLUS. *Das englische Zwerghuhn*.

Müller, Naturfyst. II. p. 470. f. das Zwerghuhn.

Borowsky, Thierreich, II. p. 179. c. das englische Zwerghuhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 404. c. Bantamhühner.

Halle, Vögel, p. 420. n. 438. das kriechende Huhn, mit ganz kurzen Schenkeln.

Onomat. hist. nat. VI. p. 442. n. 9. das Zwerghuhn.

Briffon, ornith. I. p. 47. B. Coq de Bantam.

Büffon, Vögel, IV. p. 158. der Hahn von Bantam; englische Zwerghahn.

Latham, Syn. II. 2. p. 706. Bantam Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 627. *♀*. *Gallus pusillus*,
tibiis pennatis, pennis posticis elongatis.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 13. n. 8. *der Hahn*
von Bantam; gestiefelte, rauchfüßige Hahn;
Kriechhahn; Kruphahn.

Borkhausen, Magaz. I. p. 215. *η*. *Zwerghahn.*

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. *ε*. *Gallus pusil-*
lus, tibiis pennatis.

Gerin. ornithol. II. tab. 212.

i. PLUMIPES. *Das rauchfüßige Huhn.*

Briffon, ornith. I. p. 47. A. Coq patu.

Latham, Syn. II. 2. p. 706. Roughfooted Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 627. *i*. *Gallus plumi-*
pes, pedibus ad digitos usque plumosis.

Gerin. ornithol. II. tab. 212.

Borkhausen, Magaz. I. p. 216. *♀*.

x. TURCICUS. *Das türkische Huhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 180. *e*. *das türki-*
sche Huhn.

Halle, Vögel, p. 421. n. 440. *das Türkische Huhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 407. n. 8.
das Türkische Huhn.

Onomat. hist. nat. VI. p. 440. n. 3. *das türkische*
Huhn.

Briffon, ornith. I. p. 46. D. Coq de Turquie.

Büffon, Vögel IV. p. 161. *der Türkische Hahn.*

Latham, Syn. II. 2. p. 707. Turkish Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 627. *k*. *Gallus turci-*
cus, pulchris coloribus variegatus.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 14. n. 11. *der türki-*
sche Hahn.

Borkhausen, Magazin, I. p. 216. *i*.

λ. PATAVINUS. *Das paduanische Huhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 181. *k*. *das paduani-*
sche Huhn.

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 408. n. 9.
das *Paduanische Huhn*; *große welsche Huhn*;
Hahn von Caux.

Onomat. hist. nat. VI. p. 440. n. 2. das *große welsche Huhn*.

Briffon, ornith. I. p. 46. C. Coq de Padoue.

Büffon, Vögel, IV. p. 170. das *Paduanische Huhn*.

Latham, Syn. II. 2. p. 707. Paduan Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. λ. Gallus Patavinus corpore duplo maiore.

Krinitz, Encykl. XXVI. p. 17. n. 19. der *paduanische Hahn*.

Gerin, ornithol. II. p. 66. tab. 209. 210.

Encycl. oecon. XIII. p. 27. Poule de Mirebalais.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 266. Gallus maior exoticus, *Paduanischer Hahn*.

μ. MORIO. Das *Mohrenhuhn*. (5)

Müller, Naturyst. II. p. 470. c. das *Mohrenhuhn*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 180. h. das *Mohrenhuhn*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 205. ε. das *Negerhuhn*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 408. n. 10. das *Mohrenhuhn*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 441. n. 7. das *schwarze oder Mohrenhuhn*.

Briffon, ornith. I. p. 48. n. 4. Coq negre ou de Mozambic.

Büffon, Vögel, IV. p. 165. das *Mohrenhuhn*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 216 k. Gallus Aethiops.

Latham, Syn. II. p. 708. Negro Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. μ. Gallus Morio, crista et palearibus nigris.

D 4

Krinitz,

(5) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 16. n. 15. *das schwarze oder Mohrenhuhn.*

Naturforsch. XVIII. p. 239. *Mohrenhühner.*

Isenflamm, pract. Anmerk. über die Muskeln, p. 398.

v. NIGER. *Das schwarze Huhn.*

Ist, nach Latham, mit dem vorhergehenden einerley. Ich habe auch außer dem Gmelinschen, kein Synonym weiter finden können.

ξ. TOPHACEUS. *Das beulenstirnige Huhn.*

Pallas, N. G. merkwl. Th. IV. p. 20. *Hühner mit Beulen auf dem Scheitel*, tab. 3.

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. v. *Gallus tophaceus*, vertice tuberoso.

o. LANATUS. *Das Wollhuhn.* ⁽⁶⁾

Müller, Naturfyst. II. p. 470. d. *das Straubhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 180. g. *das Japanische Huhn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 205. d. *das Wollhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 406. n. 6. *das Wollhuhn.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 441. n. 6. *das Straubhuhn.*

Briffon, ornith. I. p. 48. n. 6. *Coq du Japon.*

Latham, Syn. II. 2. p. 708. *Silk-Cock.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. o. *Gallus lanatus*, pennis pilorum aemulis.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 15. n. 14. *das japanische Huhn.*

Folgender, vielleicht noch hierher gehörigen Varietäten finde ich in unsrem System nicht gedacht.

a. *Der asiatische wilde Hahn.*

Büffon, ois. ed. in 8. p. 166. *Coq sauvage de l'Asie.*

Büffon,

(6) Nach Briffon eine eigne Gattung.

Büffon, Vögel, IV. p. 156. *der afiatifche wilde Hahn.*

b. *Der Akoho.*

Büffon, l. c. p. 167. *Acoho, ou Coq de Madagafcar.*

Büffon, Vögel, IV. p. 157. *der Akoho; der Hahn von Madagafcar.*

Bechstein, Naturgefch. Deutchl. III. p. 410. n. 14. *der Hahn von Madagafkar.*

Krüinitz, Encykl. XXVI. n. 4. *der Acoho.*

c. *Das Huhn aus der Meerenge von Darien.*

Büffon, l. c. p. 168. *Poule de l'Isthme de Darien.*

Büffon, Vögel, IV. p. 158. *das Huhn aus der Meerenge von Darien.*

Bechstein, Naturgefch. Deutchl. III. p. 411. n. 15.

Krüinitz, Encykl. XXVI. p. 12. n. 6.

d. *Das Huhn von Camboge.*

Büffon, l. c. p. 168. *Poule de Camboge.*

Büffon, Vögel, IV. p. 158. *das Huhn von Camboge.*

Krüinitz, Encykl. XXVI. p. 12. n. 7.

e. *Das indianifche Halbhuhn.*

Büffon, l. c. p. 170. *Demi-poule d'Indes.*

Büffon, Vögel, IV. p. 160. *das Indianifche Halbhuhn.*

Bechstein, Naturgefch. Deutchl. III. p. 411. n. 17. *das Indifche Halbhuhn.*

Krüinitz, Encykl. XXVI. p. 13. n. 9.

Allgem. Reif. VIII. p. 93. Indianifche Halbhühner.

f. *Das englifche-Huhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 179. *d. der Englifche Hahn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 205. *a. der Englifche Hahn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 407. n. 7.
das Englische Huhn.

Halle, Vögel, p. 421. n. 441. das Englische Huhn.
Onomat. hist. nat. VI. p. 441. n. 4. das Englische
Huhn.

Briffon, ornith. I. p. 46. E. Gallus Anglicanus,
Coq d'Angleterre.

Büffon, loc. c. p. 171. Coq d'Angleterre.

Büffon, Vögel, IV. p. 161. der englische Hahn.
M. 2. Figg.

Frisch, Vögel, tab. 129. der englische Hahn, tab.
130. die englische Henne, (cf. *Bechstein* l. c. p.
675. 676.)

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 14. n. 10. der engli-
sche Hahn.

g. Das hamburgische Huhn.

Büffon, l. c. p. 172. Coq de Hambourg.

Büffon, Vögel, IV. p. 162. der Hamburgische
Hahn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 397. c. der
Hamburgische Hahn.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 14. n. 12. Sammet-
hofen.

h. Das Huhn von Sansevarre.

Büffon, l. c. p. 172. Poules de Sansevere.

Büffon, Vögel, IV. p. 170. die Hühner von San-
sevarre.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 451. n. 16.
die Sansevarrischen Hühner.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 17. n. 18.

i. Der gehörnte Hahn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. ζ. Gallus cornu-
tus, vertice cornibus donato.

Worm, de cornuto Gallo. — Bartholin. epist.
Cent. I. ep. 38. p. 112.

Scaevin, de gallis cornutis, ib. ep. 60. p. 245.

Lochner, gallus cornutus. — Eph. nat. cur. Dec.

II. an. 8. obs. 26. p. 74. c. f.

Francus, pullus cornutus, ibid. Vol. I. obs. 147.

p. 317. c. f.

Gerin. ornithol. II. tab. 213.

k. *Das sechszehige Huhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 410. n. 12.

1. *Die Spornhenne.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 410. n. 13.

m. *Das Bastardentenhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 411. n. 18.

Taube, Naturk. von Zelle, II. p. 257.

Mannigfaltigk. II. p. 600.

n. *Die Hühner in Xensi, mit Schafwolle auf dem Leibe?*

Dapper, China, p. 14.

Büffen, Vögel, IV. p. 164. n. 84.



Sonnini de Monancourt, über die Hühner des mittägigen Amerika, — in *Rozier* obs. sur la Phys. VI. p. 130.

Hannemann, de gallinae quibusd. mirabilibus. —

Eph. nat. cur. Dec. III. an. 3. obs. 60. p. 69.

Hanow, beurtheilte Seltenheiten, die man an Hühnern gefunden. — Merkwürdigk. d. Nat. I. p. 293.

Bemerk. bey Erziehung junger Hühner. — Han. növ. nützl. Samml. 1756. p. 1565.

Ob die Hühner in einer Stadt mehr zu erhalten kosten, als sie eintragen? — Fränk. Samml. V.

p. 442.

Naturgesch. des Huhns. — Gotha'sch. Hofkal. 1777.

Eine wunderbare Geburt und Veränderung der Natur von einer Henne, Straßburg 1538. fol. 1. B.

Von monströsen Hühnern. — Bresl. Nat. und Kunstgesch. 19. Vers. p. 297.

Büchner, von einer Henne, welche zwey Küchlein ausgebrütet, mit doppelten Köpfen, vier Flügeln, und vier Füßen. — *ibid.* 1726. Sect. 36. p. 715.

Imago pulli gallinacei bicipitis. — *Lambec.* bibl. L. VI. app. p. 317.

Rommel, de pullo gallinaceo quatuor alis ac totidem pedibus praedito. — Eph. nat. cur. Dec. II. an. 5. obs. 148. p. 301. c. f.

Stolterfoht, descript. galli quadrupedis. — Nov. lit. maris Balth. 1703. p. 67. c. f.

Hoffmann, de pullo gallinaceo quadrupede. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. I. obs. 142. p. 237. cum figg.

Graff, de pullo gallinaceo monstroso. *ib.* Vol. IV. obs. 106. p. 426.

Von der Mißgeburt einer Henne. — Hamb. Magaz. II. p. 649.

Hühner mit Entenfüßen. — Bresl. Nat. und Kunstgesch. 21. Vers. p. 176.

Von Hühnern mit *rauh*en Füßen. — Neue Gesellschaftl. Erzähl. III. p. 337. IV. p. 286.

Hannemann, de mira metamorphosi plumarum in gallina. — Nov. lit. maris Balth. 1705. p. 27.

Hannemann, coloris plumarum in gallina mutatio. — Eph. nat. cur. Dec. II. an. 8. obs. 163. p. 371.

Harder, gallina ex carbonibus devoratis fatua, et anatome gallinae subito enectae. — in Obs. thesaur. obs. 16. et 17. p. 67. c. f.

Harder,

Harder, de gallinarum ductibus cholodochis, vesicula lactea, etc. ib. obs. 18. p. 72.

Peyer, exercit. de glandulis intestinorum, acc. anatome ventriculi gallinacei. Schafhus. 1677. 8.

Brickmann, de gallo, cuius ossa crassa et spongiosa. — *Commerc. Norib.* 1742. p. 175. c. f.

Verdries, de medulla in ossibus femoris gallinae lapidea. — *Eph. nat. cur.* Dec. III. an. 9. obs. 252. p. 434.

Gahrlied, de cystide monstrosa in gallina domestica. ib. Dec. II. an. 8. obs. 195. p. 494. c. f.

Borrich, de iecore gallorum monstrosae magnitudinis. — *Act. Hassn.* Vol. I. obs. 92. —

Manget. bibl. I. 2. p. 387.

Hartmann, de gallinae utero hydropico, de hernia pulli gallinacei, de hepate gallinaceo pingui. — *Eph. nat. cur.* Dec. III. an. 2. obs. 191 — 194. p. 302. ff.

Bukkii, obs. de hepate gallinae macilentae magno et ponderoso. — *Nov. lit. mar. Balth.* 1704. p. 361.

Ein Fleischgewächse im Magen einer Henne.

Wittenb. Wochenbl. XVI. p. 29.

Strauß, diss. de Ovo galli. Giefs. 1670. 4.

Relation von einem Hahne, der Eyer gelegt; — *Tenzels monathl. Unterred.* 1696. p. 884.

Gockelii, eyerlegender Hahn, sammt seinem gelegten Hahnen- oder Basiliskeneey, nebst einem Anhang von allerhand seltsamen Eyern. *Ulm.* 1697. 8.

Bartholin. galli ovipari anatome. — *Hist. anatom.* Cent. I. hist. 99. p. 162.

Id. de gallo oviparo. — *Epist.* Cent. III. ep. 52. p. 212.

Henr. Scretæ à Zavorziz, de gallo gallinaceo, ova ponente. — *Eph. nat. cur.* Dec. I. an. 3. obs. 177. p. 285.

Cleyer,

Cleyer, de ovo gallinaceo praegnante, et hepate gallinarum insigni. ib. Dec. II. an. 1. obs. 17. p. 38.

Ledel, de gallo gallinaceo oviparo. ib. Dec. II. an. 1. obs. 145. p. 359.

Gründel, de gallo gallinaceo oviparo. ib. Dec. II. an. 5. obs. 211. et 212. p. 435.

Gahrlied, notabilia quaed. circa formationem pulli gallinacei. — Eph. Nat. cur. Dec. II. an. 10. obs. 4. p. 13. c. f.

Hannari gallina superfoetans. ib. Dec. II. an. 8. obs. 117. p. 259.

Lanzon. gallina pullum pariens. ib. Dec. III. an. 1. obs. 42. p. 60. cf. Dec. II. an. 4. append. obs. 28. — it. Bresl. Samml. 1717. Novemb. p. 326. — Journal des Sçav. 1678. Juill. p. 280.

J. Dan. Maior, de pullo gallinacio, pullis incubante. ib. Dec. I. an. 1. obs. 6. p. 9.

Kochansky, de gallina reviviscente. ib. Dec. II. an. 1. obs. 132. p. 333.

Camerarius, caro gallinacea quomodo cocta facilis fiat. — Syll. memorab. Cent. XII. P. 43. p. 1011.

Ob man von vielen Hühneressen das Podagra bekomme. — *Schaarschmidt*, medic. chirurg. Nachr. II. Jahrg. p. 97.

Schröder, de gallorum vario apud veteres usu. Lips. 1743. 4.

Golzii, Alectromachia. Lub. 1709. 4.

Scaliger, gallinaceus et eius cantus. — de Subtil. ex. 239. p. 736.

Innichenhöfer, orat. de Gallicinio. Witt. 1623.

Vinding, diss. phys. phil. de Gallicinio. Hafn. 1674. 4.

Reland, orat. de galli cantu, Hierosolymis audito. Traj. ad Rhen. 1718. 8.

Besondere Freundschaft zweyer Hähne. — Neueste Mannigfalt. III. p. 193.

Hartmann, Anatome Caponis inedia enecti. — Eph. nat. cur. Dec. II. an. 7. obs. 17. p. 36.

Schröck, de podagra et ossium excreſcentia in Capone. — ib. Dec. II. an. 4. obs. 174. p. 341.

Vom Ausbrüten der Hühner durch Capaunen. — Hannöv. Beytr. 1762. p. 395. 782. 1258.

Geißler, von einem im Bauche einer Henne gebildeten Küchlein. — Fränk. Samml. 1761. St. 31. p. 49.

Reaumur, art de faire eclorre et d'elever en toute saison des oiseaux domestiques de toutes especes, etc. II. p. 239. ff.

Eine Henne brütet Enteneyer. Hannöv. Magaz. 1780. p. 479.

Hühner über einer brennenden Lampe auszubrüten. Hannöv. gel. Anz. St. 72. 1751. p. 654.

Geöffnete Eyer auszubrüten, um die allmähliche Bildung des Hühnchens zu beobachten. — Hamb. Magaz. XIX. p. 135.

Von künstlicher Ausbrütung der Eyer sind die Schriften verzeichnet, in *Krünitz* Encykl. III. p. 188.

Von Hühnereyern und Merkwürdigkeiten der Eyer überhaupt. S. *Krünitz* l. c. Art. Ey. — *Böhmer*, Handb. d. Naturgesch. II. 1. p. 533 — 543.

Berechnung über den Nutzen der Hühner. — *Leopolds* Landwirthsch. Sorau 1750. 4. p. 516.

Hühner mit Knochen, so schwarz wie Ebenholz. — *Lichtenbergs* Magaz. III. 2. p. 155.

Sonderbares Hühnerey. — ib. I. 2. p. 83.

Brütende Henne unterscheidet die faulen Eyer von den guten. Ib. I. 3. p. 65

In der Leber eines Hahns Kiesel u. a. Steine. *ib.* I. 4. p. 218.

Wie das Hühnchen im Ey die Schale durchbricht. *ib.* II. 4. p. 216.

Wie die Küchlein in Cairo in Oefen ausgebrütet werden. — Schwed. Abhandl. I. p. 38. X. p. 253.

Wie die Chineser sie ausbrüten. *ib.* XXX. p. 202.

Von den Krankheiten, sonderlich dem Pips der Hühner. *Zink*: Leipz. Samml. X. p. 964. et 1090. — Hannöv. gel. Anz. 1754. p. 473. 545. 758. — Hannöv. nützl. Samml. 1757. p. 222. — *Phyf. ökon. Patriot.* II. p. 365. — Berlin. Samml. I. p. 364. — Witt. Wochenbl. X. p. 91.

Eine gute Fütterung für die Hühner: — *Gaz. litt. de Berlin* 1774. n. 552. Berlin. Samml. VIII. p. 277.

Küchlein in kurzer Zeit fett zu machen: *Gaz. litt. de Berlin* 1770. n. 349. Berlin. Samml. III. p. 396.

De ovo et pullo vid. *Blasii* anat. animal. p. 258. m. K.

Garmanni, Oologia curiosa. Cygn. 1691. 4.

Libavii, diss. de ovo gallinarum et pulli ex eo generatione. Coburg 1610. 4.

Schoockii diss. de ovo et pullo. Ultraj. 1643. 12.

Anonymi diss. de ovo et pullo. Wratisl. 1661. 12.

Marcell. Malpighii, de formatione pulli in ovo liber. Lond. 1666. et 1672. 4. c. fig.

Aldes, observat. naturales in ovis factae. Amst. 1673. 12.

2. Мотмот. *Der Katraka.*

Müller, Natursyft. II. p. 471. n. 2. *der ungesporn- te Hahn.*

Borowsky,

Borowsky, Thierreich, II. p. 181. n. 6. *der unge-
spornte Hahn.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 442. *der amerikanische
Fasan.*

Brisson, ornith. I. p. 76. n. 3. *Faisan de la Guiane.*

Büffon, Vögel, V. p. 262. *der amerikanische Fa-
san, oder Katraka.* M. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 422. *Katraka.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 632. n. 9. *Phasia-
nus* (Motmot) fuscus subtus rufescens, cauda
cuneata, rectricibus lateralibus rufis.

Schneider, zool. Abhandl. p. 142. *der amerikani-
sche Fasan.*

Moehring, av. gen. p. 80. n. 103. *Columbae ad-
finis.*

8. PARRAKA. *Der Parraka.* (7).

Büffon, Vögel, V. p. 313. *der Parraka.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 632. n. 12. *Phasianus*
(Parragua) subcrissatus fuscus, subtus fulvus,
cauda elongata, apice integra.

Bankroft, Guian. p. 106 *Hannaquaw.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 601. *der Par-
raka.*

Barrere, Fr. equinox. p. 140. *Phasianus* vertice
fulvo cirrato.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 324. n. 2.
der Parraka.

9. MEXICANUS. *Der mexikanische Fasan.*

Büffon, Vögel, V. p. 313. *der Hoitlallotl.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 257. *der Hoitlallotl.*

Latham,

(7) Es scheint noch nicht ganz entschieden zu seyn, ob nicht die-
se Gattung mit der vorhergehenden eineley ist.

Latham, Syst. ornith. II. p. 632. n. 10. *Phasianus* (Mexicanus) fulvo - albus, cauda elongata, tectricibus viridi - nitentibus.

Raj. Synops. av. p. 158?

10. CRISTATUS. *Der Hoazin.*

Müller., Naturyst. suppl. p. 125. n. 9. *der Hoizin.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 172. n. 4. *der Hoizin; amerikanische Schlangenfresser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 255. *Hoactzin.*

Briffon, ornith. I. p. 86. n. 15. *Hocco brun du Mexique.*

Büffon, Vögel, V. p. 297. *der Hoizin, oder gehäubte Kayennische Fasan.* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 422. *der Hoizin.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 631. n. 7. *Phasianus* (Cristatus) fulvo - fuscus, capite cristato, fascia alarum duplici pallida, cauda apice lutea.

Charleton, onomast. zoic. p. 113. n. 10. *Hoactzin.*

Jonston, av. p. 172. *Hoactzin.*

Diction. des animaux II. p. 478.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 324. n. 3. *der Hoizin.*

3. COLCHICUS. *Der gemeine Fasan.* (8)

Müller, Naturyst. II. p. 472 n. 3. *der Fasan.*

Leske, Naturgesch. p. 224. n. 2. *der Fasan.*

Borowsky, Thierr. II. p. 173. n. 2. *der gemeine Fasan.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 206. n. 2. *Phasianus* (Colchicus) rufus, variegatus, capite viridi caerulefcente, cauda cuneata, genis papillofis.

Beckstein,

- (8) Wird etwa 7. höchstens 10. Jahr alt. Nährt sich von allerhand Getraide; frisst auch gern Mispeln und verschiedene Beeren. Begattet sich im März und Aprill. Nimmt man der Henne die Eyer, so leget sie oft über dreyßsig. Brütet 20 bis 25. Tage.

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 470. n. 2. *der gemeine Fasan*.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 412. *der gemeine Fasan*. p. 440. *Phasan*; *Fasanenvogel*.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 220. *der Fasan*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 110. *der Phasan*.
- Halle*, Vögel, p. 433. n. 453. *der Fasan*. Fig 30.
- Meyer*, Thiere, II. p. 1. tab. 2. *der Fasan* (mit dem Gerippe in 2. Vorstellungen.)
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 258. n. 234. *der Fasan*.
- Beckmann*, Naturhist. p. 50. c. *der Phasan*.
- Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 768. *Fasan*.
- Onomat. hist. nat. VI. p. 432. *Fasan*.
- Handb. d. Naturgesch. II. p. 68. *der Fasan*.
- Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 114. *Phasan*.
- Walther*, oekon. N. G. Deutschl. p. 127. *Fasan*.
- Klein*, av. p. 114. n. 1. *Phasianus simpliciter*.
- Klein*, Vorbereit. p. 211. n. 1. *Fasan*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 118. n. 1. *gemeiner Fasan*.
- Klein*, stemmat. av. p. 25. tab. 29. B.
- Klein*, Vögeleyer, p. 32. tab. 14. fig. 7. 8.
- Briffon*, ornithol. I. p. 73. n. 1. *Faisan*.
- Buffon*, ornith. V. p. 201. *der Fasan*; m. 2. figg.
- Gesner*, Vögelb. p. 105. *Fasan*. fig. p. 106. schl.
- Batsch*, Thiere, I. p. 421. *der gemeine Fasan*.
- Latham*, Syst. ornith. II. p. 629. n. 4. *Phasianus* (Colchicus) rufus, capite caeruleo, cauda cuneata, genis papillofis.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 391. *der Fasan*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 172. n. 2. *Fasan*.
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 244. n. 2. *der gemeine Fasan*.
- Kolbe*, Vorgeb. d. g. Hoffn. Ed. in 4. p. 394. *Fasan*.
- Pallas*, nord. Beytr. III. p. 17. *der Fasan*.

Allgem. Reisf. V. p. 202. VII. p. 632. XI. p. 692.

Fasanen.

Naturforsch. XVIII. p. 69. *der Fasan.*

Scopoli, Bein. a. d. N. G. p. 135. n. 166. *der gemeine Fasan.*

Lichtenberg, Magaz. II. I. p. III. *der Fasan.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 397. *der Fasan.*

Krünitz, Encykl. LII. p. 214. *Fasan.*

Eberhard, Thiergesch. p. 65. n. 1. *der Fasan.*

Geoffroy, mater. med. VII. p. 633. *der Fasan.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 46. *Fasan.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 279. *der Fasan.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 218. n. 92.

Meidinger, Vorles. I. p. 141. n. 2. *der Fasan.*

Oekonom. Zool. p. 86. n. 26. *der Fasan.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 320. *Fasan.*

Anweisf. Vögel zu fang. etc. p. 424. *der Phasan.*

Loniceri, Kräuterb. p. 670. *Phasan.*

Anonym. Naturgesch. des Fasans. Lpz. 1780. 8.

Onomatol. forestal. I. p. 682.

Onomatol. oecon. pract. I. p. 1025.

Lemmercy, Materialex. p. 867.

Regnard, voy. de Lapponie p. 105.

Ronnefort, descript. de Madagascar. p. 120.

Flaccourt, hist. de Madagascar. p. 165.

Hamel, relation de la Corée. p. 587.

Bosmann, descr. de la Guinée. p. 319.

Villault de Bellefond, relat. des Côtes d'Afrique.
p. 270.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. Phasianus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 28. n. 1. Phasianus
vulgaris.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. n. 3. Phasianus
(Colchicus) rufus, capite caeruleo.

Kramer, Austr. p. 356. Phasianus cauda erecta,
capite laevi.

Moehring.

Moehring, av. gen. p. 53. n. 50. Tetrao.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 331. Phasianus. *Fasan*.
Phasion.

Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 3. Phasianus;
Phasidis ales.

Belon, hist. nat. des ois. p. 253. Faisan. c. f.

Jonston, av. p. 60. Phasianus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. Phasianus Col-
chicus.

Zinnan. Uov. p. 28. tab. 2. fig. 5. Fagiano.

Bomare, Dictionn. IV. p. 343. Faisan.

Dictionn. des animaux. II. p. 146. Faisan.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 2. n. 19. Φασιανός

Alian. de nat. anim. L. 13. c. 18. Φασιανός.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 48. L. 11. c. 37. Phasianae
aves.

Palladius, de re rust. L. 1. c. 29. Phasiani.

Sueton. Vitell. c. 13. Phasianus.

Sueton. Caligul. c. 29. Phasianae.

Petron. Satyr. 79. 1. Phasidos aves.

Lamprid. Alexand. c. 41. Phasianus.

Martial. epigr. L. 13. ep. 72. Phasis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 325 n. 4.
der Fasan.

β. TORQUATUS. *Der Fasan mit dem Halsringe*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 441. n. 3.
der Fasan mit dem Halsringe.

Latham, Syn. Suppl. p. 208. Ring Pheasant.

Latham, Syst. ornith. II. p. 629. β. Ph. rufus,
capite caeruleo, cauda cuneata, collo torque
albo.

γ. VARIUS. *Der bunte Fasan*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 175. b. *der bunte Fasan*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 441. n. 2.
der bunte Fasan; weißbunte Fasan.

Briffon, ornith. I. p. 75. A. Faïfan panaché.

Büffon, Vögel, V. p. 238. *der bunte Fasan*; m. e Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 267. Variegated Pheasant.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 630. γ. Phasianus Varius.

Borkhausen, Magaz. I. p. 218. n. 92. β.

δ. ALBUS. *Der weiße Fasan.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 175. a. *der weiße Fasan*; *Silberfasan*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 440. n. 1. *der weiße Fasan* (fälschlich *Silberfasan*).

Briffon, ornith. I. p. 75. b. Faïfan blanc.

Büffon, Vögel, V. p. 236. *der weiße Fasan*.

Latham, Syn. II. 2. p. 716. White Pheasant.

Latham, Syst. ornith. II. p. 630. δ. Phasianus albus.

Götz, Naturgesch. einiger Vögel. p. 20. *der weiße Phasan*.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 645.

ε. HYBRIDA. *Der Fasänenbastard.*

Müller, Naturyst. II. p. 473. *Bastardfasane*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 175. c. *der Fasänenbastard*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 442. n. 5. *der Fasänenbastard*.

Briffon, ornith. I. p. 75. C. Faïfan bastard.

Büffon, Vögel, V. p. 239. *der Bastardfasan*, oder *Fasänenbastard*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 716. Hybridal Pheasant.

Latham, Syst. ornith. II. p. 630. ε. Phas. hybridus.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 642.

Onomat. forestal I. p. 682.

Borkhausen, Magazin, I. p. 218. n. 92. γ.

♂. GALLOPAVONIS. *Der türkische Fasan.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 441. n. 4.
der *Türkische Fasan*.

Büffon, Vögel, IV. p. 222. ein *Bastard*, der aus
der *Vermischung der Puter mit dem Fasanen*
entstanden seyn soll.

Büffon, Vögel, V. p. 240. der *Fasanputer*.

Latham, Syn. II. 2. p. 717.

Latham, Syst. ornith. II. p. 630. ♂. Ph. Gallopa-
vonis.

Philos. transact. LI. p. 883. tab. 19.



Anon. *Precis de la nature d'élever les Faisans et les*
Perdreaux. Paris 1772. 12.

Berlin. Samml. V. p. 555.

Hunter, de rara Phasiani varietate. — *Phil. trans-*
act. LXX. p. 527.

Camerarius, Phasianorum caro grata, eorum orna-
mentum naturale. — *Syll. memorab.* Cent.
VII. P. 63. p. 473.

Unterricht, was bey Anlegung einer Phasanerey
zu beobachten. — *Oekon. Nachr.* I. p. 891.
VII. p. 417.

Chladenii dissert. de iure Phasianorum eorumque
banno.

Von den, in Brandenb. Landen seit langen Zeiten
her angelegten Fasanerien. — *Beckmann*
Beschr. der Chur und Mark Brandenburg, I.
p. 808.

Börner, Stadt- und Landwirthsch. p. 227.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich. p. 92.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh. Münst. 1777.
p. 185.

Bergius, Policey- und Cameral-Magaz. III.
p. 5.

Von der Fasanenzucht — Neue oekonom. Nachr.
Leipz. 1769. p. 611.

Von Anleg. der Fasanerien. — *Jungs* Forstwirthschaft, II. p. 236.

Strelins Realwörterbuch, art. *Fasan*.

4. ARGUS. *Der Argusfasan.*

Müller, Naturfyst. II. p. 473. n. 4. *der Pfau-
fasan*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 176. n. 3. *der Ar-
gusfasan*.

Ebert, Naturl. II. p. III. *Pfaufasan, Argus*.

Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 769. n. 5. *Fasan mit
blauen Flecken*.

Onomat hist. nat. VI. p. 431. *der Pfaufasan*.

Büffon, Vögel, V. p. 257. *der Argusfasan*.

Martini, Naturlex. III. p. 185. *Argusfasan*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 629. n. 3. *Phasianus
(Argus) luteus, nigro punctatus, facie rubra,
occipite cristato caeruleo*.

Marsden, Besch. von Sumatra, p. 134. *Kuh-Auh*.

Bomare, Diction. IV. p. 349. — Dict. des anim.
II. p. 151.

5. PICTUS. *Der chinesische Goldfasan.* (9)

Müller, Naturfyst. II. p. 474. n. 5. *der bunte
Fasan*.

Leske,

- (9) Wird etwa 10. höchstens 15. Jahr alt. Frisst Reis, Hanf, Weizen, Gersten, braunen Kohl, Sallat, auch Laub von Hecken, besonders grüne Pflaumen und Birnen, und verschiedene Insekten. Begattet sich im April. Das Weibchen legt zu Ende dieses Monats in einem Busch in ein rund gefahrtes Loch 12 — 15 Eyer, etwas englischer als die vom gemeinen Fasanen, hellrothfarben, oder schmutzig röthlichweiß. Brüet 23. Tage. Die jungen sind ganz grau, etwas gelblicher als ein gemeiner Fasan, und bleiben in dieser Kleidung ein ganzes Jahr. Die
mehrere.

Leske, Naturgesch. p. 224. n. 3. *der bunte Fasan*.
Borowsky, Thierreich, II. p. 173. n. 1. *der chinesische Goldfasan*, tab. 29.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 206. n. 3. *Phasianus* (Pictus) crista flava, pectore coccineo, remigibus secundariis caeruleis, cauda cuneata.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 472. n. 3. *der Goldfasan*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 443. n. 3. *der Goldfasan*, p. 450 *rother Fasan*; *dreyfarbiger Fasan aus China*, *gemalter Fasan*, *bunter Fasan*; *chinesischer Blutfasan*; *chinesischer Goldhahn*.

Ebert, Naturl. II. p. III. *der bunte chinesische Fasan*.

Halle, Vögel, p. 436. n. 455. *der rothe Fasan*; *mit langen rothen Ohrenfedern*.

Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 769. n. 3. *blutrother Fasan*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 444. *der bunte Fasan*.

Klein, av. p. 114. n. 3. *Phasianus sanguineus*.

Klein, Vorbereit. p. 211. n. 3. *der rothe Sinesische Fasan*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 118. n. 3. *blutrother Fasan*.

Briffon, ornithol. I. p. 76. n. 4. *Faisan doré de la Chine*.

Büffon, Vögel, V. p. 245. *der chinesische dreyfarbige, rothe oder Goldfasan*. M. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 421. *der chinesische Goldfasan*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 631. n. 5. *Phasianus* (Pictus) crista flava, pectore coccineo, remigibus secundariis caeruleis, cauda cuneata.

E 5

Selig-

mehresten Weibchen legen im ersten Jahre nicht. — *Büffon* will diesen Vogel nur als eine Abänderung vom gemeinen Fasan betrachten.

Seligmann, Vögel, III. tab. 31. *der bunte chinesische Fasan*.

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 1. *der Goldfasan*, tab. 1.

Naturforsch. VII. p. 39. *Phasianus aureus Sinensis Briss*.

Berlin. Samml. X. p. 154. *der Goldfasan*.

Allgem. Reis. XI. p. 692. *die japanischen Fasane?*

Kämpfer, Japan; in *Du Halde Chin.* IV. p. 141. *die Fasane?*

Meidinger, Vorl. I. p. 151. n. 3. *der bunte Fasan*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 218. n. 93.

Beckmann, Bibl. VI. p. 397. *der chinesische Goldfasan*.

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 2. *Phasianus cristula flava, pectore coccineo*.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. n. 4. *Phasianus (Pictus) cristula flava, pectore coccineo, remigibus secundariis caeruleis*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. *Phasianus pictus*.

Bomare, Dictionn. IV. p. 348. — Diction. des anim. II. p. 151.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 326. n. 5. *der chinesische Goldfasan*.

6. NYCTHEMERUS. *Der chinesische Silberfasan.* (10)

Müller, Naturfyst. II. p. 474. n. 6. *der weiße Fasan*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 176. n. 4. *der schwarz und weiße Fasan*.

Blumen-

(10) Findet sich, wie der Goldfasan, jetzt auch in den Menagerien Deutschlands. Das Weibchen legt 18—20; — und die alten sehr häufig unfruchtbare Eyer. Sie haben die Größe kleiner Hühnereyer, sind fleischfarbig, mit vielen feinen weissen Puncten bestreuet. Ihre größte Schwere ist 3 1/4 Loth.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 206. n. 4. Phasianus (Nythemerus) albus, crista abdomineque nigris, cauda cuneata.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 472. n. 4. *der Silberfasan*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 451. n. 4. *der Silberfasan*.

Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 769. n. 4. *weißer Fasan, mit abhängenden Kopffedern*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 443. *der weiß und schwarze Fasan*.

Klein, av. p. 114. n. 4. Phasianus Sinensis, albus, capite nigris pennis dependentibus.

Klein, Vorbereit. p. 211. n. 4. *weißer Sinesischer Fasan*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 118. n. 4. *weißer Fasan, mit abhängenden Kopffedern*.

Brissou, ornith. I. p. 77. n. 5. Faisan blanc de la Chine.

Büffon, Vögel, V. p. 252. *der schwarz und weiße Fasan aus China*. M. 2. Figg.

Batsch, Thiere, I. p. 422. *der schwarz und weiße Fasan*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 631. n. 6. Phasianus (Nythemerus) albus, crista abdomineque nigris, cauda cuneata.

Seligmann, Vögel, III. tab. 27. *der schwarze und weiße chinesische Fasan aus China mit seiner Henne*.

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 14. *der Silberphasan*; tab. 2.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 136. n. 167. *der weiß und schwarze Fasan*.

Beckmann, Bibl. VI. p. 398. *der chinesische Silberfasan*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 219. n. 94.

Linne,

Linneé, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 159. n. 5. Phasianus (Nycthemerus) albus, crista abdomineque nigris.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. Ph. Nycthemerus.

Bonar. Dictionn. IV. p. 348. — Dictionn. des anim. II. p. 149. 151.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 326. n. 6. der *chinesische Silberfasan*.

7. SUPERBUS. *Der rothe chinesische Fasan.*

Müller, Naturyst. Suppl. p. 124. n. 7. der *chinesische Fasan*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. n. 2. Phasianus (Superbus) muticus rufus viridi caeruleoque varius, carunculis frontis subrotundis, palearium subulatis.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit vier Gattungen vermehrt. Bey der *erstern* Gattung sind die Varietäten β , δ , η , ϑ , κ , λ , ν , ξ , bey der *dritten*, die Varietäten β bis ζ , hinzugekommen.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der afrikanische Fasan.*

Latham, Syn. Suppl. p. 210. African Pheasant.

Latham, Syst. ornith. II. p. 631. n. 8. Phasianus (Africanus) corpore caeruleo — cinereo subtus albo, capite cristato, reſtricibus duabus intermediis apice, lateralibus toto nigris.

2. *Der purpurfarbene indianische Fasan.*

Latham, Syn. Suppl. p. 208. tab. 114. Impeyan Pheasant.

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 632. n. 11. Phasianus (Impejanus) cristatus purpureus viridi — nitens, subtus niger, colli pennis aureo cupreo viridi-que versicoloribus, cauda integra rufa.

3. *Der schwarze und weiße indianische Fasan.*

Latham, Syn. Suppl. p. 210. Coloured Pheasant.

Latham, Syst. ornith. II. p. 633. n. 13. Phasianus (Leucomelanos) cristatus niger, corpore pennis albo-marginatis.

102. GESCHLECHT. NUMIDA. *Das Perlhuhn.*

Müller, Naturfyst. II. p. 476. Gen. CII.

Leske, Naturgesch. p. 224. Gen. VIII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 182. Gen. XXX.

Bümenbach, Handb. d. N. G. p. 204. Gen. XLIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 462. Gen. LX.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 455. Gen. XL.

Briffon, ornith. I. p. 49. Gen. IV. Meleagris.

Büffon, Vögel, IV. p. 238. ff.

Batsch, Thiere, I. p. 410. Gen. CIX.

Latham, Syst. ornith. II. p. 621. Gen. LII.

Pallas, N. G. merkw. Thiere, IV. p. 12. ff.

Hermann, tab. affin. anim. p. 169.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 326. Gen. LXIX.

1. MELEAGRIS. *Das gemeine Perlhuhn.* (1)

Müller, Naturfyst. II. p. 476. *das Perlhuhn.*

Leske, Naturgesch. p. 225. *das Perlhuhn.*

Borows-

- (1) Ein lebhafter, unruhiger, unter sich geselliger, sonst aber zänkischer Vogel, der so gar dem Truthahn furchtbar ist. Wird etwa 10 bis 12. Jahr alt. In ihrem ursprünglichen Vaterlande sieht man sie zu 200 bis 300. In Tehama an der bergigten Gegend,

Borowsky, Thierreich, II. p. 182. n. 1. *das Perlhuhn*. tab. 30.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 204. n. 1. *Numida* (*Meleagris*) rostro cera instructo, nares recipiente.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 462. *das gemeine Perlhuhn*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 455. n. 1. *das gemeine Perlhuhn*, p. 467. *das Perlin*, *Pagati*, fälschlich *Knarrhuhn*, *Knorrhuhn*. — *Afrikanisches, numidisches, fremdes, barbarisches, tunisches, mauritanisches, lybisches, guineisches, aegyptisches Huhn; Pharaohuhn. Hühner aus Jerusalem.*

Funke, Naturgesch. I. p. 223. *das Perlhuhn*.

Ebert, Naturl. II. p. 109. *das Perlhuhn*.

Halle, Vögel, p. 422. n. 444. *das Perlhuhn*. fig. 28.

Meyer, Thiere, I. tab. 75. *das Perlhuhn*, mit dem Gerippe.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 264. n. 237. *das Perlhuhn*.

Neuer Schaupl. d. Nat. VI. p. 421. *Perlhuhn*.

Onomat. hist. nat. V. p. 644. *das Perlhuhn; die Henne aus Guinea.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 115. *das Perlhuhn*.

Klein, av. p. 111. n. 2. *Alector Guineensis; Gallina Guineae; africana.*

Klein,

Gegend, sind sie nach *Niebuhr* so häufig, daß die Knaben sie mit Steinen werfen, und nach der Stadt zum Verkauf bringen. Sie lieben wie die Pfauen erhabene Orter. Die Begattungszeit fällt in den März und Aprill. Das Weibchen legt bis 24. Eyer, welche etwas über 3. Wochen bebrütet werden. Das Fleisch wird von den mehresten als sehr delicat angegeben, gleichwohl behauptet *Sparrmann*, es sey sehr trocken, und weit schlechter als gewöhnliches Hühnerfleisch.

Klein, Vorbereit. p. 206. n. 2. *Perlhuhn*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 115. n. 2. *Perlhuhn*.

Klein, stemmat. av. p. 25. tab. 26. fig. 1. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 13. fig. 5. 6.

Briffon, ornith. I. p. 49. n. 1. Peintade.

Büffon, Vögel, IV. p. 237. *das Perlhuhn*; mit 2. Figg.

Gesner, Vögelb. p. 216. *ein frembder wilder Han*, auß *Africa* oder *Barbarien*. M. e. gut. Abbild.

Batsch, Thiere, I. p. 419. *das gemeine Perlhuhn*.

Latham, Syn. Suppl. p. 204. *Guinea Pintado*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 621. n. 1. *Numida* (*Meleagris*) *nigra*, *maculis rotundatis albis*, *remigibus extus albo transversim striatis*, *vertice corneo*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 393. *das Perlhuhn*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 248. n. 1. *das gemeine Perlhuhn*.

Niebuhr, Beschr. von Arabien, p. 168. *Perlhühner*.

Fermin, Surin. II. p. 139. *das Perlhuhn*.

Adanson, Senegall. p. 250. *Perlhüner*.

Hasselquist, Paläst. (ed. germ.) p. 317. n. 42. *Galina* (*Meleagris*) *vertice corneo*.

Sparrmann, Reif. p. 346. *Perlhüner*.

Reif. nach d. Insel Frankreich u. Bourbon. p. 186. *Pintadohüner*.

Allgem. Reif. III. p. 336. *Pintado* oder *guineische Henne*.

Pallas, N. G. merkwl. Th. IV. p. 15. *das gemeine Perlhuhn*.

Perrault, *Charras* u. *Dodart*, Abhandl. a. d. N. G. II. p. 17. anatomische Beschr. vieler *Pintaden* tab. 48. *Pintade*, *Art indianischer Hühner*. tab. 49. die Zergliederung.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 135. n. 165. *das Perlhuhn*.

Eberhard, Thiergesch. p. 64. *das Perlhuhn.*

Meidinger, Vorles. I. p. 141. *das Perlhuhn.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 392. *das Perlhuhn*, XVI.
p. 417. *das Perlhuhn.*

Le Vaillant, Reis. nach Afr. I. p. 230. *das Perlhuhn.*

Naturforsch. XVII. p. 69. n. 143. *das Perlhuhn.*

Beckmann, Beytr. zur Gesch. d. Erfind. III. p. 214.
Perlhühner.

Döbel, Jägerprakt. III. p. 162. *Perlinen, oder Afrikanische Hüner.*

Hannöv. Magaz. 1769. p. 702.

Allgem. Harzmagazin, I. p. 39.

Borkhausen, Magazin, I. p. 220. n. 95.

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 2. *Gallus vertice corneo.*

Charleton, onom. zoic. p. 75. n. 13. *Gallina Africana five Guineensis.*

Kramer, Austr. p. 355. n. 2. *Gallus vertice corneo.*
Perlhuhn.

Moehring, av. gen. p. 52. n. 48. *Meleagris.*

Barrere, ornithol. p. 79. *Gallus niger maculis ovalibus et orbiculatis.*

Belon, hist. nat. des ois. p. 246. *Poule de la Guinée.*

Fonston, av. p. 84. *Gallinae Guineae.*

Gerin, ornithol. II. p. 79. tab. 230.

Schaefer, element. ornithol. tab. 46.

Zinnan, Uov. p. 27. tab. 2. n. 4.

Bomar, Diction. d'hist. nat. VIII. p. 550. — Dict.
des anim. III. p. 471.

Scylaxis Periplus. p. 122. *Meleagrides aves.*

Kennet's, parochial. antiquit. p. 287. *Aves africanae, afrae.*

De la Mare, Comment. urban. lib. 25. p. 949.

Cauche, relat. de Madagascar. p. 133. *Acanques.*
Aristot.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 2. n. 19. Μελεαγριδαί.

Aelian. de nat. anim. Lib. 4. c. 42. Μελεαγριδαί.

Athen. Deipnosoph. Lugd. 1612. fol. p. 655. Μελεαγριδων γένος.

Plin. hist. nat. Lib. 10. c. 26. 48. 52. Meleagrides. — Numidicae aves?

Columella, de re rust. L. 8. c. 2. Meleagris.

Varro, de re rust. L. 3. c. 9. Gallinae africanae.

Martial. epigr. L. 3. ep. 58. Gallinae guttatae.

Sueton. Caligul. c. 22. Meleagrides.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 326. das eigentliche Perlhuhn.

β. Das weißbrüstige Perlhuhn.

Müller, Naturyst. II. p. 477.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 467. n. 2.

Briffon, ornith. I. p. 50. A. Peintade à poitrine blanche.

Büffon, Vögel, IV. p. 247. 254.

Latham, Syn. II. 2. p. 687.

Latham, Syst. ornith. II. p. 621. n. 1. β.

Borkhausen, Magaz. I. p. 221. γ.

γ. Das ganz weiße Perlhuhn. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 467. n. 3.

Briffon, ornithol. I. p. 50. Meleagrides omnino albo.

Latham, Syst. ornith. II. p. 621. n. 1. δ.

Gerin. ornithol. II. tab. 231.

Edw. glan. III. p. 269.

Borkhausen, Magazin, I. p. 221. β.

δ. Der Perlhuhnbastard. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 467. n. 4.

2. MITRATA. *Das gehaubte Perlhuhn.* (2)

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 126. n. 3. *das Kronenperlhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 184. n. 3. *das gehaubte Perlhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 468. *das gehaubte Perlhuhn.*

Büffon, Vögel, IV. p. 241. *das Afrikanische Huhn.*
p. 279. *das kleinhelmichte Perlhuhn.*

Batsch, Thiere, I. p. 419. *das gehaubte Perlhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 622. n. 2. Numida
(Mitrata) nigra, maculis albis, vertice corneo,
gula carunculata.

Pallas, N. G. merkwl. Th. IV. p. 19. *das gehaubte Perlhuhn.* tab. 3. fig. I.

Columella, de re rust. L. 8. c. 2. Gallina Africana,
quam plerique Numidicam dicunt; Meleagridi
fimilis.

Perrault, Charras u. Dodart, Abhandl. a. d. N.
G. II. p. 22. *das afrikanische Huhn.*

3. CRISTATA. *Das buschige Perlhuhn.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 126. n. 2. *das Haubenperlhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 184. n. 2. *das buschige Perlhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 468. *das buschige Perlhuhn.*

Büffon, Vögel, IV. p. 276. *das buschige Perlhuhn.*

Batsch, Thiere, I. p. 419. *das buschige Perlhuhn.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 622. n. 3. Numida
(Cristata) nigra, albo maculata, vertice cristato,
collo caerulescente, subtus sanguineo.

Pallas,

(2) Wird von Büffon, und den Parif. Academisten für das Weibchen vom gemeinen Perlhuhn gehalten.

Pallas, N. G. merkwl. Th. IV. p. 16. das buschichte Perlhuhn. tab. 2.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit zwey Gattungen vermehrt: Bey der ersten Gattung ist die Var. β . hinzugekommen.

B. Neuere Gattungen.

1. Das ägyptische Perlhuhn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 622. n. 4. Numida (Aegyptiaca) nigra caerulefcente maculata, vertice cristato, capite colloque rufis.

Gerini, ornithol. II. p. 80. tab. 232. Meleagris altera.

103. GESCHLECHT. TETRAO. Das Berg-huhn. (Waldhuhn.)

Müller, Naturyst. II. p. 478. Gen. CIII.

Leske, Naturgesch. p. 225. Gen. IX.

Borowsky, Thierreich, II. p. 185. Gen. XXX.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 202. Gen. XLII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 473. Gen. LXII.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 469. Gen. XLI.

Ebert, Naturl. II. p. 114. ff.

Halle, Vögel, p. 437 — 454.

Neuer Schaupl. d. Nat. IV. p. 68.

Onomat. hist. nat. VII. p. 509.

Klein, av. p. 114. E. p. 115. F. G.

Briffon, ornith. I. p. 51. Gen. V. Lagopus. p. 61. Gen. VI. Perdix.

Büffon, Vögel, V. p. 7. ff. VI. p. 5. ff.

Batsch, Thiere, I. p. 410. Gen. CVII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 633. Gen. LV. *Tinamus*. p. 634. Gen. LVI. Tetrao. p. 643. Gen. LVII. *Perdix*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 166.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 327. Gen. LXX.

* *Mit kahlem Fleck über den Augen, und befiederten Füßen. Berghühner.*

† *Mit vierzehigen Füßen.*

1. UROGALLUS. *Der Auerhahn.* (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 479. n. 1. *der Auerhahn.*

Leske, Naturgesch. p. 228. n. 6. *der Auerhahn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 186. n. 2. *der Auerhahn.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 204. n. 7. Tetrao (*Urogallus*) pedibus hirsutis, cauda rotundata, axillis albis; *der Auerhahn.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 473. n. 1. *der Auerhahn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 470. n. 1. *der Auerhahn* p. 482. *Urhahn; Ohrhahn; Auerhahn; Waldhahn; wilder Hahn; Gurgelhahn; Alphahn; Riethahn; Bergfasan; Spillhahn; Krugelhahn; Federhahn.*

Funke, Naturgesch. I. p. 225. *der Auerhahn.*

Ebert, Naturl. II. p. 114. *der Auerhahn.*

Halle, Vögel, p. 445. n. 469. *das Auerhuhn.*

Meyer,

- (3) Flügelweite 3. Fuß 10. Zoll. Briss. Gewicht bisweilen 14. Pfund. *Gesn. Penn.* Hat außerordentlich scharfes Gehör und Gesicht. Fliegt niedrig. Läßt sich leicht zähmen. Hält sich am Tage mehr auf der Erde auf, und geht des Abends auf die Bäume schlafen. Das Weibchen brütet 4 Wochen, und bedeckt, wenn es Hungers halber aufsteigen muß, die Eyer mit Blättern, Moos. u. d. gl.

- Meyer, Thiere. I. p. 19. tab. 16. *der Auerhahn.*
tab. 17. das Gerippe.
- Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 266. n.
241. *der Auerhahn.*
- Pennant, arct. Zool. II. p. 292. A. *der Auerhahn.*
- Beckmann, Naturhist. p. 50. a. *der Auerhahn.*
- Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 431. *Auerhahn.*
- Onomat. hist. nat. IV. p. 636. *Auerhahn.*
- Handb. der Naturgesch. II. p. 47. *der Auerhahn.*
- Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 115. *der Auerhahn.*
- Klein, av. p. 115. n. 1. Lagopus maximus; Urogallus maior.
- Klein, Vorbereit. p. 214. n. 1. *Auerhahn.*
- Klein, verb. Vögelhist. p. 120. n. 1. *Auerhahn;*
Orhahn; Bergfasan.
- Klein, Stemm. av. p. 25. tab. 27. fig. 1. a. b.
- Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. fig. 1.
- Gesner, Vögelb. p. 223. *Orhan, Urhan; Auerhan.* fig. p. 224.
- Briffon, ornith. I. p. 51. n. 1. Coq de Bruyeres, ou de Limoges.
- Büffon, Vögel, V. p. 7. *der Auerhahn;* m. 2. Figg.
- Martini, Naturlex. III. p. 508. *Auerhahn.*
- Batsch, Thiere, I. p. 412. *der Auerhahn.*
- Latham, Syst. ornith. II. p. 634. n. 1. Tetrao (Urogallus) fusco-rufus, capite colloque cinereis, gula abdomineque nigris, axillis albis.
- Bock, N. G. von Preuss. p. 393. *der Auerhahn.*
- Beseke, Vögel Kurl. p. 69. n. 141. *der Auerhahn.*
- Siemßen, meklenb. Vögel, p. 47. *Auerhähne.*
- Fischer, Liv. p. 89. n. 118. *Auerhahn.*
- Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 306. *Auerhähne.*
- Pontoppidan, Norweg. II. p. 191. *Tiur, Teer, Tödder.*
- Leem, Finnm. p. 129. *Auerhähne.*

- Scheffer*, Lappl. p. 392. *Auerhahnen*.
Steller, Kamtschatk. p. 193. *Auerhühner*.
Pennant, britt. Zool. p. 85. tab. 34. 35.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 137. n. 168. *der Auerhahn*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 44. *Auerhahn*.
Naturforsch. XVII. p. 70. n. 144. *der Auerhahn*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 277. *Auerhahn*.
Krünitz, Encykl. II. p. 710. *Auer-Hahn*.
Goeze, nützliches Allerl. II. p. 224. n. 27. *Auerhahn*.
Eberhard, Thiergesch. p. 65. *Auerhahn*.
Loniceri, Kräuterb. p. 640. *Uhrhan*.
Lichtenberg, Magazin für das Neueste, etc. II. 4. p. 176. VI. I. p. 139. *Auerhahn*.
Linné, Abhandl. II. p. 298. n. 105. *der Auerhahn*.
Oekon. Zool. p. 87. n. 28. *der Auerhahn*.
Jablonsky, allgem. Lex. p. 82. *Auerhahn*.
Meidinger, Vorles. I. p. 143. n. 5. *der Auerhahn*.
Anweil. Vögel zu fang. p. 98. *Auerhahn*.
Beckmann, Bibl. V. p. 353. VI. p. 392. XVII. p. 156.
Schwed. Abhandl. 1751. p. 139.
Herpe, wohlred. Jäger. p. 40.
Altmann, Helvet. p. 221.
Lemmery, Marteriallex. p. 1203.
André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 158.
Schriften der berlin. Gesellsch. N. Fr. V. p. 469.
Zückert, Speis. a. d. Thierreiche, p. 93.
Onomatol. forestal. I. p. 147.
Borkhausen, Magaz. I. p. 221. n. 96.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Urogallus*.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 1. *Urogallus*.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 159. n. 1. *Tetrao*
(Urogallus) pedibus hirsutis, rectricibus exterioribus subbrevioribus, axillis albis.

Müller,

Müller, zool. dan. prodr. p. 27. n. 221. Tetrao (Urogallus) pedibus hirsutis, cauda rotundata, axillis albis.

Kramer, Austr. p. 356. n. 1. Tetrao rectricibus exterioribus brev., alarum basi alba macula. *Auerhan.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 369. Urogallus maior.

Auer-Han; *Ohr-Han*. p. 371. Urogallina maior. *Auer-Hähne*; *Grugel-Han*.

Charleton, onomast. zoic. p. 73. n. 4. Urogallus.

Sibbald, Scot. illustr. p. 16. tab. 14. 18. Capricerca.

Girald, topogr. hybern. p. 706. Pavo sylvestris.

Jonston, av. p. 61. Urogallus maior; Tetrix Aristotelis.

Nieremb, hist. nat. p. 135. Tetrao.

Belon, av. p. 249. Urogallus f. Tetrao.

Hermann, tab. affin. anim. p. 166. Tetrao Urogallus.

Schäfer, element. ornithol. tab. 42.

Gerini, ornithol. II. p. 83. tab. 236. 237.

Plin, hist. nat. L. 10. c. 22. Tetraones.

Bomare, diction. III. p. 310. — Dict. des anim. I. p. 702.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 327. n. 1. der *Auerhahn*.



Kurze, jedoch zuverlässige Nachricht von denen Auerhahnen, von M. F. J. M. P. A. in den Stuttg. Select. phys. Oeconom. 1750. St. 3. p. 239.

Hagstrom, essai pour nourrir les Coqs de Bruyeres avec toutes sortes de plantes. — Journ. oeconom. Mai 1765. p. 223.

Hoffmann, obs. de capillis foliisque pini, in ventriculo urogalli repertis. — Eph. nat. cur. Cent. IX. et X. Append. p. 463.

Von der Nahrung des Auerhahns im rauhen Winter. -- *Hanow* Seltenh. d. Nat. und Oecon. I. p. 270.

7. PHASIANELLUS. *Der Spitzschwanz.* (4)

Müller, Naturfyft. II. p. 480. *der canadische fa-
sanenartige Auerhahn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 286. n. 97. *der Spitz-
schwanz.*

Buffon, Vögel, V. p. 138. *das langschwänzige
Haselhuhn aus Hudsons bay.* M. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 212. Long-tailed Grouse.

Latham, Syst. ornith. II. p. 635. n. 2. Tetrao (Pha-
sianellus) testaceus nigricante varius, rectrici-
bus duabus intermediis elongatis, maculis ocel-
laribus notatis.

Martini, Naturlex. III. p. 560. *langschwänziges
Haselhuhn a. d. Hudsons bay.*

Seligmann, Vögel, V. tab. 12. *das langschwänzi-
ge Haselhuhn a. d. Hudsons bay.*

Allgem. Reif. XVI. p. 651. *der Auerhahn?*

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 160. n. 5. Tetrao
(Phasianellus) pedibus hirsutis, cauda cuneifor-
mi, rectricibus tribus lateralibus albis.

Linne', Syst. Nat. Ed. XII. p. 273. n. 1. β.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 328. n. 2.
der Spitzschwanz.

2. TETRIX. *Das Birkhuhn.* (5)

Müller, Naturfyft. II. p. 480. n. 2. *das Birkhuhn.*

Leske, Naturfyft. p. 327. n. 5. *das Birkhuhn.*

Borows-

(4) Flügelweite 24. Zoll. Gewicht 2. Pfund. *Penn.*

(5) Gewicht des Männchens 4 Pfund, des Weibchens 2. Pfund.
Penn. Von dem Genuß der harzigen, stark riechenden Knos-
pen der Balsampappel, erhält ihr Fleisch einen angenehmen
Geruch und Geschmack. In Northumberland finden sie sich jetze
falt

Borowsky, Thierreich, II. p. 188. n. 3. *der Birkhahn*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 203. n. 6. Tetrao (Tetrix) pedibus hirsutis, cauda bifurcata, remigibus secundariis basin versus albis; *der Birkhahn*; *deutsche Fasan*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 475. n. 2. *der Birkhahn*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 483. n. 2. *das Birkhuhn*, p. 496. *der kleine Auerhahn*; *Heidelhahn*; *Laubhahn*; *Brennhahn*; *Spillhahn*; *Spielhahn*; *Maoshahn*; *Schildhahn*; *schwarze Waldhahn*; *Kurra*, *Moorhuhn*.

Funke, Naturgesch. I. p. 227. *das Birkhuhn*.

Ebert, Naturl. II. p. 115. *das Birkhuhn*.

Halle, Vögel, p. 447. n. 472. *das Birkhuhn*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 269. n. 242. *der Birkhahn*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 293. C. *das schwarze Waldhuhn*; *Birkhuhn*.

Beckmann, Naturhist. p. 50. b. *der Birkhahn*.

Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 757. Birkhahn.

Onomat. hist. nat. IV. p. 630. das Birkhuhn.

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 115. das Birkhuhn.

Gesner, Vögelb. p. 225. *Laubhan*; *Bromhan*; *kleiner Bergfasan*; *kleiner Orhan*, fig. p. 226.

Klin, av. p. 116. n. 2. *Lagopus*, *Urogallus minor*.

Klein, Vorbereit. p. 215. *Birkhahn*, *Spielhahn*, *Laubhahn*.

Klein, verb. Vögelh. p. 120. n. 2. *Birkhahn*.

Klein, Stemm. av. p. 25. tab. 27. Fig. 2. a. b.

F 5

Klein,

fast gar nicht mehr, seitdem man die Heide, die ihnen zum Futter und zum Schutze diente, weggebrannt hat; in Liefland hingegen sind sie so häufig, daß ein bemittelter Handwerker jährlich weit über 100. verzehrt.

- Klein*, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. Fig. 3.
Briffon, ornithol. I. p. 52. n. 2. Coq. de-bruyere à queue fourchue.
Büffon, Vögel, V. p. 32. *der Birkhahn*; m. 2. Figg.
Batsch, Thiere, I. p. 413. *Birkhuhn*.
Latham, Syn. Suppl. p. 213. Black Grouse.
Latham, Syst. ornith. II. p. 635. n. 3. Tetrao (Tetrix) nigro-violacea, cauda bifurca, remigibus secundariis versus basin albis.
Beseke, Vögel Kurl. p. 69. n. 145. *der Birkhahn*.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 146. n. 1. *das Birkhuhn*, *Baarkhuhn*.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 395. *das Birkhuhn*.
Fischer, Livl. p. 90. n. 119. *Birkhahn*.
Taube, Slavon. I. p. 22. *Birkhühner*.
Leem, Finnm. p. 130. *
Scheffer, Lappl. p. 392. *Birkhühner*.
Pallas, Reif. II. p. 52. 226. 667. tab. 7. Ausz. II. p. 27. *Birkhühner*.
Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 125. *Birkhahn*, (*Capercalze*, *Auercalze*, *Capercally*.)
Pontoppidan, Dännem. p. 172. *Urhane*.
Pontoppidan, Norw. II. p. 121. *Aurfugl*.
Linne, Abhandl. II. p. 298. n. 106. *das Birkhuhn*.
Steller, Kamtschatk. p. 193. *Birkhühner*.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 139. n. 169. *der Birkhahn*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 48. *Birk-Hahn*.
Naturforsch. XVII. p. 70. n. 145. *das Birkhuhn*.
Martini, Naturlex. III. p. 526. *Birkhuhn*.
Krünitz, Encykl. V. p. 382. *Birkhahn*, *Berg-hahn*.
Eberhard, Thiergesch. p. 65. *das Birkhuhn*.
Pennant, britt. Thiergesch. p. 86. tab. 36. 37.
Meidinger, Vorl. I. p. 143. n. 4. *das Birkhuhn*.

Schwed. Abhandl. XIII. p. 139. XXI. p. 142. *Birkhähne.*

André und Bechstein, Spatzierg. III. p. 173. 178. *Birkhahn.*

Beckmann, Bibl. I. p. 338. VI. p. 394. IX. p. 581. X. p. 365. *Birkhahn, kleiner Auerhahn.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 145. *Birkhahn.*

Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 233. *Birkhuhn.*

Heppe, wohlred. Jäg. p. 69. *Mooshahn.*

Oeconom. Zool. p. 88. n. 29. *das Birkhuhn.*

Zücker, Speis. a. d. Thierreich, p. 93.

Onomatol. forestal. I. p. 331.

Weygand: Bresl. Samml. 34. Verf. Nov. 1725. Cl. 4. Art. 7.

Schreber, neue Kameralsschrift. V. p. 286.

Borkhausen, Magazin, I. p. 222. n. 97.

Linne', Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Tetrao.

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 3. Tetrao minor.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 159. n. 2. Tetrao (Tetrix) pedibus hirsutis, cauda bifurcata, remigibus secundariis basin versus albis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 27. n. 222. Tetrao (Tetrix) pedibus hirsutis, cauda bifurcata, remigibus secundariis basin versus albis.

Kramer, Austr. p. 356. n. 2. Tetrao omnibus remigibus secundariis a medio basin versus albis, cauda bifurca. *Birkhan, Schildhan.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 372. Urogallus minor; *Birk-Han, Spilhan, Laubhan*, p. 373. Urogallina minor; *Birkhenne.*

Charleton, exercitat. p. 82. onom. zoic. p. 73. n. 14. Urogallus minor.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Polon. p. 422. Urogallus minor.

Jonston,

Jonston, av. p. 61. *Urogallus minor*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 167. Tetrao *Tetrix*.

Gerin. ornithol. II. p. 82. tab. 233. 234. 235.

Salerne, ornithol. p. 137.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 328. n. 3.
der Birkhahn.

β. **TETRIX ALBA.** *Das weiße Birkhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 496. n. 1.
das weiße Birkhuhn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 636. n. 3. γ. Tetr. sordide alba, ac obsolete ferrugineo undulata, rostro nigro, pedibus ferrugineis.

Neue Schwed. Abhandl. VI. p. 224. *Beschreib. eines ganz hell grauen, oder beynahe weißen Birkhuhns*, Tetrao *Tetrix* fem.

Mus. Carlson. fasc. III. tab. 66.

γ. **UROGALLUS MINOR PUNCTATUS.** *Das Bastardbirkhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 497. *das Bastardwaldhuhn*.

Batsch, Thiere, I. p. 413. *das Auerbirkhuhn*.

Halle, Vögel, p. 451. n. 474. *das Schnarchhuhn*.

Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 432. *Bastardauerhähne*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 632. *Eine Spielart vom Birkhuhn*.

Klein, Stemmat. av. p. 25. tab. 28. Fig. 1. a. b. c.
Lagopus hybridus.

Klein, Vögeleyer, p. 33. Fig. 2. *Zwitter vom Auerhahn und Birkhenne*.

Briffon, ornith. I. p. 53. A. Coq de Bruyeres piqueté.

Büffon, Vögel, V. p. 56. *das Auerbirkhuhn; Aelter-oder Bastardauerhahn*.

Martini,

Martini, Naturlex. I. p. 105. *Auerbirkhuhn*.

Latham, Syn. Suppl. p. 214. spurious Grouse.

Latham, Syst. ornith. II. p. 636. n. 1. ♂. Tetr. hybridus; cauda bifurca, subtus albo maculatus.

Pennant, arct. Zool. II. p. 293. E. das *Bastardwaldhuhn*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 69. n. 145. *Rakkelhanar*.

Schwed. Abhandl. VI. p. 173. *Rackelhauer*.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 2. Grygallus.

- ♂. T. corpore nigro alboque variegato, macula pectorali maxima, atro nitente. *

Latham, Syst. ornith. II. p. 636. n. 1. β.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 497.

Mus. Carlson. fasc. III. tab. 65. Tetr. Tetrix mas, var.

- ♀. T. albo nigroque maculata. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 497. n. 2.

das *bunte Birkhuhn*.

21. NEMESIANUS. *Das bunte Waldhuhn*. (*)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 637. n. 4. Tetrao (Nemesianus) corpore nigro rufoque vario, cauda rufa, apice nigra, nigroque maculata.

Scopoli, Bemerk. a. d. N. G. I. p. 141. n. 171. *der bunte Rauchfuß*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 516. n. 6. *das bunte Waldhuhn*.

22. BETULINUS. *Das schwarzfüßige Waldhuhn*. (**)

Latham, Syst. ornith. II. p. 637. n. 5. Tetrao (Betulinus) cauda nigra, maculis rufis transversis varia, uropygio albido nigro fasciato.

Scopoli,

(*) Nach *Bechstein* ein Haselhuhn, dessen Haut bey dem Ausstopfen so erweitert worden, daß es die Größe des Birkhuhns erreicht hat.

(**) Nach *Bechstein* ein junges Haselhuhn.

Scopoli, Rem. a. d. N. G. I. p. 141. n. 172. *der kleine bunte Rauchfuß.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 518. *das kleine bunte Waldhuhn.*

3. CANADENSIS. *Das canadensfische Waldhuhn.*

Müller, Naturfyst. II. p. 482. n. 3. *das canadische Berghuhn.*

Halle, Vögel, p. 453. n. 477. *das dunkle Schneehuhn.*

Gatterer, vom Nutz. und Schad. d. Thiere, II. p. 276. n. 243. *das Sprossenhuhn, Waldrehhuhn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 287. n. 89. *das gefleckte Waldhuhn.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 641. *das braune Haselhuhn von der Hudsonsbay.*

Klein, av. p. 117. n. 6. *Lagopus e fusco et albo in inferiore corporis parte; e fusco et nigro in superiore; ad oculos duabus lineis albis varia, freti Hudsonis.*

Klein, Vorbereit. p. 217. n. 6. *das braune Haselhuhn von der Hudsonsbay.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 121. n. 6. *Hudsons Haselhuhn.*

Briffon, ornith. I. p. 56. n. 6. *Gelinote de la Baye de Hudson.*

Büffon, Vögel, p. 121. *das kanadensfische Berghuhn, oder dunkle Schneehuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 214. *Spotted Grouse.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 637. n. 6. *Tetrao (Canadensis) fulvus, cinereo varius subtus albus lunulis nigris, rectricibus nigris, apice fulvis, lituris duabus albis ad oculos.*

Seligmann, Vögel, III. tab. 37. *das braune fleckigte Haselhuhn.*

Martini,

Martini, Naturlex. III. p. 524. *kanadenſiſches Berg-*
huhn.

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 159. n. 3. Tetrao
(Canadenſis) pedibus hirsutis, rectricibus nigris
apice fulvis, lituris duabus albis ad oculos.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 329. n. 4.
das gefleckte Waldhuhn.

b. CANACE (Das Weibchen vom vorigen.)

Müller, Naturſyſt. II. p. 185. n. 7. *das weißgefleck-*
te Huhn.

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 640. *das kleinere Holz-*
huhn aus Canada.

Briffon, ornith. I. p. 57. n. 7. Gelinote de Canada.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 637. n. 6. β. Tetr.
cauda integra, macula alba pone aures naresque
(femina).

Seligmann, Vögel, V. tab. 13. *das ſchwarzgefleck-*
te Haſel- oder Birkhuhn.

Ellis, Reif. n. Hudſonsmeerb. p. 35. *das braune*
und fleckigte Birkhuhn.

4. LAGOPUS. *Das Schneehuhn.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 482. n. 4. *das Schnee-*
huhn.

Leske, Naturgeſch. p. 227. n. 4. *das Schneehuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 189. n. 4. *das Schnee-*
huhn.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 203. n. 5. Tetrao
(Lagopus) pedibus lanatis, remigibus albis,
rectricibus nigris, apice albis; intermediis al-
bis; *das Schneehuhn; Rypen.*

Bechstein, Naturgeſch. I. p. 477. n. 4. *das Schnee-*
huhn.

Bechstein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 508. n. 4.
das Schneehuhn, p. 513. das weiße Birkhuhn,
Haſel-

Haselhuhn, oder Rebhuhn; Rypen; Weißhahn; Schneehase; Ptarmigan.

Ebert, Naturl. II. p. 116. das Schneehuhn, Steinhuhn, Hasenfuß.

Halle, Vögel, p. 452. n. 475. das Schneehuhn.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 276. n. 244. das Schneehuhn.

Onomat. hist. nat. IV. p. 628. das Schneehuhn.

Klein, av. p. 116. n. 4. Lagopus simpliciter.

Klein, Vorbereit. p. 215. n. 4. Schneehuhn.

Klein, verb. Vögelhist. p. 120. n. 4. Schneehuhn, Hasenfuß.

Gesner, Vögelb. p. 450. Schneehuhn. m. e. Fig.

Pennant, arct. Zool. II. p. 294. D. der Ptarmigan; Schneehuhn von der Hudsons bay.

Briffon, ornithol. I. p. 60. n. 12. Gelinote blanche.

Büffon, Vögel, V. p. 101. das Schneehuhn.

Martini, Naturlex. III. p. 640. Schneehuhn.

Batsch, Thiere, I. p. 415. das europäische Schneehuhn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 639. n. 9. Tetrao (Lagopus) cinereo alboque varius, pedibus latis, remigibus albis, rectricibus nigris apice albis, intermediis albis.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 396. das Schneehuhn.

Beseke, Vögel Kurl. p. 70. n. 146. das Schneehuhn.

Fischer, Livl. p. 90. 120. weißes Morasthuhn; Schneehuhn.

Leem, Finnm. p. 130. weiße Haselhühner.

Olaffen, Isl. I. p. 309. i. Riupa.

Pallas, Reif. II. p. 226. — Ausz. I. p. 86. das Schneehuhn.

Pennant, Reisen d. Schottl. I. p. 71. 124. 306. Schneehühner.

Scheffer, Lappl. p. 392. Schneehühner.

Cranz,

Cranz, Grönl. p. III. *Rypen*.

Egede, Grönl. p. 88. *Rypen*; *Schneehuhn*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 173. *Rype*.

Lichtenberg, Magaz. II. I. p. 189. *Schneehuhn*.

Naturforsch. XVII. p. 71. n. 146. *das Schneehuhn*.

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 51. tab. 3.
das Schneehuhn.

Scopoli, Bern. a. d. N. G. I. p. 140. n. 170. *das Schneehuhn*.

Neue schwed. Abhandl. III. p. 107. Tetrao *Lagopus*.

Beckmann, Bibl. VI. p. 475. *Schneehuhn*.

Roberg, et *Lithenius*, de Lagopede. Upf. 1732. 4.

Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 234. n. 4.

Gött. gel. Anz. 75. p. 449. cf. 1772. p. 467.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Lagopus*.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 4. *Lagopus*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 159. n. 4. Tetrao
(*Lagopus*) *pedibus lanatis, remigibus albis,*
rectricibus nigris, apice albis, intermediis totis
albis.

Linné, fn. Suec. I. n. 169. Tetrao *rectricibus albis,*
intermediis nigris, apice albis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 223. Tetrao
(*Lagopus*) *pedibus lanatis, remigibus albis, re-*
ctricibus nigris, apice albis, intermediis albis.

Kramer, Austr. p. 356. n. 3. Tetrao *rectricibus*
albis, intermediis nigris, apice albis. Schneehuhn.

Sibbald, Scot. illustr. p. 76. *Lagopus*.

Charleton, onom. zoic. p. 74. n. 5. *Perdix alba f.*
Lagopus.

Jonston, av. p. 68. *Perdix alba seu Lagopus.*

Scheuchzer, phys. Sacr. L. 9. c. 48. p. 1009. *La-*
gopedes.

Hermann, tab. affin. anim. p. 164. 167. Tetrao *La-*
gopus.

Philos. transact. LXIII. p. 224. Tetr. Lagopus.
Martin: act. Soc. Lond. III. p. 55. Tetrao mutus.
Bomar. Diction. I. p. 355. VIII. p. 348. — Dict. des
 Anim. I. p. 367. III. p. 386. Arbenne; Orbaine;
 Perdrix blanche; Lagopede; Poule de neige.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 329 das
Schneehuhn.

β. *Das bunte Schneehuhn.*

Müller, Natursyft. II. p. 483. ein buntes Schnee-
 huhn.
Gesner, Vögelb. p. 452. das Steinhuhn. m. e. Fig.
 Neue schwed. Abhandl. III. p. 108.
Gerin. ornithol. II. p. 85. tab. 240. Tetr. varius.

γ. *Das schottische Schneehuhn.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 633. der *Mur-Hahn*.
Gesner, Vögelb. p. 337. *Murhan*. Gallus palustris.
Briffon, ornith. II. p. 55. n. 5. Gelinote d'Ecosse.
Büffon, Vögel, V. p. 73. das Schottische Hasel-
 huhn; der *Mur-* oder *Moorhahn*.
Martini, Naturlex. III. p. 577. Schottisches Hasel-
 huhn.

δ. *Das rothe Schneehuhn.* (6)

Halle, Vögel, p. 453. n. 476. das rothe Hasel-
 huhn.
Klein, av. p. 117. n. 5. Lagopus altera.
Klein, Vorbereit. p. 217. n. 5. *Roths Holz-, Ha-
 selhuhn*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 121. n. 5. *Roths Hasel-
 huhn, Holzhuhn*.
 Onomat. hist. nat. IV. p. 632. die arabische *Al-
 chata*.

Briffon,

(6) Nach *Latham* eine eigne Gattung, zu welcher auch die Syno-
 nymen der vorhergehenden Varietät gehören sollen. *Briffon*
 und *Büffon* machen aus beyden besondere Gattungen.

Briffon, ornith. I. p. 58. n. 9. Gelinote lupée.

Büffon, Vögel, V. p. 88. *das rothe Haselhuhn*;
m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 216. Red Grouse.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 641. n. 15. Tetrao
(Scoticus) rufo et nigricante transversim striatus,
rectricibus 6. utrinque exterioribus nigricantibus.

Martini, Naturlex. III. p. 569. *rothes Haselhuhn*.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 87. tab. 38.

Frisch, Vögel, tab. 112. *das Haselhuhn?* (Weibchen).

Sibbald, Scot. illustr. p. 16. Lagopus altera.

Charleton, onom. zoic. p. 73. n. 7. Attagen;
Perdix Asclepia.

Belon, hist. nat. des ois. p. 241. Francolin.

Jonston, av. p. 62. Attagen.

Bomare, Diction. IV. p. 573. — Diction. des
anim. I. p. 707.

23. ALBUS. *Das weiße Waldhuhn.* (?)

Bechstein, Naturgesch. I. p. 477. n. 5. *das weiße Waldhuhn*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 513. n. 5.
das weiße Waldhuhn.

Büffon, Vögel, V. p. 115. *das Schneehuhn, oder weiße Rebhuhn von Hudsonsbay*; m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 652. *Schneehuhn von Hudsonsbay*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 288. n. 99. *das weiße Waldhuhn*. Titelpupf.

Latham, Syst. ornith. II. p. 639. n. 10. Tetrao
(Albus) aurantius, fasciis atris et lituris albis var-
G 2 rius,

- (7) Sollte dies wohl eine eigne Gattung seyn? Die Synonymen dieser und der vorhergehenden Gattung werden häufig verwechselt. — Flügelweite, nach *Pennant*, 23. Zoll, Gewicht 24. Unzen.

rius, digitis hirsutis, rectricibus atris apice albis, intermediis totis albis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 39. *das weiße Birkhuhn.*

Ellis, Reif. nach Hudsonsmeerbus. p. 36. *das weiße Rebhuhn.*

Schlözer, Erdbeschr. von Amer. p. 112. *das weiße Rebhuhn.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 330. n. 6. *das weiße Waldhuhn.*

24. RUPESTRIS. *Das Felsenhuhn.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 291. n. 100. *das Felsenhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 217. Rock Grouse.

Latham, Syst. ornith. II. p. 640. n. 11. Tetrao (Rupestris) aurantius, fasciis atris et lituris albis varius, digitis plumosis, rectricibus atris apice albis, intermediis totis albis, loris nigris.

25. LAPPONICUS. *Der Rehufak.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 295. E. *der Rehufak.*

Latham, Syn. Suppl. p. 216. Rehufak Grouse.

Latham, Syst. ornith. II. p. 640. n. 12. Tetrao (Lapponicus) dorso nigro ferrugineo vario, collo ferrugineo nigro maculato, pectore crissoque albis.

5. CUPIDO. *Der Schneemerkur.* ⁽⁸⁾

Müller, Naturfyst. II. p. 483. n. 5. *der Pensylvanische Fasan.* Tab. XIX. Fig. 3.

Borowsky, Thierreich, II. p. 190. n. 5. *der Schneemerkur.*

Ebert, Naturl. II. p. 117. *der pensylvanische Fasan.* Halle,

(8) *Buffon* scheint diese Gattung mit dem *Kragenhuhn* für einerley zu halten.

Halle, Vögel, p. 454. n. 478. *Das dunkelbraune Birkhuhn, mit Merkursflügeln am Kopfe. Schneemerkur.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 278. n. 245. *Schneemerkur; gefiederte Cupido.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 185. n. 96. *der Schneemerkur.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 625. *der kl. inre Auerhahn.*
Klein, av. p. 117. n. 7. *Lagopus f. Urogallus minor, americanus.*

Klein, Vorbereit. p. 217. n. 7. *der kleinere Auerhahn aus Amerika.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 121. n. 7. *amerikanischer Birkhahn; Gaukler.*

Briffon, ornith. I. p. 59. n. 10. *Gelinote hupée d'Amérique.*

Büffon, Vögel, V. p. 235. *der Schneemerkur.*

Martini, Naturlex. III. p. 645. *Schneemerkur.*

Batsch, Thiere, I. p. 412. *der Schneemerkur.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 638 n. 8. *Tetrao (Cupido) subcristatus fusco-rufescens, nigro et albicante transversim striatus, alis succenturiatis cervicalibus.*

Seligmann, Vögel, IV. tab. 104. *der amerikanische Birkhahn.*

Schöpf, Reif. d. Nordamer. II. p. 8. *Tetrao Cupido.*

Neue Mannigfaltigk. I. p. 3. *der Schneemerkur.*

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 106. n. 6. *Tetrao (Cupido) pedibus hirsutis, alis succenturiatis cervicalibus.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 166. *Tetrao Cupido.*

6. UMBELLUS. *Das Kragenhuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 485. n. 6. *das Kragenhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 185. n. 1. *der Auerhahn mit der Halskrause*, tab. 31.

Halle, Vögel, p. 454. n. 480. *das Birkhuhn mit dem Kragen*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 627. *der pensylvanische Auerhahn*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 169. *Birkhahn mit dem Kragen*.

Briffon, ornith. I. p. 59. n. 11. *Gelinote hupée de Pensylvanie*.

Büffon, Vögel, V. p. 118. *das Kragenhuhn; Mandelhuhn; m. e. Fig.*

Martini, Naturlex. III. p. 581. *das Kragenhuhn*.

Batsch, Thiere, I. p. 412. *das Kragenhuhn*.

Latham, Syn. Suppl. p. 215. *Ruffed Grouse*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 638. n. 7. *Tetrao (Umbellus) fusco rufo nigroque variegatus, sub- tus fulvo - albus, rectricibus nigro fasciatis apice cinereis, cervicali umbone exstante*.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 38. *der Auerhahn mit der Halskrause*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 282. n. 95. *das Kragenhuhn*.

Schöpf, Reisen durch Nordamer. II. p. 8. *Tetrao umbellus. Phasanen*.

Neue Mannigfaltigk. III. p. 211. *das Kragenhuhn. Fig. p. 224.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 166. *Tetrao Umbellus*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 331. n. 7. *das Kragenhuhn*.

8. TOGATUS. *Das Mantelhuhn.* (9)

Müller, Naturfyst. II. p. 485. n. 8. *das Mantelhuhn*.

Onomat.

(9) Nach *Latham* das Weibchen von *Tetrao Umbellus*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 639. *das große Holzhuhn aus Canada.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 638. n. 7. β . Tetr. pennis axillaribus maioribus nigris azureis.

Brissou, ornith. I. p. 57. n. 8. *große Gelinote de Canada.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 166. Tetrao Togatus.

9. BONASIA. *Das Haselhuhn.*

Müller, Naturfyst. II. p. 485. n. 9. *das Haselhuhn.*

Leske, Naturgesch. p. 272. n. 3. *das Haselhuhn.*

Borowsky, Thierr. II. p. 191. n. 6. *das Haselhuhn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 203. n. 4. Tetrao (Bonasia) pedibus hirsutis, rectricibus cinereis, punctis nigris fascia nigra: exceptis intermediis duabus; *das Haselhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 476. n. 3. *das Haselhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 500. n. 3. *das Haselhuhn*, p. 507. *Haselwildpret; Rothhuhn; Jerpe.* tab. 18.

Funke, Naturgesch. I. p. 228. *das Haselhuhn.*

Ebert, Naturl. II. p. 116. *das Haselhuhn.*

Halle, Vögel, p. 449. n. 473. *das Haselhuhn.*

Meyer, Thiere, II. p. 25. tab. 89. *das Haselhuhn*, mit dem Gerippe.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 278. n. 247. *das Haselhuhn.*

Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 670. *Haselhuhn.*

Onomat. hist. nat. II. p. 461. IV. p. 634. *das Haselhuhn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 296. *das Haselhuhn.*

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 116. *das Haselhuhn.*

Klein, av. p. 116. n. 3. *Lagopus Corylorum*.

Klein, Vorbereit. p. 215. n. 3. *Hasel- , Hasfelhuhn*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 120. n. 3. *Haselhuhn ;
Rotthuhn*.

Klein, Stemmat. av. p. 25. tab. 26. fig. 3. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. fig. 4.

Gesner, Thierb. p. 335. *Haselhun ; m. e. Fig.*

Briffon, ornith. I. p. 53. n. 3. *Gelinote*.

Buffon, Vögel, V. p. 62. *das Haselhuhn ; mit
2. Figg.*

Martini, Naturlex. III. p. 552. *Haselhuhn*.

Batsch, Thiere, I. p. 413. *das Haselhuhn*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 640. n. 14. *Tetrao
(Bonasia) rufescens fusco-maculatus, rectrici-
bus cinereis punctis nigris fascia nigra, excep-
tis intermediis duabus.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 70. n. 147. *das Haselhuhn*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 397. *das Hasel-
huhn*.

Fischer, Liv. p. 90. n. 121. *Haselhuhn*.

Taube, Slavon. I. p. 22. *Haselhühner*.

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 71. *Haselhühner*.

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 87. *das Haselhuhn*.

Naturforsch. XVII. p. 71. n. 147. XVIII. p. 235.
Haselhuhn.

Linné, Abhandl. II. p. 298. n. 107. *das Haselhuhn*.

Scopoli, Bern. aus der N. G. I. p. 142. n. 173. *das
Haselhuhn*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 48. *Haselhuhn*.

Loniceri, Kräuterb. p. 676. *Haselhuhn*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 280. *das Hasfel-Hun*.

Krünitz, Encykl. XXII. p. 191. *Hasel-Hun*.

Heppe, wohlred. Jäger. p. 185. *Haselhuhn*.

Anweis. Vögel zu fang. p. 301. *Haselhuhn*.

Merklein, Thierreich. p. 294. *Hasel-Hun*.

Beckmann, Bibl. VI. p. 395. *das Haselhuhn*.

Schwed.

Schwed. Abhandl. 1751. p. 142. *Haselhuhn*.

Eberhard, Thiergesch. p. 65. n. 3. *das Haselhuhn*.

Meidinger, Vorl. I. p. 142. n. 3. *das Haselhuhn*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 434. *Haselhuhn*.

Fischer, livländ. Landwirthsch. p. 634. *Haselhuhn*.

Frisch, Vögel, tab. 112. *das Haselhuhn*.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 92.

Borkhausen, Magazin, I. p. 223. n. 98.

Onomatol. forestal. II. p. 58.

Onomatol. oeconom. pract. II. p. 40.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Bonasia.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 5. Bonasia.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 160. n. 7. Tetrao
(Bonasia) pedibus hirsutis, rectricibus cinereis,
punctis nigris fascia nigra, exceptis intermediis
duabus.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 224. Tetrao
(Bonasia) pedibus hirsutis, rectricibus cinereis,
punctis nigris fascia nigra, exceptis intermediis
duabus.

Kramer, Austr. p. 356. n. 4. Tetrao rectricibus
cinereis punctis nigris fascia lata nigra, excep-
tis intermediis duabus. *Haselhun*.

Charleton, onom. zoic. p. 73. n. 6. Gallina Cory-
lorum.

Charleton, exercitat. p. 82. n. 7. Gallina Cory-
lorum.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 277. Gallina Corylorum.
Haselhun, *Rotthun*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 366. At-
tagen.

Jonston, av. p. 63. Gallina Corylorum.

Gerin, ornithol. II. p. 84. tab. 238.

Hermann, tab. affin. anim. p. 164. Tetrao Bonasia.

Bomare Diction. V. p. 59. — Diction. des anim.
II. p. 258.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 331. n. 8.
das Haselhuhn.

26. CANUS. *Das graue Waldhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 217. Helsingian Grouse.

Latham, Syst. ornith. II. p. 640. n. 13. Tetrao
(Canus) corpore cano fusco undulato, rostro
pedibusque nigris.

II. ALCHATA. *Das pyrenäische Haselhuhn.*

Müller, Naturfyst. II. p. 487. n. 11. das pyrenäi-
sche Haselhuhn.

Borowsky, Thierreich, II. p. 192. n. 7. das Pyre-
näische Haselhuhn, tab. 31. B.

Halle, Vögel, p. 441. n. 463. der Feldengel.

Halle, Vögel, p. 454. n. 479 das Afrikanische
Waldhuhn.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 282. n.
249. der Feldengel.

Onomat. hist. nat. IV. p. 632. die Arabische Al-
chata.

Klein, av. p. 115. n. 5. Perdix Alchata seu Fila-
cotoa.

Klein, Vorbereit. p. 213. n. 5. arabische Alchata.

Klein, verb. Vögelhist. p. 119. n. 5. arabisches Reb-
huhn, p. 121. n. 8. afrikanischer Rauchfuß,
p. 169. n. 2. kleiner Birkhahn mit zwey laugen
Schwanzspitzen.

Briffon, ornith. I. p. 54. n. 4. Gelinote des Pyr-
nées.

Büffon, Vögel, V. p. 76. das Pyrenäische Hasel-
huhn; Feldengel; Ganga. M. 2. Figg.

Martini, Naturlex. III. p. 561. das pyrenäische Ha-
selhuhn.

Batsch, Thiere, I. p. 214. das pyrenäische Hasel-
huhn.

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 641. n. 16. Tetrao (Alchata) olivaceo - flavicante nigro rufoque varius, abdomine albo, rectricibus duabus intermediis duplo longioribus subulatis.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 39. *der kleine Auerhahn mit zwey nadelförmigen Federn in dem Schwanz.*

Shaw, Reise, p. 163. *der Kitawiah.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 22. Tetrao Alchata.

Neue Schwed. Abhandl. III. p. 108. Tetrao Alchata.

Belon, hist. nat. des ois. p. 259. Perdrix de Damas ou de Syrie.

Hist. Prov. I. p. 354. Grandoule.

Hermann, tab. affin. anim. p. 164. Tetrao Alchata.

β. *Das Senegallische Berghuhn.* (10)

Müller, Natur Syst. Suppl. p. 127. n. 9. a. *das Senegallische Berghuhn.*

Büffon, Vögel, V. p. 83. *Senegalisches Berg- oder Haselhuhn.* M. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 526. *Senegalisches Berghuhn.*

Latham, Syn. II. 2. p. 749. n. 14. A. Senegal Grous.

Latham, Syst. ornith. II. p. 642. n. 17. Tetrao (Senegalus) pedibus hirsutis testaceus, rectricibus duabus mediis duplo longioribus.

γ. *Das langgeschwänzte Berghuhn.*

Büffon, Vögel, V. p. 87. *das langgeschwänzte Waldhuhn.*

27. NAMAQUA. *Das afrikanische Waldhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 215. Namaqua Grous.

Latham,

(10) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

Latham, Syst. ornith. II. p. 642. n. 19. Tetrao (Namaqua) pedibus hirsutis, dorso castaneo, abdomine nigricante, rectricibus duabus medijs longioribus subulatis.

Sparrmann, Reif. n. d. Vorgeb. d. g. H. p. 147.

28. INDICUS. *Das indianische Waldhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 650. n. 23. Perdix (Indica) mutica rufa fasciis nigris, fincipite albo lunula nigra, remigibus secundariis albo nigroque alternatim fasciatis, medio rufis.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 128. *das indische Haselhuhn*, p. 129. *die chinesische Wachtel*, tab. 96.

29. ARENARIUS. *Das russische Sandhuhn.*

Büffon, Vögel, V. p. 142. *das russische Sand- oder Steppenlühn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 642. n. 18. Tetrao (Arenarius) torque, abdomine et crisso atris, rectricibus fusco et griseo fasciatis apice albis, intermediis 2. fulvescentibus.

Pallas, Reif. Ausz. III Anh. p. 10. n. 27. Tetrao arenaria, Tataris *Dsherdk*.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 17. *das langschwänzige Berghuhn.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 164. T. arenaria. Comment. Lips. XXII. p. 665.

†† *Mit dreyzehigen Füßen.*

30. PARADOXUS. *Das Bastardberghuhn.*

Müller, Natur Syst. Suppl. p. 127. n. 9. b. *das Bastardhuhn.*

Büffon, Vögel, V. p. 140. *das Bastardberghuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 643. n. 20. Tetrao (Paradoxus) pedibus tridactylis hirsutis, dorso griseo

griseo nigroque undulato, abdomine nigro maculis pallidis latioribus, colli macula fulva.

Pallas, Reif. Ausz. II. Anh. p. 13. n. 25. Tetrao paradoxus, tab. F.

Hermann, tab. affin. anim. p. 163. Tetr. paradoxus.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 332. n. 9. das Bastardberghuhn.

** Mit warziger Haut um den Augen, und nackten Füßen.

† Mit Sporen an den Füßen, bey dem Männchen: Rebhühner.

10. FRANCOLINUS. Der Frankolin.

Müller, Naturfyst. II. p. 486. n. 10. das indische Huhn.

Halle, Vögel, p. 441. n. 464. das Cipriscche Rebhuhn.

Onomat. hist. nat. VII. p. 513. der Frankolin.

Klein, verb. Vögelhist. p. 168. Cyprisches Rebhuhn.

Briffon, ornith. I. p. 68. n. 13. Francolin.

Büffon, Vögel, VI. p. 59. der Frankolin. M. 2. Figg.

Martini, Naturlex. III. p. 543. Frankolin.

Batsch, Thiere, I. p. 415. der Frankolin.

Latham, Syst. ornith. II. p. 644. n. 6. Perdix (Francolinus) calcarata, corpore vario, abdomine gulaque atris, cauda cuneata.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 36. das Haseluhn.

Hasselquist, Palaeft. (ed. germ.) p. 330. n. 43. Tetrao orientalis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 161. n. 12. Tetrao (Orientalis) pedibus antice pilosis, abdomine gulaque atris, collari ferrugineo, cauda cuneiformi.

Zinnan, Uov. p. 28. tab. 3. Fig. 6. Francolino.

Bomare,

Bomare, Diction. IV. p. 573. — Dict. des anim.
II. 219.

31. MADAGASCARIENSIS. *Das madagascari-
sche Rebhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 219. Pintado Partridge.

Latham, Syst. ornith. II. p. 645. n. 8. *Perdix*
(*Madagascariensis*) *calcarata*, *supra varia*, *ab-*
domine nigro, *maculis albis*, *fascia per ocu-*
los alteraque infra nigris.

12. RUFUS. *Das rothe Rebhuhn.*

Müller, Naturfysl. II. p. 488. n. 12. *das rothe*
Rebhuhn, tab. 24. Fig. 4.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 479. n. 7. *das Roth-*
huhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 519. n. 8.
das Rothhuhn, p. 524. *rothes Rebhuhn*; *grie-*
chisches Rebhuhn; *Berghuhn*, *Steinhuhn*; *rothes*
europäisches Rebhuhn; *italiänisches Rebhuhn*;
welsches Rebhuhn; *rothfüßiges Rebhuhn*; *Per-*
nise; *Cottorna*. — cf. p. 672.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 525. a.
das griechische Rothhuhn.

Borowsky, Thierreich, II. p. 192. n. 8. *das ro-*
the Rebhuhn.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 203. n. 3. Tetrao
(*Rufus*) *pedibus nudis calcaratis rostroque san-*
guineis, *gula alba cincta fascia nigra*, *albo pun-*
ctata.

Ebert, Naturl. II. p. 118. *das rothbeinige oder*
spanische Rebhuhn.

Halle, Vögel, p. 440. n. 462. *das Rothhuhn*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 283. n.
250. *das rothe Rebhuhn*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 517. *das Rothhuhn*.

Klein,

Klein, av. p. 115. n. 4. *Perdix graeca*.

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 4. *das feuerrothe Feldhuhn aus Griechenland*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 119. n. 4. *griechisches Rebhuhn*.

Briffon, ornithol. I. p. 67. n. 12. *Bartavelle*.

Büffon, Vögel, V. p. 37. *das rothe Rebhuhn, oder griechische Feldhuhn*.

Martini, Naturlex. III. p. 620. *rothes Rebhuhn*.

Batsch, Thiere, I. p. 416. *das rothe Feldhuhn*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 647. n. 12. *Perdix* (Rufa) pedibus calcaratis rostroque sanguineis, gula alba cincta fascia nigra albo punctata.

Frisch, Vögel, tab. 117. *das rothe italiänische Rebhuhn*.

Altmann, Helvetien, p. 224.

Anweis. Vögel zu fang. p. 602. *rothe Rebhühner*.

Onomatol. forestal. III. p. 145.

Linne, Syst. Nat. Edit. VI. p. 28. n. 6. *Perdix rufa*.

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 160. n. 8. *Tetrao* (Rufus) rostro pedibusque sanguineis, gula alba cincta fascia nigra albo punctata.

Kramer, Austr. p. 357. n. 5. *Tetrao rectricibus cinereis superiore medietate hinc inde rufis*.

Charleton, onom. zoic. p. 74. n. 12. *Perdix graeca*.

Jonston, av. p. 68. *Perdix graeca*.

Zinnman, Uov. p. 29. tab. 3. Fig. 7. *Pernice*.

Bomare, Dictionn. VIII. p. 349. — Diction. des anim. III. p. 388.

Belon, hist. nat. des ois. p. 257. *Perdrix de Grece*.

Domdorff, Handb. d. Thiergesch. p. 332. n. 10. *das rothe Rebhuhn*.

β. *Das rothe europäische Rebhuhn.* (¹)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 519. und die p. 524. angeführten Synonymen. (f. vorher.)

Klein, av. p. 115. n. 4. *Perdix rufa*.

Briffon, ornith. I. p. 66. n. 10. *Perdrix rouge*.

Büffon, Vögel, VI. p. 51. *das rothe europäische Rebhuhn*.

Gesner, Vögelb. p. 415. *Rothun*, oder *Welsches Räbhun*, fig. p. 416. schl.

Martini, Naturlex. III. p. 632. *rothes europäisches Rebhuhn*.

Latham, Syn. Suppl. p. 220. *Guernsey Partridge*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 647. n. 12. β.

Scopoli, Bemerk. a. d. N. G. I. p. 143. n. 174. *das Steinhuhn oder Berghuhn*.

Charleton, onom. zoic. p. 74. n. 2. *Perdix rufa*.

Jonston, av. p. 68. *Perdix rufa*.

γ. *Das weißbunte Rebhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 527. c. *das weißbunte Rebhuhn*.

Büffon, Vögel, p. 58. *das roth-und weiße Rebhuhn*.

Briffon, ornith. I. p. 66. n. 10. A. *Perdrix rouge blanche*.

δ. *Das Rebhuhn aus der Barbarey.* (²)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 525. b. *das barbarische Rothhuhn*.

Briffon, ornith. I. p. 67. n. 11. *Perdrix rouge de Barbarie*.

Klein, av. p. 115. n. 4. *Perdix barbara*.

Büffon, Vögel, VI. p. 73. *rothes Rebhuhn aus der Barbarey*. M. e. Fig.

Martini,

(1) Nach *Briffon* und *Büffon* eine eigne Gattung.

(2) Nach *Briffon* und *Büffon* eine eigne Gattung.

Martini, Naturlex. III. p. 632. *rothes Rebhuhn aus der Barbarey.*

Latham, Syn. II. 2. p. 770.

Latham, Syst. ornith. II. p. 647. n. 12. γ.

Seligmann, Vögel, III. tab. 35. *das rothfüßige Rebhuhn aus der Barbarey.*

Shaw, Reif. p. 163. *das Rebhuhn in der Barbarey.*

Cetti, Sardin. II. p. III. *das große rothe italienische Rebhuhn?*

13. PERDIX. *Das gemeine Rebhuhn.*

Müller, Naturyst. II. p. 488. n. 1. *das graue oder gemeine Rebhuhn.* tab. 24. fig. 5.

Leske, Naturgesch. p. 226. n. 2. *das Rebhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 193. n. 9. *gemeine Rebhuhn.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 202. n. 2. Tetrao (Perdix) pedibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo. *Das Rebhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 478. n. 6. *das gemeine Rebhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 527. n. 9. *das gemeine Rebhuhn*, p. 553. *Räbhuhn; Repphuhn; Ruffhuhn; Feldhuhn; Wildhuhn; graues Rebhuhn.*

Funke, Naturgesch. I. p. 228. *das Rebhuhn.*

Ebert, Naturl. II. p. 118. *das gemeine Rebhuhn.*

Halle, Vögel, p. 437. n. 459. *das gemeine Rebhuhn.*

Meyer, Thiere, II. p. 25. tab. 88. *das Rebhuhn; mit dem Gerippe.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 284. n. 252. *das Rebhuhn.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VII. p. 68. *Rebhuhn.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 515. *das Feldhuhn.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 68. *das Rebhuhn.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 116. *das Rebhuhn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 298. A. *das gemeine Rebhuhn.*

Beckmann, Naturhist. p. 50. c. *das Rebhuhn.*

Klein, av. p. 114. n. 1. *Perdix cinerea, vulgaris, nostras.*

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 1. *gemeines Feldhuhn.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 118. n. 1. *gemeines Rebhuhn.*

Klein, Stemmat. av. p. 25. tab. 26. fig. 2. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 15. fig. 5.

Gesner, Vögelb. p. 407. *Räbhun*; m. e. ziemlich guten Fig.

Briffon, ornith. I. p. 61. n. 1. *Perdrix grise.*

Büffon, Vögel, VI. p. 12. *das gemeine oder graue Rebhuhn*, m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 587. *das gemeine Rebhuhn.*

Batsch, Thiere, I. p. 416. *das gemeine Rebhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 645. n. 9. *Perdix (Cinerea) calcarata, cinereo rufo et nigro varia, macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 71. n. 148. *das Feldhuhn.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 48. n. 2. *das Rebhuhn; Rapphohn.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 399. *das Rebhuhn.*

Fischer, Livl. p. 90. 122. *Rebhuhn.*

Taube, Slavon. I. p. 22. *Rebhühner.*

Pallas, Reisen, III. p. 296. *Rebhühner*, p. 473. (Rebhühnerfang.)

Strahlenberg, Asien, p. 354. *Feld- oder Rebhühner.*

Pontop-

- Pontoppidan*, Dännem. p. 172. *Agerhöne*.
Pennant, britt. Thiergesch. p. 88. tab. 41. fig. 1. 2.
Pallas, nord. Beytr. III. p. 16. *Feldhühner*.
Boswell, Beschr. von Corfica p. 45. *Rebhühner*.
Borkhausen, Magaz. I. p. 224. n. 99.
 Neue schwed. Abhandl. IV. p. 47. *Rebhühner*.
Linné, Abhandl. II. p. 298. n. 108. *das Rebhuhn*.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 143. n. 175. *das Rebhuhn*.
Naturforsch. XVII. p. 72. n. 148. *das graue Rebhuhn*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 119. 281. 507. *das Feld- oder Rebhuhn*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 49. *Rebhuhn*.
Naumann, Vogelsteller, p. 176. *Feldhühner*.
Eberhard, Thiergesch. p. 65. *das Rebhuhn*.
Loniceri, Kräuterb. p. 675. *Rebhuhn*.
Walther, ökon. Naturgesch. Deutschl. p. 162. *Rebhuhn*.
André, u. Bechstein, Spazierg. III. p. 66. 70. 72. *Rebhuhn*.
Anweil. Vögel zu fang. p. 444. *das Rebhuhn*.
Geoffroy, mater. med. VII. p. 625. *das gemeine Rebhuhn*.
Lichtenberg, Magazin für das Neueste, etc. III. 1. p. 63. 65. *das Rebhuhn*.
Meidinger, Vorles. I. p. 142. n. 2. *das Rebhuhn*.
Jablonsky, allgem. Lex. p. 879. *Rebhuhn; Wildhuhn*.
Merklein, Thierreich, p. 338. *Rebhuhn*.
Mannigfaltigk. I. p. 298. II. p. 623.
Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 236.
Oekon. Zool. p. 88. n. 30. *das Rebhuhn*.
Beckmann, Beschr. der Kurm. Brandenb. I. p. 811.
Onomatol. forestal. III. p. 143.
Onomatol. oecon. pract. III. p. 39.

Lemmercy, Materiallex. p. 854.

Hannöy, Beytr. 1759. p. 266.

Anon. Précis de la nature d'élever les Faifans et les Perdreaux. Paris 1772. 12.

Aldrovand. encom. Perdices: in Dornav. amphitheatr. I. p. 433.

Clodii, diff. de Perdice. Witteb. 1671. 4.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Perdix.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 7. Perdix cinerea.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 160. n. 9. Tetrao (Perdix) pedibus nudis, macula nuda coccinea pone oculos, cauda ferruginea, sterno brunneo.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 125. Tetrao (Perdix) pedibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo.

Kramer, Austr. p. 357. n. 5. Tetrao macula nuda coccinea pone oculos, rectricibus ferrugineis. *Rebhun.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 327. Perdix. *Räbhun; Wild-Hun.*

Charleton, onom. zoic. p. 74. Perdix cinerea. p. 75. n. 7. Perdix vulgaris.

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 147. Perdix.

Jonston, av. p. 68. Perdix cinerea seu minor.

Forskål, fn. orient. p. VII. n. 11. Tetrao Perdix; turc. *Tjeklik*; ad *Tor Schingan*; Djiddae *Hädjal.*

Schaeffer, element. ornithol. tab. 54.

Zinnan. Uov. p. 30. tab. 3. fig. 8. Starna.

Bomare, Diction. VIII. p. 343. — Diction. des anim. III. p. 383.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 11. n. 123. 144. Πηγδikes.

2. B. Mos. c. 16. v. 13. — Psalm 78. v. 26. —
Jerem. c. 17. v. 1. — Sam. 26. v. 20.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 332. n. 11.
das gemeine Rebhuhn.

Donndorff, Natur u. Kunst, III. p. 354. *das Reb-*
huhn.

β. *Das grauweiße Rebhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 553. n. 1.

Briffon, ornith. I. p. 62. A. Perdrix grise blanche.

Büffon, Vögel, VI. p. 31. *das grauweiße Reb-*
huhn.

Martini, Naturlex. III. p. 613. *grauweißes Reb-*
huhn.

Latham, Syn. II. 2. p. 763.

Latham, Syst. ornith. II. p. 646. n. 9. β.

γ. *Das ganz weiße Rebhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 553. it.
p. 672.

Frisch, Vögel, tab. 116. *das weiße Rebhuhn.*

Martini, Naturlex. III. p. 639. *weißes Rebhuhn.*

Scaliger, exerc. in Cardan. 59. Perdices albae?

Pontoppidan, Dännem. p. 172. not. 20. *ein weißes*
Rephuhn.

δ. *Das Rebhuhn mit dem Halsbände.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 553. n. 3.

Latham, Syn. II. 2. p. 764.

ε. *Das bunte Rebhuhn.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 553. n. 2.

32. DAMASCENUS. *Das Damascener Rebhuhn.* (3)

Halle, Vögel, p. 439. n. 460. *das Damascener-*
feldhuhn.

Klein, av. p. 114. n. 2. Perdix Damascena.

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 2. *Damascener.*

H 3

Klein,

(3) Nach *Briffon* eine Varietät von *Tetr. Perdix*

Klein, verb. Vögelhist. p. 118. n. 2. *Damascener*.
Briffon, ornith. I. p. 62. B. Perdrix de Damas.
Büffon, Vögel, VI. p. 33. *das Damascener- oder*
kleine graue Rebhuhn.

Martini, Naturlex. III. p. 610. *damaszener Reb-*
huhn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 646. n. 10. Perdix
 (Damascena) cauda ferruginea, pectore brun-
 neo, pedibus flavis.

Charleton, onomast. zoic. p. 74. n. 4. Perdix Da-
 mascena.

Jonston, av. p. 68. Perdix Damascena.

Bomare, Diction. VIII. p. 350. n. 6. Dict. des
 anim. III. p. 388.

33. MONTANUS. *Das Bergrebhuhn*. (4)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 554. n. 4.
das Bergrebhuhn.

Briffon, ornithol. I. p. 62. n. 2. Perdrix de mon-
 tagne.

Büffon, Vögel, VI. p. 36. *das Bergrebhuhn*; m.
 e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 608. *Bergrebhuhn*;
schwarzbraunes Rebhuhn.

Latham, Syn. II. 2. p. 765. n. 10. Mountain Par-
 tridge.

Latham, Syst. ornith. II. p. 646. n. 11. Perdix
 (Montana) dilute castanea, capite et collo su-
 premo fulvis, rectricibus septem extimis pal-
 lide castaneis.

34. RUBRICOLLIS. *Das rothkehlige afrikanische* *Rebhuhn*.

Büffon, Vögel, VI. p. 69. *das rothe afrikanische*
Rebhuhn; m. e. Fig.

Martini,

(4) Nach *Bechstein* eine Varietät oder vielmehr ein sehr altes Männ-
 chen des gemeinen Rebhuhns.

Martini, Naturlex. III. p. 590. *das rothe afrikanische Rebhuhn.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 643. n. 13. *Perdix* (Rubricollis) calcarata, corpore fusco maculato, crisso albo, orbitis gulaque nudis rubris.

35. PETROSUS. *Das Felsenrebhuhn.*

Büffon, Vögel, VI. p. 74. *das Felsenrebhuhn; Rebhuhn von Gambia.*

Martini, Naturlex. III. p. 612. *Rebhuhn von Gambia.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 648. n. 14. *Perdix* (Petrofa) fusca, rostro, pedibus iridibusque rubris, macula pectoris ferruginea.

36. PERLATA. *Das Perlrebhuhn.*

Müller, Naturyst. Suppl. p. 129. n. 23. *das Perlberghuhn.*

Briffon, ornith. I. p. 65. n. 9. *Perdix de la Chine.*

Büffon, Vögel, VI. p. 75. *das Perlberghuhn, oder das geperlte Chinesische Rebhuhn.*

Martini, Naturlex. III. p. 586. *das Perlberghuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 648. n. 15. *Perdix* (Perlata) calcarata fusca, albido et rufescente maculata, dorso rufescente striato, gula alba, lateribus capitis fasciis duabus nigris, superciliis rufis.

β. *Das afrikanische Perlrebhuhn. (s)*

Latham, Syn. III. 2. p. 773. n. 15. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 648. n. 16. *Perdix* (Afra) calcarata fusca, fasciolis striisque albidis, superciliis colloque subtus, albo nigroque variis, remigibus caudaque lineolis transversim albis.

37. CAPENSIS. *Das Rebhuhn vom Cap.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 643. n. 1. Perdix (Capensis) subbicalcarata cinereo-nigricans, griseo-fescente transversim lineata, pectore strigis albis, pedibus rubris.

15. BICALCARATUS. *Das doppeltgespornte senegalische Rebhuhn.*

Müller, Naturfyst. II. p. 490. n. 15. der Doppelsporn.

Briffon, ornithol. I. p. 65. n. 8. Perdrix du Senegal.

Büffon, Vögel, VI. p. 67. der Doppelsporn, m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 542. das Senegalische Rebhuhn.

Batsch, Thiere, I. p. 416. der Doppelsporn.

Onomat. hist. nat. VII. p. 511. das Rebhun aus Senegal mit zwey Sporen.

Latham, Syst. ornith. II. p. 643. n. 2. Perdix (Bicalcarata) bicalcarata, rufo fusco et albido varia, superciliis nigris.

Adanson, Senegal. p. 37. 38. 71. 217. Rebhühner.

Hermann, tab affin. anim. p. 168. Tetr. bicalcaratus.

38. ZEYLONENSIS. *Das doppeltgespornte zeilanische Rebhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 222. Chittygong Partridge? (das Weibchen?)

Latham, Syst. ornith. II. p. 644. n. 3. Perdix (Ceylonensis) bicalcarata, capite, collo corporeque antice albo nigroque vario, postice ferrugineo.

Neueste Mannigfaltigk. I. p. 211. Fig. 1. 2.

39. SPADICEUS. *Das rothbraune madagascarishe Rebhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 644. n. 4. *Perdix* (Spadicea) bicalcarata fusco - rubra, rostro flavo, pedibus rubris.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 132. *das rothe madagascarishe Rebhuhn.*

40. NUDICOLLIS. *Das glattkehlige Rebhuhn.*

Büffon, Vögel, VI. p. 69. *die Glattkehle.*

Martini, Naturlex. III. p. 590. *die Glattkehle.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 644. n. 5. *Perdix* (Nudicollis) bicalcarata, corpore variegato, collo antice nudo rubro.

41. GINGICUS. *Das Rebhuhn aus Gingi.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 648. n. 17. *Perdix* (Gingica) rufo - grisea, superciliis albo nigro-que variis, uropygio rectricibusque alarum mediis nigro, minoribus griseo maculatis.

Sonnerat, Reif. nach Ostind. u. Chin. II. p. 130. *das Rebhuhn aus Gingi.*

42. PONDICERIANUS. *Das Rebhuhn von Pondichery.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 649. n. 18. *Perdix* (Ponticeriana) calcarata, rufa, nigro fasciata, subtus alba, lunulis nigris, rectricibus duabus mediis fasciis quatuor albidis, lateralibus intus nigro fasciatis.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 129. *das Rebhuhn von Pondichery.*

β. *Tetr. mutica* fusca, nigro fasciata, collo pectore-que albo maculis nigris, rectricibus fasciis nigris. *

Latham, Syn. Suppl. p. 221.

Latham, Syst. ornith. II. p. 649. n. 18. β . (An femina?)

43. NAEVIUS. *Der Okokolin.*

Klein, av. p. 58. n. 3. *Corvus cristatus*.

Klein, Vorbereit. p. 110. n. 3. *Straußrabe*.

Klein, verb. Vögelh. p. 58. n. 3. *Straußrabe*.

Briffon, ornith. I. p. 63. n. 3. *Perdrix de montagne du Mexique*.

Briffon, ornith. I. p. 177. n. 10. *Rollier hupé du Mexique*.

Büffon, Vögel, VI. p. 142. *der Okokolin, oder das Mexikanische Bergrebhuhn*.

Martini, Naturlex. III. p. 609. *mexikanisches Bergrebhuhn*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 649. n. 19. *Perdix* (Naevia) fusco pallente et fulvo varia, capite, gutture et lateribus nigro maculatis, rostro pedibusque incarnatis.

†† *Mit ungespörnten Füßen: Wachteln.*

* *Mit vierzehigen Füßen.*

44. FERRUGINEUS. *Die große chinesische Wachtel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 651. n. 26. *Perdix* (Ferruginea) rufo fusca, dorso rectricibusque alarum lineis longitudinalibus flavescentibus, pennis elongatis mucronatis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 133. *die große chinesische Wachtel*.

45. JAVANICUS. *Die javanische Wachtel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 651. n. 27. *Perdix* (Javanica) cinerea, lunulis obscuris, genis nigris, fronte, sincipite abdomineque fulvis, rectricibus maculis lunatis nigris.

46. VIRIDIS. *Die grüne Wachtel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 650. n. 22. *Perdix* (Viridis) viridis, alis castaneis nigro punctulatis, rostro pedibusque pallide rubris.

16. VIRGINIANUS. *Die virginische Wachtel.*

Müller, Natursyf. II. p. 490. n. 16. *das virginische Rebhuhn.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 519. *das Virginische Rebhuhn.*

Klein, av. p. 115. n. 6. *Perdix virginiana.*

Klein, Vorbereit. p. 213. n. 6. *Amerikaner aus Virginien.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 119. n. 6. *Virginisches Rebhuhn.*

Briffon, ornith. I. p. 64. n. 7. *Perdrix d'Amerique.*

Martini, Naturlex. III. p. 591. *das amerikanische Rebhuhn.*

Latham, Syf. ornith. II. p. 650. n. 24. *Perdix* (Virginiana) mutica nigro varia, supra fuscorufescens, subtus flavescens, fascia nigra supra et infra oculos, linea verticali fulva.

Büffon, ois. II. p. 399. *Perdrix d'Amerique.*

Seligmann, Vögel, IV. tab. 109. *das amerikanische Rebhuhn.*

Linné, Syf. Nat. Ed. X. I. p. 161. n. 10. *Tetrao* (Virginianus) pedibus nudis, fascia nuda supra et infra oculos, linea verticali fulva.

17. MARYLANDUS. *Die marylandische Wachtel.*

Müller, Natursyf. II. p. 490. n. 17. *das maryländische Rebhuhn.*

Halle, Vögel, p. 439. *das Amerikanische Rebhuhn.* Fig. 31.

Onomat. hist. nat. VII. p. 514. *das Rebhun aus Neu-England.*

Klein, av. p. 115. n. 3. *Perdix novae Angliae.*

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 3. *Neuengländer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 119. n. 3. *Neuengländer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 297. n. 101. *das Rebhuhn von Maryland.*

Briffon, ornith. I. p. 64. n. 6. *Perdrix de la nouvelle Angleterre.*

Büffon, Vögel, VI. p. 77. *das Marilandische Rebhuhn.*

Martini, Naturlex. III. p. 619. *das Marilandische Rebhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 651. n. 25. *Perdix (Marilanda) rufa, nigro varia, subtus albida undulatum lineata, superciliis gulaque albida.*

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 161. n. 10. *Tetrao (Marilandicus) pedibus nudis, cervice albo nigroque punctata.*

Philos. transact. XVII. p. 992. *American Partridge.*

Du Pratz, Louis. II. p. 86.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 333. n. 12. *das Marylandische Rebhuhn.*

47. KAKELIK. *Der Kakelik.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 655. n. 42. *Perdix (Kakelik) rostro, palpebris pedibusque coccineis, pectore cinereo, dorso albo et cinereo undulato.*

48. CASPIUS. *Die caspische Wachtel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 655. n. 43. *Perdix (Caspia) cinerea, spadiceo-maculata, naribus, orbitis et temporibus calvis pedibusque luteis.*

14. MEXICANUS. *Der Kolenikui.*

Müller, Naturfyft. II. p. 489. n. 14. *das mexicanische Rebhuhn.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 130. n. 26. *der Colenicui.*
Onomat. hist. nat. III. p. 128. Colcuicuiltic: *die roth gestreifte mexicanische Wachtel.*

Briffon, ornithol. I. p. 72. n. 20. Caille de la Louisiane.

Büffon, Vögel, VI. p. 139. *der Kolenicui*, m.e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 616. *Kolenicui.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 653. n. 31. *Perdix* (Mexicana) mutica, rostro pedibusque sanguineis, corpore transversim striato, linea superciliari gulaque albis.

Jonston, av. p. 224. Colcuicuiltic.

49. FALKLANDICUS. *Die maluinische Wachtel.*

Büffon, Vögel, VI. p. 116. *die Maluinische Wachtel*, m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 691. *die Maluinische Wachtel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 653. n. 32. *Perdix* (Falklandica) mutica, corpore supra fuscescente, iuguloque flavesciente lunulis fuscis, pectore imo abdomineque albis.

50. NOVAE HISPANIAE. *Die neuspanische Wachtel.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 129. n. 24. *der Colin.*

Briffon, ornith. I. p. 72. n. 19. grande Caille du Mexique.

Büffon, Vögel, VI. p. 136. *der große Kolin.*

Martini, Naturlex. III. p. 615. *Kolin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 653. n. 33. *Perdix* (Novae Hispaniae) mutica, capite cristato, corpore fulvo, remigibus apice albis.

Jonston,

Jonston, av. p. 223. *Coturnix alia omnium maxima fulvaque.*

51. COYOLCOS. *Der Koyolkos.*

Müller, *Natursyst. Suppl.* p. 129. n. 25. *der Coyolcos.*

Onomat. hist. nat. III. p. 454. *Coyolcozque.*

Briffon, *ornith.* I. p. 71. n. 18. *Caille du Mexique.*

Büffon, *Vögel*, VI. p. 138. *der Koyolkos, oder Koyolcozque.*

Martini, *Naturlex.* III. p. 618. *Koyolkos.*

Latham, *Syst. ornith.* II. p. 653. n. 34. *Perdix (Coyolcos) mutica fulva, corpore supra fulvo albo nigroque vario, subtus fulvo.*

Jonston, av. p. 223. *Coyolcozque seu Collifonalis.*

52. SUSCITATOR. *Der Wecker.*

Briffon, *ornith.* I. p. 70. n. 15. *Caille de Java.*

Büffon, *Vögel*, VI. p. 122. *die Javanische Wachtel oder der Wecker.*

Martini, *Naturlex.* III. p. 688. *Javanische Wachtel.*

Latham, *Syst. ornith.* II. p. 654. n. 35. *Perdix (Suscitator) flavicante rufo nigro et griseo variegata, rostro longiore.*

Donndorff, *Handb. der Thiergesch.* p. 333. n. 13. *die javanische Wachtel.*

53. STRIATUS. *Die gestreifte Wachtel.*

Latham, *Syst. ornith.* II. p. 654. n. 36. *Perdix (Striata) mutica, corpore variegato, pectore nigro, maculis albis, gula nigra, vitta supra oculos maxillarique albis.*

54. GRISEUS. *Die graue Wachtel.*

Latham, *Syst. ornithol.* II. p. 654. n. 37. *Perdix (Grisea) mutica, supra griseo nigroque varia, subtus*

subtus cinereo grisea, iugulo, pectore abdomi-
neque fasciis nigris.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 133. *die braune Wachtel aus Madagascar.*

55. COROMANDELICUS. *Die Wachtel aus Co-
romandel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 654. n. 38. *Perdix*
(*Coromandelica*) mutica corpore fasciolis li-
neisque pallidis, supra castaneo subtus flavo,
fascia per oculos flavescente, gula alba.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 134. *die kleine Wachtel aus Gingi.*

56. NOVAE GUINEAE. *Die neuguineische Wachtel.*

Büffon, Vögel, VI. p. 128. *die Neu-Guineische Wachtel*, m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 692. *Wachtel von Neu-Guinea.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 655. n. 39. *Perdix*
(*Novae Guineae*) mutica, corpore fusco, tectri-
cibus alarum flavescente marginatis.

Sonnerat, Reif. n. Neuguinea, p. 61. *die neugui-
neische Wachtel.*

57. MANILLENSIS. *Die kleine luzonische Wachtel.*

Büffon, Vögel, VI. p. 127. *die kleine Luzonische Wachtel*. m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 690. *kleine Luzonische Wachtel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 655. n. 40. *Perdix*
(*Manillensis*) mutica, corpore supra nigrican-
te, subtus flavescente, fasciis nigricantibus gula
alba.

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 22. *die kleine Wäch-
tel der Insel Luçon*, m. e. Fig.

18. CRISTATUS. *Die mexikanische Wachtel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 491. n. 18. *die mexicanische Wachtel.*

Ebert, Naturl. II. p. 119. *die mexikanische Wachtel.*

Onomat. hist. nat. III. p. 453. *die gehaubte Wachtel von Mexico.*

Briffon, ornith. II. p. 72. n. 21. Caille hupée du Mexique.

Büffon, Vögel, VI. p. 135. *der Zonekolin.*

Martini, Naturlex. III. p. 618. *Zonekolin.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 652. n. 30. Perdix (Cristata) mutica, corpore variegato, crista dependente gulaque fulvis.

Jonston, av. p. 223. Colin genus Quauhtzonecolin nuncupatum.

19. SINENSIS. *Die kleine chinesische Wachtel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 491. n. 19. *die chinesische Wachtel.*

Halle, Vögel, p. 444. n. 467. *die chinesische Wachtel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 304. n. 254. *die chinesische Wachtel.*

Onomat. hist. nat. III. p. 453. *die chinesische Wachtel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 169. *chinesische Wachtel.*

Briffon, ornith. I. p. 71. n. 17. Caille des Philippines.

Büffon, Vögel, VI. p. 117. *die Chinesische Wachtel;* m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 685. *chinesische Wachtel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 652. n. 29. Perdix (Chinenfis) mutica, corpore griseo maculato, iugulo nigro arcu albo.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 37. die chinesische Wachtel.

20. COTURNIX. Die gemeine Wachtel. (6)

Müller, Natursyft. II. p. 492. n. 20. die gemeine Wachtel, tab. 24 fig. 6.

Leske, Naturgesch. p. 226. n. 1. die Wachtel.

Borowsky, Thierreich, II. p. 194. n. 10. die Wachtel.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 202 n. 1. Tetrao (Coturnix) pedibus nudis, corpore griseo maculato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea; die Wachtel.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 480. n. 8. die Wachtel.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 556. n. 10. die Wachtel. p. 580. Schlagwachtel; Quakel.

Funke,

(6) Ein scheuer Vogel, der sehr schnell, aber nicht gern fliegt, flach über der Erde hinstreicht, und wegen seiner Schwere und kurzen Flügel nur eine kurze Strecke fliegt. Kommt zu Anfang des Mayes, seltener zu Ende des Aprils, bey uns an, und zieht aufs späteste zu Anfang des Octobers wieder weg. Wahrscheinlich ziehen sie des Nachts, denn noch nie hat man sie am Tage auf ihren Wanderungen bemerkt, und gehen vermuthlich von uns nach dem südlichen Rußland, und von da in die asiatische Turkey; denn auf ihren Wanderungen werden sie im südlichen Rußland zu tausenden gefangen, und in Färsen nach Moskau und Petersburg geschickt. Sie ziehen nicht Trupp- sondern Familienweise, wie man sie im Herbst antrifft. Das Weibchen legt nur einmal des Jahrs, und zwar sehr spät, mehrentheils erst zu Ende des Julius, 8, 14, bis 20 Eyer, mehrentheils auf einem Waizenacker, seltener auf einer Wiese, und brütet drey Wochen. Die Männchen sind im ersten Jahre fast gar nicht von den Weibchen zu unterscheiden, und bekommen erst im zweyten Jahre die beyden großen rostfarbigen Flecke auf der Brust, die in der Jägersprache das Schild genannt werden.

Funke, Naturgesch. I. p. 229. *die Wachtel*.

Ebert, Naturl. II. p. 119. *die Wachtel*.

Halle, Vögel, p. 442. n. 466. *die Wachtel*.

Meyer, Thiere, II. p. 22. tab. 80. *Wachtel*; *Dic-
cyrhivogel*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 305.
n. 256. *die Wachtel*.

Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 396. *Wachtel*.

Onomat. hist. nat. III. p. 449. *die Wachtel*.

Handb. der Naturgesch. II. p. 73. *die Wachtel*.

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 117. *die Wach-
tel*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 298. B. *die Wachtel*.

Klein, av. p. 115. n. 1. *Coturnix vulgaris*, nostras.
Quiscula; *Quisquila*; *Qualea*; *Quaquila*.

Klein, Vorbereit. p. 213. n. 1. *Quakel*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 119. n. 1. *gemeine Wachtel*.

Klein, stemmat. av. p. 25. tab. 27. fig. 3. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. fig. 6.

Gesner, Vögelb. p. 538. *Wachtel*; m. e. gut. Ab-
bildung.

Briffon, ornith. I. p. 69. n. 14. *Caille*.

Büffon, Vögel, VI. p. 79. *die Wachtel*; m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 657. *die Wachtel*.

Batsch, Thiere, I. p. 417. *die Wachtel*.

Latham, Syn. Suppl. p. 222. *Quail*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 651. n. 28. *Perdix*
(*Coturnix*) *mutica*, corpore griseo-maculato,
superciliis albis, rectricibus margine lunulaque
ferruginea.

Beseke, Vögel Kurl. p. 71. n. 149. *die gemeine
Wachtel*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 49. n. 3. *die Wach-
tel*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 400. *die Wachtel*.

Cetti,

Cetti, Sardin. II. p. 115. *die Wachtel.*

Fischer, Liv. p. 91. n. 123. *Wachtel; Schnarr-
wachtel.*

Pallas, Reif. Ausz. III. p. 296. *Wachteln.*

Molina, Chili, p. 209. *die Wachteln.* *

Taube, Slavon. I. p. 22. *Wachteln.*

Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffn. ed. in 4. p. 395. *die
Wachteln.*

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 3. *Wachtel.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 192. *Vagtel.*

Hasselquist, Paläst. ed. germ. p. 331. n. 44. Te-
trao Israelitarum.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 89. tab. 42.

Zorn, Petinotheol. I. p. 162. 360. 425. 542. II. p.
65. 82. III. p. 145. 186. 283. 556. 719. *die Wach-
tel.*

Lichtenberg, u. Voigt, Magaz. für das Neueste,
etc. VII. 2. p. 115. *Wachteln.*

Le Vaillant, Reif. n. Afr. I. p. 74. *Wachteln.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 144. n. 176. *die
Wachtel.*

Linne, Abhandl. II. p. 282. n. 32. p. 285. n. 49. p.
299. n. 109. *die Wachtel.*

Naturforsch. XVII. p. 73. n. 149. *die gemeine Wach-
tel.* XXII. p. 136. *Wachtel.*

Oekonom. Zool. p. 89. n. 31. *die Wachtel.*

Beckmann, Naturhist. p. 51. *die Wachtel.*

Eberhard, Thiergesch. p. 65. *die Wachtel.*

Geoffroy, mater. med. VII. p. 412. *die Wachtel.*

Naumann, Vogelfsteller, p. 177. *die Wachtel.*

Meidinger, Vorles. I. p. 142. n. 1. *die Wachtel.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 51. *die Wachtel.*

Loniceri, Kräuterb. p. 676. *die Wachtel.*

Merklein, Thierreich. p. 405. *Wachtel.*

André, u. Bechstein, Spazierg. II. 162. *die Wach-
tel.*

Goeze, Nützl. Allerl. II. p. 225. n. 28. *die Wachtel*.
 Jablonsky, allgem. Lex. p. 1314. *Wachtel*.
 Hervieux, von Canarienvögeln. p. 180. *die Wachtel*.

Sander, Natur u. Relig. p. 226. *die Wachtel*.

Walther, ökonom. Naturgesch. Deutschl. p. 171.
Wachtel.

Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 237. n. 7.

Derham, Physicotheol. p. 572.

Anweis. Vögel zu fang. p. 562.

Neues Hamburg. Magaz. St. 84. p. 462.

Borkhausen, Magazin, I. p. 225. n. 100.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich. p. 94.

Bresl. Natur- u. Kunstgesch. Vers. 28. p. 409.

Ventzky: Pommerische Nachr. 1748. n. 6.

Allgem. Reis. VII. p. 39. 616. *Wachteln*.

Mem. de Mathem. et de Phys. III. p. 91. 92.

Tournefort, voy. au Levant. p. 169. 281. 313.

De la Porte, Reisen, V. p. 386.

Onomatol. forestal. III. p. 772.

Lenmery, Materiallex. p. 360.

Hahn, diff. de Coturnicibus. Regiom. 1712. 4.

Zacutus Lusit. de coturnicibus earumque epilepsia; in Medic. Princip. hist. Lib. 5. edit. oper. Tom. I. p. 838.

Camerarius, Coturnicum esus an convulsiones pariat. Syll. memorabil. Cent. 16. Part. 16. p. 1303.

Linne, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. Coturnix.

Linne, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 8. Coturnix.

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 161. n. 13. Tetrao (Coturnix) pedibus nudis, corpore griseo-maculato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 226. Tetrao (Coturnix) pedibus nudis, corpore griseo-maculato,

culato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea.

Kramer, Austr. p. 357. n. 7. Tetrao pedibus nudis, corpore griseo-maculato, linea superciliarum alba. *Wachtel*.

Charleton, onom. zoic. p. 75. n. 15. Coturnix.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 247. Coturnix. *Wachtel*; *Quackel*.

Moehring, av. gen. p. 54. n. 51. Coturnix.

Heerkens, av. Fris. p. 151. Coturnix.

Belon, hist. nat. des ois. p. 264. Caille.

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 375. Coturnix.

Sibbald, Scot. illustr. p. 16. Coturnix.

Zinnan. Uov. p. 36. tab. 5. fig. 19. Quaglia.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 23. Coturnices.

Varro, de re rust. L. 3. c. 5. Coturnices.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 6. n. 137. c. 10. n. 144. *ὄρνυες*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 167. Tetrao Coturnix.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 334. n. 14. *die gemeine Wachtel*.

Donndorff, Natur und Kunst, III. p. 364. *die Wachtel*.

β. Die große polnische Wachtel.

Borowsky, Thierreich, II. p. 196. *die große polnische Wachtel*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 581. n. 4. *die große Wachtel*.

Brisson, ornith. I. p. 70. A. grande Caille.

Büffon, Vögel, VI. p. 114. *die große Polnische Wachtel*.

Martini, Naturlex. III. p. 687. *große polnische Wachtel*.

Latham, Syn. II. 2. p. 782.

Latham, Syst. ornith. II. p. 652. n. 28. β.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 277.

γ. *Die weiße Wachtel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 581. n. 5.
die weiße Wachtel.

Briffon, Vögel, VI. p. 115. *die weiße Wachtel.*

Martini, Naturlex. III. p. 692. *die weiße Wachtel.*

δ. *Die Sandwachtel.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 580. n. 2.

ε. *Die Mohrenwachtel.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 580. n. 3.

ζ. *Die bunte Wachtel.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 581. n. 6.

η. *Die aschgraue Wachtel.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 582. n. 7.

θ. *Die schwarze Wachtel.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 582. n. 8.

** *Mit dreyzehigen Füßen.*

58. GIBALTARICUS. *Die Wachtel von Gibraltar.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 656. n. 45. *Perdix*
(*Gibraltarica*) *tridactyla mutica*, corpore supra
fusco, nigro-fasciato, subtus flavescente albo,
tectricibus alarum maculis, pectore lunulis
nigris.

59. ANDALUSICUS. *Die Wachtel von Andalusien.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 656. n. 46. *Perdix*
(*Andalusica*) *tridactyla mutica*, corpore rufo,
nigro undulato, subtus flavescente.

60. NIGRICOLLIS. *Die schwarzhälfige Wachtel.*

Briffon, ornithol. I. p. 70. n. 16. *Caille de Madagascar.*

Briffon,

Büffon, Vögel, VI. p. 120. *die Madagaskarische Wachtel*; m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 690. *Madagaskarische Wachtel*.

Onomat. hist. nat. III. p. 452. *die Wachtel von Madagascar*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 656. n. 47. *Perdix* (Nigricollis) tridactyla mutica, corpore supra cinereo rufo et nigro vario, gutture et collo inferiore nigris.

61. LUZONIENSIS. *Die luzonische Wachtel.*

Büffon, Vögel, VI. p. 126. *die dreyzeige Luzonische Wachtel*; m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 686. *dreyzehige Luzonische Wachtel*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 656. n. 48. *Perdix* (Luzoniensis) tridactyla mutica, supra fusca, subtus flava, capite albo nigroque vario, tectricibus alarum apice flavis, macula nigra.

Sonnerat, Reis. n. Neuguinea, p. 22. *die dreyzehige Wachtel*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 335 n. 15. *die luzonische Wachtel*.

*** *Gegend um den Augen mit wenigen Federn bedeckt. Füße blos, ungespornt, vierzehig. Die Tinamus.*

62. GUIANENSIS. *Der Toco. (7)*

Büffon, Vögel, XIII. p. 244. *der Toco oder das Guianische Rebhuhn*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 650. n. 21. *Perdix* (Guianensis) rufo-fusca, nigro maculata et varia,

I 4

gula

(7) Diese Vögel halten sich in Wäldern auf, und setzen sich des Nachts auf die Sträucher. Das Weibchen legt 12—15. weiße Eyer. Das Fleisch ist von vortreflichem Geschmack.

gula cinerea, per oculos vitta fulva, remigibus
xtus maculis rufis.

Bankroft, Guian. p. 106. *das guianische Rebhuhn*.
p. 107. *Mams?*

Samml. zur Phys. u. Naturgesch. III. p. 108. der
Tocro.

Hermann, tab. affin. anim. p. 165. *Tocro.*

63. MAIOR. *Der Macucagua.* (8)

Halle, Vögel, p. 98. n. 7. *die Brasilianische*
Trappe.

Klein, av. p. 18. n. 4. *Tarda Mucucagua.*

Klein, Vorbereit. p. 35. n. 4. *die Trappe Muku-*
kagua.

Klein, verb. Vögelhist. p. 19. n. 4. *Mucucagua.*

Briffon, ornith. I. p. 63. n. 4. *Perdrix du Brésil.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 235. *der Macucagua;*
in. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 633. n. 1. *Tina-*
mus (Brasilienfis) fusco-olivaceus, fusco macu-
latus, abdomine albido vario, tibiis postice sca-
bris.

Fermin, Surin. II. p. 169 *die erste Art Rebhühner.*
Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 107. der Magoua.

Jonston, av. p. 180. *Macucagua.*

Barrere, Fr. equinox. p. 13. — Ornith. p. 81. *Per-*
dix maior olivacea longiusculo et nigro rostro.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 335. n. 16.
der Macucagua.

64. CINEREUS. *Der aschgraue Tinamus.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 239. *der aschgraue Ti-*
namus.

Latham,

(8) In der XII. Edit. hat Linné diesen Vogel noch zu *Psophia*
Crepitans gerechnet. Auch *Briffon* verwechselt beyder Syno-
nymen.

Latham, Syst. ornith. II. p. 633. n. 2. *Tinamus* (Cinereus) cinereo-fuscus, capite cerviceque rufescentibus.

Samml. zur Physf. u. N. G. III. p. 107. *der aschgraue Tinamou.*

65. *VARIEGATUS. Der bunte Tinamus.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 240. *der bunte Tinamus*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 634. n. 3. *Tinamus* (Variegatus) rufo fusco nigricanteque fasciatus, subtus rufus, pileo nigro, gula abdomineque medio albis.

Samml. zur Physf. u. N. G. III. p. 107. *der bunte Tinamou.*

Barrere, Fr. equinox. p. 319. *Perdix minor cirrhata*, rostro atro. *Petite perdrix.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 335. n. 17. *der bunte Tinamus.*

66. *SOVI. Der Soui.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 242. *der Tinamus Soui*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 634. n. 4. *Tinamus* (Soui) fusco-nebulosus, subtus rufus, gula albo varia, capite supra colloque postice nigris.

Sammlung zur Physf. und N. G. III. p. 107. *der Soui.*

Barrere, Fr. equinox. p. 319. *Perdix minor fulva. Perdrix cul-rond.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 336. n. 18. *der Soui.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 273. n. 1. *β. Phasianellus*. p. 747. n. 7. Tetrao Phasianellus.

p. 275. n. 7. Tetrao Canace. p. 749. n. 3. *b. Canace*.

Das Geschlecht ist mit *sechs und vierzig* Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung sind *drey*, bey der 11ten *drey*, bey der 12ten *vier*, bey der 13ten *sechs*, bey der 20ten *drey* Varietäten aus einander gesetzt, und bey der 4ten die Varietäten *γ* und *δ*. hinzugekommen.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Das arragonische Rebhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 223. Arragonian Partridge.

Latham, Syst. ornith. II. p. 645. n. 7. *Perdix* (Arragonica) calcarata, pedibus antice hirsutis, remigibus, abdomine femoribusque nigris.

Faun. Arragon. p. 81. 3. tab. 7. Fig. 3.

2. *Das asiatische Rebhuhn.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 649. n. 20. *Perdix* (Asiatica) rufo-flavescens, fusco nigroque variegata, subtus albida, fasciis nigris, pedibus obtuse calcaratis.

3. *Die Wachtel von der Hudsonsbay.*

Latham, Syn. Suppl. p. 224. Hudsonian Quail.

Latham, Syst. ornith. II. p. 655. n. 41. *Perdix* (Hudsonica) mutica, corpore rufo-fuscescente pallido, cervice albo maculata, alis dorso caudaque lineis transversis distantibus albis.

4. *Die indianische Wachtel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 655. n. 44. *Perdix* (Cambaiensis) rufo-flavescens; nebulis saturatioribus, digito postico mutico.

SECHSTE ORDNUNG.

PASSERES. (*Singvögel. Spertingsartige Vögel.*)104. GESCHLECHT. COLUMBA. *Die Taube.*

Müller, Naturfyß. II. p. 496. Gen. CIV.

Leske, Naturgesch. p. 253. Gen. XXXVI.

Borowsky, Thierreich, III. p. 205. Gen. LXXV.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 199. Gen. XLI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 483. Gen. LXIII.

Ebert, Naturl. II. p. 121.

Halle, Vögel, p. 455.

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 796.

Onomat. hist. nat. III. p. 175.

Pennant, arct. Zool. II. p. 300.

Klein, av. p. 118. Gen. XVII.

Briffon, ornith. I. p. 12. Gen. I.

Büffon, Vögel, VI. p. 144.

Batsch, Thiere, I. p. 411. Gen. CXIII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 589. Gen. IV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 208.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 336. Gen. LXXI.

* *Mit geradem, mittelmäßigem Schwanze.*

1. OENAS. *Die Holztaube. (wilde Taube.)* (9)

Müller, Naturfyß. II. p. 496. n. 1. *die Feldtaube.* *

Leske, Naturgesch. p. 253. n. 1. *die Feldtaube.* *

Borowsky, Thierreich, III. p. 207. n. 2. *die wilde Taube; Bergtaube.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 199. n. 1. Columba (Oenas) caerulea; cervice viridi nitente,

(9) Die mit einem * bezeichneten Synonymen gehn auf diese und die folgende Gattung zugleich. S. die folgende Anmerk.

te, dorso postico albo, fascia alarum apiceque caudae nigricante, *Haustaube*; *Feldtaube*; *Holztaube*. *

Bechstein, Naturgesch. I. p. 483. n. 1. a. *die wilde Taube*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 679. *die wilde Taube*.

Haie, Vögel, p. 470. n. 497. *die Holztaube*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 315. n. 257. *die wilde Taube*; *Bergtaube*, *Holztaube*; *blaue Holztaube*; *kleine Holztaube*; *Lochtaube*, *Blochtaube*; *Blocktaube*; *Hohltaube*; *Waldtaube*; *Blautauben*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 306. A. *die Feldtaube*.
Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 798. *die Bergtaube*.

Onomat. hist. nat. V. p. 669. *Feldtaube*. *

Klein, av. p. 119. n. 8. *Columba lignorum*, proprie.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 8. *Holztaube*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. n. 8. *Holztaube*.

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 16. Fig. 6.

Gesner, Vögelb. p. 524. *wilde Taube*; m. e. fchl. Fig.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 117. *Holztaube*.

Briffon, ornith. I. p. 20. n. 5. Pigeon sauvage.

Büffon, Vögel, VI. p. 147. *die wilde Taube*, p. 158. *Holztauben*.

Batsch, Thiere, I. p. 427. *die Bergtaube*.

Latham, Syn. Suppl. p. 197. Stock Dove.

Latham, Syst. ornith. II. p. 589. n. 1. *Columba* (Oenas) caerulefscens, cervice viridi nitente, dorso postico cinerascante, fascia alarum duplici apiceque caudae nigricante.

Beseke, Vögel Kurl. p. 71. n. 150. *die Feldtaube*.

Siemssen,

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 42. n. 1. *die gemeine Holztaube.*

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 402. n. 150. *die Feldtaube.*

Fischer, Livl. p. 91. n. 124. *gemeine Taube, wilde Taube.*

Taube, Slavon. I. p. 23. *wilde Tauben.*

Leem, Finnm. p. 132. *Holztauben.*

Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 271. *wilde Tauben.*

Boswell, Besch. von Corfica, p. 45. *wilde Taube.*

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 8. p. 77. *Holztaube; Feldtaube.*

Linne', Abhandl. II. p. 299. n. III. *die Feld-Taube.*

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 1. a. *Waldtaube.*

Pontoppidan, Norw. II. p. 132. *Waldtauben.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 302. *die Hohl-Taube.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 152. *Hol-, oder Blau-Taube.*

Naumann, Vogelfsteller, p. 160. *die gemeine Holztaube.*

Naturforsch. XVII. p. 74. n. 150. *die Feldtaube.*

Anweiss. Vögel zu fang. p. 557. *Hohltaube.*

Meidinger, Vorl. I. p. 145. n. 1. *die Feldtaube.*

Oekonom. Zool. p. 90. n. 32. *die Feldtaube.*

Neueste Mannigfaltigk. I. p. 570. *Holztauben.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1183. *Taube.* *

Rozier, obs. sur la physique etc. XIX. p. 306.

(Fang auf den Pyrenäen.)

Mem. d' Agriculture etc. 1787. p. 159. (An columba Livia Briss.?)

Borkhausen, Magazin, I. p. 208. n. 85. *Holztaube.*

Linne', Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Columba.* *

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 1. *Oenas.*

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 162. n. 1. *Columba (Oenas) caerulea*, collo supra viridi nite-
tente, fascia alarum apiceque caudae nigricante.

Müller,

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 227. Columba (Oenas) caerulefcens, cervice viridi-nitento, dorfo poffico albo, fascia alarum apiceque caudae nigricante. *

Brünniche, ornith. bor. p. 60. n. 203. Columba Oenas. *

Kramer, Auflr. p. 358. n. 1. Columba caerulefcens, collo nitido, macula duplici alarum nigricante, *α*. Oenas, *Holtaube*.

Charleton, onom. zoic. p. 77. n. 3. Columba Cavernalis.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 240. Columba fera arborea, *Holtaube*; *Koltaube*; *Blawe Taube*; *wilde Taube*.

Sibbald, Scot. illuftr. p. 114. Oenas.

Forskål, fn. orient. p. VII. n. 13. b. Columba vulgaris, *Hudjaefa*?

Belon, hift. nat. des oif. p. 312. Pigeon fuyard.

Jonfton, av. p. 92. Oenas feu Vinago.

Schaefer, element. ornithol. tab. 28.

Donndorff, Handb. d. Thiergefch. p. 337. n. 1. die *Holztaube*.

2. DOMESTICA. Die gemeine Haustaube. ⁽¹⁰⁾

Borowsky, Thierreich, III. p. 207. die *Feldtaube*; *Haustaube*.

Bech-

(10) Bey dem Taubengefchlecht findet man die größte Verwirrung fast in der ganzen Ornithologie. Bald werden Gattungen zu Spielarten, bald wieder Spielarten zu Gattungen gemacht, u. f. w. und es wird sehr schwer halten, hierin zur völligen Gewissheit zu kommen. Die meisten neuern Ornithologen nehmen die gemeine Haustaube als *Spielart* von der wilden, oder als von ihr ursprünglich abstammend an. Die Fruchtbarkeit der Haustauben ist erstaunlich; denn ob sie gleich jedesmal nur 2 Eyer legen, so kann man doch, da sie mehrmahls brüten, von einem einzigen Paar binnen vier Jahren an funfzehntausend erhal-

Bechstein, Naturgesch. I. p. 284. b. *die zahme Taube; Feldflüchter.*

Funke, Naturgesch. I. p. 214. *die Taube.*

Ebert, Naturl. II. p. 121. *die Tauben.*

Halle, Vögel, p. 464. n. 481. *die gemeine Taube.*

Meyer, Thiere, I. p. 50. tab. 80. *die Taube.*
(schlecht.)

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 320. n. 258. *die gemeine zahme Taube; Feldtaube; Haustaube; Hoftaube; Monatstaube; Bauertaube; Pastetentaube; Flugtaube; Schlagtaube; Feldflüchter.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 800. 806. *eigentliche Haustaube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 179. *die Haus-, oder Hof-Taube.*

Handb. d. Naturgesch. III. p. 55. *die Taube.*

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 117. *Haustaube.*

Sander, oekonom. Naturgesch. II. p. 22. *die Taube.*

Walther, oekonom. N. G. Deutschl. p. 169. *Tauben.*

Klein, av. p. 118. n. 1. *Columba rusticorum, vulgaris, arvorum.*

Klein, Vorbereit. p. 218. n. 1. *Bauer-, Feld-, Pastetentaube.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 122. n. 1. *Feldtaube.*

Gesner, Vögelb. p. 507. *die gemeine Taube; m. c. Fig.*

Briffon, ornith. I. p. 13. n. 1. *Pigeon domestique.*
Büffon,

erhalten. Die Eyer werden von beyden Geschlechtern wechselseitig 17. Tage bebrütet. Das Alter der Tauben erstreckt sich auf 8 bis 12. Jahre. Doch hat man auch Beyspiele von einigen, die 20. Jahr alt geworden sind. In den deutschen Synonymen der verschiedenen Spielarten herrscht große Verwechselung.

Büffon, Vögel, VI. p. 144. *die Taube.* p. 147.
gemeine Haustaube. p. 151. *Haustauben.* p. 165.
zahme Haustauben.

Batsch, Thiere, I. p. 427. *die Haustaube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 589. n. 2. *Columba*
 (Domestica) minor versicolor, dorso inferiore
 albo.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 402. *die Haus-*
taube.

Cetti, Sardin. II. p. 128. *die zahme Taube.*

Knox, Ceyl. p. 57. *Tauben.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 92. tab. 44.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 1. b. *Monats-*
taube.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 132. *zahme Tauben.*

Naturforsch. XVII. p. 75. n. 151. *die Haustaube.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 147. n. 177. *die*
Feldtaube.

Merklein, Thierreich, p. 399. *Taube.*

Loniceri, Kräuterb. p. 647. *Taube.*

Geoffroy, mater. med. VII. p. 386. 392. *die*
Taube.

Oekon. Zool. p. 90. n. 32. β. *die Haustaube.*

Lemmerly, Materiallex. p. 332. u. p. 1160.

Onomatol. forestal. III. p. 543.

Onomatol. oecon. pract. III. p. 508.

Preuss. Sammler, I. p. 166.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 239.

Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 137.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 15.

Beckmann, Naturhist. p. 51. n. 1. a. *die gemeine*
Taube.

Borkhausen, Magazin, I. p. 204. n. 84.

Hannöv. Magaz. 1771. p. 95. 1773. p. 301.

Ludovici, Kaufmannslex. II. p. 1507.

André, u. Bechstein, Spazierg. VII. p. 257. 272. 334.

Aller.

Allerneueste Maunigfaltigk. II. p. 665. 683.

Linne, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 2. Columba domestica.

Linne, Syst. nat. Ed. X. I. p. 162. n. 1. β . Col. domestica.

Kramer, Austr. p. 358. n. 1. β . Columba domestica f. vulgaris.

Charleton, onomast. zoic. p. 76. Columba domestica.

Brünniche, ornith. bor. p. 63. n. 219. Columba prolifera. Columba oenas domestica.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 237. Columba domestica. Columba cicur. Columba cellaris. *Heimische Taube; Schlagtaube.*

Moehring, av. gen. p. 54. n. 52. Columba.

Sibbald, Scot. illustr. p. 115. Columba domestica.

Rzaczyński, hist. nat. Polon. p. 183. Columba.

Belon, hist. nat. des ois. p. 313. Pigeon.

Præsp. Alpin. Aegypt. I. p. 198. Columba.

Du Tertre, hist. des Antill. II. p. 266. Pigeon.

Jonston, av. p. 89. Columba domestica.

Bomare, Diction. VIII. p. 501. — Diction. des anim. III. p. 453.

Plin. hist. nat. L. 8. c. 27. L. 10. c. 34. 53. L. 18. c. 16. Columbae.

Varro, de re rust. L. 3. c. 7. Columba.

Columella, de re rust. L. 8. c. 8. Columba cellaris.

Palladius, de re rust. L. 1. c. 24. Columba.

Aelian, nat. anim. L. 3. c. 15. περιστεραι. c. 44. Αδοκραι.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 11. n. 119. περιστεραι.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 337. n. 2. die Feldtaube.

β. LIVIA. *Die Stocktaube.* (¹)

Halle, Vögel, p. 471. n. 499. *die Bergtaube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 184. *die italienische Strichtaube.*

Klein, av. p. 119. n. 10. Columba Livia.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 10. *Feldtaube; Feldflüchter.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. n. 9. *Stocktaube.*

Gesner, Vögelb. p. 525. *Lochtaube.*

Briffon, ornith. I. p. 18. n. 3. Biset.

Briffon, Vögel, VI. p. 155. *die Bergtaube; wilde Taube; m. e. Fig.*

Latham, Syn. II. 2. p. 605 n. 2. A. Biset Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 590. n. 1. β. Col. dom. *Livia*, cinereo-caerulescens, fascia alarum duplici nigra, dorso inferiore alba.

Fermin, Surin. II. p. 144. * *die sogenannte Holzttaube.*

Charleton, onomast. zoic. p. 76. n. 1. Columba livia.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 240. Columba fera saxatilis?

Rom. orn. I. p. 83. — Hist. Prov. I. p. 490.

Jonston, av. p. 92. Columba livia.

γ. SAXATILIS. *Die Felsentaube.* (²)

Halle, Vögel, p. 470. n. 498. *die Felsentaube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 188. *die Felstaube.*

Klein, av. p. 119. n. 9. Columba Rupicola.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 9. *Felsentaube.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. n. 11. *Felsentaube.*

Briffon, ornith. I. p. 19. n. 4. Pigeon de roche, ou Rocheraie.

Briffon,

(1) Nach Briffon eine eigne Gattung.

(2) Nach Briffon u. a. eine eigne Gattung. Raj. u. a. halten sie wieder mit *Col. Livia* für einerley.

Büffon, Vögel, VI. p. 158. *Felsen- oder Steintauben*.

Latham, Syn. II. 2. p. 608. Rock Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 590. n. 2. γ. Col. dom. *Rupicola*, cinerea, pectore dilute vinaceo, fascia alarum duplici fusco-nigricante, remigibus maioribus fuscis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 240. Columba fera faxatilis?

Charleton, onom. zoic. p. 77. n. 2. Palumbus Rupicola.

δ. HISPANICA. Die spanische Taube. (3).

Müller, Naturyst. II. p. 499. n. 2. die spanische Taube.

Borowsky, Thierreich, III. p. 210. n. 4. die Spanische Taube; Mondtaube.

Berchstein, Naturgeschichte, I. p. 487. die spanische Taube.

Ebert, Naturl. II. p. 122. die spanische oder römische Taube.

Onomat. histor. natur. III. p. 182. die Spanische Taube.

Briffon, ornith. I. p. 13. n. 2. Pigeon romain.

Büffon, Vögel, VI. p. 176. die Spanische Taube.

Büffon, Vögel, VI. p. 178. die römische Taube, m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 426. die Mond- oder Monatstaube.

Latham, Syn. II. 2. p. 608. Roman Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 590. n. 2. δ. Col. dom. *Hispanica*, versicolor, cera albido fufuracea.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 251.

K 2

Linné,

(3) Nach *Briffon* eine eigne Gattung. Einige wollen auch die spanische Taube wieder von der römischen trennen.

Linneé, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 163. n. 10. Columba (Hispanica) cinerea, remigibus, rectricibus, plumis pedum rostroque albis.

ε. *DASYPUS. Die Trommeltaube.*

Müller, Natur Syst. II. p. 499. n. 3. *der Federfuß.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 210. n. 3. *die Trommeltaube.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 200. a. *die Trommeltaube.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 486 *die Trommeltaube.*

Ebert, Naturl. II. p. 122. *die Trommeltaube.*

Halle, Vögel, p. 464. n. 482. *die Trummeltaube.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 324. n. 260. *Trommeltaube; Rauchfuß; Rodler; Gluglu.*

Klein, av. p. 118. n. 5. Tympanistae.

Klein, Vorbereit. p. 219. n. 5. *Trummeltauben.*

Klein, verb. Vögelhistor. p. 123. n. 5. *Trummeltauben.*

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 16. fig. 5.

Briffon, ornith. I. p. 14. A. Pigeon patu.

Büffon, Vögel, VI. p. 179. *der ungehäubte Rauchfuß oder Trommeltaube; m. e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 427. *die Trommeltaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 609. Rough-footed Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 590. n. 2. ε. Col. dom. *Dasytus*, pedibus hirsuto-pennaceis.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 404. *der Federfuß.*

Naturforsch. XVII. p. 75. n. 152. *der Federfuß.*

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 214. Columba (Tympanista) pennis in basi rostri recurvatis. *Trommel-Due.*

Kramer, Austr. p. 359. n. 1. λ. Columba crista duplici, una in fronte, altera in occipite. *Rodler; Trummeltaube.*

Charleton, onomast. zoic. p. 77. n. 8. Columba pedibus hirsutis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 239. Columbae dasypodes. *Rauchfüßige Tauben; gehösete, oder Reufische Tauben.*

Zinn, Uov. degl' Uccell. p. 32. tab. 4. fig. 12.

Rom. orn. I. p. 78.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 338. a.

ζ. CRISTATA. *Die Mohntaube.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 682. *die Mönchstaube.*

Briffon, ornith. I. p. 14. B. Pigeon hupé.

Büffon, Vögel, VI. p. 179. *der gehäubte Rauchfuß.* p. 180. *die gehäubte Monatstaube.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 324. n. 261. *die Mohntaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 609. Crested Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 591. n. 1. ζ. Col. dom. *Cristata*, pedibus hirsuto-pennaceis, capite cristato.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 239. Columbae cristatae. *Köppichte Tauben.*

Jonston, av. p. 90. Columba cypria alia.

η. NORWEGICA. *Die norwegische Taube.* (4)

Briffon, ornith. I. p. 14. C. Pigeon de Norwege.

Büffon, Vögel, p. 201. n. 1. *Schwenkfelds Norwegische große Taube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 609. Norway Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 591. n. 1. η. Col. dom. *Norwegica*, capite cristato, corpore niveo, pedibus plumosis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 239. Columba Norwegica.

(4) Soll, nach *Schwenkfeld*, fast die Gröfse eines Huhns haben.

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 215. Columba (Mercurialis) corpore niveo, pileo capitis, pedibus pennatis, alisque unicoloribus? *Svalle Due?*

Jonston, av. p. 90. Columba norwegica, tota alba.

a. Alis glaucis. b. Nigris. c. Rufis. d. Flavis? *

9. BARBARICA. *Die Barbareytaube.*

Halle, Vögel, p. 467. n. 489. *die Barbareytaube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 178. *die numidische Taube.*

Briffon, ornithol. I. p. 14. D. Pigeon de Barbarie.

Büffon, Vögel, VI. p. 201. *die Barbareytaube; kretische Taube, cyprische Taube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 609. Barbary Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 591. n. 2. 9. Col. dom. *Barbarica*, area oculorum nuda tuberculata, furfuracea, macula alarum duplici nigricante.

Kramer, Aufsr. p. 358. n. 1. ♂. Columba barbarica f. Numidica. *Indianer.*

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 217. Columba (Turca) oculis magnis lucidis, palpebris nudis rubris, rostro minuto?

1. CUCULLATA. *Die Schleyertaube.*

Müller, Naturyst. II. p. 505. n. 5. *die Haubentaube.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 200. e. *die Schleyertaube; Zopftaube.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 486. *die Schleyertaube.*

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 685. *Schleyertaube.*

Halle, Vögel, p. 466. n. 487. *die Jakobinertaube; Fig. 34.*

Gatterer,

- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 335. n. 263. *Schleyertaube*, *Kappentaube*; *Kappennonne*; *Perückentaube*; *Dictertaube*; *Venustaube*, *cyprische*, *rußische oder englische Taube*.
- Onomat. hist. nat.* III. p. 178. *die Mönchtaube*.
- Klein*, av. p. 118. n. 5. *Columba cucullata*.
- Klein*, Vorbereit. p. 219. n. 5. *Haubentaube*.
- Klein*, verbess. Vögelhistor. p. 123. n. 5. *Venustaube*.
- Briffon*, ornith. I. p. 15. E. Pigeon nonain.
- Gesner*, Vögelb. p. 507. *Englische oder Rußische Taube*, m. e. Fig.
- Büffon*, Vögel, VI. p. 181. *die Jakobiner- und Nonnentaube*, m. e. Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 426. *die Perückentaube*.
- Latham*, Syn. II. 2. p. 610. *Jacobine Pigeon*.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 591. n. 2. 1. Col. domest. *Cucullata*, pennis occipitis reflexo-erectis.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 172. n. 3. *Parykdue*.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 404. *die Schopf- oder Haubentaube*.
- Naturforsch.* XVII. p. 75. n. 154. *die Haubentaube*.
- Merklein*, Thierreich, p. 391. *cyprische Tauben*; m. e. Fig.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 162. n. 3. *Columba* (*Cucullata*) pennis occipitis reflexo-erectis.
- Linné*, fn. Suec. p. 75. n. 207. ♂. *Columba cucullata*.
- Charleton*, onom. zoic. p. 76. n. 3. *Columba cucullata*.
- Kramer*, Austr. p. 358. n. 1. ♂, *Columba cucullata* f. *Jacobeae*. *Paruckentaube*.
- Brünniche*, ornith. bor. p. 61. n. 211. *Columba* (*Cucullata*) colore vario, fasciis alarum corpori concoloribus, capite, oculis, remigibus primori-

moribus et rectricibus albis, pennis occipitis in cucullum reflexo erectis; *Paryk Due*.

Jonston, av. p. 90. Columba cucullata.

Aldrovand, ornith. p. 254. Columba cypria cucullata.

Bomare, Diction. VIII, p. 509. — Dict. des anim. III. p. 452.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. c. die *Schleyertaube*.

κ. *HISPIDA. Die Strupptaube.*

Müller, Natursystem, II. p. 500. n. 6. die rauhe Taube.

Bechstein, Naturgeschichte I. p. 488. die Strupptaube.

Onomat, hist. nat. III. p. 182. die Strobeltaube.

Briffon, ornith. I. p. 15. G. Pigeon frisé.

Büffon, Vögel, VI. p. 202. die wollichte Taube.

Latham, Syn. II. 2. p. 610. Laced Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 591. n. 2. κ. Col. dom. *Hispida*, plumis minimis erectis, per dorsum alasque dispersis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 239. Columbae crispae.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 19. Columba (*Hispida*) plumis minimis erectis, per dorsum alasque dispersis.

λ. *TURBITA. Das Möwchen.*

Müller, Naturyst. II. p. 501. n. 7. die Meerwentaube.

Borowsky, Thierreich, II. p. 211. n. 7. das Möwchen.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 200. c. das Möwchen.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 487. die Möwchentaube.

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 683. *das Mewchen.*

Halle, Vögel, p. 467. n. 488. *die Möventaupe.*

Gatterer, vom Nutz u. Sch. d. Th. II. p. 325. n. 264. *die Mewentaube.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. *Möwchen.*

Briffon, ornith. I. p. 15. Pigeon à gorge frisée.

Büffon, Vögel, VI. p. 187. *das Möwchen; die Möventaupe*, m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 611. Turbit pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 592. n. 2. λ. Col. dom. *Turbita*, pennis in pectore recurvis.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 4. *Mefike.*

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247. n. 5. *Halskrausentaube.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 162. n. 4. Columba (Turbita) pennis in pectore recurvatis.

Kramer, Austr. p. 358. n. 1. ♂. Columba turbita dicta. *Türkl.*

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 216. Columba (Turbita) pennis in pectore recurvatis, rostro minuto. *Maefekke.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. d. *das Möwchen.*

a. Alis flavis. b. Rufis. c. Atris. d. Glaucis. e. Argenteis. f. Albis. g. Albis, rectricibus nigris. h. Fasciatis. aa. Fascia atra. bb. Fascia caerulea. cc. Fascia spadicea. *Brünn. l. c.*

μ. LATICAUDA. *Die Pfauentaube.*

Müller, Natursystem, II. p. 501. n. 8. *der Breit-schwanz.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 211. n. 8. *die Pfauentaube, Schüttelkopf, Zittertaube.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 200. f. *die Pfauentaube; der Hühnerschwanz.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 487. *die Pfauentaube*.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 685. *die Pfauentaube*.

Halle, Vögel, p. 465. n. 484. *die Pfauentaube*.
Gatterer, vom Nat. u. Sch. d. Th. II. p. 326. n. 265. *die Pfauentaube*.

Onomat. hist. nat. III. p. 191. *die Pfauentaube*.

Klein, av. p. 118. n. 3. *Columba laticauda*, tremula.

Klein, Vorbereit p. 219. n. 3. *Pfauentaube*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 122. n. 3. *Pfauentaube*.

Briffon, ornith. I. p. 18. P. Pigeon-Paon.

Briffon, ornithol. I. p. 18. Q. Pigeon Trembleur.
Columba tremula.

Batsch, Thiere, I. p. 426. *die Pfauentaube*.

Latham, Syn. II. 2. p. 611. Broad and narrow-tailed Shaker Pigeons.

Latham, Syst. ornith. II. p. 592. n. 2. μ . Col. dom. *Laticauda cauda erecta multipenni patula*.

Büffon, Vögel, VI. p. 183. *die Pfauentaube*.

Pontoppidan, Dänneim. p. 172. n. 5. *Hoystiert*.

Büchotz, Abh. vom Federvieh, p. 247. 252.

Bo. k, N. G. von Preuss. IV. p. 404. *Pfauentaube*.

Naturforsch. XVII. p. 75 n. 155. *Pfauentaube*.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 162. n. 5. *Columba* (Tremula) cauda erecta multipenni patula.

Kramer, Austr. p. 359. n. 1. 9. *Columba tremula laticauda*, *Pfauentaube*.

Brünniche, ornith. bor. p. 61. n. 209. *Columba* (Tremula) cauda erecta multipenni patula, rectricibus 36. *Hoy-Stiert*.

Charleton, onom. zoic. p. 77. n. 7. *Columba tremula*; *Laticauda* vel *Acuticauda*.

Dictionn. des animaux, III. p. 451.

Donn-

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. e. die Pfäuentaube.

a. Nivea, b. Variegata, Brünn. l. c. *

1. GYRATRIX. Der Tümmler.

Müller, Naturyst. II. p. 502. n. 9. der Taumler.

Borowsky, Thierreich, III. p. 292. n. 9. die Tummeltaube; Tümmler.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 200. d. der Tümler.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 487. die Purzeltaube.

Halle, Vögel, p. 468. n. 491. die Taumeltaube.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 326. n. 266. die Tummeltaube.

Onomat. hist. nat. III. p. 181. die Purzeltaube.

Klein, av. p. 119. n. 6. Gyratrices.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 6. Taumler.

Kein, verb. Vögelh. p. 123. n. 6. Taumler.

Briffon, ornith. I. p. 17. N. Pigeon culbitant.

Büffon, Vögel, VI. p. 197. der Tümmler; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 428. die Tummeltaube.

Latham, Syn. II. 2. p. 612. Tumbler Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 592. n. 2. v. Col. dom. Gyratrix, sub volatu se gyrams.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 404. Taumler.

Naturforsch. XVII. p. 76. n. 156. der Taumler.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247. 254.

Kramer, Austr. p. 359. n. 1. n. Columba Gyratrix, Burzlerl, Burzler.

Charleton, onom. zoic. p. 76. n. 4. Columba Gyratrix.

Jonston, av. p. 90. Columbae gyratrices.

Brünniche, ornith. bor. p. 60. n. 205. Columba (Vertaga) iride lucida albida, pupilla atra, in volatu retrorsum volubilis, Tümler.

Donn-

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. f. der
Timmeler.

- a. Atra, alis totis et abdomine albis. * (*Skade*.)
 - b. Atra, alis ad dimidium et abdomine albis. * (*Knokkel-Skade*.)
 - c. Alba, pileo et rectricibus nigris; mandibula superior nigra, inferior alba. * (*Kalotte*.)
 - d. Nigra, remigibus septem primoribus albis. *
 - e. Nigra, remigibus septem primoribus rectricibusque omnibus albis. *
 - f. Atra rectricibus albis. *Hybrida*. *
 - g. Caerulea, h. Atra, i. Alba. }
 - k. Rufa, l. Flava. }
 - m. Guttura alarumque fasciis flavis vel rufis. *
 - n. Cauda patula; corpore plerumque toto albo. *
 (*Huulrumped*.)
 - o. Atra, variis coloribus intertextis. * }
 - p. Alba, variis coloribus intertextis. * }
- Brünniche*, ornith. boreal. l. cit.

ξ. GALEATA. *Die Helmtaube*.

Müller, Naturfyst. II. p. 502. n. 10. *die Helmtaube*.

Halle, Vögel, p. 468. n. 492. *die Helmtaube*.

Onomat, histor. natur. III. p. 179. *die Helmtaube*.

Briffon, ornith. I. p. 18. O. Pigeon cuirassé.

Büffon, Vögel, VI. p. 191. *die Helmtaube*; *gehäubte Taube*.

Latham, Syn. II. 2. 612. Helmet Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 592. n. 2. ξ. Col. dom.
Galeata, capite, remigibus rectricibusque coloribus, a corpore diversicoloribus.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. not. 21. *Crosonobel*.

Charleton, onom. zoic. p. 76. n. 5. Columba galeata.

Brünniche, ornith. bor. p. 61. n. 210. Columba (Galeata) colore vario, fasciis alarum corpori concoloribus, capite, oculis, remigibus primoribus et rectricibus albis, pennis occipitis in galeam erectis, *Kroffsonobel*.

Dictionn. des anim. III. p. 452.

Jonston, av. p. 90. Columbae galeatae.

o. TURCICA. *Die türkische Taube.* (5)

Müller, Naturfyst. II. p. 502. n. II. die türkische Taube.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 486. die türkische, arabische, persische Taube.

Klein, av. p. 118. n. 6. Columba turcica.

Klein, Vorbereit. p. 219. n. 6. Kreiselschnäbler.

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. n. 6. Kreiselschnäbler.

Brisson, ornithol. I. p. 16. H. Pigeon turc.

Büffon, Vögel, VI. p. 177. die türkische Taube; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 427. die türkische Taube.

Latham, Syn. II. 2. p. 612. Persian or turkish Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 593. n. 1. o. Col. dom. *Turcica*, cera papillosa rubra.

Charleton, onom. zoic. p. 76. n. 6. Columba turcica. (mit der folgenden verwechselt.)

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 217. Columba (Turca) oculis magnis lucidis, palpebris nudis rubris, rostro minuto? *Tyrk?*

Jonston, av. p. 90. Columba turcica feu persica.

Bomare, Dictionn. VIII. p. 510. — Diction. des anim. III. p. 453.

π. TA-

(5) Hat viel Aehnlichkeit mit der folgenden; wird auch häufig damit verwechselt, und beyde von vielen für einerley gehalten.

π. TABELLARIA. *Die Brieftaube.*

Müller, Natursyft. II. p. 503. n. 12. *die Posttaube.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 213. n. 11. *die Posttaube; Pavedette.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 200. g. *die Posttaube, türkische Taube.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 486. *türkische Taube.*

Ebert, Naturl. II. p. 123. *die Posttaube.*

Halle, Vögel, p. 465. n. 486. *die Pavedette, Brieftaube, Curiertaube.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 327. n. 269. *Brieftaube, Briefträger.*

Onomat. hist. nat. III. p. 190. *die Brieftaube, cyprische Taube.*

Klein, av. p. 118. n. 4. Columba tabellaria.

Klein, Vorbereit. p. 219. n. 4. *Pavedette.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. *Pavedette.*

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 16. Fig. 5.

Briffon, ornith. I. p. 16. I. Pigeon Messager.

Büffon, Vögel, VI. p. 202. *die Brieftaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 613. Carrier Pigeon.

Latham, Syft. ornith. I. p. 593. n. 2. π. Col. dom.

Tabellaria, cera lata carunculata albida, palpebris nudis.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 405. *die Pavedette.*

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 6. *Pavedette.*

Niebuhr, Reisebeschreibung durch Arabien, II. p. 239.

Volney, Voy. en Syrie et en Egypte, I. p. 85.

Beckmann, phys. ökon. Bibl. XV. p. 56.

Hamb. Magazin, XIX. p. 618.

Alb. Columbi, de columbis tabellariis, Regiom,

1714. 4.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 227.

Leipzig. ökonom. Abhandl. II. p. 86. n. 7.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 163. n. 6. Columba
(Tabellaria) cera lata verrucosa, palpebris
nudis.

Kramer, Austr. p. 359. 4. Columba tabellaria, *Ban-*
cadeten.

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 213. Columba
(Tabellaria) rostro longiore, cera lata verru-
cosa, ad dimidium tecto, palpebris nudis, *Pa-*
vedette.

Diction. des anim. III. p. 452. Pigeon Cavalier,
Porteur des Lettres.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. h. die
Brieftaube.

g. GUTTUROSA. *Die Kropftaube.*

Müller, Naturyst. II. p. 500. n. 4. *der Kropfer.*

Müller, Naturf. Suppl. p. 131. n. 4. *der Kropfer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 210. n. 5. *die Kropf-*
taube.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 200. b. *die*
Kropftaube.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 486. *die Kropftaube.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 683. *Kropf-*
taube, Kröpper.

Halle, Vögel, p. 465. n. 483. *die Kropftaube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 181. *die Kropftaube.*

Klein, av. p. 118. n. 2. Columba gutturosa.

Klein, Vorbereit. p. 219. n. 2. *Kropfer; Kröpper,*
Krepper.

Klein, verb. Vögelhist. p. 122. n. 2. *Kropfer.*

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 16. Fig. 5.

Briffon, ornith. I. p. 16. k. Pigeon grand gosier.

Büffon, Vögel, VI. p. 168. *Kropftaube; mit*
einer Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 427. *die Kropftaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 613. Powder Pigeon.

Latham,

- Latham*, Syst. ornith. II. p. 593. n. 2. ♀. Col.
dom. *Gutturosa*, pectore inflato.
- Börner*, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 137. n. 2.
- Büchotz*, Abh. von Federvieh, p. 247.
- Merklein*, Thierreich, p. 391. holländische Tauben.
- Linneé*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 162. n. 2. Colum-
ba (*Gutturosa*) pectore inflato.
- Kramer*, Austr. p. 358. n. 1. γ. *Columba guttu-
rosa*.
- Brünniche*, ornith. bor. p. 62. n. 212. *Columba*
(*Gutturosa*) gutture inflato. *Krop-Due*.
- Charleton*, onom. zoic. p. 76. n. 2. *Columba gut-
turosa*.
- Jonston*, av. p. 90. *Columbae gutturofae*.
- Diction. des anim. III. p. 451.
- Donndorff*, Handb. d. Thiergesch. p. 338. g. die
Kropftaube.
- a. *Maior*, *Heelkroppert*, b. *Minor*, *Halvkroppert*.
Brünniche, orn. bor. p. 62.
- aa. *Alba*, rectricibus nigris. * *Brünn.* l. c. n. 1.
- bb. *Nigra*, remigibus primoribus albis. * *Brünn.*
l. c. n. 2.
- cc. *Rufa*, remigibus primoribus albis. * *Brünn.* l.
c. n. 3.
- dd. *Flava*, remigibus primoribus albis. * *Brünn.* l.
c. n. 4.
- ee. *Die weinsuppenfarbige Kropftaube*. *
- Müller*, Naturyst. Suppl. p. 131. a.
- Büffon*, Vögel, VI. p. 169. n. 1. Pigeon Grosse-
gorge soupe en vin.
- Büchotz*, Abhandl. vom Federvieh, p. 247.
- ff. *Die bunte, Isabelfarbige Kropftaube*. *
- Büffon*, Vögel, VI. p. 169. n. 2. Pigeon Grosse-
gorge chamois, panache.
- Büchotz*,

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247.

gg. *Die schneeweiße Kropftaube.* *

Müller, Natur syst. Suppl. p. 131. b.

Büffon, Vögel, VI. p. 169. n. 3. Pigeon Grosse-
gorge blanc comme un Cigne.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247.

hh. *Die weiße rauchfüßige Kropftaube mit langen Flügeln.* *

Müller, Natur syst. Suppl. p. 131. c.

Büffon, Vögel, VI. p. 169. n. 4. Pigeon Grosse-
gorge blanc pattu à ailes longues.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247.

ii. *Die graue, gefleckte und sanftgraue Kropftaube.* *

Müller, Natur syst. Suppl. p. 131. d.

Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 5. Pigeon Grosse-
gorge gris panaché et gris doux.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.

kk. *Die stahlgraue bandirte Kropftaube.* *

Müller, Natur syst. Suppl. p. 131. e.

Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 6. Pigeon Grosse-
gorge gris de fer, gris barré et à rubans.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.

ll. *Die silberspiegelnde, graue gesprenkelte Kropftaube.* *

Müller, Natur syst. Suppl. p. 131. f.

Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 7. Pigeon Grosse-
gorge gris piqué comme argenté.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.

mm. *Die Hyacinthen-Kropftaube.* *

Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 8. Pigeon Grosse-
gorge jacinthe, de couleur bleue ouvragée en blanc.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.

- nn. *Die feuerfarbige oder hochrothe Kropftaube.* *
Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 9. Pigeon Grosse-
 gorge couleur de feu.
Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.
- oo. *Die nußholzfarbige Kropftaube.* *
Müller, Naturyst. Suppl. p. 132. h.
Büffon, Vögel, VI. p. 171. n. 10. Pigeon Grosse-
 gorge couleur de bois de noyer.
Büchotz, Abh. vom Federvieh, p. 248.
- pp. *Die kastanienbraune Kropftaube; mit ganz wei-
 ßen Schwungfedern.* *
Müller, Naturyst. Suppl. p. 132. i.
Büffon, Vögel, VI. p. 171. n. 11. Pigeon Grosse-
 gorge couleur de marron avec les penes de l'aile
 toutes blanches.
- qq. *Die Mohrenkropftaube.* *
Müller, Naturyst. Suppl. p. 132. k.
Büffon, Vögel, VI. p. 171. n. 12. Pigeon Grosse-
 gorge maurin d'un beau noir velouté, etc.
Büchotz, Abh. vom Federvieh, p. 248.
- rr. *Die schieferfarbige Kropftaube, mit weißen
 Schwungfedern.* *
Büffon, Vögel, VI. p. 172. n. 13.
- σ. EQUES. *Die Rittertaube.* (6)
Halle, Vögel, p. 468. n. 493. *die Rittertaube.*
Briffon, ornith. I. p. 17. L. *Pigeon Cavalier.*
Büffon, Vögel, VI. p. 205. *die Rittertaube.*
Latham, Syn. II. 2. p. 614. *Horseman - Pi-
 geon.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 513. n. 2. σ. Col.
 domest. *Eques*, pectore inflato, cera caruncu-
 lata.
Kramer, Austr. p. 359. n. 1. i. *Columba eques.*

τ. PER-

(6) Bastard von der Kropftaube und Brieftaube.

τ. PERCUSSOR. *Die Wendetaube.* (7)

Halle, Vögel, p. 467. n. 490. *die Klatschtaube, Klatscher.*

Briffon, ornith. I. p. 17. M. Pigeon batteur.

Büffon, Vögel, VI. p. 200. *die Wendetaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 614. Smiter Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 593. n. 1. τ. Col. dom.

Percussor, sub volatu se gyians, ac alas velociter percussans.

Kramer, Austr. p. 358. n. 1. η. Columba percussor. *Plätscher.*

Brünniche, ornith. bor. p. 63. n. 218. Columba (Percussor) versicolor, varie et indeterminate volans. *Dreyert.*

Büchotz, Abh. vom Federvieh, p. 247. 254.

Diction. des anim. III. p. 452.

υ. JUBATA. *Die Mähntaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 614. Turner Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 594. n. 2. υ. Col. dom. *Jubata*, cervice pennis iuba equinae instar reversis.

Halle, Vögel, p. 468. n. 494. *die mähnige Taube.*

φ. MACULATA. *Die Schnippentaube.* (8)

Büffon, Vögel, VI. p. 194. *die Maskentaube.*

Bechstein, Naturgeschichte, I. p. 485. *Maskentaube, Schnippentaube, Brilltaube.*

Halle, Vögel, p. 468. n. 495. *die Brilltaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 615. Spot Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 594. n. 2. φ. Col. dom. *Frontalis*, corpore albo, macula frontis caudaque concoloribus.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. not. 21. *Sneppert.*

L. 2. *Brün-*

(7) Schlägt im Fluge so stark mit den Flügeln, daß es ein Geräusch giebt, als ob zwey Bretter an einander schlugen.

(8) Ist nicht mit N. 52. p. 780. zu verwechseln.

Brünniche, ornith. bor. p. 61. n. 206. Columba (Fulicaria) corpore albo, fronte maculata, cauda fronti concolore. *Snippert*.

- a. Macula frontali et rectricibus rufis, mandibula superiore alba. *
- b. Macula frontali et rectricibus atris, mandibula superiore atra. *

Brünn. orn. bor. loc. cit.



Smellie, Philosoph. der Naturgesch. II. p. 9.

Jac. Vaniere, de S. I. Columbae et Vites. Paris 1696. 8.

Anon. A Treatise on domestic pigeons.

Du pigeon; in Erreurs populaires, l. 2. c. 3. p. 241.

Memoire sur les pigeons, sur leurs colombiers, et sur la maniere d'y gouverner les oiseaux domestiques. — Journ. Oecon. 1761. p. 16.

Sur la maniere de rafraichir l'air des Colombiers. — Nouvel. Oecon. Tom. II. p. 110.

Erfahrungen, Versuche, und Anmerkungen über die Taubenzucht. — Hannöv. Beytr. 1761. p. 825. u. 866.

Ob es vortheilhaft sey, Tauben bey der Landwirthschaft zu halten. — Nachr. der Schlef. patr. Gesellsch. 1781. p. 111.

Vom Halten der Tauben in den Städten. — Wittenb. Wochenbl. IX. p. 9.

Eine wohlfeile Art, die Tauben im Winter zu erhalten. — Hannöv. Magaz. 1771. p. 958.

Mittel wider die Raute der Tauben. — Berlin. Samml. IV. p. 263.

Tauben vor der Flucht zu bewahren. — Berlin. Samml. III. p. 618.

Salanders Tauben- und Bienenzucht. Freft. 1723. 8.

Von

Von dem Schaden, den die Tauben in der Landwirthschaft verursachen. — *Schönfeld*, Landwirthsch. p. 195.

Nützliches und vollständiges Taubenbuch, m. e. K. Ulm 1790. 8.

Woher die Tauben die Pocken bekommen. Hamburg. Magaz. XV. p. 651. cf. *Universalregister*.

Böhmius, de columba bicipite. Eph. nat. cur. Dec. II. an. 6. obs. 57. p. 137. c. fig.

Borrich. anatom. Columbae. — Act. Hafn. Vol. I. Obs. 96. — *Manget*, Bibl. I. 1. p. 388.

Camerarii sanguinis Columbini vis in oculis fugilatis, columbarum usus medicus. — Syll. memorabil. Cent. 6. P. 94. p. 414.

Num pulli columbini bonis cibis sint annumerandi? in *Zacut. Lusit. medic. princ. hist. L. 2.* ed. oper. T. I. p. 265.

Ausführl. Geschichte der Tauben. — Leipz. ökonom. phys. Abhandl. II. p. 65. — *Büffons* Vögel, VI. p. 317. ff.

Allgemeine Haushalt. u. Landwissensch. I. p. 864.

Der kluge Landmann. Francf. u. Leipzig 1713. 4. p. 393.

Magazin für den Landmann, II. p. 57.

Halle, Magie, IV. p. 268.

13. MONTANA. Die Bergtaube. (9)

Müller, Naturfyst. II. p. 504. n. 13. die Bergtaube. Onomat. hist. nat. III. p. 186. die Bergtaube.

Klein, verb. Vögelhist. p. 125. n. 27. Rothe Bergtaube.

Briffon, ornith. I. p. 32. n. 29. Pigeon roux de Cayenne.

L 3

Latham,

(9) In *Büffons* Vög. VI. p. 217. sind alle hieher und zu N. 24. p. 781. gehörige Synonymen unter einander geworfen.

Latham, Syn. Suppl. p. 197. Partridge Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 594. n. 3. Columba (Montana) orbitis nudis sanguineis, corpore rufo, subtus flavo.

Seligmann, Vögel, V. tab. 14. das Berggreb-
huhn.

Neue Mannigfaltigk. III. p. 293. die rothen Tauben.

Linne, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 163. n. 7. Columba (Montana) obscure rufa, subtus flava, orbita oculorum nuda sanguinea.

3. TETRAOIDES. Die Steinhuhnähnliche Taube.

Latham, Syn. IV. 2. p. 614. n. 4. Tetraoid Pigeon.

Latham, Syft. ornith. II. p. 594. n. 4. Columba (Tetraoides) capite colloque nigris, margine nigro.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 149. n. 180. die dem Steinhuhn (Tetr. Rufus) ähnliche Taube.

14. LEUCOCEPHALA. Die weißgekrönte Taube. (10)

Müller, Natursyft. II. p. 504. n. 14. der Weißkopf.

Halle, Vögel, p. 478. n. 517. die Taube mit weißer Platte.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 328. n. 271. der Weißkopf.

Onomat. hist. nat. III. p. 183. die Taube mit der weißen Krone.

Pennant, arct. Zool. II. p. 305. n. 105. die Taube mit dem weißen Scheitel.

Klein, av. p. 120. n. 18. Columba capite albo.

Klein, Vorbereit. p. 221. n. 18. Weißkopf.

Klein,

(10) Nach *Buffon* eine Abänderung von der gemeinen wilden Taube.

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 18. *Weißkopf*.

Briffon, ornithol. I. p. 34. n. 33. Pigeon de roche de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, VI. p. 235. *die weißgekrönte Taube*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 594. n. 5. Columba (Leucocephala) caerulefcens, orbitis verticeque albis, remigibus rectricibusque fuscis.

Seligmann, Vögel, I. tab. 50. *die Taube mit der weißen Krone*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 13. Columba (Leucocephala) caerulefcens, vertice depresso albo.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 339. n. 3. *die weißköpfige Taube*.

15. LEUCOPTERA. *Die weißflüglige Taube.* ⁽¹⁾

Müller, Naturfyft. II. p. 504. n. 15. *der Weißflügel*.

Onomat. hist. nat. III. p. 177. *die braune indianische Taube*.

Klein, av. p. 120. n. 26. Columba indica fusca.

Klein, Vorbereit. p. 223. n. 26. *indianische braune Taube*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 125. n. 26. *braune indianische Taube*.

Briffon, ornith. I. p. 25. n. 15. Pigeon des Indes.

Büffon, Vögel, VI. p. 222. *die braune Indianische Taube*; m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 197. White-winged Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 595. n. 6. Columba (Leucoptera) fusco-rufescens, orbitis nudis

L 4

caeru-

(1) Nach *Büffon* eine Abänderung von der gemeinen wilden Taube.

caeruleis, rectricibus cinereis, apice albis, intermediis fuscis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 47. *die braune indische Taube*.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 164. n. 14. Columba (Leucoptera) palpebris nudis caeruleis, iridibus oculorum fulvis.

4. FUSCA. *Die braune Taube von Carthagera.*

Ist, nach *Latham*, mit der vorhergehenden einerley.

5. NOVAE SEELANDIAE. *Die neuseeländische Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 603. n. 37. Columba (Zealandica) rubra, abdomine albo, uropygio caeruleo, cauda nigra.

6. CARIBAEA. *Die ringelschwänzige madagascarische Taube.*

Halle, Vögel, p. 476. n. 511. *die Taube mit der dunkelbraunen Binden um den Schwanz.*

Klein, av. p. 120. n. 19. Columba cauda torquata, seu fascia notata.

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 19. *Ringelschwanz.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 124. n. 19. *Ringelschwanz.*

Briffon, ornith. I. p. 35. n. 34. Pigeon à queue annelée de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, VI. p. 258. *der Ringelschwanz; die blaue madagascarische Ringeltaube; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 603. n. 36. Columba (Caribaea) caerulefcens, abdomine albo, capite, collo inferiore pectoreque purpurascens, cauda fascia transversa nigra.

β. Col. cauda cuneata, orbitis denudatis flavescentibus, corpore caerulescente. *

Latham, Syn. Suppl. p. 199. — Syst. ornith. II. p. 603. n. 36. β.

Jacquin, Vög. p. 30. n. 24.

16. GUINEA. Die guineische Taube. (2)

Müller, Naturfyst. II. p. 405. n. 16. die guineische Taube.

Halle, Vögel, p. 478. n. 515. die graubraune Taube, mit rother Membrane um die Augen.

Onomat. hist. nat. III. p. 180. die Taube mit dreyeckigten Flecken.

Klein, av. p. 120. n. 25. Columba Guineensis.

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 25. Taube von Guinea.

Klein, verb. Vögelhist. p. 125. n. 25. guineische Taube.

Briffon, ornith. I. p. 33. n. 30. Pigeon de Guinée.

Büffon, Vögel, VI. p. 254. die Guineische Ringeltaube mit dreyeckigen Flecken; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 602. n. 35. Columba (Guinea) orbitis nudis rufis, alis maculis albis triquetris, rectricibus apice nigris.

Seligmann, Vögel, III. tab. 45. die Taube mit drey-eckichten Flecken.

Sommerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 139. die Turteltaube vom Vorgebürge der guten Hoffnung.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 163. n. 9. Columba (Guinea) rectricibus cinereis apice nigris, orbita oculorum nuda rubra.

17. CORONATA. Der Kronenvogel.

Müller, Naturfyst. II. p. 405. n. 17. die große Kronentaube.

L 5 Blumen-

(2) Nach *Büffon* eine Spielart von der europäischen Ringeltaube.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 201. n. 2. Columba (Coronata) caerulefcens fupra cinera, orbitis nigris, crifta erecta, humeris ferrugineis; *der Kronvogel*.

Briffon, ornith. I. p. 78. n. 6. Faifan couronné des Indes.

Büffon, Vögel, VI. p. 266. *der Kronenvogel*.

Latham, Syft. ornith. II. p. 596. n. 9. Columba (Coronata) orbitis nigris, crifta erecta, corpore caerulefcence, humeris ferrugineis.

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 60. *die Kronentaube*.

Götz, Naturgefch. einiger Vögel, p. 65. *der Kronenvogel*, tab. 4.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 28. *große gekrönte indianifche Taube*.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 148. n. 179. *die grunzende oder blöckende Taube; die Taube mit aufrecht ftehendem Federbufch*.

Donndorff, Handb. d. Thiergefch. p. 339. n. 4. *der Kronvogel*.

7. CRISTATA. *Der Rouloul*.

Latham, Syft. ornith. II. p. 596. n. 10. Columba (Cristata) fufco-rufefcens cristata, fubtus capite colloque nigris, dorfo caudaque viridibus, fronte fetis fex longiffimis erectis.

Sonnerat, Reif. n. Oflind. u. Chin. II. p. 136. *der Rouloul aus Malacca*, tab. 100.

Muf. Carlson. fasc. III. tab. 64. Phasianus cristatus.

Philof. tranfact. LXII. p. 1. tab. 1. Uncommon Bird from Malacca.

β. *Latham*, Syft. ornith. II. p. 597. n. 10. β.

8. ALBICAPILLA. *Die grüne, grauköpfige Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 233. *die grüne, grauköpfige Taube der Insel Antigua.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 597. n. 11. Columba (Albicapilla) viridis, vertice cano, colli lateribus rufescente aureis, remigibus primoribus caudaque nigris.

Sommerat, Reis. n. Neuguin. p. 40. *die grüne, grauköpfige Taube der Insel Antigua.*

9. POMPADORA. *Die Pompadurtaube.*

Latham, Syn. Suppl. p. 198.

Latham, Syst. ornith. II. p. 597. n. 12. Columba (Pompadora) viridis, alis purpurascens, remigibus nigris, genis gulaque flavis.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 597. n. 12. (Femina.)

10. ERYTHROPTERA. *Die rothflügelige Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 597. n. 15. Columba (Erythroptera) granatina, subtus, nucha, dorso remigibusque nigris, fronte superciliisque albis, cauda a medio ad apicem nigra.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 598. n. 15. β. Col. gutture et pectore albis, superciliis ferrugineis, remigibus caudaque nigricantibus.

γ. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 598. n. 15. γ. Col. nigro-rubescens, superciliis colloque subtus albis, pedibus rubris.

11. STRIATA. *Die gestreifte Taube.*

Müller, Naturfyst. II. p. 506. n. 18. *die gestreifte Taube.*

Klein, av. p. 120. n. 21. Columba turtur Ind. orientalis, alis dorsoque ex cinereo seriatim quasi squamatis.

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 21. *graugeschuppte Turteltaube*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 21. *graugeschuppte Turteltaube*.

Briffon, ornith. I. p. 26. n. 17. *Tourterelle rayée des Indes*.

Büffon, Vögel, VI. p. 303. 305. *die gestreifte Indianische Turteltaube*; m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 200. *Barred Turtle*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 53. *Columba (Striata) orbitis lorisque candidis, corpore cinereo nigro fasciato, subtus rufo*.

Schligmann, Vögel, I. tab. 31. *die quergestreifte Taube*.

19. PALUMBUS. *Die Ringeltaube*.

Müller, Naturfyst. II. p. 506. n. 19. *die Ringeltaube*.

Leske, Naturgesch. p. 254. n. 2. *die Ringeltaube*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 205. n. 1. *die Ringeltaube*, tab. 75.

Bumenbach, Handb. d. N.G. p. 201. n. 3. *Columba (Palumbus) rectricibus postice atris, remigibus primoribus margine exteriori albidis, collo utrinque albo, Ringeltaube; große Holzttaube; Schlagtaube; Blochtaube; Kohltaube; Holzttaube*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 490. n. 2. *die Ringeltaube*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 779. *die Ringeltaube*.

Ebert, Naturl. II. p. 123. *die Ringeltaube*.

Halle, Vögel, p. 469. n. 496. *die große Ringeltaube*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 329. n. 273. *die Ringeltaube*.

Beckmann,

Beckmann, Naturhist. p. 51. b. die Ringeltaube.

Pennant, arct. Zool. II. p. 307. b. die Ringeltaube.

Onomat. hist. nat. V. p. 3. die Ringtaube.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 117. die Ringeltaube.

Klein, av. p. 119. n. 7. Columba torquata.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 7. Ringeltaube.

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. n. 7. Ringeltaube.

Klein, Stemmat. av. p. 27. tab. 29. Fig. 1. a—c.

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. Fig. 2.

Gesner, Vögelb. p. 526. Ringeltauben; Bloßtauben.

Briffon, ornith. I. p. 20. n. 6. Pigeon ramier.

Büffon, Vögel, VI. p. 238. die Ringeltaube; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 428. die Ringeltaube.

Latham, Syn. Suppl. p. 198. Ring-Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 32. Columba (Palumbus) cinerea, rectricibus postice atris, remigibus primoribus margine exteriori albidis, collo utrinque albo.

Beseke, Vögel Kurl. p. 71. n. 151. die Ringeltaube.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 43. n. 2. die Ringeltaube.

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 405. die Ringeltaube; Waldtaube.

Fischer, Livl. p. 91. n. 125. Ringeltaube; Waldtaube.

Cetti, Sardin. II. p. 130. die Holz- oder Ringeltaube.

Molina, Chil. p. 208. Ringeltauben?

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 7. Ringeltaube.

White, N. G. von Engl. p. 66. n. 6. Ringeltaube.

Adan-

Adanson, Senegal. p. 93. *Felsentauben*.

Leem, Finnm. p. 132. * *Ringeltauben*.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 94. tab. 45.

Linne', Abhandl. II. p. 299. n. 110. *die Ringeltaube*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 300. *Ringel-Taube*.

Dübel, Jägerprakt. I. p. 52 *Ringel-Taube*.

Naumann, Vogelfsteller, p. 160. *Ringeltaube*.

Naturforsch. XVII. p. 76. n. 157. *die Ringtaube*.

Anweil. Vögel zu fang. p. 556. *Ringeltaube*.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 147. n. 178. *die wilde Taube, Ringeltaube*.

Loniceri, Kräuterb. p. 649. *Holztaube; Blochtaube; Waldtaube*.

Neues hamburg. Magaz. St. 37.

Börner, Stadt- und Landwirthsch. p. 137. n. 3.

Angenehme Landluft, p. 311.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 97.

Borkhausen, Magazin, I. p. 208. n. 86.

Linne', Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Palumbus*.

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 3. *Palumbus*.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 163. n. 11. *Columba (Palumbus) rectricibus postice atris, remigibus primoribus margine exteriori albidis, collo utrinque albo*.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 228. *Columba (Palumbus) rectricibus postice atris, remigibus primoribus margine exteriori albidis, collo utrinque albo*.

Kramer, Austr. p. 359. n. 2. *Columba collo utrinque albo, pone macula fusca, Wildtaube; Ringeltaube*.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 313. *Palumbus. Ringeltaube*.

Charleton, onom. zoic. p. 77. n. 1. *Palumbus torquatus*.

Rzaczyns.

Rzaczyusky, hist. nat. Pol. p. 143. Palumbus.

Sibbald, Scot. illustr. p. 109. Palumbus.

Zinnan. Uov. p. 32. tab. 4. Fig. 14. Colombaccio.

Olin. uc. p. 54. — Hist. Prov. I. p. 490. — Rom. orn. I. p. 84. tab. 14.

Bomare, Diction. VIII. p. 508. — Dict. des anim. III. p. 458.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 24. Palumbes.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 11. n. 119. 121. *Φαττα*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 339. n. 5. die Ringeltaube.

11. CAERULEA. Die blaue mexicanische Taube.

Briffon, ornith. I. p. 35. n. 35. Pigeon bleu du Mexique.

Büffon, Vögel, VI. p. 216. der Tlacahoiotl.

Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 31. Columba (Caerulea) caerulea, subtus tectricibusque alarum rubris, capite colloque rubro variegatis.

12. HOILOTL. Die mexicanische Bergtaube.

Briffon, ornith. I. p. 32. n. 28. Pigeon de Montagne du Mexique.

Büffon, Vögel, VI. p. 215. Hoilotl.

Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 30. Columba (Hoilotl) rufo-purpurea, tectricibus alarum minoribus albis.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 601. ad n. 30.

42. NAEVIA. Die braune, schwarz gefleckte ne-spanische Taube.

Briffon, ornith. I. p. 23. n. 11. Pigeon sauvage du Mexique.

Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 29. Columba (Naevia) fusca, supra nigro-maculata, subtus fulvescens, tectricibus caudae inferioribus cinereis.

43. MEXICANA. *Die braune mexicanische Taube.*

Briffon, ornith. I. p. 23. n. 10. Pigeon du Mexique.

Büffon, Vögel, VI. p. 215. die braune Taube aus Neuspanien, Cehollotl.

Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 28. Columba (Mexicana) fusca, orbitis coccineis, pectore candido, alis extremis albis.

44. PACIFICA. *Die Taube von den Inseln des stillen Ocean.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 600. n. 27. Columba (Pacifica) dorso fusco-virescente, capite, collo, pectore abdomineque cinereo-albis, cauda nigricante.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 600. n. 27. Col. capite, collo, pectore abdomineque albidis, dorso, rectricibus alarum caudaque subviridibus, basi rostri gibba.

45. CURVIROSTRA. *Die krummschnäblige Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 600. n. 25. Columba (Curvirostra) viridis subtus flavescens, dorso castaneo, fascia alarum duplici rectricumque lateralium unica nigris.

46. ST. THOMAE. *Die Taube von der Insel St. Thomae.*

Halle, Vögel, p. 471. n. 500. die grüne Papagaitaube.

Klein, av. p. 119. n. 11. Columba ex insula St. Thomae sylvestris.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 11. Papageytaube von der Insel St. Thomae.

Klein, verb. Vögelhist. p. 113. n. 10. Thomas-taube.

Briffon,

Briffon, ornith. I. p. 38. n. 40. Pigeon verd de l'Isle de S. Thomas.

Büffon, Vögel, VI. p. 228. *die Papagaytanbe* (3)

Latham, Syst. ornith. II. p. 600. n. 24. Columba (St. Thomae) viridis; tectricibus caudae inferioribus flavis, remigibus et apice caudae viridi-fuscis.

Marcgr. hist. nat. Brasil. p. 213. Columbae sylvestris species ex Insula St. Thomae.

Jonston, av. p. 208. Columbae sylvestris species ex Insula S. Thomae allata.

47. AROMATICA. *Die olivenfarbige amboinische Taube.*

Briffon, ornith. I. p. 37. n. 39. Pigeon vert d'Amboine.

Büffon, Vögel, VI. p. 229. *Amboinische grüne Taube*; m. c. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 631. n. 21. Aromatic Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 23. Columba (Aromatica) viridi-olivacea, dorso castaneo, fascia alarum duplici flavicante et nigra, remigibus nigris, margine flavis.

20. CYANOCEPHALA. *Die blauköpfige Taube. (*)*

Müller, Natursyf. II. p. 507. n. 20. *der Blaukopf*.
Onomat. histor. natur. III. p. 179. *blauköpfige Turteltaube*.

Halle, Vögel, p. 474. n. 506. *die mohrenköpfige Turteltaube*.

Klein,

(3) Hier sind alle zu dieser, der folgenden, und 69ten Gattung gehörige Synonymen, unter einander geworfen.

(*) Die Trivialbenennung *Cyanocephala* kommt im System p. 781. n. 56. nochmals vor.

- Klein, av. p. 119. n. 15. Columba capite nigro.
 Klein, Vorbereit p. 221. n. 15. *Jamaicanische Turteltaube; mit schwarzem Kopfe.*
 Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 15. *Jamaicanische Turteltaube.*
 Brisson, ornith. I. p. 34. n. 2. Tourterelle de la Jamaïque.
 Brisson, Vögel, VI. p. 308. *Jamaizensische Turteltaube; m. e. Fig. p. 311. der Blaukopf.*
 Latham, Syn. Supplem. p. 100. Blue-headed Turtle.
 Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 54. Columba (Cynocephala) vinaceo-fusca, capite gulaque caeruleis, fascia suboculari alba.
 Linné, Syst. nat. Ed. X. I. p. 163. n. 12. Columba (Cynocephala) capite caeruleo.

48. SURATENSIS. *Die Taube von Surate.*

- Latham, Syst. ornithol. II. p. 609. n. 55. Columba (Suratensis) grisea, collo supra nigro, nucha alba, vertice rufo-fasciata, rectricibus alarum cinereo-griseis, rachibus nigris.
 Sonnerat, Reis. nach Ostind. und Chin. II. p. 39. *die Turteltaube von Surate.*

49. CAMBAYENSIS. *Die graue, weißbauchige Taube von Surate.*

- Latham, Syst. ornith. II. p. 609. n. 56. Columba (Cambayensis) grisea, subtus alba, capite subvinaceo, collo subtus nigro rufo vario, rectricibus lateralibus nigro griseoque dimidiatis.
 Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 140. *die graue Turteltaube von Surate.*

50. MALABARICA. *Die malabarische Taube.*

- Latham, Syst. ornith. II. p. 609. n. 57. Columba (Malabarica) cinerea, subtus alba, alis medio maculis

maculis ovatis, rectricibus lateralibus a basi ultra medium nigris, reliqua parte albis.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 140. *die Taube von der Küste Malabar.*

21. MADAGASCARIENSIS. *Die blaue Madagascarische Taube.*

Müller, Naturfyst. II. p. 507. *die madagascarische Taube.*

Briffon, ornith. I. p. 36. n. 36. Pigeon-ramier bleu de Madagascar.

Büffon, Vögel, VI. p. 259. *die blaue Madagascarische Ringeltaube; der Founingo, m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 604. n. 40. Columba (Madagascariensis) pedibus plumosis, cauda violacea, corpore caeruleo-nigro.

Bontecoë, voyag. aux Indes orient. p. 16.

β. Die grüne madagascarische Taube. ()

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 132. *der Gelbschwanz.*

Briffon, ornith. I. p. 36. n. 37. Pigeon-ramier verd de Madagascar.

Büffon, Vögel, VI. p. 260. *grüne Madagascarische Ringeltaube; Founingo-maitfu, m. e. Fig.*

Latham, Syn. II. 2. p. 641. n. 35. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 604. n. 41. Columba (Australis) viridis, abdomine, crisso, femoribusque maculatis, humeris violaceis.

Bont. Ind. orient. p. 62. Columba viridissimi coloris.

51. FRANCIAE. *Die holländische Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 604. n. 42. Columba (Franciae) caerulea, orbitis nudis, uropygio caudaque rubris, penniis colli angustis elongatis, apice acuminatis.

M 2

Sonnerat

(4) Nach *Briffon* und *Latham* eine eigne Gattung.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 137. die holländische Taube.

52. MACULATA. Die grüne, weißgefleckte Taube.

Latham, Syst. ornith. II. p. 605. n. 43. Columba (Maculata) saturate viridis, corpore supra albido maculato, abdomine nigricante, cauda nigra, apice ferruginea.

22. AENEAE. Die kupferfarbene Muskattaube.

Müller, Naturfyst. II. p. 508. n. 22. die moluccische Taube.

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 133. d. die moluckische Taube.

Onomat. hist. nat. VI. p. 5. die Molluccische Taube.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 330. n. 274. die Muskatringeltaube.

Briffon, ornith. I. p. 38. n. 41. Pigeon-ramier des Moluques.

Büffon, Vögel, VI. p. 251. die Molukkische Ringeltaube; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 602. n. 33. Columba (Aenea) pedibus plumosis, rostro pedibusque virefcentibus, corpore aeneo.

β. *Büffon*, Vögel, VI. p. 253. n. 1. die kupferfarbige Muskatringeltaube.

Latham, Syn. II. 2. p. 637.

Latham, Syst. ornith. II. p. 602. n. 33. β.

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 60. die kupferfarbene Muskattaube; m. e. Fig.

53. ALBA. Die weiße Muskattaube.

Büffon, Vögel, VI. p. 253. n. 2. die weiße Muskatringeltaube von Neu-Guinea.

Latham, Syst. ornith. II. p. 602. n. 34. Columba (Alba) corpore albo, remigibus primoribus caudaque ad apicem nigris.

Sonnerat,

Sonnerat, Reif. nach Neuguinea, p. 60. *die weiße Muskat-Taube.*

23. *VIRIDIS. Die grüne amboinische Taube.*

Müller, Naturfyst. II. p. 508. n. 23. *die amboinische Taube.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 132. *die amboinische Taube.*

Briffon, ornith. I. p. 39. n. 43. *Tourterelle verte d'Amboine.*

Büffon, Vögel, VI. p. 296. *der Türvert. n. 1. purpurbrüstige amboinische Turteltaube; m. e. Fig. p. 300. amboinische grüne Turteltaube.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 609. n. 58. *Columba (Viridis) aenea, collo subtus purpureo-vio-laceo.*

54. *MELANOCEPHALA. Die schwarzkappige Taube.*

Müller, Naturfyst. Supplem. p. 133. *die batavische Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 296. 297. *der Türvert. n. 2. batavische Turteltaube, m. e. Fig. p. 300. batavische Turteltaube. p. 301. schwarzgehäubte Javanische grüne Taube; Taube mit schwarzer Kappe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 610. n. 59. *Columba (Melanocephala) viridis, capite cinerascens, occipite nigro, gula, abdomine imo crissoque flavis, rectricibus tribus exterioribus purpureo coccineis.*

Naturforsch. I. p. 269. n. 7. *die schwarzgehaubte Taube.*

Berlin. Samml. IX. p. 192. *die javanische Taube mit schwarzer Kappe.*

Neueste Mannigfaltigkeit. I. p. 189. n. 7.

55. JAVANICA. *Die javanische Taube.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 133. *der Grünrückten.*

Buffon, Vögel, VI. p. 296. 298. *der Türvert*, n. 3. *javanische Turteltaube*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 610. n. 60. Columba (Javanica) viridis, capite colloque vinaceo-rubris, abdomine obscuriore, remigibus primoribus fuscis.

56. CYANOCEPHALA. *Die blaugescheitelte chinesische Taube.* (5)

Latham, Syst. ornith. II. p. 610. n. 61. Columba (Caeruleocephala) viridis, subtus rubens; vertice caeruleo, remigibus rectricibusque caeruleo-nigricantibus.

24. MARTINICA. *Die martinikische Taube.*

Müller, Naturfyst. II. p. 508. n. 24. *Die martinikische Taube.*

Briffon, ornith. I. p. 32. n. 27. Pigeon violet de la Martinique.

Buffon, Vögel, VI. p. 217. *die violette Martinikische Taube*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 595. n. 7. Columba (Martinica) subviolacea, abdomine rufescente, remigibus interius rufis.

Du Tertre, hist. des Antill. II. p. 254. Perdrix rousse?

β. Briffon, ornith. I. p. 25. n. 14. Pigeon de la Martinique.

Buffon, Vögel, VI. p. 217. *die Martinikische Taube*; *rothe Kayenische Taube*. (mit Col. Montana verwechselt.)

Latham, Syn. II. 2. p. 618. n. 7. Var. A.

Latham,

(5) Ist nicht mit n. 20. p. 778. zu verwechseln.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 595. n. 7. β . Col. fusco-rufescens, torque violaceo-aureo, alis nigro-maculatis, rectricibus lateralibus nigro terminatis, apice fummo albo.

25. JAMAICENSIS. *Die jamaicaische Taube.* (6)

Müller, Naturfyst. II. p. 508. n. 25. *die jamaicaische Taube.*

Briffon, ornithol. I. p. 33. n. 31. Pigeon de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, VI. p. 236. *eine andere Jamaicensische Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 595. n. 8. Columba (Jamaicensis) fusco-purpurascens, subtus alba, rectricibus caeruleis, linea alba terminatis.

26. SENEGALENSIS. *Die senegalische Taube ohne Halsband.*

Müller, Natursystem, II. p. 509. *die Senegalische Taube.*

Briffon, ornith. I. p. 31. n. 25. Tourterelle à gorge tachetée du Sénégal.

Büffon, Vögel, VI. p. 289. *die senegalische Turteltaube mit gefleckter Kehle*, m. e. Fig. p. 290. *die senegalische Turteltaube ohne Halsband.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 610. n. 62. Columba (Senegalensis) fusco-rufescens, subtus alba, collo subtus nigro-maculato, rectricibus tribus extimis, ultima medietate albis.

7. VINACEA. *Die senegalische Taube mit dem Halsbande.* (7)

Briffon, ornith. I. p. 30. n. 24. Tourterelle à collier du Sénégal.

M 4

Büffon,

(6) Wird häufig mit *Columba Leucocephala*, p. 772. n. 14. verwechselt.

(7) Nach *Büffon* eine Varietät von der vorigen.

Büffon, Vögel, VI. p. 290. *die senegalische Turteltaube mit schwarzem halben Ring auf dem Halse*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 611. n. 63. *Columba* (Vinacea) griseo-fusca, subtus alba, collo superiore torque nigro, remigibus fuscis albido extus marginatis.

27. NICOBARICA. *Die nikobarische Taube.*

Müller, Natursystem, II. p. 509. n. 27 *die nicobarische Taube.*

Halle, Vögel, p. 477. n. 513. *die Hahnentaupe.*

Onomat. histor. natur. III. p. 187. *die nicobarische Taube.*

Klein, av. p. 120. n. 23. *Columba Nincombar.*

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 23. *indianische Taube von Ninkombar.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 23. *Nincombar.*

Briffon, ornithol. I. p. 40. n. 44. *Pigeon de Nincombar.*

Büffon, Vögel, VI. p. 264. *die Taube von der Insel Nicobar*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 605. n. 44. *Columba* (Nicobarica) cauda alba, corpore nigro, remigibus caeruleis, dorso viridi-nitente, penni colli elongatis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 15. *Columba* (Nicobarica) cauda alba, corpore nigro, remigibus caeruleis, dorso viridi-nitente, pennis colli elongatis.

Bomare, diction VIII. p. 510. n. 2. — Dict. des Anim. III. p. 460.

58. SPECIOSA. *Die cayennische Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 263. *die Kayennische Ringeltaube*; m. e. Fig.

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 605. n. 45. *Columba* (Speciosa) ferruginea, cauda nigricante, collo inferiore pectoreque rufo albo purpureoque undulatis.

59. *CORENSIS*. *Die graue südamerikanische Taube.*

Latham, Syn. Suppl. p. 201. Grey Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 605. n. 46. *Columba* (Corensis) cauda aequali, orbitis denudatis atro-punctatis, corpore griseo.

28. *SINICA*. *Die gestreifte chinesische Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 509. n. 28. *die chinesische Taube.*

Halle, Vögel, p. 476. n. 512. *die Turtelaube aus China; von kurzer Taille.*

Onomat. hist. nat. III. p. 189. *die chinesische Taube.*

Klein, av. p. 120. n. 22. *Columba sinensis, elegans.*

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 22. *Sinesische Taube.*

Klein, verb. Vögelh. p. 124. n. 22. *chinesische Taube.*

Briffon, ornith. I. p. 26. n. 16. *Tourterelle rayée de la Chine.*

Büffon, Vögel, VI. p. 302. 305. *die gestreifte Chinesische Taube; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 52. *Columba* (Sinica) fusca, nigro fasciata, abdomine sub-fanguineo, remigibus nigris, rostro nigro.

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 17. *Columba* (Sinica) rectricibus dorsoque fuscis, abdomine fanguineo, alis flavis, remigibus nigris.

60. *EIMEENSIS*. *Die purpurbrüstige Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 21. *Columba* (Eimensis) fusco-virescens, fronte colloque

subtus

subtus vinaceis, pectore testricibusque alarum
fulco-rubris, fascia pectorali alba.

61. PURPUREA. *Die grüne purpurköpfige Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 20. Columba
(Purpurea) viridis, capite colloque purpura-
scentibus, pectore fulvo, crisso rubro.

62. RUBRICAPILLA. *Die violette, rothköpfige Taube.*

Buffon, Vögel, VI. p. 234. *die violette rothköpfi-
ge Taube von Antigua.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 19. Columba
(Rubricapilla) atro-violacea, pileo orbitisque
nudis rubris, collo, dorso superiore pectore-
que grisescentibus.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 41. *die violette
rothköpfige Taube.*

63. JAMBU. *Die Taube von Sumatra.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 598. n. 18. Columba
(Jambos) viridis, supra rubra, pectore albo.

64. PURPURATA. *Die Taube mit purpurfarbenem Scheitel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 598. n. 17. Columba
(Purpurata) viridis, pileo coccineo, crisso ful-
vo, capite, collo pectoreque albis.

29. INDICA. *Die grüingeflügelte indianische Taube.* ⁽⁸⁾

Müller, Natur Syst. II. p. 509. n. 29. *die india-
nische Taube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 182. *die grüingeflügelte
Taube.*

Halle, Vögel, p. 475. n. 507. *die rosenrothe Tur-
teitaube, mit grünen Flügeln.*

Klein,

(8) Buffon hält sie für das Weibchen von seiner *Tourterelle de la
Jamaïque*. (Col. cyanocephala, p. 778. n. 20.)

Klein, av. p. 120. n. 20. *Columba turture nostrate minor*; principibus coloribus superbiens Indiae orientalis.

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 20. *Scharlattaube aus Ostindien*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 20. *Scharlattaube*.

Briffon, ornith. I. p. 39. n. 42. Pigeon-ramier d'Amboine.

Büffon, Vögel, VI. p. 308. 311. *die grüingeflügelte Indianische Taube*.

Latham, Syn. Suppl. p. 198. Green-winged Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 598. n. 16. *Columba (Indica) corpore purpureo, humeris viridibus, pileo caerulefcente, remigibus primoribus rectricibusque nigris*.

Seligmann, Vögel, I. tab. 27. *die grüingeflügelte Taube*.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 18. *Columba (Indica) corpore purpureo, humeris viridibus, superciliis albis*.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 598. n. 16. β. Col. tectricibus alarum violaceis, remigibus viridibus.

30. CANADENSIS. *Die canadische Taube*.

Müller, Naturfyst. II. p. 510. n. 30. *die canadische Taube*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 303. n. 106. *die Canadische Taube*.

Briffon, ornithol. I. p. 29. n. 21. Tourterelle de Canada.

Büffon, Vögel, VI. p. 285. *die Kanadensische Turteltaube, mit langem Schwanze; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 613. n. 72. *Columba (Canadensis) cauda cuneata, corpore griseo-fusco*

fusco subtus albido, remigibus primoribus apice flavicantibus, rectricibus extimis albis.

65. SANGUINEA. *Die weiße, blutfleckige Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 299. *die weiße blutflekkichte Turteltaube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 611. n. 66. Columba (Sanguinea) corpore toto albo, macula pectorali, rostro pedibusque sanguineis.

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 21. *die weiße blutfleckigte Turteltaube.*

66. CRUENTA. *Die graue blutfleckige Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 298. *die graue blutflekkichte Turteltaube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 611. n. 65. Columba (Cruenta) grisea, collo subtus albo, cervice violacea, fasciis alarum tribus grisescentibus, macula pectoris sanguinea.

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 21. *die graue blutfleckigte Turteltaube.*

31. AFRA. *Die afrikanische Taube.*

Müller, Naturfyst. II. p. 510. n. 31. *die africanische Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 289. *Senegalische Turteltaube; m. e. Fig.*

Briffon, ornithol. I. p. 30. n. 23. *Tourterelle du Senegal.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 611. n. 64. Columba (Afra) griseo-fusca subtus albida, maculis tetricum alarum violaceo azureis, rectricibus extimis basi exteriori maculaque apicis albis.

32. TURTUR. *Die Turteltaube.*

Müller, Naturfyst. II. p. 510. n. 32. *die Turteltaube.*

Leske,

Leske, Naturgesch. p. 254. n. 3. *die Turteltaube.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 92. n. 10. *die Turteltaube.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 201. n. 4. Columba (Turtur) rectricibus apice albis, dorso griseo, pectore incarnato, macula laterali colli nigra lineolis albis; *die Turteltaube; Wegetaube.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 491. n. 3. *die Turteltaube.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 680. *die Turteltaube.*

Ebert, Naturl. II. p. 123. *die Turteltaube.*

Halle, Vögel, p. 472. n. 501. *die Turteltaube.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 332. n. 275. *die Turteltaube.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 640. *die Turteltaube.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 117. *die Turteltaube.*

Klein, av. p. 119. n. 12. Columba Turtur.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 12. *Turteltaube.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 12. *Turteltaube.*

Klein, Stemm. av. p. 27. 29. Fig. 3. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 16. Fig. 3. 8.

Gesner, Vögelb. p. 529. *Turteltaube; m. e. zieml. gut. Fig.*

Briffon, ornith. I. p. 21. n. 7. Tourterelle.

Büffon, Vögel, VI. p. 271. 281. *die Turteltaube, m. e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 428. *die Turteltaube.*

Latham, Syn. Suppl. p. 199. Common Turtle.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 605. n. 47. Columba (Turtur) rectricibus apice albis, dorso griseo, pectore incarnato, macula laterali colli nigra lineolis albis.

Frisch, Vögel, tab. 140. *die Turteltaube.*

Beseke,

Beseke, Vögel Kurl. p. 71. n. 153. *die Turteltaube.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 44. n. 3. *die Turteltaube.*

Cetti, Sardin. II. p. 136. *die Turteltaube.*

Fischer, Livl. p. 91. n. 126. *Turteltaube.*

Molina, Chil. p. 208. *Turteltaube.*

Niebuhr, Besch. von Arab. p. 168. *Turteltauben.*

Boswell, Besch. von Corfic. p. 45. *die Turteltaube.*

White, N. G. von Engl. p. 59. n. 13. *die Turteltaube.*

Taube, Slavon. I. p. 23. *Turteltauben.*

Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *die Turteltauben.*

Georgi, Reif. p. 173. *Turteltaube.*

Forskål faun. Orient. p. VII. n. 12. a. *Columba*

Turtur. Djahleb. — Deser. animal. p. 4. n.

14. *Columba Turtur*; rectricibus fuscis: extimis apice et extrorsum, reliquis apice albis, intermediis exceptis.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 8. *Turteltaube.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 94. tab. 44.

Boßmann, Reif. n. Guinea, p. 390. *Turteltauben.*

Allgem. Reif. IV. p. 388. *Turteltauben.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 149. n. 181. *die Turteltaube.*

Merklein, Thierreich, p. 392. *Turteltaube.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 303. *die Turteltaube.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 52. *Turteltaube.*

Anweil. Vögel zu fang. p. 557. *Turteltaube.*

Naumann, Vogellsteller, p. 161. *die Turteltaube.*

Meidinger, Vorl. I. p. 145. n. 3. *die Turteltaube.*

Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 137. n. 4.

Hamb. Magazin, XIX. p. 58.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 97.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 397. *Turteltaube.*

Lemmery,

- Lemmery*, Materiallex. p. 1160.
Neue Mannigfaltigk. III. p. 293.
Neueste Mannigfaltigk. I. p. 570.
Loniceri, Kräuterb. p. 650. *Turtel-Taube.*
André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 26. *Turteltaube.*
Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. III. 1. p. 63.
Berkhausen, Magazin, I. p. 209. n. 87.
Naturforsch. XVII. p. 76. n. 158. *Turteltaube.*
Linne, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Turtur.*
Linne, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 4. *Turtur.*
Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 20. *Columba* (*Turtur*) rectricibus apice albis, dorso griseo, pectore incarnato, macula laterali colli.
Kramer, Austr. p. 359. n. 3. *Columba* area oculorum nuda coccinea laevi, collo postice semicirculo nigro; *wilde Turteltaube.*
Charleton, onom. zoic. p. 77. n. 5. *Turtur.*
Schwenkfeld, av. Siles. p. 362. *Turtur, Turteltaube.*
Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 302. *Turtur.*
Sibbald, Scot. ill. p. 179. *Turtur.*
Jonston, av. p. 92. *Turtur.*
Zinnan. Uov. p. 33. tab. 4. Fig. 15. *Tortora.*
Schlichten, obs. phil. de Turture eiusque qualitatibus, usu antiquo et emblemate, ad illustranda varia S. S. loca, Hal. 1739. 4.
Riedlinus, Turturum dubia castitas. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. 5. et 6. obs. 129. p. 260.
Hartmann, anatome Turturis, pinguedine suffocatae, — ibid. Dec. II. an. 7. obs. 32. p. 69.
Camerarius, Turtur sapientum caro, dysenteriae et strabismi remedium. — Syll. memorab. Cent. VIII. P. 89. p. 621.
Second. Voyage de Siam. p. 248.
Geronier, hist. nat. et polit. de Siam. p. 35.
Dampier,

Dompier voy. I. p. 406. II. p. 83. III. p. 155. IV. p. 139.

Voyage de Frézier, p. 74. p. III.

Le Gentil, voy. I. p. 94.

Charlevoix, hist. de St. Domingue, I. p. 28.

Histoir. des Navigations aux terres australes, II. p. 52.

Nouv. voy. aux Isles de l'Amerique, II. p. 67.

Bomare, Diction. XI. p. 439. — Diction. des anim. IV. p. 410.

Plin. hist nat. L. 10. c. 24. Turtur.

Varro, de re rust. L. 3. c. 5. et 8. Turtures.

Columella, de re rust. L. 8. c. 9. Turtures.

Palladius, de re rust. L. 1. c. 25. Turtures.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 6. n. 65. L. 9. c. 2. n. 22. L. 9. c. 11. n. 127. *τρυγones*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 340. n. 6. die Turteltaube.

β. Die Turteltaube mit schwarzen, weißgefleckten Seitenhalsfedern.

Latham, Syn. II. 2. p. 645. n. 4. A. Spotted-necked Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 606. n. 1. β.

γ. Die portugiesische Turteltaube. (9)

Halle, Vögel, p. 474. n. 505. die Portugiesentaube.

Klein, av. p. 119. n. 14. Columba Portugallensis.

Klein, Vorbereit. p. 221. n. 14. Portugallische Taube.

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 14. Portugiesische Taube.

Briffon, ornith. I. p. 23. n. 9. Pigeon de Portugal.

Büffon, Vögel, VI. p. 302. 305. die portugiesische Taube.

Latham,

(9) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Latham, Syn. II. 2. p. 646. Portugal Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 606. n. 47. γ. Col. fusca, macula laterali colli albo nigroque varia, rectricibus cinereis, lateralibus latere exteriori, omnibus apice albis.

δ. Die aschgraue Turteltaube von der Insel Luçon.

Büffon, Vögel, VI. p. 298. die aschgraue Turteltaube.

Latham, Syn. II. 2. p. 646. Luzonian Turtle.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 606. n. 47. δ. Col. griseo-cinerea, subtus vinaceo-grisea, macula colli nigra, pennis apice albis, rectricibus intermediis duabus nigris, lateralibus albis.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 22. die aschfarbene Turteltaube.

ε. Die braune chinesische Turteltaube. (1)

Latham, Syn. IV. p. 647. Chinese Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 606. n. 48. Columba (Orientalis) fusco-grisea, lateribus colli pennis nigris, apice griseo-cinereis, fascia alarum flava.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 138. die braune Chinesische Turteltaube.

Latham, Syst. ornith. II. p. 607. n. 49. Columba (Aegyptiaca) testaceo-incarnata, gula maculata, plumis nigris, apice bilobo-truncatis, ferrugineis.

Forskål, fn. orient. p. 5. n. 15. Columba testaceo-incarnata: gula maculata, plumis nigris, apice bilobo-truncatis, ferrugineis.

ζ. Die

(1) *Latham* nimmt *Sonnerats* Tourterelle brune de la Chine, und *Forskåls* Columba testaceo-incarnata, als zwey besondere Gattungen an.

ζ. *Die weiße Turteltaube.* *

Lichtenberg u. Voigt, Magazin für das Neueste,
etc. VII. 2. p. 97.

η. *Die Ohrenturteltaube.* *

Müller, Naturfyst. II. p. 511. *die Ohrtaube.*

Halle, Vögel, p. 472. n. 502. *die Turteltaube mit Ohren.*

Klein, av. p. 119. n. 12. *Turtur auritus; Eardove.*

Klein, Vorbereit. p. 221. *Turteltaube mit Ohren.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 12. *Ohrtaube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 281. *Ohrentauben.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 303.

Raji Synops. p. 184. n. 26. *Turtur auritus.*

Sloane, Jam. p. 304. tab. 262. fig. 2. *Eardove.*

67. SURINAMENSIS. *Die Surinamische Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 607. n. 50. *Columba*
(*Surinamensis*) cinerea subtus alba, gula viridi
nigroque varia, rostro caeruleo.

Fermin, Surin. II. p. 144. *die Turteltaube.*

33. RISORIA. *Die Lachtaube.* (2)

Müller, Naturfyst. II. p. 512. n. 33 *die Lachtaube.*

Leske, Naturgesch. p. 254. n. 4. *die Lachtaube.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 214. n. 12. *die Lachtaube.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 201. n. 5. *Columba*
(*Risoria*) supra lutescens, lunula cervicali
nigra.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 492. n. 4. *die Lachtaube.*

Ebert, Naturl. II. p. 124. *die Lachtaube.*

Halle, Vögel, p. 473. n. 503. *die Lachtaube mit schwarzem Bogen im Nacken.*

Gatterer,

- (2) Wird von *Büffon*, *Kramer*, u. a. als eine Spielart oder Abänderung von der gemeinen Turteltaube angesehen.

- Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 352. n. 276. *die Lachtaube*.
- Neuer Schaupl. d. Nat. V. p. 6. *Lachtaube*.
- Onomat. hist. nat. III. p. 188. *die gemeine Turteltaube*.
- Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 118. *die Lachtaube*.
- Klein, av. p. 119. n. 13. *Columba turtur indica*.
- Klein, Vorbereit. p. 221. n. 13. *Lachtaube aus Indien*.
- Klein, verbess. Vögelhistor. p. 124. n. 13. *Lachtaube*.
- Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 16. fig. 4.
- Briffon, ornith. I. p. 22. n. 8. *Tourterelle à collier*.
- Büffon, Vögel, VI. p. 271. 279. 282. *die Lachtaube*; m. e. Fig.
- Batsch, Thiere, I. p. 428. *die Lachtaube*.
- Latham, Syst. ornith. II. p. 607. n. 51. *Columba (Riforia) supra lutescens, subtus alba, lunula cervicali nigra*.
- Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 405. *die Lachtaube*.
- Fischer, Liv. p. 92. n. 127. *Lachtaube*.
- Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 150. n. 182. *die Lachtaube*.
- Naturforsch. XVII. p. 76. n. 159. *die Lachtaube*.
- Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 137. n. 5.
- Leipz. ökonom. Abhandl. II. p. 158.
- Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 97.
- Bresl. Natur- u. Kunstgesch. Verf. 19. p. 182.
- Borkhausen, Magazin, I. p. 209. n. 88.
- Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 165. n. 21. *Columba (Riforia) supra lutescens lunula cervicali nigra*.
- Kramer, Austr. p. 359. n. 3. *β. Turtur; einheimische Turteltaube, Lachtaube*.

Brünniche, ornith. bor. p. 63. n. 220. *Columba risoria*. *Turteldae*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 364. *Turtur turcicus*.
Lachendes Teublin; *Türkisch Teublin*; *Indi-
nisch Turtur Teublin*.

Jonston, av. p. 92. *Turtur indicus*.

Bomare, Diction. XI. p. 442. — Diction. des
anim. IV. p. 412.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 341. n. 8.
die Lachtaube.

β. *Die graue chinesische Lachtaube*.

Latham, Syn. II. 2. p. 649. *Chinesse grey Tur-
tle*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 51. β. *Col-
fusca subtus vinaceo-grisea, vertice griseo, cer-
vice lunula nigra maculis albis, rectricibus late-
ralibus nigris, albo maculatis*.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. China, II. p. 137. *die
graue chinesische Turteltaube*.

γ. *Die Bastardlachtaube*.

Müller, Natursystem, II. p. 512. *die Bastardturtel-
taube*.

Briffon, ornithol. I. p. 22. n. 8. A. *Tourterelle
Mulet*.

Büffon, Vögel, VI. p. 279. *Zwittertaube*.

Latham, Syn. II. 2. p. 649. *Hebridal Turtle*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 51. γ. *Turtur
hybridus*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 365. *Turtur mixtus*;
Zwitter Turtel Taube.

δ. *Die weiße Lachtaube*. *

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 117. n. 7.

Naturforsch. XVI. p. 47. n. 5.

34. PASSERINA. *Die Sperlingstaube.* (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 512. n. 34. *die Sperlingstaube.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 493 n. 6. *die Sperlingstaube.*

Halle, Vögel, p. 473. n. 504. *die Jalousietaube.*

Halle, Vögel, p. 477. n. 514. *die graue Turteltaube, mit schwarzen Schuppen und rothen Schwungfedern.*

Onomat. hist. nat. III. p. 188. *die kleinste gefleckte Turteltaube.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 306. n. 107. *die Erdtaube; Sperlingstaube.*

Klein, av. p. 120. n. 24. *Columbus minimus. Tur-tur minimus guttatus.*

Klein, Vorbereit. p. 222. *kleinste Taube; kleinste punktirte Turteltaube.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 124. n. 24. *kleinste Turteltaube.*

Brissou, ornith. I. p. 27. n. 19. *petite Tourterelle d'Amerique.*

Büffon, Vögel, VI. p. 313. *die Sperlingstaube; Kokozin; m. 2. Figg.*

Batsch, Thiere, I. p. 429. *die Sperlingstaube.*

Latham, Syn. Suppl. p. 100. *Ground Pigeon.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 611. n. 67. *Columba (Passerina) rectricibus remigibusque obscurioribus, corpore purpurascente, rostro pedibusque flavis.*

Seligmann, Vögel, I. tab. 52. *die kleinste gefleckte Turteltaube.*

N 3

Bankroft.

- (3) Liebt besonders die Beeren des Zahnwehbaums (*Xanthoxylum Clava Herculis* Linn.) wovon ihr Fleisch einen angenehmen Geschmack bekömmt. Die französischen Insulaner nennen sie wegen ihrer grossen Fettigkeit und des feinen Geschmacks wegen, *Ortolane*. Jung gefangen werden sie zahm.

Bankroft, Guian. p. 107. *die kleine Turteltaube des Ray mit gesprenkelten Flügeln.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. p. 151. n. 183. *die ganz kleine amerikanische Taube.*

Neueste Mannigfaltigk. I. p. 570. *Steintauben.*

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 165. n. 22. *Columba* (Passerina) rectricibus remigibusque obscurioribus, corpore purpurascente, rostro pedibusque flavis.

*Forst*on, av. p. 199. *Picuipinima.*

Pison, hist. nat. p. 86. *Picuipinima.*

Nouv. voy. aux Isles de l'Amérique, II. p. 237.

35. MINUTA. *Die Zwergtaube.*

Müller, Naturyst. II. p. 512. n. 35. *die Zwergtaube.*

*Briss*on, ornith. I. p. 28. n. 20. *petite Tourterelle brune d'Amérique.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 612. n. 68. *Columba* (Minuta) fusca alis punctatis 5. f. 7. chalybeis, rectricibus extimis apice albis.

68. MALACCENSIS. *Die malakkische Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 612. n. 69. *Columba* (Malaccensis) nigro undulatum lineata, supra cinereo-grisea, subtus cinerea, collo lateribus albo, rectricibus fuscis, lateribus versus apicem albis.

Sonnerat, Reif n. Ostind. u. Chin. II. p. 180. *die kleine Turteltaube von Queda.*

69. VERNANS. *Die grüne philippinische Taube.*

Müller, Naturyst. Supplem. p. 132. a. *die grüne Taube.*

*Briss*on, ornithol. I. p. 37. n. 38. *Pigeon vert des Philippines.*

Büffon,

Büffon, Vögel, VI. p. 228. die grüne philippinische Taube, m. e. Fig. p. 232. die grüne Taube von der Insel Luçon und Antigua.

Latham, Syn. II. 2. p. 630. n. 20. Parrot-Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 22. Columba (Vernans) viridis subtus flavens, alarum margine exteriore luteo.

Raj, Syn. p. 196. n. 15. tab. 2. fig. 15. Columba maderaspatana, variis coloribus eleganter depicta.

Sommerat, Reis. n. Neuguin. p. 40. die grüne Taube der Insel Luçon und Antigua; m. 2. Figg. M. u. Weibch.

** Mit langen keilförmigen Schwänzen.

36. MIGRATORIA. Die Wandertaube. (4)

Müller, Naturfyst. II. p. 513. n. 36. die Wandertaube.

N 4

Leske,

- (4) Gewicht, nach *Penn* 9. Unzen. Die Anzahl dieser Vögel, besonders wenn sie wandern, ist ganz ungeheuer, und übersteigt fast allen Glauben. Wenn sie die Noth zwingt, ihren Aufenthalt zu verändern, so fliegen sie millionenweise in einer Herde, und halten im eigentlichen Verstande das Sonnenlicht eine beträchtliche Strecke weit auf. Wo sich ihr Schwarm niederläßt, da richten sie, wie die Heuschrecken, unter den Blumen und Früchten schreckliche Verwüstungen an; und dabey machen sie einen solchen Lärm, daß die Menschen einander weder hören noch verstehen können. Eine nicht sonderlich zahlreiche Gesellschaft von Indianern schlug einst in einer Nacht über 18000. mit Stöcken todt. Auf einen Schuß mit der Muskete werden zuweilen über 120. getödtet. Sie nisten auf Bäumen, bauen in den Wäldern Nest an Nest, und binden durch ihre Nester Baum an Baum viele Meilen weit zusammen. Wenn die Irokese merken, daß die jungen Tauben flick sind, so hauen sie die Bäume um, und treffen oft auf einem Baume wohl 100. Paar junge Tauben an. Oft brechen die Zweige starker Eichen von

- Leske*, Naturgesch. p. 254. n. 5. *die Wandertaube*.
- Borowsky*, Thierreich, III. p. 214. n. 13. *die Wandertaube, Strichtaube*.
- Blumenbach*, Handb. der N. G. p. 202. n. 6. *Columba (Migratoria) orbitis denudatis sanguineis, pectore rufo*.
- Halle*, Vögel, p. 476. n. 510. *die röthliche Waldtaube aus Karolina, mit langem Schwanze, und vergoldeter Schulter*.
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 332. n. 278. *Wandertaube; Zugtaube; Strichtaube; amerikanische Taube*.
- Onomat. hist. nat.* III. p. 184. *die langgeschwänzte Taube*.
- Pennant*, arch. Zool. II. p. 300. *die Wandertaube*.
Tab. 14. ober. Fig.
- Klein*, av. p. 119. n. 16. *Palumbus Carolinensis*.
- Klein*, Vorbereit. p. 221. n. 16. *langgeschwänzte Holztaube aus Karolina*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 124. n. 16. *langgeschwänzte Holztaube*.
- Briffon*, ornith. I. p. 24. n. 12. *Pigeon sauvage d'Amerique*.
- Büffon*, Vögel, VI. p. 225. *die Wandertaube*;
m. e. Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 429. *die Wandertaube*.
- Latham*, Syst. ornith. II. p. 612. n. 70. *Columba (Migratoria) cauda cuneata, orbitis denudatis sanguineis, corpore cinereo, pectore rufo*.
- Seligmann*, Vögel, I. tab. 46. *die Strichtaube*.
- Shaw*, Reise, p. 352. not. t. *Strichtauben*.

Loskiel,

von dem Gewicht der aufsitzen- den Menge, und der Boden unter den Bäumen, worauf sie eine Nacht gefressen haben, ist einige Zoll hoch mit Mist bedeckt. Das Fleisch wird frisch, geräuchert und getrocknet gegessen.

Loskiel, Geschichte der Mission der evangelischen Brüder unter den Indianern in Nordamerika.

Barby, 1789. p. 514.

Lichtenberg u. Voigt, Magaz. für das Neueste, etc. VI. 2. p. 168. *wilde Tauben*.

Linné, Abhandlung. II. p. 280. n. 13. *die Schwanz-Tauben*.

Schwed. Abhandl. XXI. p. 268.

Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorseh. I. p. 356.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 16. Columba (Macroura) cauda cuneiformi, longa, pectore purpurascente.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 341. n. 9. *die Wandertaube*.

37. CAROLINENSIS. *Die carolinische Taube.*

Müller, Naturyst. II. p. 514. n. 37. *die carolinische Taube*.

Halle, Vögel, p. 478. n. 518. *die Turteltaube, mit einem großen Flecken aus Gold, Karmin, und Grün an der Seite des Halses*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 504. *die Carolinische Taube*, tab. 14. unt. fig.

Klein, av. p. 119. n. 17. Columba Turtur Carolinensis.

Klein, Vorbereit. p. 221. n. 17. *Langgeschwänzte Turtel aus Karolina*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 124. n. 17. *Langgeschwänzte Turteltaube*.

Briffon, ornithol. I. p. 27. n. 18. Tourterelle de la Caroline.

Büffon, Vögel, VI. p. 317. *die Karolinische Turteltaube*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 603. n. 71. Columba (Carolinensis) cauda cuneata, corpore rufocinereo subtus rufescente, orbitis caeruleis.

Seligmann, Vögel, I. tab. 48. *die carolinische Turteltaube.*

Jonston, av. p. 199. Picacureba.

70. MELANOPTERA. *Die schwarzgeflügelte Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 615. n. 78. Columba (Melanoptera) cauda cuneata, corpore caerulefcente, remigibus nigris.

Molina, Naturgesch. von Chili, p. 208. Columba melanoptera.

38. AMBOINENSIS. *Die braunrothe amboinische Taube.*

Müller, Naturfyft. II. p. 514. n. 38. *die amboinische Taube.*

Briffon, ornith. I. p. 31. n. 26. Tourterelle d'Amboine.

Büffon, Vögel, VI. p. 303. *die amboinische Turteltaube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 614. n. 74. Columba (Amboinensis) cauda cuneata, corpore rufo, collo undulato nigricante.

39. CAPENSIS. *Die capsche Taube.*

Müller, Naturfyft. II. p. 514. n. 39. *die capsche Taube.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 135. n. 45. *der Schwarzhals.*

Briffon, ornith. I. p. 29. Tourterelle du Cap de bonne éſperance.

Büffon, Vögel, VI. p. 293. *das Afrikanische Turteltäubchen; die Turteltaube mit schwarzem Halskragen; das kapische Turteltäubchen; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 614. Columba (Capensis) cauda cuneata, corpore griseo-fusco, subtus

subtus albo, remigibus primoribus latere interiore rufis.

71. MACROURA. *Der Turocko.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 134. n. 43. *der Langschwanz.*

Büffon, Vögel, VI. p. 292. *der Turokko; die breitschwänzige Senegalische Turteltaube; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 615. n. 76. Columba (Macroura) macroura, cauda cuneata, corpore cinnamomeo subtus albido, rectricibus apice albis.

40. MARGINATA. *Die gerändelte Taube. (5)*

Müller, Naturfyst. II. p. 515. n. 40. *die gerändelte Taube.*

Briffon, ornith. I. p. 24. n. 13. *Tourterelle d'Amerique.*

Halle, Vögel, p. 475. n. 508. *die langschwänzige Turteltaube, Schwanzstaube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 286. *langgeschwänzte Turteltaube; amerikanische Turteltaube.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 614. n. 73. Columba (Marginata) cauda cuneata, corpore supra fusco, subtus fusco-cinereo, pectore rubro, rectricibus apice nigris, albo marginatis.

Seligmann, Vögel, I. tab. 29. *die langgeschwänzte Taube.*

A. Ver.

(5) Nach Büffon zu Columba Canadensis n. 30. gehörig.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 279. β. Col. domest. Var.	p. 769. n. 2. Col. Domestica —
p. 279. n. 2. Col. Hispanica.	p. 770. n. 2. β. Var.
p. 279. n. 3. Col. Dasyus.	p. 770. n. 2. ε. Var.
p. 280. n. 4. Col. Gutturosa.	p. 771. n. 2. ς. Var.
p. 280. n. 5. Col. Cucullata.	p. 770. n. 2. ι. Var.
p. 280. n. 6. Col. Hispida.	p. 770. n. 2. κ. Var.
p. 280. n. 7. Col. Turbita.	p. 770. n. 2. λ. Var.
p. 280. n. 8. Col. Laticauda.	p. 770. n. 2. μ. Var.
p. 280. n. 9. Col. Gyratrix.	p. 771. n. 2. ν. Var.
p. 280. n. 10. Col. Galeata.	p. 771. n. 2. ξ. Var.
p. 281. n. 11. Col. Turcica.	p. 771. n. 2. ο. Var.
p. 281. n. 12. Col. Tabellaria.	p. 771. n. 2. π. Var.

Das Geschlecht ist, der Anzahl nach, mit 31. Gattungen vermehrt. Wenn man aber hiezu nimmt, daß 11. Gattungen der XII. Edition jetzt nur als Varietäten angenommen, und deren Stellen mit andern besetzt worden, so beträgt die Summe der neuhinzugekommenen Gattungen 42. Auch die Spielarten β. γ. ζ. η. θ. σ. τ. υ. φ. von Nro. 2. sind neu. — Bey der 21ten Gattung ist die Varietät β; bey der 22ten die Var. β; bey der 24ten die Var. β; bey der 29ten die Var. β; bey der 32ten die Varietäten β. γ. δ. ε; bey der 33ten die Var. β. γ; bey der 34ten die Var. β. γ. δ. hinzugekommen.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Die Waalia in Abyssinien.*

Brüce, Reif. nach den Quellen des Nils, V. p. 188. n. 8. tab. 38. *Waalia*.

Gmelin, Anhang zu Brüce Reisen, p. 31. *Columba viridis, subtus flava, alarum tectricibus purpureis,*

pureis, remigibus nigris apice albidis, cauda
fordide caerulefcente, subtus fulvo alboque
varia.

Meyer, Ueberficht des neuest. zool. Entdeck. Lpz.
1793. p. 128. n. 6.

C. Neuere Gattungen.

1. Die olivenfarbige Taube mit purpurfarbenen Schul- tern, in Indien.

Latham, Syn. Suppl. p. 201. n. 60. β. Purple
shouldered Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 597. n. 13. Colum-
ba (Phoenicoptera) olivacea, subtus cinera-
fcens, capite colloque flavescentibus, tectrici-
bus alarum minoribus purpurafcentibus, maio-
ribus remigibusque fecundariis albo nigroque
ftriatis.

2. Die afiatifche Taube.

Latham, Syn. Suppl. p. 202. n. 60. γ. Indian
Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 597. n. 14. Columba
(Afatica) cinereo viridis, capite cinereo, ma-
cula alarum corporeque subtus albo, remigibus
nigris, albo extus marginatis.

3. Die Taube von der Infel Tanna.

Latham, Syst. ornith. II. p. 600. n. 26. Columba
(Tannensis) viridis, tectricibus alarum albo-
maculatis, remigibus fecundariis ad apicem
margine flavis.

Vielleicht eine Spielart von *Columba Curviro-
stra* Gmel. Syst. p. 777. n. 45.

4. Die braune neuſeeländiſche Taube.

Latham, Syst. ornith. II. p. 603. n. 38. Colum-
ba (Brunnea) pileo, collo supra, dorſo tectricibus-
que

que alarum brunneis, pectore collo, subtus uropygioque viridi splendidis.

5. *Die goldflüglige Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 604. n. 39. *Columba* (Chalcoptera) fusco-cinerea, rufo-marginata, fronte gulaque albis, fascia alarum cupereo-aurea bifida, rectricum ad apicem nigra.

White, Reis. nach Neu-Süd-Wallis, — in dem Magaz. merkwl. Reisebeschr. V. p. 129. *die goldflügelichte Taube.*

6. *Die bantamische Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 615. n. 77. *Columba* (Bantamensis) cauda cuneata, orbitis denudatis carneis, collo, pectore hypochondriisque albo nigroque undulatis.

Mus. Carlson. fasc. III. tab. 67. *Columba Bantamensis.*

7. *Die Taube von St. Domingo.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 615. n. 79. *Columba* (Dominicensis) cauda cuneata, corpore griseo, capite subtus albo, macula verticis, fascia sub oculis et torque colli nigris.

Buffon, pl. enl. 487. Tourterelle de St. Domingue.

105. GESCHLECHT. A L A U D A. *Die Lerche.*

Müller, Natur Syst. II. p. 517. Gen. CV.

Leske, Naturgesch. p. 254. Gen. XXXVII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 195. Gen. LXXIII.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 179. Gen. XXVII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 493. Gen. LXIV.

Ebert, Naturl. II. p. 125.

Halle,

Halle, Vögel, p. 305. Gen. VI.

Pennant, arct. Zool. II. p. 365.

Neuer Schaupl. d. Nat. V. p. 92.

Onomat. hist. nat. I. p. 234.

Klein, av. p. 71. Gen. VI.

Briffon, ornith. I. p. 404. Gen. XXXIX.

Buffon, Vögel, XIV. p. 152. ff.

Batsch, Thiere, I. p. 317. Gen. LXXIV.

Latham, Syst. ornith. II. p. 491. Gen. XLI.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 342. Gen. LXXII.

I. ARVENSIS. Die Feldlerche. (6)

Müller, Natursyft. II. p. 517. n. 1. die Ackerlerche.

Borowsky, Thierreich, III. p. 196. n. 2. die Ackerfeld-, Saat-, Himmel-, Sanglerche.

Blumenbach, Handb. d. N.G. p. 179. n. 1. Alauda (Arvensis) rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis: intermediis inferiori latere ferrugineis. Feldlerche; Pardale.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 494. n. 1. Feldlerche; gemeine Acker- oder Sandlerche.

Funke, Naturgesch. I. p. 231. die Ackerlerche.

Ebert, Naturl. II. p. 125. die Ackerlerche.

Halle, Vögel, p. 306. n. 271. die Feldlerche.

Meyer, Thiere, II. tab. 98. Feldlerche.

Neuer Schaupl. der Natur, V. p. 94. n. 1. Ackerlerche.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 377. n. 307. die Lerche.

Onomat. hist. nat. I. p. 240. Kornlerche, Weglerche, Brachlerche.

Pennant,

(6) Flügelweite 12 1/2 Zoll, Gewicht 1 1/2 Unzen, Penn. Kann über 24. Jahre alt werden. —

Pennant, arch. Zool. II. p. 367. A. die *Feldlerche*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 122. *Saatlerche*.

Beckmann, Naturhist. p. 51. *Die Lerche*.

Klein, av. p. 71. n. 1. *Alauda simpliciter*.

Klein, Vorbereit. p. 134. n. 1. *Himmellerche*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 72. n. 1. *Himmelslerche*.

Klein, Stemm. av. p. 13. tab. 15. Fig. 1. a. b. c. d.

Klein, Vögeleyer, p. 23. tab. 9. Fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 316. *Heidlerch*, *Gefanglerch*,
Himmellerch, *Holzlerch*, fig. p. 317.

Briffon, ornith. I. p. 404. n. 1. *Alouette*.

Buffon, Vögel, XIV. p. 152. *die Lerche*; m.
e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 343. *Saatlerche*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 491. n. 1. *Alauda* (*Arvensis*) *nigricante-griseo-rufescente et albido vario, subtus rufo-alba, rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis, intermediis interiori latere ferrugineis*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 72. n. 153. *die Feldlerche*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 104. n. 1. *die Feldlerche*, *Leewaark*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 406. *die Ackerlerche*.

Cetti, Sardin. II. p. 143. *die Ackerlerche*.

Fischer, Livl. p. 92. n. 128. *Feldlerche*.

White, N. G. von Engl. p. 63. n. 7. p. 66. n. 1.
Feldlerche.

Georgi, Reif. I. p. 173. *Feldlerche*; *Shaworonok*.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 14. IV. p. 14. *die gemeine Feldlerche*.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 1. *Sanglerche*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 158. *Sang-Lerke*.

Kolbe,

Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffn. Ed. in 4. p. 398. *die Lerche.*

Forskål, fn. orient. p. VII. n. 16. *Alauda arvensis.*
Kunbar vel Kombara.

Linné, Abhandlung. II. p. 300. n. 113. *die Acker-Lerche.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 289. *die Feldlerche.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 58. *Feldlerche.*

Naumann, Vogelfsteller, p. 178. *die Lerche.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 152. n. 184. *die Feldlerche.*

Forstlex. II. p. 688. *Feld- oder Kornlerche.*

Martini, Naturlex. I. p. 226. *Ackerlerche.*

Oekon. Zool. p. 92. n. 33. *Ackerlerche.*

Naturforsch. XVII. p. 77. n. 160. *die Ackerlerche.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 681.
die Lerche.

Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 1. *die gemeine Lerche.*

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 294. *Lerche.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 120. *die Lerche*
oder Feldlerche.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 598. *Lerche.*

Börner, schlesische ökonom. Nachr. 1781. p. 97.
n. 179

Eberhard, Thiergesch. p. 83. *die Lerche.*

Hannöv. Magaz. 1779. p. 130.

Zücker, Speis. aus d. Thierreich, p. 95.

Merklein, Thierreich, p. 307. *Lerche.*

Hamburg. Magaz. VII. p. 161.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 280. *die gemeine Lerche.*

Valentini, Alaudarum commestio minus laudabilis. — Eph. nat. cur. Vol. II. Obf. 120. p. 278.

Goetze, nützl. Allerl. I. p. 18.

Anweis. Vögel zu fang. p. 358. *die Lerche.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 166. n. 37.

André u. Becastein, Spazierg. II. p. 228. 233.

Linne', Syst. Nat. Ed. II. p. 57. *Alauda*.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 165. n. 1. *Alauda* (Arvensis) rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis, intermediis interiore latere ferrugineis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 229. *Alauda* (Arvensis) rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis, intermediis interiore latere ferrugineis.

Charleton, exercitat. p. 88. *Alauda*.

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 8. *Alauda*.

Moehring, av. gen. p. 43. n. 32. *Alauda*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 191. *Alauda* vertice plano; coelipeta; *Feldlerche*; *große Lerche*; *Himmellerche*.

Sibbald, Scot. p. 364. *Alauda* vulgaris.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Polon. p. 354. *Alauda* non cristata; *alauda terrena*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 269. *Alauda* non cristata seu gregalis. *Alouette*.

Jonston, av. p. 99. *Alauda*, p. 100. *Alauda* non cristata.

Schaefer, element. ornithol. tab. 18.

Zinnar, Uov. p. 55. tab. 8. fig. 43. *Lodola*.

Herkens, av. Fris. p. 1. *Alauda*.

Bomare, diction. I. p. 157. *Alouette* ordinaire.

Salerne, hist. nat. des Ois. p. 90. *Alavette*.

Du Tertre, hist. des Antill. II. p. 55.

Sloane, Jamaic. I. p. 51.

Vie du Comte Marfigli P. X. p. 148.

Aristot. hist. anim. L. 4. c. 1. L. 9. c. 25. Κορυδος.

Aelian. de nat. anim. L. 1. c. 35. L. 3. c. 30. L. 4. c. 5. L. 6. c. 46. L. 16. cap. 5. Κορυδος, Κορυδαλος.

Donndorff,

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 342. n. 1.
die gemeine Lerche.

β. Die weiße Lerche.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 599. b.
die weiße Lerche.

Klein, av. p. 72. n. 4. Alauda alba.

Klein, Vorbereit. p. 135. n. 4. weiße Lerche.

Klein, verb. Vögelhist. p. 72. n. 4. weiße Lerche.

Briffon, ornith. I. p. 405. A. Alouette blanche.

Büffon, Vögel, XIV. p. 181. die weiße Lerche;
m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 369. A. White Lark.

Latham, Syst. ornith. II. p. 491. n. 1. β. Alauda
candida.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 7. weißgraue
Lerche.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 105. n. 1. β. die
weiße Feldlerche.

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 116. n. 5.

Naturforsch. I. p. 63. n. 9. — XIII. p. 17. — XVI.
p. 48. n. 1. weiße Lerche.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. ad n. 229.

Brünniche, ornith. bor. p. 63. ad n. 222.

Barrere, Sp. nov. cl. III. Gen. 16. p. 40. Alauda
alba sine crista.

γ. Die schwarze Lerche.

Hall, Vögel, p. 316. n. 280. die schwarze Lerche.

Briffon, ornith. I. p. 405. B. Alouette noire.

Büffon, Vögel, XIV. p. 186. die schwarze Lerche;
m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 370. Dusky Lark.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 492. n. 1. β. Alauda
nigra.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14. die schwarze astra-
chanische Lerche.

Naturforscher, II. p. 2. n. 4. *die schwarze Lerche.*

δ. *Die langfüßige Lerche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 492. n. 1. δ.

7. R U F A. *Die schwarzbraune Lerche.* (7)

Büffon, Vögel, XIV. p. 188. *die schwarze Lerche mit falben Rücken.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 492. n. 2. Alauda (Fulva) fusco-nigricans, cervice, dorso scapularibusque rufo-aurantiis, alis caudaque obscuris.

2. P R A T E N S I S. *Die Wiesenlerche.* (8)

Müller, Natursystem, II. p. 518. n. 2. *die Wiesenlerche.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 198. n. 3. *die Wiesenlerche; Brachlerche.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 496. *die Wiesenlerche; Hüfter.*

Ebert, Naturl. II. p. 125. *die Wiesen- oder Brachlerche.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 378. n. 308. *Wiesenlerche; Löwerke.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 368. C. *die Wiesenlerche.*

Neuer Schaupl. der Nat. V. p. 94. n. 2. *Wiesenlerche.*

Onomat. hist. nat. I. p. 245. *die Wiesenlerche.*

Klein, stemmat. av. p. 13. tab. 15. fig. 2. a — c. Alauda stratorum?

Briffon, ornith. I. p. 406. n. 3. Alouette du Prez, ou la Farlouise.

Büffon,

(7) Die Trivialbenennung: *Rufa*, kommt im Syst. p. 798. n. 28. nochmals vor.

(8) *Bock*, *Fischer*, u. a. wollen sie als eine Abart von der Feldlerche ansehen.

- Büffon, Vögel, XIV. p. 203. *die Wiesenlerche*,
p. 204. *kleine Lerche, Holz- oder Heidelerche*,
Bastardlerche; Buschlerche; Gartenlerche.
- Batsch, Thiere, I. p. 344. *Wiesenlerche.*
- Latham, Syst. ornith. II. p. 493. n. 5. Alauda (Pratensis) viridi-fusca, rectricibus duabus extrorsum albis, linea superciliarum alba.
- Fischer, Livl. p. 92. n. 129. *Wiesenlerche; Himmelslerche.*
- Cetti, Sardin. II. p. 148. *die Wiesenlerche.*
- White, N. G. von England, p. 63. n. 10. p. 66. n. 2. *Wiesenlerche.*
- Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 2. *Englerke.*
- Siemssen, meklenb. Vögel, p. 105. n. 2. *die Wiesenlerche.*
- Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 2. *die Wiesenlerche.*
- Eberhard, Thiergesch. p. 84. *die Wiesenlerche.*
- Borkhausen, Magaz. I. p. 168. n. 38.
- Linné, Abhandl. II. p. 300. n. 112. *die Wiesenlerche.*
- Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 123. *die Wiesenlerche.*
- André u. Bechstein, Spazierg. IV. p. 99.
- Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 2. Alauda pratensis.
- Linné, Syst. nat. Ed. X. I. p. 166. n. 2. Alauda (Pratensis) rectricibus extimibus duabus extrorsum albis, linea superciliarum alba.
- Charleton, onom. zoic. p. 81. n. 3. Alauda pratensis.
- Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 230. Alauda (Pratensis) rectricibus extimibus duabus extrorsum albis, linea superciliarum alba.
- Beton, hist. nat. des ois. p. 271. Farlouse, fallope, alouette de près.

Jonston, av. p. 101. *Alauda pratorum*.

Zinnan. Uov. p. 55. tab. 8. fig. 44. *Mattolina*?

Zinnan. Uov. p. 50. tab. 7. fig. 37. *Spippola minore*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 215. *Alauda pratensis*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 43. n. 2. *die Wiesenlerche*.

β. *Die weiße Wiesenlerche*. (9)

Briffon, ornith. I. p. 407. A. *Farlouse blanche*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 213. *die weiße Wiesenlerche*.

Büffon, ois. IX. p. 51. Varieté de la *Farlouse*.

δ. *Die schwarzfüßige Wiesenlerche*.

ε. *Die ganz schwarze Wiesenlerche*. *

Beseke, Vögel Kurl. p. 72. n. 154.

12. MINOR. *Die kleine Feldlerche*. (10)

Pennant, arct. Zool. II. p. 368. D. *die Brachlerche*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 494. n. 8. *Alauda* (Minor) *rubro fusca*, *subtus maculata*, *gula abdomineque albis*, *iugulo pectoreque obscure flavescens*.

Britt. zool. Nro. 139. *Field-Lark*.

13. ITALICA. *Die italienische Lerche*. (1)

Halle, Vögel, p. 315. n. 278. *die Wachtellerche*.
Briffon,

(9) *Briffon* rechnet hierher auch die *Spipola alba* sive *Boavina Aldr.* ingl. die *Spipola tertia Jonst Willughb. Raj u. Rzac.*

(10) Unter den Synonymen dieser und der vierten Gattung herrscht große Verwechslung; in der arct. Zool. werden beyde für einerley angenommen, und *Büffons Farlousanne* (*Alauda Ludoviciana* n. 14.) als Abart davon angesehen.

(1) *Latham* ist geneigt, sie als eine Spielart von *Alauda arborea* anzusehen.

Briffon, ornith. I. p. 409. n. 7. Alouette d'Italie.

Büffon, Vögel, XIV. p. 235. *die Giarola*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 492. n. 4. Alauda (Italica) fusco-castanea, subtus alba, capite vitta annulari albicante, rectrice extima alba, proxima apice alba.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VII. p. 696. *die italienische Lerche*.

3. ARBOREA. *Die Baumlerche*. (2)

Müller, Natur Syst. II. p. 519. n. 3. *die Baumlerche*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 198. n. 4. *Waldlerche, Heidelerche, Baumlerche*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 495. n. 2. *die Waldlerche, Düllerche*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 597. *die Waldlerche*.

Ebert, Naturl. II. p. 125. *Heidelerche*.

Halle, Vögel, p. 310. n. 272. *die Waldlerche*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 379. n. 309. *die Baumlerche; Gereutlerche; Schmervogel*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 367. B. *die Waldlerche*.

Neuer Schaupl. d. Nat. V. p. 93. *Heide-Waldlerche*, p. 94. n. 3. *Baumlerche*.

Onomat. hist. nat. I. p. 238. *Heidelerche, Buschlerche, Holzlerche*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 122. *Heidelерche*.

Klein, av. p. 71. n. 2. Alauda sylvestris, pratorum.

Klein, Vorbereit. p. 135. n. 2. *Heide-Wiese-Brach-Mittel-Wald-Steinlerche*.

(2) Die Baumlerche, Wiesenlerche, Piplerche und Gereutlerche werden von den mehresten Schriftstellern verwechselt.

- Klein*, verb. Vögelhist. p. 72. n. 2. *Wiesenlerche*,
Brächlerche.
- Klein*, stemmat. av. p. 13. tab. 15. fig. 4. a—c.
- Klein*, Vögeleyer, p. 24. tab. 9. fig. 5.
- Briffon*, ornith. I. p. 405. n. 2. Alouette de bois ou
 Cujelier.
- Büffon*, Vögel, XIV. p. 190. *die Baum- oder*
Waldlerche.
- Batsch*, Thiere, I. p. 314. *die Waldlerche*.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 492. n. 3. Alauda
 (Arborea) varia, capite vitta annulari alba
 cincto.
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 106. n. 3. *die Baum-*
lerche.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 173. n. 3. *Heedelerke*,
Pibelerke.
- Linné*, Abhandlung. II. p. 300. n. 112. *die Baum-*
lerche.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 407. *die Baumler-*
che; Haidelerche.
- Cetti*, Sardin. II. p. 145. *die Baumlerche*.
- White*, N. G. von Engl. p. 62. n. 2. p. 63. n. 1. p.
 66. n. 3. et 5. *Holzlerche*.
- Fischer*, Liv. p. 92. n. 130. *Baumlerche*.
- André u. Bechstein*, Spazierg. III. p. 145. 150.
- Samml. zur Phys. u. N. G.* III. p. 122. *Baumlerche*,
Waldlerche.
- Scopoli*, Rem. aus der N. G. I. p. 153. n. 186. *Baum-*
lerche; Heydelerche.
- Naturforsch.* XVII. p. 78. n. 161. *Baumlerche*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 292. *die Heide-Lerche*.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 59. *Heidelerche*.
- Onomat. forestal.* II. p. 695. *die Heidelerche*.
- Borkhausen*, Magazin, I. p. 169. n. 40.
- Börner*, schlesische ökonom. Gesellschaft 1781.
 p. 98.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 687.
Heidelerche.

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 2. Alauda arborea.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 166. n. 3. Alauda (Arborea) capite vitta annulari alba cincto.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 231. Alauda (Arborea) capite vitta annulari alba cincta.

Kramer, Austr. p. 362. n. 3. Alauda lineola superciliorum alba, torque in collo pallido, cauda brevissima; *Ludllerche*, *Waldlerche*.

Charleton, onomast. zoic. p. 81. n. 2. Alauda arborea.

Charleton, exercitat. p. 88. Alauda arborea.

Sibbald, Scot. p. 249. Alauda arborea.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 137. Alauda arborea.

Barrere, Sp. nov. class. III. Gen. 16. p. 40. Alauda non cristata fusca.

Zinnan. Uov. p. 55. tab. 8. fig. 44. Mattolina?

Hermann, tab. affin. anim. p. 215. Alauda arborea.

Bomare, diction. I. p. 159. Alouette des bois.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 343. n. 3. die Baumlerche.

14. LUDOVICIANA. Die louisianische Lerche. (3)

Büffon, Vögel, XIV. p. 216. die Louisianische Lerche oder Farlousanne.

Pennant, arct. Zool. II. p. 368. ad D. Farlousanne.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 494. n. 9. Alauda (Ludoviciana) fusco nigricans, subtus fulva, iugulo pectoreque flavescens griseis, pectore fusco-maculato.

O 5

15. Ru-

- (3) Nach *Pennant* eine Spielart von *Alauda minor* n. 12. dem auch *Latham* beyzupflichten nicht abgeneigt ist. *Büffon* sagt, sie habe viel Aehnliches mit der *Wiesenerleche*.

15. RUBRA. *Die pensylvanische Lerche.*

Briffon, ornithol. I. p. 413. n. 13. Alouette de Pensylvanie.

Büffon, Vögel, XIV. p. 253. *die pensylvanische Lerche*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 494. n. 10. Alauda (Rubra) obscure fusca, subtus fulvo-rufescens, maculis fuscis varia, genis nigricantibus, superciliis pallide rufis.

Pennant, arct. Zool. II. p. 366. n. 196. *die rothe Lerche.*

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 87. *pensylvanische Lerche.*

Brittische Thiergesch. p. 102. n. 5. *die englische Rothlerche.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 126. *die rotbäckigte pensylvanische Lerche.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 700. *die Lerche mit braunen Backen aus Pensylvanien.*

16. MOSELLANA. *Die Mocrastlerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 255. *die Mocrastlerche*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 495. n. 1. Alauda (Mosellana) rufa fusco-varia, subtus rufescens, pectore fusco-maculato, fasciis tribus subocularibus fuscis.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 701. *die Sumpflerche.*

4. CAMPESTRIS. *Die Gereuthlerche.*

Müller, Naturyst. II. p. 519. n. 4. *die Feldlerche.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 199. n. 5. *die Feldlerche; braunfalbe Lerche, Guckerlein.*

Halle, Vögel, p. 312. ad n. 272. *die Gereutlerche*.
(mit der Heidelerche und Wiesenlerche ver-
wechselt.)

Klein, Stemmat. av. p. 13. tab. 15. Fig. 3. a—c.
Alauda dumetorum.

Briffon, ornith. I. p. 408. n. 5. *Alouette de champ*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 224. *die Gereuthlerche*,
Brachlerche oder *Spipolette*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 344. *die Feldlerche*.

Gesner, Vögelb. p. 143. *Gickerlein*, *Guckerlein*,
Grienvögelein; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 495. n. 12. *Alauda*
(*Campestris*) *rectricibus fuscis*, inferiore me-
dietate, exceptis intermediis duabus, albis,
gula pectoreque flavescente.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 4. *Marklerke*.

Linné, Abhandlung, II. p. 300. n. 112. *die Feld-
lerche*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 107. n. 4. *die Brach-
lerche*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 59. *Spießlerche*; *Kraut-
vögelgen*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 168. n. 39. *Brach-
lerche*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 297. *die Brach- oder Koth-
lerche*.

Storr, Alpenreise, I. p. 78. *Feldlerche*.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 125. *Spipolette*.

Schrift. der berlin. Gefellsch. N. Fr. VII. p. 465.
n. 52. *die Feldlerche*.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. VIII. p. 694.
die Gereuthlerche.

Börner, schlef. ökon. patr. Gefellsch. 1781. p. 98.
Alauda campestris.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 4. *Alauda cam-
pestris*.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 166. n. 4. Alauda (Campestris) rectricibus fuscis, inferiori medietate, exceptis intermediis duabus, albis, gula pectoreque flavescente.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 232. Alauda (Campestris) rectricibus fuscis, inferiori medietate, exceptis intermediis duabus, albis, gula pectoreque flavescente.

Brünniche, ornith. bor. p. 64. n. 226. Alauda campestris.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 349. Stoparola, Acredula, Glariana; Stoppelvogel; Stöpling; Spies-Lörche; Grienvögelin; Greinerlin; Gückerlin.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Polon. p. 42. Zdzoto.

β. SPINOLETTA. Die florentinische Lerche. (4)

Müller, Natur Syst. II. p. 520. n. 7. die florentinische Lerche.

Halle, Vögel, p. 316. n. 279. die braunfalbe Lerche.

Latham, Syn. II. 2. p. 378. n. 10. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 495. n. 12. β. A. rectricibus fuscis, extimis duabus oblique dimidiato albis.

Büffon, Vögel, XIV. p. 233. die Spinoletta.

Cetti, Sardin. II. p. 149. die florentinische Lerche.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 153. n. 187. Alauda Spinoletta.

Borkhausen, Magazin, I. p. 169. n. 39. β.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 125. Spinoletta.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 166. n. 7. Alauda (Spinoletta) rectricibus fuscis, extimis duabus oblique dimidiato-albis.

17. MA-

(4) Länge, nach *Cetti*, nicht über 5 Zoll.

17. MALABARICA. *Die malabarische Lerche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 495. n. 13. *Alauda* (Malabarica) fusca, penncis rufo-marginatis, apice albo-maculatis, collo rufescente, maculis sagittatis nigris.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 158. *die Haubenlerche von der Küste Malabar*, tab. 113. Fig. 1.

18. GINGICA. *Die Lerche aus Gingi.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 496. n. 14. *Alauda* (Gingica) cinereo-rufa, capite cinereo, subtus vittaeque per oculos nigra.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 158. *die kleine graue Lerche aus Gingi*, tab. 113. Fig. 2.

19. TATARICA. *Die tatarische Lerche. (5)*

Müller, Natur Syst. Suppl. p. 136. *die Tartarlerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 287. *die schwarze Steppenlerche, oder die tatarische Lerche*; m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 177. Black Lark.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 496. n. 15. *Alauda* (Tatarica) fusco-nigricans, pennis albido-marginatis, remigibus rectricibusque nigris.

Pallas, Reif. III. p. 647. *die schwarze Steppenlerche.*

Pallas, Reif. Ausz. II. Anh. p. 8. n. 15. *Alauda tatarica*, tab. C.

Pallas, Reif. Ausz. II. p. 240. III. p. 365. 474. *die schwarze Steppenlerche.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 216. *Alauda tatarica.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 343. n. 4. *die schwarze Steppenlerche.*

20. MU-

(5) *Latham* rechnet hieher auch die *Tunagra Sibirica*, Syst Gmel. p. 89. n. 42.

20. MUTABILIS. *Die veränderliche Lerche.* (6)

Büffon, Vögel, XIV. p. 289. *die veränderliche Lerche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 496. n. 15. β . A. nigra, pennis margine canis, subtus toto nigra, remigibus rectricibus fuscis.

5. TRIVIALIS. *Die Piplerche.* (7)

Müller, Naturyst. II. p. 519. n. 5. *die Pieplerche.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 200. n. 6. *die Pieplerche, Leimvogel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 496. n. 4. *die Pieplerche, Gereuthlerche, Heidelerche.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 598. *die Pieplerche.*

Ebert, Naturl. II. p. 126. *die Pieplerche.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 260. *Piplerche.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 123. *die Pippelerche.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 392. L. *Der Grashüpfer; die Pieplerche.*

Klein, av. p. 71. ad n. 2. *Alauda fistulans.*

Klein, Vorbereit. p. 135. n. 2. *Pfeif- oder Pieplerche.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 72. n. 2. *Pfeiflerche.*

Briffon, ornith. I. p. 407. n. 4. *Alouette de buisson.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 218. *die Piplerche; m. e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 344. *die Piplerche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 493. n. 6. *Alauda (Trivialis) nigricante et olivaceo-varia, sub-*
tus

(6) Nach *Latham* eine Varietät von *Alauda Tatarica*, n. 19.

(7) Aus den verschiedenen Synonymen, welche sich von dieser und andern Gattungen bey den Naturhistorikern finden, läßt sich beurtheilen, wie schwankend und unzuverlässig, besonders die deutschen Benennungen, bey den Lerchenarten sind.

tus albo-flavicans, maculis nigricantibus, rectrice extima dimidiato, secunda apice alba.

Brittisch. Thiergesch. p. 103. tab. 50. fig. *Buschlerche*.

White, N. G. von Engl. p. 33. p. 34. n. 14. p. 59. n. 14. *die Pieplerche*.

Pontoppidan, Dänem. p. 173. n. 5. *Havelerke*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 298. *die Pip-Lerche*.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 124. *die Pieplerche*.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. VIII. p. 692. *Pieplerche*.

Börner, Schles. patriotisch. Schrift. 1781. p. 98. n. 183.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 104.

Siemsen, meklenb. Vögel, p. 108. n. 5. *die Pieplerche*.

Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 4. *die Pieplerche*.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 166. n. 5. *Alauda* (*Trivialis*) rectricibus fuscis, extima dimidiato alba, secunda apice cuneiformi alba, linea alarum duplici alba.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 233. *Alauda* (*Trivialis*) rectricibus fuscis, extima dimidiato alba, secunda apice cuneiformi alba, linea alarum duplici albida.

Brünniche, ornith. bor. p. 64. n. 227. *Alauda Trivialis*. *Hauge-Hylde-Pibe-Lerke*.

Jonston, av. p. 122. *Anthos*?

Hermann, tab. affin. anim. p. 215. *Alauda trivialis*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 344. n. 5. *die Pieplerche*.

6. CRISTATA. *Die Haubenlerche*.

Müller, Natursyst. II. p. 520. n. 6. *die Haubenlerche*.

Müller,

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 136. n. 13. *der Rostflügel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 200. n. 7. *die Haubenlerche, Kobellerche, Kothmönch.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 180. n. 2. *Alauda (Cristata) rectricibus nigris, extimis duabus margine exteriori albis, capite cristato. Haubenlerche, Heidelerche.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 496. n. 5. *die Haubenlerche.*

Ebert, Naturl. II. p. 125. *Heidelerche; Haubenlerche.*

Halle, Vögel, p. 312. n. 273. *die Haubenlerche; Fig. 17.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 379. n. 311. *Haubenlerche, Schopflerche.*

Neuer Schaupl. d. N. V. p. 94. n. 6. gehaubte Lerche.

Klein, av. p. 71. n. 3. *Alauda capitata cristata, viarum.*

Klein, Vorbereit. p. 135. n. 3. *Kobel-Koth-Wege-Heubellerche.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 72. n. 3. *Kobellerche, Wegelerche, Kothlerche.*

Klein, Stemmat. av. p. 13. tab. 15. Fig. 6. a — c.

Klein, Vögeleyer, tab. 9. Fig. 4.?

Briffon, ornith. I. p. 410. n. 8. *Alouette hupée, ou Cochevis.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 265. *die Zopflerche; m. e. Fig. p. 267. Weinlerche; Kammelerche; gehörnte Lerche; Lerche von Brie; große Lerche.*

Batsch, Thiere, I. p. 344. *die Haubenlerche.*

Gesner, Vögelb. p. 360. *Heubellerch, Kobellerch, Weglerch, fig. p. 361.*

- Latham*, Syst. ornith. II. p. 499. n. 25. *Alauda*
(*Cristata*) rectricibus nigris, extimis duabus
margine exteriori albis, capite cristato.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 408. *die Hauben-*
lerche, Schubslerche.
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 109. n. 6. *die Hau-*
benlerche, Töppellerch; Heidlerch.
- Cetti*, Sardin. II. p. 146. *die Haubenlerche.* *
- Fischer*, Livl. p. 92. n. 131. *Haubenlerche, Wege-*
lerche.
- Scopoli*, Bem. a. d. N. G. I. p. 152. n. 185. *die*
Schopflerche.
- Naturforsch.* XVII. p. 79. n. 162. *die Haubenlerche.*
- Pontoppidan*, Dännem. p. 173. n. 6. *Topplerke.*
- Samml. zur Phys. u. N. G.* III. p. 224. *die Heide-*
lerche.
- Naumann*, Vogelfsteller, p. 74. *Heidelerche.*
- Naturgesch. aus den best. Schriftst.* VIII. p. 703.
die Haubenlerche.
- Jagd- und Forstlex.* II. p. 700. *die Haubellerche.*
- Meidinger*, Vorl. I. p. 146. n. 3. *die Heidelerche.*
- Börner*, Schles. ökon. patr. Gesellsch. 1781. p. 98.
Haubenlerche.
- Anweiss.* Vögel zu fang. p. 321. *die Heydelerche.*
- Borkhausen*, Magazin, I. p. 170. n. 41.
- Linne'*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 166. n. 6. *Alauda*
(*Cristata*) rectricibus nigris, extimis duabus
margine exteriori albis, capite cristato.
- Müller*, zool. dan. prodr. p. 29. n. 234. *Alauda*
(*Cristata*) rectricibus nigris, extimis duabus
margine exteriori albis, capite cristato.
- Kramer*, Austr. p. 362. n. 1. *Alauda crista depen-*
dente, Kothlerche, Schopflerche.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 193. *Alauda cristata;*
Heubel-Lerch, Kott-Lerche, Lürle.
- Sibbald*, Scot. ill. p. 17. *Alauda cristata.*
- II. Band II. Th. P *Rzaczyns-*

Rzaczyński, auct. hist. nat. Pol. p. 315. *Alauda capellata*, viarum. *Dzierlatka*.

Charlton, onom. zoic. p. 81. *Alauda galerita*, castita, cristata.

Belon, hist. nat. des ois. p. 267. Cochevis.

Salerne, ornithol. p. 194. Cochevis.

Jonston, av. p. 100. *Alauda cristata maior*.

Zinnann. Uov. p. 64. tab. 9. Fig. 56. *Lodola capelluta*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 344. n. 6. *die Haubenlerche*.

21. NEMOROSA. *Die Waldlerche*.

Briffon, ornithol. I. p. 411. n. 9. *petite Alouette hupée*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 277. *die kleine Zopflerche, oder Lulu*; p. 279. *Waldlerche*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 499. n. 26. *Alauda* (*Cristatella*) *cristata*, corpore supra fusco sub-
tus albicante, remigibus rectricibusque fuscis,
pedibus subrubris.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 225. *die Stein-
lerche*.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 706. *die kleine Haubenlerche*.

Britt. Thiergesch. p. 102. *die kleine Schopf- oder
Haubenlerche*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 193. *Alauda arborea*;
Heide Lerche; *Mittel Lerche*; *Baumlerche*;
Wald Lerche; *Stein Lerche*.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Polon. p. 354. *Alauda
arborea seu sylvatica*.

Jonston, av. p. 100. *Alauda cristata minor*.

22. UNDATA. *Die Coquillade*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 281. *die Coquillade*; m.
e. Fig.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 500. n. 27. Alauda (Undata) cristata nigricans rufo varia, subtus alba, pectore nigro maculato, rectricibus alarum maioribus apice albis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 225. *die Coquillade.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 707. *die provenzalische Lerche.*

23. **SENEGALENSIS.** *Die senegalische Lerche.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 137. n. 15. *die senegallische Lerche.*

Briffon, ornith. I. p. 411. n. 10. Alouette hupée du Senegal.

Büffon, Vögel, XIV. p. 285. *die senegalische Zopflerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 500. n. 28. Alauda (Senegalensis) fusco griseoque varia, subtus albida, collo inferiore fusco maculato, rectricibus duabus extimis extus rufo-albis.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 708. *die Grisette, oder senegalische Haubenlerche.*

Adanson, Senegal. p. 217. 251. *Lerchen?*

24. **TESTACEA.** *Die gibraltarische Lerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 500. n. 29. Alauda (Testacea) testacea subtus albida, vertice rectricibusque alarum nigro-maculatis, rectricibus quatuor exterioribus testaceo-albis.

25. **LUSITANA.** *Die portugiesische Lerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 500. n. 30. Alauda (Lusitana) fusco flavesens, pennis medio fuscis, subtus rectricibusque exterioribus flavescente albis.

26. AFRICANA. *Die afrikanische Lerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 263. *der Sirli vom Cap*;
m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 499. n. 24. Alauda
(Africana) fusca, rufo alboque varia, subtus
alba maculis fuscis, alis caudaque fuscis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 224. *der kap-
sche Sirli.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 703.
der Sirli vom Vorgeb. der gut. Hoffn.

Hermann, tab. affin. anim. p. 216. Alauda curvi-
rostris.

27. CINEREA. *Die graue Lerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 261. *die aschgraue Lerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 499. n. 23. Alauda
(Cinerea) cinerea, abdomine albo, remigibus
rectricibusque fuscis, rectrice extima extus apice
alba.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 224. *die graue
Lerche.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 703.
die Aschlerche.

28. RUSA. *Die Lerche vom de la Plata.* (8)

Büffon, Vögel, XIV. p. 259. *die Lerche vom de
la Plata*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 498. n. 22. Alauda
(Rusa) nigricans, rufo-nebulosa, corpore sub-
tus gulaque albis, rectricibus duabus extimis
albo-marginatis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 223. *die Va-
riole.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 782.
der Schücke.

8. CA-

(8) Die Trivialbenennung *Rusa* ist im Syst. p. 792. n. 7. schon
einmal vorgekommen.

8. CAPENSIS. *Die capische Lerche.*

Müller, Natursystem, II. p. 520. n. 8. *die capische Lerche.*

Briffon, ornith. I. p. 411. n. 11. Alouette du Cap de bonne espérance.

Büffon, Vögel, XIV. p. 247. *die capische Lerche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 498. n. 20. Alauda (Capensis) rectricibus tribus lateralibus apice albis, gula lutea, nigro marginata, superciliis flavis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 126. *die capische Calandra.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 698. *gelbe Halsbinde.*

29. NOVAE SEELANDIAE. *Die neuseeländische Lerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 497. n. 19. Alauda (Novae Zealandiae) obscura, pennis cinerascens, marginatis, abdomine albo, superciliis albis, fascia oculari nigra.

β. A. cinerea, subtus cinereo-alba, remigibus rectricibusque nigris, margine exteriori albis. *

Latham, Syst. ornith. II. p. 497. n. 19. β.

30. MONGOLICA. *Die mongolische Lerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 292. *die mongolische Lerche; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 497. n. 18. Alauda (Mongolica) capite colloque ferrugineis, vitta annulari verticis marginali maculaque medio albis, gula macula bifida.

Pallas, Reif. Anz. III. Anh. p. 8. n. 19. Alauda Mongolica.

Schwed. Abhandl. XL. p. 192. *die mongolische Lerche.*

31. SIBIRICA. *Die sibirische Lerche.* (9)

Büffon, Vögel, XIV. p. 291. *die Lerche vom Irtisfluß.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 497. n. 17. β. Al. flavo-ferruginea subtus albida, iugulo ferrugineo vario, remigibus secundariis maxima parte albis.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 9. n. 15. * III. p. 365. Anh. p. 8. * *Alauda Calandra.*

9. CALANDRA. *Die Kalanderlerche.*

Müller, Natur Syst. II. p. 521. n. 9. *die Kalanderlerche.*

Ebert, Naturl. II. p. 126. *Kalander.*

Halle, Vögel, p. 315. n. 276. *die große Ringlerche.*

Onomat. hist. nat. II. p. 398. *die große Lerche.*

Klein, av. p. 72. n. 7. *Alauda Calandra.*

Klein, Vorbereit. p. 137. n. 7. *die Calandra Lerche.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 73. *Calandra.*

Brisson, ornithol. I. p. 408. n. 6. *Grosse Alouette ou Calandre.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 238. *die Kalanderlerche, oder große Lerche; m. e. Fig.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 366. n. 197. *die Calandra.*

Latham, Syn. Supplem. p. 177. *Calandre Lark.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 498. n. 17. *Alauda (Calandra) rectrice extima exterius tota alba, secunda tertiaque apice albis, fascia pectorali fusca.*

Gesner, Vögelb. p. 361. *Kalander oder Galander, p. 472 kleiner Tetrax.*

Cetti, Sardin. II. p. 139. *die Ringlerche; m. e. Fig.*

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 58. *die große Lerche, Pallas,*

(9) Nach *Latham* eine Varietät von *Alauda Calandra*, n. 9.

Pallas, Reif. III. p. 697. — Ausz. III. Anh. p. 8.
not. * *Calander*.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 126. *die Calandra*.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VII. p. 697.
die Kalanderlerche.

Charleton, onom. zoic. p. 81. n. 4. *Alauda Calandra*.

Jonston, av. p. 100. *Calandra*.

Barrere, ornith. p. 40. *Alauda non cristata cinerea*, pectore albo maculoso.

Belon, hist. nat. des ois. p. 270. *Calandre*.

Salerne, ois. p. 196. *Kalandra*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 216. *Alauda Calandra*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 344. n. 7.
die Kalanderlerche.

10. ALPESTRIS. *Die Schneelerche*.

Müller, Naturfyst. II. p. 521. n. 10. *die Berglerche*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 201. n. 8. *die Berglerche*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 498. n. 6. *die Berglerche*.

Ebert, Naturl. II. p. 126. *die Schneelerche*.

Halle, Vögel, p. 314. n. 274. *die gelbköpfige Lerche*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 365. n. 195. *die Uferlerche*.

Klein, av. p. 72. n. 5. *Alauda gutture flavo*, Virginiae et Carolinae.

Klein, Vorbereit. p. 136. n. 5. *gelbbärtige Lerche*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 73. n. 5. *gelbbärtige amerikanische Lerche*.

Klein, stemmat. av. p. 13. tab. 15. fig. 5. c. d.

Briffon, ornith. I. p. 412. n. 12. Alouette de Virginie.

Büffon, Vögel, XIV. p. 249. die Schneelerche oder Berglerche.

Batsch, Thiere, I. p. 343. Berg- oder Winterlerche.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 498. n. 21. Alauda (Alpestris) rectricibus dimidio interiore albis, gula flava, fascia suboculari pectoralique nigra.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 408. Berglerche, nordische Schneelerche.

Seligmann, Vögel, II. tab. 64. gelbbärtige Lerche.

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 194. wilde zweyschopfige Alpenlerche.

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 285. Berglerche.

Pallas, Reis. III. p. 647. Schneelerche.

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 99. III. p. 474. Schneelerchen.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 48. die Schneelerche.

Linné, Abhandlung. II. p. 280. n. 14. die Caroliner-Lerche.

Naturforsch. XVII. p. 79. n. 163. Berglerche; türkische Lerche.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 126. Schneelerche.

Borkhausen, Magaz. I. p. 171. n. 42.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 699. die virginische Lerche.

Naumann, Vogelsteller. p. 179. die Schneelerche.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 166. n. 8. Alauda (Alpestris) rectricibus dimidio inferiore albis, gula flava, fascia suboculari pectoralique nigra.

22. FLAVA. Der Priestergürtel. (10)

Büffon, Vögel, XIV. p. 257. die sibirische Lerche.

Latham,

(10) Nach Latham eine Varietät von *Alauda Alpestris* n. 10.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 498. n. 21. β . Al. rufa griseo varia subtus alba, vertice nigromaculato, fascia pectorali suboculari lorisque nigris.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 207. *der Priester Gürtel oder die sibirische Lerche.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 171. n. 43. *gelbe sibirische Lerche.*

33. OBSCURA. *Die unbestimmte Lerche.*

Buffon, Vögel, XIV. p. 296. *eine Lerchenart, von der es ungewiß ist, ob sie zu den Lerchen gehöre.*

II. MAGNA. *Die Riesenlerche.* (1)

Müller, Naturfyst. II. p. 522. n. II. *die Riesenlerche.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 196. n. I. *die Riesenlerche.* tab. 73.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 498. not. c.

Halle, Vögel, p. 314. n. 275. *die große Amerikanische Baumlerche.*

Klein, av. p. 72. n. 6. *Alauda magna.*

Klein, Vorbereit. p. 136. n. 6. *Dubbellerche.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 73. n. 6. *Dubbellerche.*

Briffon, ornithol. I. p. 225. n. 15. *Merle à collier d'Amerique.*

Buffon, Vögel, IX. p. III. *die amerikanische Amsel mit dem Ringkragen; m. e. Fig.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 308. n. 108. *der halbe Mond; die amerikanische Ringamsel.*

Latham, Syn. II. I. p. 6. n. 3. *A. Crescent Staare.*

(1) Nach *Briffon* eine Amsel; nach *Pennant* ein Staar; nach *Catesby* eine Lerche; nach *Latham* eine Varietät von *Sturnus Ludovicianus*; p. 802. n. 3. — Gewicht, nach *Pennant*, zwischen 3. und 4. Unzen.

Latham, Vögel, II. 1. p. 6. n. 3. Var. A. *der Staar mit dem halben Monde. Amerikanische Staar.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 323. n. 3. A. *Sturnus supra fusco-rufescente et nigricante varius, subtus flavus, fascia pectorali curva nigra, rectricibus tribus lateralibus albis.*

Silgmann, Vögel, II. tab. 66. *die große Lerche.*

Fermin, Surin. II. p. 181. *die amerikanische Lerche?*

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 167. n. 9. *Alauda (magna) subtus flava, fascia pectorali curva nigra; rectricibus tribus lateralibus albis.*

Gentlem. Magaz. XXIII. tab. p. 324. *Large Lark.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. 214. *Alauda magna.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 288. n. 7. *Alauda Spinoletta.*

p. 794. n. 4. *β. Spinoletta. Var.*

Das Geschlecht ist, der Anzahl nach, mit 22. Gattungen vermehrt; da aber die 7te der XIIten Edition jetzt als Spielart von einer andern aufgeführt worden, so sind der neuhinzugekommenen Gattungen überhaupt 23.

Bey der 1sten Gattung sind vier, bey der 2ten drey Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Die Winterlerche des Scopoli.*

Scopoli, an. I. p. 129. n. 188. *Alauda brumalis.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 154. n. 188. *die Winterlerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 295. *die Winterlerche.*

2. *Alauda*

2. *Alauda pectore lutescente, punctis atris.*
Kramer, Austr. p. 362. n. 4. Austr. *Breinvogel*;
Norimb. Krautvogel; *Styr. Schmelvogel*.
 In der *Büffonschen* Vögelübersetzung wird dies
 Synonym, p. 204. zu *Alauda pratensis*, und
 p. 219. wieder zu *Alauda trivialis* gerechnet.
3. *Alauda hispanica Hasselq.*
Hasselquist, Reis. n. Palästina, p. 335. n. 46.
Büffon, Vögel, XIV. p. 582. die spanische Lerche.
 Vielleicht *Alauda arvensis*?
4. Die Grillenlerche; in den sumpfigen Gegenden
 von England.
Halle, Vögel, p. 315. n. 277. die Lerchenheu-
 schrecke.
Büffon, ois. IX. p. 59. Locustelle.
Büffon, Vögel, XIV. p. 214. die Grillenlerche.
Pennant, brittisch Zoolog. p. 95. the Willow Lark.
Pennant, britt. Thiergesch. p. 103. tab. 50. fig. 4.
 Weidenlerche.
Naturgesch. aus den best. Schriftst. VIII. p. 694.
 die Lerchenheuschrecke.
Latham, Syst. ornith. II. p. 494. n. 7. *Alauda*
 (Obscura) olivaceo-fusca, nigricante varia,
 subtus flavicans, rectricibus colli pectoreque
 maculis fuscescentibus, rectrice extima dimidiato,
 secunda apice albo-cinerascente?
5. *Thufu-Tytlinger. Olaffen*, Isl. I. p. 310. b. —
Müll. zool. dan. prodr. p. 29.

C. Neuere Gattungen.

1. Die Yeltonische Lerche.
Büffon, Vögel, XIV. p. 288. die Yeltonische
 Lerche.

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 496. n. 16. *Alauda* (Yeltoniensis) nigra supra rufescente-varia, sex-ta remigum margine exteriori alba, rectricibus duabus intermediis rufis.

Forster, philos. transact. LVII. p. 350. *Alauda yeltoniensis*.

Vielleicht eine Spielart von *Alauda tatarica*?

106. GESCHLECHT. STURNUS. *Der Staar*.

Müller, Natursyft. II. p. 523. Gen. CVI.

Leske, Naturgesch. p. 255. Gen. XXXVIII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 201. Gen. LXXIV.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 180. Gen. XXVIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 498. Gen. LXV.

Halle, Vögel, p. 272. Gen. IV.

Pennant, arct. Zool. II. p. 308.

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 408.

Onomat. hist. nat. VII. p. 358.

Klein, av. p. 64. Gen. IV.

Briffon, ornith. I. p. 280. Gen. XXVI.

Büffon, Vögel, VII. p. 5. 199.

Batsch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXVIII.

Latham, Vögel, II. 1. p. 1. Gen. XXX.

Latham, Syst. ornith. I. p. 321. Gen. XXXI.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 345. Gen. LXXIII.

1. VULGARIS. *Der gemeine Staar*. (2)

Müller, Natursyft. II. p. 523. n. 1. *die Sprehe*.

Leske, Naturgesch. p. 255. n. 1. *der gemeine Staar*.

Borows-

(2) Gewicht etwa 3 1/2 Unze. Brütet zweymal; 18—20. Tage.
Kann über 10. Jahr alt werden.

Borowsky, Thierreich, III. p. 202. n. 1. *der gemeine Staar*, tab. 74.

Blumenbach, Handb. d. N.G. p. 180. n. 1. *Sturnus* (Vulgaris) rostro flavescente, corpore nigro punctis sagittatis albis; *der Staar*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 498. n. 1. *der gemeine Staar*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 714. *der gemeine Staar*.

Funke, Naturgesch. I. p. 239. *der Staar*.

Ebert, Naturl. II. p. 140. *Sprehe*.

Halle, Vögel, p. 272. n. 227. *der gemeine Staar*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 380. n. 314. *der Staar*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 309. A. *der gemeine Staar*.

Neuer Schaupl. der Nat. VIII. p. 408. *Sprehe*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 363. *der gemeine Staar*.

Handb. der Naturgesch. II. p. 212. *der Staar*, p. 214. *Wiesenstaar*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 123. *Staar*; *Stär*; *Stärlein*; *Sprehe*; *Spren*.

Klein, av. p. 64. n. 1. *Sturnus pratorum*, vulgaris.

Klein, Vorbereitung. p. 121. n. 1. *Rinderstaar*; *Spreche*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 63. n. 1. *gemeiner Wiesenstaar*; *Rinderstaar*; *Sprehe*.

Klein, stemmat. av. p. 10. tab. 12. fig. 5. a. b. c.

Klein, Vögeleyer, p. 22. tab. 8. fig. 7.

Gesner, Vögelb. p. 484. *Staar oder Rinderstaar*; m. e. zieml. gut. Fig.

Briffon, ornith. I. p. 280. n. 1. *Etourneau*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 5. *der Staar*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 357. *der gemeine Staar*.

Latham, Syn. Suppl. p. 137. *Common Stare*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 1. n. 1. *der gemeine Staar*.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 321. n. 1. *Sturnus*
(*Vulgaris*) rostro flavescente, corpore nigro
nitente, punctis albis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 72. n. 155. *die Sprehe*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 85. n. 1. *die gemeine Sprehe*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 409. *der Staar*.

Cetti, Sardin. II. p. 174. *der Staar*.

Fischer, Liv. p. 93. n. 132. *Sprehe*.

Fabricius, Reis. nach Norweg. p. 59. *der gewöhnliche Sprehe*.

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 17. *die Staare*.

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 99. III. p. 475. *die Staare*.

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. III. p. 13. *Staare*.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 1. *Stär*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 185. *Stär, oder Star*.

Hasselquist, Palästina. (ed. germ.) p. 335. n. 48.
Sturnus vulgaris.

Leske, Reis. durch Sachsen, p. 31. *die Staare*.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 99.

Borkhausen, Magazin, I. p. 164. n. 35.

Linné, Abhandlung. II. p. 283. n. 40. *die Staare*,
p. 284. n. 44. p. 301. n. 14. *Staare*.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 155. n. 189. *der gemeine Staar*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 58. *Staar*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 323. *der Star*.

Naumann, Vogelfsteller, p. 122. *der Staar*.

Hervieux, von Canarienvögeln, p. 170. *der Star*.

Beckmann, Naturhist. p. 55. *der gemeine Staar*.

Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 1. *der gemeine Staar*.

Naturforsch. XVII. p. 79. n. 164. *die Sprehe*, XXI.
p. 133. *Staar*.

Naturforsch. XXV. p. 14. *der Staar*.

Anweis. Vögel zu fang. p. 521. *der Staar*.

Jablonsky

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1116. *Staar*.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 214. 222.

Oekon. Zool. p. 93. n. 34. *der Staar*.

Loniceri, Kräuterb. p. 680. *Staar*.

Zückert, Speis. aus d. Thierreich, p. 98.

Lemmery, Materiallex. p. 1087.

Beckmann, Bibl. VIII. p. 533. *der Staar*.

Mannigfaltigkeit. II. p. 159.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. *Sturnus*.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 1. *Sturnus*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 167. n. 1. *Sturnus*
(*Vulgaris*) rostro flavescente, corpore nigro,
punctis albis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 235. *Sturnus*
(*Vulgaris*) rostro flavescente, corpore variegato
punctis albis.

Kramer, Austr. p. 361. n. 1. *Sturnus* rostro flavescente, corpore nigro, punctis albis. *Starl*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 351. *Sturnus*. *Staar* ;
Spreche.

Charleton, onomast. zoic. p. 84. n. 3. *Sturnus*.

Moehring, av. gen. p. 32. n. 9. *Sturnus*.

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 291. *Sturnus*.

Sibbald, Scot. p. 157. *Sturnus*.

Jonston, av. p. 107. *Sturnus vulgaris*.

Heerkens, av. Fris. p. 169. *Sturnus*.

Scharfer, element. ornithol. tab. 65.

Zinnar, Uov. p. 69. tab. 10. fig. 60. *Storno*.

Russel, Alepp. p. 69. *Stare*.

Levin, britt. Birds II. tab. 56.

Belon, hist. nat. des ois. p. 322. *Estourneau* ; *Sansonnet*.

Voy. en Barbar. p. 271. *Etourneau*.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 42. *Sturnus*.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 34. n. 202. $\psi\alpha\gamma\omicron\varsigma$.

Aelian. de nat. anim. L. VI. c. 46. $\psi\alpha\gamma$.

Donn.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 345. n. 1.
der gemeine Staar.

Donndorff, Natur und Kunst, III. p. 176. der
Staar.

β. Der weiße Staar.

Briffon, ornith. I. p. 281. A. Etourneau blanc.

Büffon, Vögel, VIII. p. 24. der weiße Staar.

Latham, Syn. II. 1. p. 3. White Stare.

Latham, Vögel, II. 1. p. 3. Var. A. der weiße
Staar.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 1. β. Sturnus
albus.

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. III. n. 1. ein
weißer Staar.

Naturforscher, XVI. p. 46. n. 1. weißer Staar.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 353. Sturnus candidus.

Jonston, av. p. 107. Sturnus totus candidus.

Rozier, observat. XIV. p. 228.

γ. Der schwarz und weiße Staar.

Briffon, ornithol. I. p. 281. B. Etourneau blanc et
noir.

Büffon, Vögel, VIII. p. 24. der schwarz und
weiße Staar.

Latham, Syn. II. 1. p. 4. Pied Stare.

Latham, Vögel, II. 1. p. 3. Var. B. der bunte
Staar.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 2. γ. Stur-
nus leucomelas.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 352. Sturnus ut pica va-
rius. Elster-Staar.

δ. Der weißköpfige Staar.

Briffon, ornithol. I. p. 281. C. Etourneau à tête
blanche.

Büffon, Vögel, VIII. p. 24. der weißköpfige Staar.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 1. ♂. *Sturnus leucocephalus*.

Jonston, av. p. 108. *Sturnus alter*.

ε. *Der aschgraue Staar*.

Briffon, ornith. I. p. 282. D. Etourneau gris.

Büffon, Vögel, p. 25. *der aschgraue Staar*.

Latham, Syn. II. 1. p. 4. Grey Stare.

Latham, Vögel, II. 1. p. 44. Var. C. *der graue Staar*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 1. ε. *Sturnus cinereus*.

Charleton, onom. zoic. p. 84. ad n. 8. *Sturnus cinereus*.

Jonston, av. p. 108. *Sturnus tertius*.

2. CAPENSIS. *Der capsche Staar*. (3)

Müller, Natursystem, II. p. 524. n. 2. *der Capsche Staar*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 204. n. 3. *der Capische Staar*.

Onomat. histor. natur. VII. p. 359. *der Capische Staar*.

Briffon, ornith. I. p. 282. n. 3. Etourneau du Cap de bonne Esperance.

Büffon, Vögel, VIII. p. 31. *der Elsterstaar*, oder *Staar vom Vorgeb. der gut. Hoffn.* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 4. n. 2. *der Capsche Staar*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 2. *Sturnus (Capensis) nigricans*, capitis lateribus subtusque albis.

3. L u.

(3) *Büffon* rechnet hierher auch den *Sturnus Contra*, p. 803. n. 7. und alle daselbst bemerkte Synonymen. Auch *Latham* nimmt letztern als eine Spielart davon an.

3. LUDOVICIANUS. *Der louisianische Staar.* (4)

Müller, Naturfyst. II. p. 524. n. 3. *der louisianische Staar.* Tab. 20. Fig. 3.

Pennant, arct. Zool. II. p. 309. n. 109. *der louisianische Staar.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 362. *der Louisianische Staar.*

Briffon, ornith. I. p. 283. n. 4. *Etourneau de la Louifiane.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 37. *der Louisianische Staar.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 5. n. 3. *der Louisianische Staar.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 323. n. 3. Sturnus (Ludovicianus) griseo fuscoque maculatus, subtus flavus, linea capitis superciliisque albis, gula nigra.

4. CONTRA. *Der Kontra.* (5)

Müller, Naturfyst. II. p. 525. *der bunte indianische Staar.*

Halle, Vögel, p. 295. n. 250. *die schwarze Bengalische Amsel. Der Kontra von Bengalen.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 511. *die Elfter von Bengalen.*

Klein, verb. Vögelhistor. p. 70. n. 37. *Tag und Nacht Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 181. n. 9. *Troupiale de Bengale.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 35. *Staar Kontra; mit e. Fig.*

Latham, Syn. II. 1. p. 5. *Contra Stare.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 5. n. 2. Var. A. *der Contra-Staar.*

Latham,

(4) Latham rechnet auch die *Alanda magna* Linn. p. 801. n. 11. als Spielart hieher.

(5) S. vorher Anmerk. 3.

Latham, Syst. ornith. I. p. 322. n. 2. β . *Sturnus fuscus macula oculari fascia alari abdomineque albis.*

Seligmann, Vögel, VI. tab. 82. *der schwarz und weiße indianische Staar.*

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 167. *Sturnus* (Contra) *fuscus, macula oculari, fascia alari abdomineque albis.*

5. CINCLUS. *Der Wasserstaar.* (6)

Müller, Naturyst. II. p. 525. n. 5. *der Wasserstaar.*

Leske, Naturgesch. p. 255. n. 2. *der Wasserstaar.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 203. n. 2. *der Wasserstaar; Wasseramsel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 499. n. 2. *der Wasserstaar.*

Ebert, Naturl. II. p. 140. *Wassermerte.*

Halle, Vögel, p. 296. n. 252. *die schwarze Wasseramsel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 383. n. 315. *Wasseramsel; Seeamsel.*

Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 552. *Wasseramsel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 361. *Wasseramsel.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 313. *die Wasseramsel.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 124. *Wasserstaar.*

Klein, av. p. 68. n. 18. *Turtur aquaticus.*

Klein, Vorbereit. p. 129. n. 18. *Wasserdrössel.*

Q 2

Pennant,

- (6) Gewicht, nach *Pennant*, 2 1/2 Unze. Dieser Vogel scheint, wie *Pallas* bemerkt, die Ordnung der Grallen mit den Passeribus zu verbinden, indem er seinem Schnabel und Füßen nach ohne allen Zweifel zu den letztern gehört, hingegen die Stellung seines Körpers und seine Oekonomie ihn zu den erstern hinbringen. *Pallas* hat auch am angef. O. die ausführlichste Beschreibung von ihm gegeben. Vid. *Zoolog. Beytr.* I. B. p. 550.

Pennant, arch. Zool. II. p. 310. B. der *Wasserstaar*.

Gesner, Vögelb. p. 39. *Wasseramsel*; m. e. Fig.

Briffon, ornith. II. p. 275. n. 19. Merle d'eau.

Büffon, Vögel, VIII. p. 53. der *Wasserstaar*.

Latham, Syn. Suppl. p. 142. Water Ouzel.

Latham, Vögel, II. 1. p. 45. n. 50. die *Wasseramsel* oder der *Wasserstaar*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 343. n. 57. Turdus (Cinclus) fusco-nigricans, genis, gutture, collo inferiore et pectore niveis, ventre supremo fusco-rufescente, imo rectricibusque nigricantibus.

Beseke, Vögel Kurl. p. 72. n. 156. der *Wasserstaar*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 87. n. 2. die *Bachspröhe*.

Cetti, Sardin. II. p. 177. die *Bachamsel*.

Leem, Finnm. p. 138. *Elve-Kald*.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 2. *Strömstär*; *Bachvogel*.

Pallas, Reif. I. p. 96. die *Wasseramsel*.

Pallas, Reif. Ausz. I. p. 87. die *Wasseramsel*.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 70. Sturnus Cinclus.

Zorn, Petinotheol. II. p. 440. die *Wasser-Amsel*.

Linné, Abhandl. II. p. 301. n. 118. die *Wasseramsel*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 75. *Wasser-Amsel*.

Beckmann, Bibl. III. p. 171. die *Wasseramsel*.

Schrift. der berlin. Gesellsch. N. Fr. VII. p. 455. n. 24. der *schwarze Blauspecht*. Sitta Melaina.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 185. n. 223. die *Wasseramsel*.

Anweil. Vögel zu fang. p. 170. die *Wasseramsel*.

Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 2. der *Wasserstaar*.

Günther, Nest. u. Ey. tab. 67. *Wasseramsel*.

André

André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 161.

Borkhausen, Magaz. I. p. 165. n. 36.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 168. n. 4. Sturnus
(Cinclus) niger, pectore albo.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 236. Sturnus
(Cinclus) niger, pectore albo.

Kramer, Austr. p. 374. n. 3. Motacilla pectore al-
bo, capite et collo piceis, corpore nigricante.

Wasser-Amsel; *Bach-Amsel*.

Charleton, onom. zoic. p. 108. n. 9. Tringa.

Charleton, onom. zoic. p. 108. n. 12. Merula
aquatica.

Mérot, pinac. rer. natural. Britan. p. 183.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 302. Merula aquatica.
Bachamsel; *Seeamsel*.

Jonston, av. p. 107. Merula aquatica.

Zinn, Uov. p. 109. tab. 19. fig. 97. Merla ac-
quajuola.

Levin, britt. Birds. II. tab. 63.

Dec. Russ. I. p. 307. 314.

Soc. nat. Lips. 1747. p. 444. tab. 8. fig. 3. Turdus
musculus palustris dumetorum arundinaceus.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 9. n. 158. Κίρκλος?

Hermann, tab. affin. anim. p. 212. Sturnus Cin-
clus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 346. n. 2.
der Wasserstaar.

6. MILITARIS. *Der weißstreifige Staar*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 46. *der weißstreifige Staar*;
m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 6. n. 4. *der magellani-
sche Staar*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 313. n. 4. Sturnus
(Militaris) griseus, pectore gulaque sangui-
neis.

7. MONTANUS. *Der Bergstaar.* (7)

Latham, Syst. ornith. I. p. 325. n. 1. *Sturnus* (*Moritanus*) (*soll ohnstreitig montanus heißen*.) cinereus, capitis parte inferiore et gula ex cinereo et albo variis, ventre cano rufescente maculato, rostri apice nigro.

8. LOYCA. *Der chilefische Staar.*

Latham, Vögel, II. I. p. II. n. 14. *der rothbrüftige Staar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 325. n. 12. *Sturnus* (*Loyca*) fusco alboque maculatus, pectore coccineo.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 346. n. 3. *der chilefische Staar.*

9. MEXICANUS. *Der mexicanische Staar.*

Briffon, ornith. I. p. 254. n. 4. *Cotinga du Mexique.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 43. *der Caxcaxtototl.*

Latham, Vögel, II. I. p. II. n. 13. *der mexikanische Staar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 326. n. 15. *Sturnus* (*Mexicanus*) caeruleus nigro variegatus, iridibus luteis.

10. OBSCURUS. *Der Schilffstaar.*

Briffon, ornithol. I. p. 283. n. 3. *Etourneau de la nouvelle Espagne.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 42. *der Schilffstaar oder Tolocatzanatl.*

Latham, Vögel, II. I. p. II. n. 12. *der braunköpfige Staar.*

Latham,

(7) Soll, nach *Bechstein*, nichts anders als *Motacilla alpina* p. 957. n. 65.) seyn, und auch *Sturnus collaris* n. 16, dahin gehören. S. *Naturgesch. Deutschl.* III. p. 715. *

Latham, Syst. ornith. I. p. 326. n. 14. Sturnus
(Junceti) niger capite fusco.

II. ZEYLANICUS. *Der zeylonische Staar.*

Latham, Vögel, II. I. p. 10. n. II. der zeylanische Staar.

Ist nach *Latham*, mit *Turdus Ochrocephalus*, p. 821.
n. 70. einerley.

12. FUSCUS. *Der olivenfarbige Staar.*

Latham, Vögel, II. I. p. 10. n. 10. der braune Staar.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 325. n. 10. Sturnus
(Olivaceus) fusco-olivaceus, subtus flavescens,
vitta oculari caerulea.

13. VIRIDIS. *Der grüne Staar.*

Latham, Vögel, II. I. p. 10. n. 9. der grüne Staar.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 325. n. 9. Sturnus
(Viridis) viridis supra caeruleus, macula sin-
cipitis poneque oculos unica, scapulari duplici
alba.

14. SERICEUS. *Der Seidenstaar.*

Latham, Syn. Suppl. p. 137. Silk Stare.

Latham, Vögel, II. I. p. 9. n. 8. der Seiden-
staar.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 324. n. 8. Sturnus
(Sericeus) pallide griseus, capite flavescen-
te-albo, basi remigum albo, remigibus rectri-
busque nigris.

15. CARUNCULATUS. *Der gelappte Staar.*

Latham, Vögel, II. I. p. 8. n. 6. der gelappte Staar.

Latham, Syst. ornith. I. p. 324. n. 6. Sturnus (Ca-
runculatus) niger, dorso rectricibusque alarum
ferru-

ferrugineis, ad basin mandibulae inferioris palea duplici carunculata fulva.

16. COLLARIS. *Der Staar mit dem Halsbände.* (8)

Latham, Vögel, II. I. p. 7. n. 5. *der Staar mit dem Halsbände.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 323. n. 5. Sturnus (Collaris) fusco-nigricans, dorso maculato, uropygio albo vario, gula alba, fusco-maculata, remigibus caudaque apice fuscis.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 156. n. 192. *der Staar mit dem Halsbände.*

17. DAURICUS. *Der daurische Staar.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 48. *der daurische Staar*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 12. n. 15. *der daurische Staar.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 325. n. 13. Sturnus (Dauricus) corpore supra ex atro violaceo, subtus ex cinerasciente albo, capite et cervice caeruleo-canis, verticis litura violaceo-atra (femina fusca.)

Donnerhoff, Handb. der Thiergesch. p. 346. n. 4. *der daurische Staar.*

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit zwölf Gattungen vermehrt. Bey der 1ten Gattung sind fünf Varietäten aus einander gesetzt.

107 GE-

(8) S. die vorhergehende Anmerk. Auch *Latham* hält ihn mit der *Macilla alba* für einenley und zieht alle in unserm Syst. p. 957. angeführte Synonymen, selbst seinen eignen *Alpine Warbler* hierher.

107. GESCHLECHT. TURDUS. *Der Krametsvogel. (Droßel.)*

Müller, Naturfyst. II. p. 527. Gen. CVII.

Leske, Naturgesch. p. 256. Gen. XXXIX.

Borowsky, Thierreich, III. p. 162. Gen. LXVII.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 180. Gen. XXIX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 500. Gen. LXVI.

Funke, Naturgesch. I. p. 233.

Ebert, Naturl. II. p. 127.

Halle, Vögel, p. 277. Gen. V.

Neuer Schaupl. der Natur. II. p. 406.

Onomat. hist. nat. VII. p. 610.

Klein, av. p. 65. Gen. V.

Briffon, ornith. I. p. 213. Gen. XXII.

Biffon, Vögel, VIII. p. 202.

Pennant, arch. Zool. II. p. 310.

Batsch, Thiere, I. p. 3117. Gen. LXXIII.

Latham, Vögel, II. 1. p. 13. Gen. XXXI.

Latham, Syst. ornith. I. p. 326. Gen. XXXII.

Hermann, tab. affin. anim. p. 209.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 347. Gen. LXXIV.

I. VISCIVORUS. *Der Ziemer. (9)*

Müller, Natursystem, II. p. 528. n. 1. *die Mistel-Droßel.*

Leske, Naturgesch. p. 256. n. 1. *die Misteldroßel, Schnarre.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 164. n. 2. *Mistel, Schnarrdroßel.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 180. n. 1. Turdus (Viscivorus) dorso fusco, collo maculis albis, rostro flavescente; *Schnarre, Ziemer, Mistler, Brachvogel; Zaritzer.*

Q 5

Bechstein,

(9) Gewicht an 5. Unzen. Penn. Wird über 15. Jahr alt.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 500. n. 1. *die Misteldrossel*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 610. *die Misteldrossel*.

Funke, Naturgesch. I. p. 233. *die Misteldrossel*.

Ebert, Naturl. II. p. 128. *Misteldrossel*; *Ziener*.

Halle, Vögel, p. 277. n. 233. *die große Drossel*.

Meyer, Thiere, II. p. 17. tab. 66. *der Mistler*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 384. n. 316. *die Schnarre*; *Zarër*; *Zerrer*; *Zehër*; *Zaritzer*; *Mistelfink*; *Mistelziemer*; *Scherner*; *Schneer*; *Ziering*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 318. B. *die Misteldrossel*.

Beckmann, Naturhist. p. 52. a. *die Schnarrdrossel*.

Neuer Schaupl. d. Nat. VII. p. 722. *Schnarre*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 637. *Misteldrossel*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 125. *Misteldrossel*.

Klein, av. p. 65. n. 1. *Turdus viscivorus maximus*.

Klein, Vorbereit. p. 122. n. 1. *Schnarrdrossel*, *Misteldrossel*; *Schnarre*.

Klein, verb. Vögelh. p. 65. n. 1. *Schnarre*, *Ziener*.

Klein, Stemmat. av. p. 12. tab. 13. Fig. 1. a — c.

Gesner, Vögelb. p. 430. *Mistler*, Fig. p. 431. gut.

Briffon, ornith. I. p. 213. n. 1. *Große Grive*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 261. *die Misteldrossel*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 338. *die Misteldrossel*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 13. n. 1. *die Misteldrossel*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 326. n. 1. *Turdus* (*Viscivorus*) *supra griseo-fuscus, subtus albo-flavicans, maculis nigricantibus varius, rectricibus tribus extimis albo-terminatis*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 73. n. 157. *die Misteldrossel*.

Siemsen,

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 88. n. 1. *die Misteldrossel*; *Schnarr*; *Brakvogel*.

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 410. *die Misteldrossel*.

Cetti, Sardin. II. p. 152. *die Misteldrossel*.

Fischer, Livl. p. 93. n. 133. *die Misteldrossel*.

White, N. G. von Engl. p. 65. n. 1. p. 129. *Misteldrossel*.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 95. tab. 47. Fig. 1. *der Mistler*.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 1. *Simmerfjære*; *doppelter Kramsvogel*.

Naturforsch. XVII. p. 80. n. 165. *die Misteldrossel*.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 158. n. 193. *der Mistler*, oder *Schnärre*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 304. *der Mistler*.

Oekonom. Zool. p. 94. n. 35. *der gemeine Krametsvogel* oder *Ziemer*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 54. *Schnerre*.

Naumann, Vogelteller, p. 84. *Schnarre* oder *Schnarrziemer*.

Anweil. Vögel zu fang. p. 385. *Mistler*.

Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 1. *die Misteldrossel*.

Hamb. Magazin, XIX. p. 531. XXI. p. 269.

Zückert, Speis. aus dem Thierr. p. 96.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 683. *Mistler*.

Beckmann, Bibl. VIII. p. 535. *die Schnarre*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 160. n. 29. *Mistler*.

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 168. n. 1. *Turdus* (*Viscivorus*) dorso fusco, collo maculis albis, rostro flavescente.

Müller, Zool. dan. prodr. p. 29. n. 237. *Turdus* (*Viscivorus*) dorso fusco, collo maculis albis, rostro flavescente.

Kramer, Austr. p. 361. n. 6. *Turdus pedibus fuscis, alis subtus albis*, *Zaritzzer*; *Mistler*; *Zerrér*.

Charleton, onom. zoic. p. 83. n. 1. *Turdus viscivorus*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 359. *Turdus maximus*, *Schnarre*, *Schnerre*, *Mistler*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 423. *Turdus maximus*.

Sibbald, Scot. ill. p. 155. *Turdus viscivorus*.

Be'lon, hist. nat. des ois. p. 324. *Grive*, *Siferre*.

Jonston, av. p. 103. *Turdus viscivorus*.

Zinnan, Uov. p. 39. tab. 5. Fig. 21. *Tordo viscido*.

Heerkens, av. Fris. p. 193. *Turdus*. (cum reliq. specieb.)

Levin, britt. Birds, II. tab. 57.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 347. *der Ziemer*.

Donndorff, Natur u. Kunst, III. p. 520. *der Ziemer*.

2. PILARIS. *Der gemeine Krammetsvogel*. (10)

Müller, Natursyft. II. p. 528. n. 2. *die Wacholder-Drossel*.

Leske, Naturgesch. p. 256. n. 2. *der Ziemer*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 165. n. 2. *der Krammetsvogel*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 181. n. 2. *Turdus (Pilaris) rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano*; *der Krammetsvogel*.

Rech.

(10) Gewicht 4 Unzen. *Penn.* Die deutschen Benennungen, dieser, der vorhergehenden, ingl. der dritten und vierten Gattung, werden häufig verwechselt.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 501. n. 2. *die Wacholderdroffel*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 611. *die Wacholderdroffel*.

Funke, Naturgesch. I. p. 234. *der eigentliche Krammetsvogel*.

Ebert, Naturl. II. p. 127. *Wacholderdroffel*.

Halle, Vögel, p. 279. n. 234. *Kramsvogel*.

Meyer, Thiere, II. p. 18. tab. 65. *Kramtvoegel*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 385. n. 317. *der Krammetsvogel*; *Krambsvogel*; *Schömerling*; *Schacker*, etc.

Pennant, arch. Zool. II. p. 317. A. *der Ziemer*.

Beckmann, Naturhist. p. 52. b. *der Kramsvogel*.

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 725. *Krammetsvogel*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 630. *der Krammetsvogel*.

Handb. der Naturgesch. p. 78. *der Krametvogel*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 124. *der Krammetsvogel*.

Klein, av. p. 65. n. 2. *Turdus simpliciter*; *Turdus medius pilaris*.

Klein, Vorbereit. p. 123. n. 2. *Großziemer*; *Blauziemer*; *Wacholderdroffel*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 65. n. 2. *Krametvogel*.

Klein, Stemmat. av. p. 11. tab. 13. Fig. 4. a. b. c.

Gesner, Vögelb. p. 425. *Reckholdervogel*, fig. p. 427. gut.

Briffon, ornith. I. p. 217. n. 5. *Litorne ou Tourdelle*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 276. *der Ziemer oder Krammetsvogel*; m. e Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 339. *der Ziemer*.

Latham,

Latham, Vögel, II. I. p. 21. n. II. *die Wacholderdrossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 330. n. I. *Turdus* (Pilaris) fusco-rufescens, subtus nigricante varius, rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano.

Beseke, Vögel Curl. p. 73. n. 158. *die Wacholderdrossel.*

Siemsen, meklenb. Vögel, p. 89. n. 2. *der Schaker.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 410. *der Krammetsvogel.*

Fischer, ivl. p. 94. n. 134. *Krammetsvogel.*

Cetti, Sardin. II. p. 153. *der Ziemer.*

Boswell, Besch. von Corsic. p. 45. *die Drossel.*

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 3. *Krammetsvogel.*

Taube, Slavon. I. p. 22. *Krammetsvögel.*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. III. p. 13. *Drosseln.*

Pennant, Reis. d. Schottl. II. p. 17. *Wacholderdrosseln.*

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 2. *Kramsvogel.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 131. *Krametsfugl.*

Georgi, Reis. d. Russl. p. 173.

Pennant, brittisch. Thiergesch. p. 96. tab. 48.

Fig 2.

Borkhausen, Magazin, I. p. 160. n. 30.

Naturforsch. XVII. p. 81. n. 166. *die Wacholderdrossel.*

Schwed. Abhandl. XXVIII. p. 299. *Ziemer.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 308. *Wacholder-Drossel.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 53. *Krammets- oder Kramnabet Vogel.*

Naumann, Vogelfsteller, p. 85. *Ziemer, oder Krammetsvogel.*

Linné, Abhandl. II. p. 283. n. 39. *Krammetsvogel.*

Scopoli,

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 158. n. 194. *Krammetvogel*, *Zeumer*.

Anweis. Vögel zu fang. p. 349. *Kranwets. Vogel*.
Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 2. *der Ziemer*.

Loniceri, Kräuterb. p. 677. *Krametvogel*; *Zyimmer*.
Oekonom. Zool. p. 94. n. 3. *die Wacholderdrossel*.

Beckmann, Bibl. VIII. p. 535. *der Kramtsvogel*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 550. *Krammets Vogel*.
Krünitz, ökon. Encykl. XLVI. p. 758. *Krammetsvogel*.

André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 56. *Krammetsvogel*.

Schönfeld, Landwirthsch. p. 707.

Physik. oekonom. Zeit. 1785. II. p. 631.

Berlin. Intell. Blatt, 1784. n. 287. p. 2297.

Neues allgem. Harzmagaz. 1768. St. 5. p. 318.

Matthioli, epist. An Turdi salubre praebeant alimentum? Epist. medic. I. p. 55.

Zückert, Speis. aus dem Thierr. p. 95.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. *Turdus simpl.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 6. *Turdus pilaris*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 168. n. 2. *Turdus*
(*Pilaris*) rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 238. *Turdus*
(*Pilaris*) rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano.

Kramer, Austr. p. 361. n. 7. *Turdus rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite cano*; *Kranabetsvogel*; *Kranabeter*.

Charleton, onom. zoic. p. 83. n. 2. *Trichas*.

Schwenk-

Schwenkfeld, av. Siles. p. 359. *Turdus medius*;
Groß-Ziemer; *Blau-Ziemer*, *Krametvogel*.
Rzaczyusky, auct. hist. nat. Polon. p. 424. *Tur-*
dus pilaris.

Sibbald, Scot. p. 211. *Turdus pilaris*.

Jonston, av. p. 103. *Trichas*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. *Turdus pilaris*.

Hist. Prov. I. p. 492. *Grive*.

Voyage en Barbarie, p. 271. *Grive*.

Levin, britt. Birds, II. tab. 60.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 25. c. 42. c. 53. L. 17. c. 9.

Turdi.

Varro, de re rust. L. 3. c. 2. c. 5. *Turdi*.

Columella, de re rust. L. 8. c. 10. *Turdi*.

Palladius, de re rust. L. 1. c. 26. *Turdi*.

Helian. de nat. anim. L. 1. c. 35. Κίχλαι.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 1. n. 12. Κίχλαι.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 347. *der*
gemeine Krammetsvogel.

Donndorff, Natur und Kunst, III. p. 523. *der ge-*
meine Krammetsvogel.

β. *Der kleinere Krammetsvogel*.

γ. *Der bunte Krammetsvogel*.

Klein, av. p. 67. n. 10. *Turdus pilaris*, maculis
 lunatis variegatus.

Klein, Vorbereit. p. 127. n. 10. *die bunte Dros-*
sel mit mondförmigen Flecken.

Klein, verb. Vögelhist. p. 68. ad n. 16.

Briffon, ornith. I. p. 218. B. *Litorne tachetée*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 284. *der gefleckte Ziemer*.

Halle, Vögel, p. 291. n. 242. *der weißköpfi-*
ge Krammsvogel.

Latham, Syn. II. I. p. 25. n. II. A. — *Latham*,
 Vögel, II. I. p. 22. n. n. II. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 330. n. I. β. T. ni-
 gro maculatus, capite collo subtusque albo, gu-
 la

la pectoreque rufis, dorso fusco, uropygio cinereo.

δ. *Der weißköpfige Krammetsvogel.*

Briffon, ornith. I. p. 218. A. Litorne à tête blanche.

Büffon, Vögel, VIII. p. 284. *der weißköpfige Ziemer.*

Latham, Syn. II. I. p. 25. n. II. B.

Latham, Vögel, II. I. p. 22. n. II. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 330. n. II. γ. T. capite cerviceque albis corpore communi.

Naturforsch. I. p. 62. n. 4. *ein Krammetsvogel mit ganz weißem Kopfe.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 360. Turdus pilaris, λευκοκεφαλος.

ε. *Der Krammetsvogel mit weißem Kopf und Halse,*
etc.

Latham, Syn. II. I. p. 26. n. II. C.

Latham, Vögel, II. I. p. 22. n. II. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 330. n. II. δ. T. capite colloque albis, corpore albo maculis magnis nigricantibus.

14. AFRICANUS. *Die geränderte Drossel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 143. Margined Thrush.

Latham, Vögel, II. I. p. 81. n. 123. *die geränderte Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 362. n. 130. Turdus (Africanus) nigricans, pectore pennis nigris, rufo-marginatis, subtus rufo-flavus, pedibus cinereis.

29. TRIPOLITANUS. *Die olivenfarbige barbarische Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 175. *die olivenfarbene Amstel aus der Barbarey.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 21. n. 10. *die Tripolische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 329. n. 10. Turdus (Tripolitanus) olivaceo-flavus, subtus albidus, remigibus nigris, rectricibus nigricantibus, apice albis.

30. BARBARICUS. *Die grüne barbarische Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 306. *die kurzbeinichte Drossel aus der Barbarey.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 20. n. 9. *die Drossel aus der Barbarey.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 329. n. 9. Turdus (Barbaricus) virescens, pectore albo nigricante-maculato, uropygio caudaque apice luteis.

Shaw, Reif. p. 164. *die grüne Drossel.*

31. AONALASCHKAЕ. *Der Krammetsvogel von Unalaska.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 315. n. 118. *der Krammetsvogel von Unalaska.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 20. n. 8. *die Unalaskha-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 329. n. 8. Turdus (Aonalaschkæ) fuscus, obscure maculatus, pectore flavo, nigro maculato, uropygio caudaque apice luteis.

3. ILIACUS. *Die Weindrossel. (1)*

Müller, Natursyst. II. p. 530. n. 3. *die Zipdrossel.*

Leske, Naturgesch. p. 257. n. 3. *die Weindrossel; Zippe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 166. n. 4. *die Weindrossel, Weißdrossel, Zipdrossel.*

Blumen-

(1) Gewicht 2 1/4 Unze. Penn. Wird häufig mit Turdus Musicus verwechselt.

- Blumenbach*, Handb. d. N. G. p. 181. n. 3. *Turdus* (*Iliacus*) alis subtus ferrugineis, superciliis flavescentibus. *Rothdrossel*.
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 502. n. 4. *die Rothdrossel*.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 233. *die Weindrossel; Drossel*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 128. *die Zipdrossel*.
- Halle*, Vögel, p. 282. n. 235. *die Weißdrossel; Pfeifdrossel*.
- Meyr*, Thiere, II. p. 18. tab. 67. *Rothdrossel*.
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 391. n. 318. *die Buntdrossel; Winterdrossel; Heidedrossel; Walddrossel; Heideziemer, Rehemie*.
- Pennant*, arch. Zool. II. p. 319. D. *der rothsittige Krammetsvogel*.
- Onomat. hist. nat.* VII. p. 617. *die Rothdrossel*.
- Handb. der deutsch. Thiergesch.* p. 126. *Rothdrossel*.
- Klein*, av. p. 66. n. 3. *Turdus iliacus; Illas aut Tylas*.
- Klein*, Vorbereit. p. 124. n. 3. *Ziep-, Pfeifdrossel*.
- Klein*, verb Vögelhist. p. 65. n. 3. *Zipdrossel; Pfeifdrossel; Weißdrossel; Singdrossel*.
- Klein*, Stemm. av. p. 11. tab. 14. Fig. 6. a—c.
- Klein*, Vögeleyer, p. 23. tab. 9. Fig. 1.
- Gesner*, Vögelb. p. 432. *Winsel; Wintze; Bergtrostel; Boemerlein; Beemerziemar; Weintrostel; Rottrostel; Bitter; Gixerlein; Weingartvogel; m. e. Fig.*
- Briffon*, ornith. I. p. 216. n. 5. *Mauvis*.
- Büffon*, Vögel, VIII. p. 296. *die Rothdrossel; m. e. Fig.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 339. *die Rothdrossel*.
- Latham*, Vögel, II. 1. p. 19. n. 7. *die Rothdrossel*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 329. n. 7. *Turdus* (*Iliacus*) griseo - fuscus, subtus albidus, maculis fuscis, alis subtus ferrugineis, superciliis albicantibus.

Beseke, Vögel Kurl. p. 74. n. 159. *die Zipdrossel*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 90. n. 3. *die Rothdrossel; Zippdrossel*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 411. *die Weindrossel*.

Fischer, Livl. p. 94. n. 135. *Pfeifdrossel*.

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 2. p. 70. *Weißdrossel*.

Pennant, Reif. d. Schottl. II. p. 17. *Zipdrosseln*.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 97. tab. 48. fig. 6. *Rothdrossel*.

Linne, Abhandlung. II. p. 283. n. 39. p. 301. n. 117. *die Zipdrossel*.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 20. *Turdus Iliacus*.
Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 48. *Turdus Iliacus*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 313. *Rothdrossel; Weindrossel*.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 160. n. 196. *Rothdrossel; Winterdrossel*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 161. n. 31. *Weißdrossel*.

Naturforsch. XVII. p. 81. n. 167. *die Zipdrossel*.

Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 3. *die Weindrossel*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 54. *Zipp - Drossel*.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 266. *Rothdrossel*.

Krünitz, Encykl. IX. p. 642. *die Weiß - oder Ziepdrossel*.

Naumann, Vogelfsteller, p. 77. *Zippdrossel*.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 741. *Weindrossel*;
Gefangdrossel.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 96.

Anweis. Vögel zu fang. p. 163. *Rothdrossel*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. n. 7. *Turdus*
viscivorus.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 169. n. 4. *Turdus*
(*Musicus*) alis subtus ferrugineis, linea super-
ciliarum albicante.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 239. *Turdus*
(*Iliacus*) alis subtus ferrugineis, superciliis al-
bicantibus.

Kramer, Austr. p. 361. n. 9. *Turdus* alis subtus
ferrugineis, linea supra oculos albicante. *Roth-*
droschl; *Walddröschel*; *Winterdroschl*.

Charleton, onom. zoic. p. 83. n. 3. *Illas*, non-
nullis *Tyllas*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 361. *Turdus minor*;
Kleinziemer, *Heide-Drossel*; *Bergdrossel*;
Winsel; *Gixerle*.

Sibbald, Scot. p. 195. *Turdus Iliacus*.

Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 296. *Turdus minor*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 424. *Turdus*
Illas seu *Tylas*.

Jonston, av. p. 103. *Illas*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. *Turdus Iliacus*.

Levin, britt. Birds, II. tab. 59.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 348. n. 3.
die Weindrossel.

Donndorff, Natur u. Kunst, III. p. 529. *die Wein-*
drossel.

β. Die bunte *Weindrossel*. *

Frisch, Vögel, tab. 28. Fig. 2.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 611.

32. MINOR. *Die kleine Drossel.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 315. n. 117. *der kleine Krammetsvogel.*

Klein, av. p. 69. n. 23. *Turdus minimus.*

Klein, Vorbereit. p. 131. n. 23. *die kleinste Drossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 69. n. 24. *kleine carolinische Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 217. n. 4. *Mauvis de la Caroline.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 250. *die kleine karolinische Drossel; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 18. n. 5. *die kleine Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 328. n. 5. *Turdus (Minor) fusco-rufescens, corpore subtus maculis nigricantibus vario, gula, abdomine crisfoque albis.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 62. *die kleinste Drossel.*

33. JAMAICENSIS. *Die jamaicaische Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 17. n. 4. *die Jamaikaische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 329. n. 4. *Turdus (Jamaicensis) fusco-cinereus, subtus albus, gula iuguloque longitudinaliter fusco-striatis, pectore cinereo.*

34. GUIANENSIS. *Die guianische Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 248. *die guianische Drossel; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 17. n. 3. *Die Guianische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 328. n. 3. *Turdus (Guianensis) viridi-fuscus, subtus flavescens-albus, maculis longitudinalibus nigricantibus.*

4. MUSICUS. Die Singdrossel. (2)

Müller, Natursyst. II. p. 530. n. 4. die Singdrossel.

Leske, Naturgesch. p. 257. n. 4. die Singdrossel.

Borowsky, Thierreich, III. p. 67. n. 5. die Singdrossel; Winddrossel.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 181. n. 4. Turdus (Musicus) remigibus basi interiore ferrugineis.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 501. n. 3. die Singdrossel; Zipdrossel.

Funke, Naturgesch. I. p. 233. die Singdrossel.

Ebert, Naturl. II. p. 128. Singdrossel; kleine Misteldrossel; Rothdrossel.

Halle, Vögel, p. 283. n. 236. die Gesangdrossel.

Meyer, Thiere, II. p. 18. tab. 66. Weißdrossel.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 390. n. 319. die Sangdrossel; Sommerdrossel.

Pennant, arch. Zool. II. p. 318. C. die Singdrossel.

Onomat. hist. nat. VII. p. 624. Weißdrossel; Singdrossel; Zippe.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 125. Zippe; Pfeisdrossel.

Klein, av. p. 66. n. 4. Turdus minimus, nostras.

Klein, Vorbereit. p. 124. n. 4. Sangdrossel; weinrothe Drossel.

Klein, verb. Vögelhist. p. 66. n. 4. Weindrossel; rothe Drossel; Sangdrossel.

Klein, Stemmat. av. p. 11. tab. 14. Fig. 7. a—c. d.

Gesner, Vögelb. p. 433. Trostel; Droschel; Drossel; Durstel; Sangdruschel; Weißtrostel.

Brissou, ornith. I. p. 214. n. 2. petite Grive.

Büffon, Vögel, VIII. p. 227. die Weißdrossel; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 338. Weißdrossel.

Latham, Syn. Suppl. p. 139. Mavis. Throstle; Songthrush.

R. 4

Latham,

(2) Gewicht 3 Unzen. Penn.

- Latham*, Vögel, II. 1. p. 15. n. 2. *die Singdroffel*.
Latham, Syst. ornith. I. p. 327. n. 2. *Turdus*
 (Musicus) supra griseo-fuscus, subtus albo-
 rufescens, maculis nigricantibus varius, remi-
 gibus basi interiore ferrugineis.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 74. n. 160. *die Singdroffel*.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 91. n. 4. *Sangdrof-
 sel; Graagdroffel; Wiendroffel*.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 414. *die Sing-
 droffel*.
- Fischer*, Livl. p. 94. n. 136. *Singdroffel*.
White, N. G. von Engl. p. 63. n. 2. p. 66. n. 2.
 p. 70. *Singdroffel*.
- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 20. *Turdus musicus*.
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 3. *Taletrost*.
Olassen, Reif. d. Isl. I. p. 310. *Thröstr; Skogar-
 thröstur*.
- Borkhausen*, Magazin, I. p. 162. n. 32. *Singdroffel*.
Günther, Nest. u. Ey. tab. 33. *Weißdroffel*.
Linne', Abhandl. II. p. 283. n. 39. *Weindroffeln*.
Naturforsch. XVII. p. 82. n. 168. *die Singdroffel*.
Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 48. *Turdus musicus*.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 159. n. 195. *Weiß-
 droffel, oder Zippe*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 306. *die eigentlich soge-
 nannte Droschel; Sang-, oder Weiß-Droschel*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 55. *Weindroffel, Pfeiff-
 droffel*.
- Anweif.* Vögel zu fang. p. 163. *Weißdroffel*.
Meidinger, Vorl. I. p. 147. n. 4. *Singdroffel*.
Krinitz, Eneykl. IX. p. 643. *Rothdroffel; Berg-
 droffel; Winterdroffel*.
- André u. Bechstin*, Spazierg. II. p. 196.
Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 240. *Turdus*
 (Musicus) remigibus basi inferiore ferrugi-
 neis.

Kramer, Austr. p. 361. n. 8. Turdus alis subtus ochreis. *Weindroschl*; *Weißdroschl*; *Sommerdroschl*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 361. Turdus musicus. *Sangdrossel*; *Zierdrossel*.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Polon. p. 424. Turdus musicus.

Belon, ois. p. 226. petite grive.

Jonston, av. p. 104. Turdus simpliciter dictus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. Turdus iliacus.

Schaefer, element. ornithol. tab. 68.

Zinnan. Uov. p. 37. tab. 5. fig. 20. Tordello.

Levin, britt. Birds. II. tab. 58.

Russel, Alepp. p. 65.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 348. n. 4. *die Singdrossel*.

Donndorff, Natur und Kunst, III. p. 531. *die Singdrossel*.

β. *Die weißköpfige Singdrossel*.

Briffon, ornithol. I. p. 215. A. petite grive à tête blanche.

Büffon, Vögel, VIII. p. 239. *Weißdrossel mit weißer Kopfplatte*.

Aldrovand. ornithol. II. p. 601.

Jonston, av. p. 103. Turdus leucocephalus.

γ. *Die gehäubte Singdrossel*.

Briffon, ornith. I. p. 215. B. petite grive hupée.

Büffon, Vögel, VIII. p. 240. *die gehäubte Drossel des Schwenkfeld*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 362. Turdus musicus cristatus. *Kobeldrossel*.

Latham, Vögel, II. I. p. 17. n. 6. *die Singdrossel mit dem Federbusch*.

d. *Die weiße Singdroffel.*

Buffon, Vögel, VIII. p. 239. *die weiße Gesangdroffel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 68. n. 17. *weiße Droffel.*

Frisch, Vögel, tab. 33. *zweyerley weiße Droffeln.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 615.

Naturforscher, I. p. 62. n. 5.

e. *Die Singdroffel mit weißem Halsringe. **

Frisch, Vögel, tab. 27. fig. 2.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 611.

f. *Die graue Singdroffel. **

Latham, Vögel, II. 1. p. 17. n. 5.

5. OLIVACEUS. *Die olivenfarbige afrikanische Droffel.*

Müller, Natursystem, II. p. 531. n. 5. *Olivendroffel.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 626. *die olivenfarbige Droffel.*

Briffon, ornithol. I. p. 240. n. 43. *Merle olive du Cap de bonne esperance.*

Buffon, Vögel, IX. p. 133. *die olivenfarbige capische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 60. n. 80. *die olivenfarbige Droffel.*

Latham, Syn. II. 1. p. 66. n. 80. *Olive Thrush.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 351. n. 88. *Turdus (Olivaceus) fusco-olivaceus, subtus fulvus, remigibus rectricibusque lateralibus intus fuscis.*

35. INDICUS. *Die olivenfarbige indianische Droffel.*

Briffon, ornith. I. p. 241. n. 45. *Merle olive des Indes.*

Buffon,

Büffon, Vögel, IX. p. 138. *die olivenfarbige indische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 61. n. 81. *die Indische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 351. n. 89. *Turdus* (Indicus) viridi-olivaceus, remigibus intus fuscis, extus flavescentibus.

36. CINEREUS. *Die aschgraue indianische Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 237. n. 39. *Merle cendrée des Indes.*

Büffon, Vögel, IX. p. 139. *die aschfarbige indische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 61. n. 82. *die aschfarbige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 352. n. 90. *Turdus* (Cinereus) cinereo-nigricans, subtus dilutior, tectricibus alarum maioribus, remigibus, rectricibusque lateralibus nigris.

6. MIGRATORIUS. *Die Wanderdrossel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 531. n. 6. *die Wanderdrossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 312. n. 112. *der Krametsvogel mit der rothen Brust.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 623. *die Zug- oder Wanderdrossel.*

Klein, av. p. 68. n. 17. *Turdus musicus Carolinensis.*

Klein, Vorbereit. p. 129. n. 17. *Karolinische Sangdrossel.*

Briffon, ornithol. I. p. 220. n. 9. *Grive de Canada.*

Büffon, Vögel, IX. p. 292. *der canadische Ziemer; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 23. n. 12. *die Wanderdrossel.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 330. n. 12. *Turdus* (Migratorius) griseus abdomine rufo, palpebris albis, rectrice extima interiore alba.

Seligmann, Vögel, II. tab. 58. die carolinische Strichdrossel.

Kalm, Reif. n. d. nördl. Amer. p. 58.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 349. n. 5. die Wanderdrossel.

7. *TRICHAS*. Die gelbbrüstige Drossel.

Müller, Naturfyst. II. p. 531. n. 7. die maryländische Drossel.

Pennant, arct. Zool. II. p. 371. n. 200. der Sänger mit der gelben Brust.

Pennant, arct. Zool. II. p. 371. n. 201. der Sänger mit orangegelben Schenkeln.

Onomat. hist. nat. III. p. 901. die marilandische Bachstelze mit gelber Kehle.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 166. n. 1. Gelbbrüstchen aus Maryland.

Briffon, ornithol. I. p. 448. n. 58. Figuier de Maryland.

Büffon, Vögel, XVI. p. 106. der schwarzbakkige Feigenesser.

Martini, Naturlex. V. p. 122. marylandische Bachstelze.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 519. n. 36. *Sylvia* (Trichas) olivacea, corpore subtus flavo, fascia oculari nigra.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 25. das Gelbkehlchen aus Maryland.

8. *CANORUS*. Der bengalische Banjahbu. (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 532. n. 8. die bengalische Merle.

Halle,

(3) Ist, nach *Latham*, mit *Lanius Faustus*, p. 311. n. 26. einerley.

Halle, Vögel, p. 500. n. 264. *die gelbfüßige braune bengalische Drossel.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 407. n. 23. *braungelbe Misteldrossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 614. *die Amsel oder Drossel von Bengala.*

Klein, av. p. 70. n. 30. Turdus bengalensis.

Klein, Vorbereitung. p. 132. n. 30. *braungelber Mistler.*

Klein, verbeß. Vögelhistor. p. 69. n. 30. *braungelber Mistler; Baniahbow.*

Briffon, ornithol. I. p. 230. n. 25. *Merle de Bengale.*

Büffon, Vögel, IX. p. 124. *der bengalische Banjahbu; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 32. n. 32. *die Schreydrossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 336. n. 34. Turdus (Canorus) griseus, subtus ferrugineus, linea alba pone oculos, cauda rotundata.

Seligmann, Vögel, VI. tab. 79. *die braune indische Drossel.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 169. n. 5. Turdus (Canorus) griseus, subtus ferrugineus, linea alba ad latera capitis, cauda rotundata.

Hermann, tab. affin. anim. p. 211. Turdus Canorus.

9. RUFUS. *Die rostfarbige Drossel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 532. *der rothe Krammetsvogel.*

Halle, Vögel, p. 296. n. 253. *die fuchsfarbene große Gesangdrossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 634. *die rothe Drossel.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 312. n. III. *der rostfarbige Krammetsvogel.*

Klein,

Klein, av. p. 69. n. 19. *Turdus rufus*.

Klein, Vorbereit. p. 130. n. 19. *rosthige Drossel*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 68. n. 20. *rosthige Drossel*.

Brissou, ornithol. I. p. 220. n. 8. Grive de la Caroline.

Büffon, Vögel, VIII. p. 334. *die Spottedrossel der Franzosen*.

Batsch, Thiere, I. p. 340. *die französische Spottedrossel*.

Latham, Vögel, II. I. p. 36. n. 4. *die rostfarbige Drossel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 338. n. 4. *Turdus* (Rufus) ferrugineus, subtus dilutior maculatus, remigibus unicoloribus, cauda rotundata, rectricibus rufis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 56. *die fuchsfärbige Drossel*.

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 169. n. 6. *Turdus* (Rufus) ferrugineus, subtus dilutior maculatus, remigibus unicoloribus, cauda rotundata.

10. POLYGLOTTUS. *Die amerikanische Nachtigall.*

Müller, Naturyst. II. p. 532. n. 10. *der Melodist*.

Leske, Naturgesch. p. 257. n. 5. *der vielstimmige Krammetsvogel*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 168. n. 6. *die Spottedrossel*.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 181. n. 5. *Turdus* (Polyglottus) fusco-cinereus, subtus albidus, maculis verticis, alarum et caudae candidis; *die amerikanische Nachtigall*; *Sinsonte*.

Halle, Vögel, p. 297. n. 255. *die graue langschwänzige Spottedrossel*; *Vielzungige Drossel*; *Vierhundertzunge*.

Gatterer,

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 393. n. 320. *Spottdroffel*; *Spötter*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 310. n. 110. *der Spötter*; *Cenicotlatolli*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 632. *die größere Spott-droffel*.

Klein, av. p. 69. n. 21. *Turdus minor cinereo-albus, immaculatus*.

Klein, Vorbereit. p. 130. n. 21. *graue langschwänzige Droffel*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 68. n. 22. *graue langgeschwänzte Droffel*.

Briffon, ornithol. I. p. 232. n. 29. *grand Moqueur*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 322. *die große Spott-droffel des Briffon*, p. 327. *die Spottdroffel*; m. e. Fig.

Büffon, Vögel, VIII. p. 334. *der Spötter des Catesby*.

Batsch, Thiere, I. p. 340. *die eigentliche Spott-droffel*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 36. n. 42. *die Spott-droffel, oder der Spottvogel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 339. n. 45. *Turdus (Polyglottus) obscure cinereus, subtus pallido-cinereus, remigibus primoribus exteriore dimidio albis*.

Seligmann, Vögel, II. tab. 54. *graue langschwänzige Droffel*.

Kalm, Reis. n. d. nördl. Amer. p. 361.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 169. n. 7. *Turdus (Polyglottus) obscure cinereus, subtus pallide cinereus, macula alarum albida*.

Charleton, onom. zoic. p. 68. n. 3. *Mimus, five Picus garrulus Indicus*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 242. Turdus Polyglottus.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 349. n. 6. die amerikanische Nachtigall.

II. ORPHEUS. Der Spottvogel.

Müller, Naturyst. II. p. 533. n. 11. der Sänger. Onomat. hist. nat. VII. p. 628. die kleine Spottdroffel.

Klein, av. p. 80. n. 27. Sylvia inferne ex albo cinerea, superne ex terreo colore cinerascens, genis albis; alis fusco et albo variis, rostro pedibusque nigricantibus.

Klein, Vorbereit. p. 151. n. 27. bunter Wenzel.

Klein, verb. Vögelhist. p. 81. n. 30. Weißschmuzziger Wenzel mit weißen Backen.

Briffon, ornith. I. p. 231. n. 27. Moqueur.

Büffon, Vögel, VIII. p. 320. Briffons Spottvogel, p. 321. Cencontlatolli.

Büffon, Vögel, VIII. p. 336. der Spötter des Edwards.

Latham, Vögel, II. 1. p. 37. n. 43. der Orpheus.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 339. n. 47. Turdus (Orpheus) dorso fusco, pectore rectricibusque lateribus albidis, superciliis albis.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 51. der kleinere Spötter.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 169. n. 8. Turdus (Orpheus) dorso fusco, pectore rectricibusque lateralibus albidis, alis fascia alba.

Charleton, onomast. zoic. p. 114. n. 17. Polyglotta.

Jonston, av. p. 177. Polyglotta.

β. Der bunte Spottvogel. (+)

Briffon, ornith. I. p. 232. n. 28. Moqueur varié.

Büffon,

(4) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Buffon, Vögel, VIII. p. 321. *der Tzonpan*. p. 318.
die bunte *Spottdrossel*.

Latham, Syn. II. I. p. 41. — *Latham*, Vögel,
II. I. p. 38. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 340. n. 47. β. T. gri-
feo-fuscus, nigro et candenti varius, subtus
albus, cinereo et nigro maculatus.

Nieremberg, hist. nat. L. 10. c. 77. *Tzonpan*.

γ. *Der Thenca*. (5)

Latham, Syst. ornithol. I. p. 339. n. 46. *Turdus*
(*Thenca*) fusco cinereus, subtus pallido-cine-
reus, remigibus rectricibusque apice albis.

Vidaure, Chil. p. 74. *der Trenca*.

37. *SANDWICHENSIS*. *Die Drossel von den Sand-
wichinseln*.

Latham, Vögel, II. I. p. 35. n. 40. die *Sandwi-
chische Drossel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 338. n. 42. *Turdus*
(*Sandvicensis*) pallide fuscus, subtus cum inci-
pente cinereo-albus, abdomine fuscescente.

38. *PACIFICUS*. *Die Drossel von den Freundschafts-
inseln*.

Latham, Vögel, II. I. p. 35. n. 39. die *Drossel*
vom stillen Meere.

Latham, Syst. ornith. I. p. 338. n. 41. *Turdus*
(*Pacificus*) cinereus, corpore subtus genisque
fuscescente-albis, loris obscuris, cauda nigra
apice alba.

39. *SURATENSIS*. *Die Drossel von Surate*.

Latham, Vögel, II. I. p. 35. n. 38. die *Suratische*
Drossel.

Latham,

(5) Ich weiß nicht, warum *Latham* den Vogel als eine eigne
Gattung aufstellt, da *Molina* ihn selbst nur für eine Spielart
ausgiebt.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 338. n. 40. *Turdus* (Suratensis) capite cristato colloque nigris, sub-
tus griseus, dorso uropygioque flavescens;
alis viridibus nitentibus, remigibus primoribus
caudaque nigris.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 151. *die*
Ansel von Surate.

40. PHILIPPENSIS. *Die philippinische Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 311. *die kleine philippini-*
sche Drossel.

Latham, Vögel, II. I. p. 35. n. 37. *die Philippi-*
nische Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 338. n. 39. *Turdus*
(Philippensis) olivaceo-fuscus, collo pectore-
que rufis, albo-maculatis, abdomine flavescen-
te-albo.

41. SHANHU. *Der Schonhu.*

Latham, Vögel, II. I. p. 34. n. 36. *die Schonhu-*
Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 337. n. 38. *Turdus*
(Shanhu) viridi-fuscus, capite, collo inferiore,
pectore abdomineque griseis, orbitis, gula iu-
guloque nigris, macula aurium alba.

42. NOVAE HOLLANDIAE. *Die neuholländische*
Drossel.

Latham, Vögel, II. I. p. 34. n. 35. *die Neuhollän-*
dische Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 337. n. 36. *Turdus*
(Novae Hollandiae) caerulescente-plumbeus,
facie, gula iuguloque nigris, remigibus nigri-
cantibus, rectricibus lateralibus apice albis.

12. PLUMBEUS. *Der Thili.*

Müller, Naturfyst. II. p. 533. n. 12. *die bleysfarbige*
Drossel.

Halle,

Halle, Vögel, p. 298. n. 256. *die schwarzblaue geschlanke Drossel; mit hellrothen Schenkeln.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 631. *die bleyfärbige Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 314 n. 116 *der Tilly.*
Klein, av. p. 69. n. 22. *Turdus viscivorus plumbeus.*

Klein, Vorbereit. p. 130. n. 22 *die bleyfarbige Drossel mit rothen Reinen.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 68. n. 23. *Hochschwanz mit rothen Füßen.*

Briffon, ornithol. I. p. 238. n. 40. *Merle cendré d'Amerique.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 308 *der Tilly, oder die aschgraue amerikanische Drossel; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 31. n. 29. *die rothbeinige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 334. n. 29. *Turdus (Plumbeus) ater, axillis luteis, cauda cuneata. (Mas).*

Seligmann, Vögel, II. tab. 60. *die Drossel mit rothen Füßen.*

Vidaure, Chil. p. 76. *der Thile. oder Chile.*

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 169. n. 9. *Turdus (Plumbeus) caeruleus, gula atra.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 350. n. 7 *der Thili.*

β. Latham, Syst. ornithol. I. p. 334. n. 29. β. T. *caeruleus, gula atro-punctata, cauda cuneata, rectricibus quatuor exterioribus apice albis. (Femina).*

43. CRASSIROSTRIS. *Die dickschnäblige Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 31. n. 30. *die dickschnäblige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 335. n. 30. *Turdus* (*Craffirostris*) rufo-fuscus, subtus cinereus, pennis longitudinaliter medio striatis, rectricibus lateralibus obscure rufis.

44. *ULIETENSIS. Die Drossel von Ulieta.*

Latham, Vögel, II. I. p. 32. n. 31. *die rothbraune Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 335. n. 31. *Turdus* (*Ulietensis*) rufo-fuscus, alis, cauda rotundata pedibusque nigricantibus, rostro incarnato.

45. *PALLIDUS. Die graugelbe Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 28. n. 27. *die blasse Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 334. n. 27. *Turdus* (*Pallidus*) corpore flavescente-cinereo, subtus albido, collo lutescente, rectricibus fusco-cinereis, extimis apice albis.

46. *SIBIRICUS. Die sibirische Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 342. *die Sibirische Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 28. n. 26. *die Sibirische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 333. n. 26. *Turdus* (*Sibiricus*) niger superciliis, alis subtus crissoque albis.

Pallas, Reif. Ausz. III. Anh. p. 5. n. 10. *Turdus sibiricus.*

47. *RUFICOLLIS. Die rothhälfige Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 341. *die rothhälfigte Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 28. n. 25. *die rothhälfige Drossel.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 333. n. 25. Turdus (Ruficollis) corpore supra fusco, subtus albo, collo rectricibusque lateralibus rufis.

Pallas, Reif. Ausz. III. Anh. p. 5. n. 9. Turdus ruficollis.

48. OBSCURUS. *Die dunkelbraune Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 27. n. 24. *die dunkle Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 333. n. 24. Turdus (Obscurus) corpore fusco, pectore nigricante, superciliis, gula crissoque albis.

49. PHOENICURUS. *Die rothschwänzige Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 27. n. 23. *die rothschwänzige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 333. n. 23. Turdus (Phoenicurus) viridi-olivaceus, fascia per oculos nigra, superciliis albis, collo inferiore, pectore rectricibusque lateralibus rufis.

50. RUFICAUDUS. *Die gelbrothschwänzige Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 27. n. 42. *die gelbrothschwänzige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 333. n. 22. Tetrao (Ruficaudus) olivaceo-fuscus, subtus purpureo albus, rectricibus lateralibus a basi ad medium rufis.

51. MALABARICUS. *Die malabarische Drossel. (6)*

Latham, Syn. Suppl. p. 140. Malabar Thrush.

Latham, Vögel, II. I. p. 26. n. 21. *die Malabarische Drossel.*

S 3

Latham,

(6) *Latham* hält ihn für das Weibchen von der folgenden Gattung. Die Trivialbenennung *Malabaricus* kommt im System p. 837. n. 125. nochmals vor.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 333. n. 21. Turdus (Malabaricus) cinereo - fuscus, subtus rufo-fuscus, capite colloque albo lineatis.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 152. der grise Eisevogel von der Küste Malabar.

52. PAGODARUM. Die Bramanendrossel.

Latham, Syn. Suppl. p. 140. Pagoda Thrush.

Latham, Vögel, II. I. p. 26. n. 20. die Pagoden-Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 20. Turdus (Pagodarum) cristatus griseus, capite, corpore subtus, remigibus caudaque nigris, abdomine albo lineato, crisso albo.

Sonnerat, Reif. nach Ostind. und Chin. II. p. 148. der Bramanen-Eisevogel.

53. CAYENNENSIS. Die aschgraue cayennische Drossel.

Büffon, Vögel, VIII. p. 291. der cayennische Ziemer.

Latham, Vögel, II. I. p. 25. n. 19. die Cayennische Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 19. Turdus (Cayanus) cinereus, subtus albus, pennis medio nigricantibus, gula nigricante, alis nigris tectricibus maioribus ferrugineo-marginatis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. Turdus cayannensis.

54. VARIEGATUS. Die schwarz und weißbunte Drossel.

Latham, Vögel, II. I. p. 25. n. 18. die bunte Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 18. Turdus (Variegatus) albescente nigroque variegatus, corpore supra fusco, subtus albescente.

Fermin,

Fermin, Surin. II. p. 169. die zwote Art von Drosseln.

55. STRIATUS. Die gelbrückige Drossel.

Latham, Vögel, II. I. p. 25. n. 17. die gelbrückige Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 17. Turdus (Striatus) flavo griseoque variegatus, stria dorso longitudinali flava.

Fermin, Surin. II. p. 168. die erste Art von Drosseln.

56. FUSCUS. Die braune Drossel.

Pennant, arch. Zool. II. p. 314. n. 15. der braune Krammetsvogel.

Latham, Vögel, II. I. p. 25. n. 16. die braune Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 16. Turdus (Fuscus) olivaceo-fuscus, pectore abdomineque albescentibus, maculis nigris fuscis.

57. MUSTELINUS. Die lohgelbe Drossel.

Pennant, arch. Zool. II. p. 314. n. 114. der hellbraune Krammetsvogel.

Latham, Vögel, II. I. p. 24. n. 15. die lohgelbe Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 331. n. 15. Turdus (Mustelinus) rufo-fuscus, subtus albus maculis nigris, genis albo maculatis, uropygio, remigibus caudaque fuscis.

58. CAMTSCHATKENSIS. Die kamtschatkische Drossel. (?)

Pennant, arch. Zool. II. p. 319. E. der Kamtschatkische Krammetsvogel.

S 4

Latham,

(7) Ist, nach *Latham*, mit *Motacilla Calliope* p. 977. n. 129. einverleget.

Latham, Vögel, II. 1. p. 24. n. 14. *die Kamtschatkische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 331. n. 14. Turdus (Calliope) fusco ferrugineus, subtus flavescens albus, gula cinnabrina, albo nigroque marginata, loris nigris, superciliis albis.

59. NAEVIUS. *Die gefleckte Drossel.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 314. n. 113. *der bunte Krammetsvogel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 23. *die gefleckte Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 331. n. 13. Turdus (Naevius) obscurus cinereus, pileo nigricante, fascia pone oculos corporeque subtus ferrugineis, tectricibus alarum remigibusque ferrugineo maculatis, pectore fascia nigra.

60. HUDSONIUS. *Die hudsonische Drossel.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 316. n. 120. *der Krammetsvogel von der Hudsons Bay.*

Latham, Syn. Suppl. p. 143. Hudsonian Thrush.

Latham, Vögel, II. 1. p. 81. n. 124. *die Hudsonische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 362. n. 131. Turdus (Hudsonius) caeruleo-cinereus, vertice, nucha, tectricibus alarum uropygioque pallide-castaneo marginatis, cauda cinerea rotundata.

61. NOVEBORACENSIS. *Die newyorkische Drossel.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 316. n. 121. *der Krammetsvogel von Newyork.*

Latham, Syn. Suppl. p. 144. New-York Thrush.

Latham, Vögel, II. 1. p. 81. n. 125. *die Newyorkische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 362. n. 132. Turdus (Noveboracensis) nigro subferrugineoque nebulosus, subtus nigricans, remigibus caudaque nigris

nigris viridi-nitentibus, supra et infra oculos
vitta nigra.

62. CURAEUS. *Der Cureu.*

Molina, Chil. p. 223. *der Cureu.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 83. n. 131. *die Chilefische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 342. n. 53. *Turdus* (Curaeus) ater nitens, rostro substriato, cauda cuneiformi.

Vidaure, Beschr. von Chile, p. 75. *der Kereu.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 350. n. 8. *der Cureu.*

13. NITENS. *Die grüne angolische Drossel.*

Müller, Natursyft. II. p. 534. n. 13. *die grüne Drossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 622. *die grüne Amsel aus Angola.*

Briffon, ornith. I. p. 244. n. 53. *Merle vert d'Angola.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 53. n. 60. *die Glanz-drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 346. n. 66. *Turdus* (Nitens) viridis, macula tectricum alarum violacea nitida.

β. *Buffon*, Vögel, IX. p. 114. *die angolische grüne Amsel*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 56. A. — Suppl. p. 143. — Vögel, p. 53. n. 60. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 347. n. 66. β. T. olivaceo-nitens, caeruleo violaceoque splendens, alis maculis nigricantibus.

Edw. tab. 300. Blue and green Daw?

63. AENEUS. *Die Schillerdrossel.*

Briffon, ornith. I. p. 245. n. 54. Merle verd à longue queue du Senegal.

Büffon, Vögel, IX. p. 109. die goldgrüne senegalische Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 53. n. 61. die Schillerdrossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 347. n. 67. Turdus (Aeneus) viridis nitens, capite nigro aureo, abdomine cupreo, uropygio rectricibusque duabus intermediis purpureo splendentibus, cauda longissima cuneiformi.

64. AURATUS. *Die Golddrossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 116. die violette guianische Amsel; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 54. n. 62. die Golddrossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 347. n. 68. Turdus (Auratus) viridis auratus, capite, collo corporeque subtus violaceis; cauda fasciaque alarum caeruleis.

65. LEUCOGASTER. *Die weißbäuchige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 169. die violette weißbäuchige afrikanische Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 54. n. 64. die weißbäuchige Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 348. n. 71. Turdus (Leucogaster) violaceus, abdomine albo, remigibus nigricantibus.

15. ROSEUS. *Die rosenfarbige Drossel, (*)*

Müller, Naturfyft. II. p. 534. n. 15. die rosenfarbige Drossel.

Borows-

(*) Kommt in großer Zahl in die Gegend von Aleppo im Julius und August, wo sie die Schwärme von Heuschrecken verfolgt, und

Borowsky, Thierreich, III. p. 163. n. 1. *die Ackerdrossel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 504. n. 9. *die rosenfarbige Drossel.*

Halle, Vögel, p. 301. n. 267. *die rosenfarbige Ackerdrossel, mit liegendem Federbusche; Seeaar.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 320. *G der rosenrothe Krammetsvogel (Heuschreckenvogel.)*

Onomat. hist. nat. VII. p. 633. *die rosenfarbige Drossel.*

Klein, av. p. 71. n. 37. *Turdus roseus, capite ex nigro caeruleo, et cirro retro compto, alis et cauda nigris; rostro ultra dimidium lutescente.*

Klein, Vorbereit. p. 134. n. 37. *rosenfarbige Drossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 70. n. 35. *haarzopfige Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 228. n. 20. *Merle couleur de rose.*

Büffon, Vögel, IX. p. 55. *die rosenfarbige Amsel; m. e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 341. *die rosenfarbige Amsel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 142. *Rose-coloured Thrush.*

Latham, Vögel, II. I. p. 46. n. 52. *die rosenfarbige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 344. n. 59. *Turdus (Roseus) subincarnatus, capite, alis caudaque nigris, occipite cristato.*

Seligmann, Vögel, I. tab. 39. *die rosenrothe oder fleischfarbene Amsel des Aldrovandi.*

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 415. *die rosenfarbige Bruch-Weidendrossel.*

Lep-

und vertilgt, daher dieser Vogel von den Türken für heilig gehalten wird. In England ist er nur selten.

Lepechin, Tageb. d. russ. Reif. I. p. 267. *die rosenfarbenen Drosseln.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 23. *die rosenfarbene Drossel.*

Linne, Abhandl. II. p. 301. n. 116. *die rosenfarbene Drossel.*

Gmelin, Reif. d. Russl. I. p. 153.

Wirsing, Vög. tab. 1. *turdus asiaticus.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 156. n. 191. *die rosenfarbene Drossel.*

Martini, Naturlex. I. p. 219. tab. 14. *Ackerdrossel.*

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 170. n. 1. *Turdus (Roseus) subincarnatus, capite, alis caudaque nigris, occipite cristato.*

Charleton, onom. zoic. p. 84. n. 5. *Merula rosea.*

Jonston, av. p. 107. *Merula rosea.*

Brückmann, epist. itin. p. 161. *avis incognita.*

Forskål, fn. orient. p. VI. n. 16. *Turdus Seleucis; Grylli-vora. Arab. Samarmar.*

Forskål, descript. anim. p. 5. n. 16. *Turdus (Seleucis) rostro pedibusque flavicantibus; abdomine dorsoque incarnatis, cauda, alis femoribusque fuscis.*

Russel, Alepp. p. 70. *Locust bird. (Heuschrecken-vogel.)*

Levin, britt. bird. II. tab. 64.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. *Turdus roseus.*

66. LEUCURUS. *Die weißschwänzige Drossel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 142. *White-tailed Thrush.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 46. n. 51. *die weißschwänzige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 344. n. 58. *Turdus (Leucurus) niger, uropygio, femoribus caudaque a basi fere ad apicem albis.*

Faun. arragon. p. 72. Corvus totus niger, rectricibus basi albis?

16. CAFER. *Die caffersche Drossel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 534. n. 16. *die cafrische Drossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 613. *die gehaubte Amsel vom Vorgeb. d. g. H.*

Briffon, ornithol. I. p. 229. n. 23. Merle hupé du Cap de bonne esperance.

Büffon, Vögel, IX. p. 151. *die gehaubte Amsel; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 65. n. 92. *die Capsche Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 354. n. 99. Turdus (Caffer) nigricans subcristatus, capite nigro-violaceo, uropygio ventreque albis, crisso rubro.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 154. *die schwarzköpfige Grasmücke aus China.*

β. Latham, Syn. II. 1. p. 72. n. 92. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 66. n. 92. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 354. n. 16. β. T. fusco-cinereus, fusco lineatus, subtus cinereo-albus, capite nigro, crisso coccineo rectricibus tribus lateralibus apice albis.

67. MACROURUS. *Die langschwänzige Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 66. n. 93. *die langschwänzige Drossel.* Tab. 40.

Latham, Syst. ornith. I. p. 354. n. 100. Turdus (Macrourus) nigro-caeruleus, ventre rufo, uropygio rectricibusque tribus extimis albis.

β. Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 153. *die langgeschwänzte Grasmücke aus Gingi.* — Latham, Vögel, II. 1. p. 66. ad n. 93.

68. AMBOINENSIS. *Die amboinische Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 226. n. 16. Merle d'Amboine.

Büffon, Vögel, IX. p. 153. *die amboinische Ansel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 66. n. 94. *die Amboinische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 354. n. 101. Turdus (Amboinensis) fusco-rubescens, corpore subtus remigibusque minoribus prima medietate flavescentibus, rectricibus subtus auris.

69. BORBONICUS. *Die bourbonische Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 239. n. 42. Merle de l'Isle de Bourbon.

Büffon, Vögel, IX. p. 154. *die Ansel von Bourbon.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 67. n. 95. *die Bourbonische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 355. n. 102. Turdus (Borbonicus) cinereo-olivaceus, subtus flavicans, vertice nigro, rectricibus fuscis, fasciis duabus saturatoribus.

70. OCHROCEPHALUS. *Die gelbköpfige Drossel.* (8)

Latham, Syn. Suppl. p. 143. Yellow-crowned Thrush.

Latham, Vögel, II. 1. p. 67. n. 96 *die gelbköpfige Drossel.* (Tfut-ju-Craven, in Java)

Latham, Syst. ornith. I. p. 355. n. 103. Turdus (Ochrocephalus) pileo genisque flavis, corpore subtus cinereo, remigibus rectricibusque obscure viridibus, sub genis striga alba.

71. ORIENTALIS. *Die schwarze indianische Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 227. n. 19. Merle des Indes.

Büffon,

(8) Ist, nach *Latham*, mit *Sturnus Ceylanicus*, p. 804. n. 11, ein-
nerley.

Büffon, Vögel, IX. p. 160. *der Terat - Bu'on, oder die indische Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 67. n. 97. *die Drossel mit dem aschgrauen Steiße.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 355. n. 104. Turdus (Orientalis) niger, subtus albus, uropygio cinereo, fascia per oculos nigra, rectricibus nigris, tribus extimis apice albis.

72. NIGERRIMUS. *Die Savigala.*

Briffon, ornith. I. p. 217. n. 18. Merle doré de Madagascar.

Büffon, Vögel, IX. p. 162. *die madagascarische Goldamsel, oder Savigala; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 68. n. 98. *die schwarzwangige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 105. Turdus (Savi-jala) splendide niger, marginibus penarum citrinis, gutture, remigibus, rectricibusque nigris.

73. HISPANIOLENSIS. *Die olivenfarbige domingische Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 240. n. 44. Merle olive de St. Domingue.

Büffon, Vögel, IX. p. 172. *die olivenfarbne Domingische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. 68. n. 99. *die Drossel von Hispaniola.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 106. Turdus (Hispaniolensis) olivaceus, subtus griseus, remigibus rectricibusque fuscis, extus violaceis.

ß. *Die olivenfarbige cayennische Drossel. **

Büffon, ois. III. p. 404. — Pl. enl. 558. 2. Merle olive de Cayenne.

Büffon, Vögel, IX. p. 173. *die olivenfarbige cayennische Amsel; m. e. Fig.*

Latham,

Latham, Syn. II. 1. p. 76. *

Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 106. β. T. olivaceus subtus griseo-albus, crisso flavescente, remigibus rectricibusque fuscis.

74. ALBIFRONS. *Die weißstirnige Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 64. n. 91. *die weißstirnige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 354. n. 98. Turdus (Albifrons) plumbeo nigricans, subtus obscure flavescens, sincipite macula alba.

β. Latham, Syn. II. 1. p. 71. n. 91. Var. A.

Latham, Syn. Suppl. p. 143. — Vögel, II. 1. p. 65. n. 91. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 98. β. T. niger, corpore subtus lateribusque sincipitis utrinque macula albis.

17. CAPENSIS. *Die capsche Drossel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 535. n. 17. *die capsche Drossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 614. *die braune Amsel vom Vorgeb. d. g. H.*

Briffon, ornith. I. p. 230. n. 24. Merle brun du Cap de b. E.

Büffon, Vögel, IX. p. 147. *die braune capsche Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 64. n. 90. *die bräunliche Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 353. n. 97. Turdus (Capensis) nigricans, abdomine subflavescente, crisso luteo.

β. Büffon, Vögel, IX. p. 148. *Abänderung der braunen kapschen Amsel.*

Latham, Syn. II. 1. p. 71. n. 90. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 64. n. 90. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 353. n. 97. β.

18. **ATRICAPILLUS.** *Die schwarzköpfige Drossel.*
Müller, Naturfyst. II. p. 535 n. 18. *die Amsel.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 612. *die schwarzköpfige Amsel vom Vorgeb. d. g. H.*
Briffon, ornith. I. p. 252 n. 66. Merle à tête noire du Cap de bonne Esperance.
Büffon, Vögel, IX. p. 145. *die schwarzköpfigte capsche Amsel*; m. e. Fig.
Latham, Vögel, II. I. p. 63. n. 89. *die schwarzköpfige Drossel.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 353. n. 96. *Turdus (Atricapillus) nigricans, capite atro, abdomine uropygioque rufis, macula alarum alba.*
75. **MAURITIANUS.** *Die Drossel von Isle de France.*
Büffon, Vögel, IX. p. 144. *die grüne Amsel von der Isle de France*; m. e. Fig.
Latham, Vögel, II. I. p. 63. n. 88. *die Mauritius-Drossel.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 349. n. 75. *Turdus (Mauritianus) toto corpore virescente caeruleo, pennis capitis collique longioribus angustis.*
76. **MINDANAENSIS.** *Die Drossel von Mindanao.*
Büffon, Vögel, IX. p. 143. *die Amsel von Mindanao.*
Latham, Vögel, II. I. p. 63. n. 87. *die Mindanaische Drossel.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 353. n. 95. *Turdus (Mindanensis) caeruleo-chalybeus, corpore subtus strigaeque longitudinali alarum albis.*
77. **MADAGASCARIENSIS.** *Der Tanaombé.*
Briffon, ornith. I. p. 234. n. 33. Merle de Madagascar.

Büffon, Vögel, IX. p. 141. *der Tanaombé, oder madagascarische Amsel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 62. n. 86. *die Madagaskarische Drossel*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 352. n. 94. Turdus (Madagascariensis) fuscus, subtus albus, pectore lateribusque rufescentibus, macula alarum rufo-aurea, rectricibus duabus intermediis, lateraliumque marginibus viridi-auratis, extimis margine exteriori albis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. Turdus madagascarius.

78. **SENEGALENSIS.** *Die Senegalische Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 231. n. 26. Merle du Sénégal.

Büffon, Vögel, IX. p. 140. *die braune Senegalische Amsel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 62. n. 85. *die Senegalische Drossel*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 352. n. 93. Turdus (Senegalensis) griseo-fuscus, ventre fordide albo, remigibus rectricibusque fuscis.

79. **LONGIROSTRIS.** *Die langschnäblige Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 62. n. 84. *die lang-schnäblige Drossel*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 352. n. 92. Turdus (Longirostris) fusco-virefcens, subtus flavus, superciliis rectricibusque extus flavescens.

80. **GRISEUS.** *Die graue Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 61. n. 83. *die graue Drossel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 352. n. 91. Turdus (Griseus) griseus, subtus griseo-rubescens, vertice cerviceque albidis.

Sonne-

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 150. die graue Amsel aus Gingi.

19. PALMARUM. Die Palmendrossel.

Müller, Natursyft. II. p. 535. n. 19. die Palm-drossel.

Onomat. hist. nat. VII. p. 620. die Palmdrossel.

Briffon, ornith. I. p. 242. n. 47. Palmiste.

Büffon, Vögel, IX. p. 166. die Palmenamsel; m. e. Fig. (eigentlich p. 167.)

Latham, Vögel, II. I. p. 69. n. 101. die Palm-Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 108. Turdus (Palmarum) viridi-olivaceus, subtus subcine-reus, fincipite genisque nigris, maculis utrin-que tribus albis.

β. Die schwarzköpfige Palmendrossel. (?)

Briffon, ornith. I. p. 242. n. 48. Palmiste à tête noire.

Büffon, Vögel, IX. p. 166. Palmiste.

Latham, Syn. II. I. p. 77. n. 101. Var. A. — Vögel, II. I. p. 69. n. 110. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 108. β.

81. MONACHA. Die Nonnendrossel.

Büffon, Vögel, IX. p. 176. die abyssinische Non-ne, oder Molopita.

Latham, Vögel, II. I. p. 70. n. 102. die Non-nen-Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 109. Turdus (Monacha) fusco-luteus, subtus lutescens, ca-pite colloque inferiore nigris.

82. AETHIOPICUS. Die aethiopische Drossel.

Büffon, Vögel, IX. p. 177. die schwarz und weis-se abyssinische Amsel.

T 2

Latham,

(9) Nach Briffon eine eigne Gattung.

Latham, Vögel, II. 1. p. 70. n. 103. *die Aethiopische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 110. Turdus (Aethiopicus) niger, corpore subtus fasciaque alarum albis.

83. ABYSSINICUS. *Die abyssinische Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 179. *die braune abyssinische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 70. n. 104. *die Abyssinische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 111. Turdus (Abyssinicus) fuscus, remigibus caudaque saturationibus, gutture fusciscente, corpore subtus fulvo.

84. COCHINCHINENSIS. *Die cochinchinesische Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 181. *der kochinchinesische Grünling.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 71. n. 106. *Die Drossel mit schwarzem Kinne.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 113. Turdus (Cochinchenensis) viridis, loris gulaque nigris, sub gula lunula lata flava, ad basin rostri utrinque macula caerulea.

85. CINNAMOMEUS. *Die zimmetfarbige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 150. *die kayennische Amsel mit der Halsbinde; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 71. n. 107. *die schwarzbrüstige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 358. n. 114. Turdus (Cinnamomeus) testaceo-ruber, collo inferiore nigro undique albo marginato, tectricibus alarum nigris, minoribus albo, mediis maioribusque rufo-terminatis.

86. RUFIFRONS. *Die rothstirnige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 170. *die gelbrothe cayennische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 72. n. 108. *die gelbrothe Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 358. n. 115. *Turdus* (Rufifrons) fuscus, fincipite, lateribus capitis corporeque subtus rufis, tectricibus alarum nigris flavo-marginatis, cauda cinerea, tectricibus inferioribus albis.

87. CANTANS. *Der Arada.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 193. *der Arada*; mit e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 72. n. 109. *die flötende Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 358. n. 116. *Turdus* (Arada) rufo-fuscus, nigricante transversim striatus, subtus albidus, sub oculis macula nigra, albo-punctata, genis colloque interiore rufo-fulvis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 103. *der Arada.*

88. CORAYA. *Der Coraya.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 199. *die Ameisen-Nachtigall*, mit gebändertem Schwanz.

Latham, Vögel, II. 1. p. 73. n. 110. *die Coraya-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 358. n. 117. *Turdus* (Coraya) rufo-fuscus, pileo lateribusque capitis et colli nigris, gula, iugulo strigisque sub oculis albis, cauda grisea, fasciis nigris.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 104. *der Coraya.*

89. FUSCIPES. *Die braunfüßige Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 74. n. 111. *die lohflügelige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 359. n. 118. *Turdus* (Fuscipes) cinereus, subtus obscure rufus, pileo nigro, tectricibus alarum flavescente fasciatis.

90. ALAPI. *Der Alapi.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 201. die buntflügelichte Ameisen-Nachtigall.

Latham, Vögel, II. I. p. 74. n. 112. die weißrückige Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 359. n. 119. *Turdus* (Alapi) fuscus, subtus cinereus, collo inferiore pectoreque nigris, tectricibus alarum albo punctatis, dorso macula alba.

Samml. zur Physf. u. N. G. III. p. 102. *der Alapi.*

91. CIRRHATUS. *Die geschopfte Drossel.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 183. *der Ameisenvogel mit dem Zopf.*

Latham, Vögel, II. I. p. 74. n. 113. die Drossel mit schwarzem Federbusche.

Latham, Syst. ornith. I. p. 359. n. 12. *Turdus* (Cirrhat) cristatus griseo-cinereus, pileo, collo inferiore pectoreque nigris, gula albo varia, tectricibus alarum apice, rectricibus margine et apice albis.

Samml. zur Physf. u. N. G. III. p. 102 *der gehäubte Ameisenfresser.*

92. TITINNABULATUS. *Der Glockenspieler.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 187. *der Ameisenvogel, Glöckner.*

Latham, Vögel, II. I. p. 75. n. 114. die Läute-Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 359. n. 121. *Turdus* (Campanella) fuscus, subtus uropygioque rufus-fulvus, gula alba, pileo genisque albis, nigro

nigro maculatis, superciliis strigaeque pone oculos nigris.

Samml. zur Physf. u. N. G. III. p. 102. *der Glockenspieler.*

93. *BAMBLA. Der Bambla.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 190. *der Ameisenvogel, Bambla, oder Weißbinde.*

Latham, Vögel, II. I. p. 75. n. 115. *die schwarzflügelige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 360. n. 122. *Turdus* (Bambla) *nebulosus*, supra rufo-fuscus, subtus cinerascens, alis nigris fascia alba, cauda nigricante brevi.

Samml. zur Physf. u. N. G. III. p. 103. *der Bambla.*

94. *AURITUS. Die weißhörige Drossel. (10)*

Büffon, Vögel, XIII. p. 185. *der weißhörigte Ameisenvogel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 76. n. 116. *die weißhörige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 360. n. 123. *Turdus* (Auritus) rufo-olivaceus, fusco-varius, abdomine albo, gula iuguloque nigris, vertice fasciaque pectorali rufo-fuscis, vitta aurium argentea.

Samml. zur Physf. u. N. G. III. p. 102. *der weißhörige Ameisenfresser.*

95. *COLMA. Der Colma.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 181. *der Ameisenvogel, Colma; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 76. n. 117. *die Colma-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 360. n. 124. *Turdus* (Colma) rufo-fuscus, subtus cinereus, lunula nuchae

(10) Ist nach *Latham*, mit *Pipra Lencotis* p. 1003. n. 19. einerley.

nuchae rufa, iugulo albo nigroque vario, macula narium gulaque albis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 102. *der Colma.*

β. *Der Tetema.* (1)

Büffon, Vögel, XIII. p. 182. *der Ameisenvogel Tetema*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 86. — Vögel, II. I. p. 77. n. 117. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 360. n. 124. β.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 102. *der Tetema.*

96. TINNIENS. *Der Läutvogel.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 175. *der größere läutende Ameisenvogel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 77. n. 118. *die Larum-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 360. n. 125. *Turdus (Tinniens) fuscus, subtus albus, pectore nigricante nebuloso.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 101. *der große Befroi.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 350. n. 9. *der Läutvogel.*

97. LINEATUS. *Die gestreifte cayennische Drossel.* (2)

Büffon, Vögel, XIII. p. 177. *der kleinere läutende Ameisenvogel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 78. n. 119. *die gesprenkelte Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 361. *Turdus (Lineatus) fusco-olivaceus, subtus albus fusco punctatus, lateribus colli albo lineatis, rectricibus alarum maculis rufis.*

98. FOR.

(1) *Büffon* hält den *Tetema* für das Männchen, und den *Colma* für das Weibchen. *Latham* umgekehrt.

(2) Nach *Büffon* eine Abart vom vorigen.

98. FORMICIVORUS. *Der Palikour.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 178. *der Ameisenvogel*,
Palikour; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 78. n. 120. *die Ameisen-*
drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 361. n. 127. Tur-
dus (Formicivorus) rufo-fuscus, subtus al-
bidus, macula dorsali, collo inferiore pectore-
que nigris, tectricibus alarum flavo-maculatis,
cauda rufa.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 101. *der Pa-*
likour.

β. T. jugulo rufo, nigro marginato; cauda apice
nigro, inter scapulas macula alba. *Latham*
l. c. *

γ. T. jugulo nigro medio albo. *Lath.* l. c. *

δ. T. abdomine et crasso cinereis, femoribus rufo-
fuscis. *Lath.* l. c. *

99. CYANURUS. *Die blaushwänzige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 183. *der Blauling*; mit
e. Fig.

Büffon, Vögel, XIII. p. 174. *der himmelblaue*
Ameisenvogel.

Latham, Vögel, II. 1. p. 79. n. 121. *die blau-*
schwänzige Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 361. n. 128. Turdus
(Cyanurus) rufo-fuscus, subtus flavus, abdo-
mine caeruleo fasciato, pileo lateribusque colli
striga longitudinali nigris, fascia pectorali cau-
daque caeruleis.

100. REX. *Die Königsdrossel.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 171. *der größte Ameisen-*
vogel; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 80. n. 122. *die Königs-Drossel.*

Latham, Syst. ornith I. p. 361. n. 129. Turdus (Grallarius) fusco-nebulosus, subtus rufescens, maxillae inferioris striga, macula pectoris crisso-que albis, nucha plumbea.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 100. *der König der Ameisenfresser.*

20. SINENSIS. *Der Hoamy.*

Müller, Naturfyst. II. p. 335. n. 20 *der chinesische Krammetsvogel.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 635. *die chinesische Drossel.*

Briffon, ornithol. I. p. 219. n. 7. Grive de la Chine.

Büffon, Vögel, VIII. p. 312. *der chinesische Hoamy.*

Latham, Vögel, II. I. p. 33. n. 33. *die chinesische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 337. n. 35. Turdus (Sinensis) rufescens, capite fusco-striato, superciliis albis, rectricibus fuscis strigis obscurioribus, pedibus flavis.

101. ARCUATUS. *Die Bogendrossel.*

Latham, Vögel, I. I. p. 34. n. 34. *die mondhälfige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 337. n. 36. Turdus (Arcuatus) rufo-fuscus, corpore subtus superciliis, lorisque albis, cervice, iugulo pectore-que rubentibus, genis lunulaque sub gula nigris.

102. MELANOPIS. *Die Drossel mit schwarzem Gesichte.*

Ist nach Latham, mit *Turdus Shannu* p. 814. n. 41. einerley.

103. VIOLACEUS. *Die violette Drossel.*

Latham, Syn. II. I. p. 57. n. 63. Violet Thrush.

Latham, Vögel, II. I. p. 54. n. 63. *die violette Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 347. n. 69. Turdus (Violaceus) violaceo-nitens, pennis capitis, colli, pectoris tectricibusque alarum caeruleo-chalybeis, macula alarum femoribusque intus albis.

Sonnerat, Reif. nach Ostind. und Chin. II. p. 147. *die blaue chinesische Amsel.*

104. LEUCOCEPHALUS. *Die weißköpfige Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 55. n. 66. *die weißköpfige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 348. n. 73. Turdus (Leucocephalus) cinereo-griseus, capite colloque albis, alis caudaque viridi-cupreis, remigibus nigris, macula alarum alba.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 149. *die chinesische Dominicaner Amsel.*

105. NIGRICOLLIS. *Die schwarzhälfige Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 56. n. 68. *die schwarzhälfige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 349. n. 76. Turdus (Nigricollis) fusco-ferrugineus, subtus fusco-albus, capite toto albo, collo, remigibus caudaque nigris, secundariis apice albis.

106. RUBIL. *Der Bubil.*

Latham, Vögel, II. I. p. 56. n. 70. *die Pfeif-Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 349. n. 78. Turdus (Bubil) fuscus, pone aures fascia nigra.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 150. *der chinesische Bubil.*

107. PERSPICILLATUS. *Die Brillendrossel.*

Büffon, Vögel, IX p. 108. *die chinesische Amsel*;
m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 57. n. 71. *die Brillen-*
Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 349. n. 79. Turdus
(Perspicillatus) griseo-viridis subtus flavescens-
albus, capite colloque cinereis, sincipite lunu-
laque sub oculis nigris.

108. FLAVUS. *Die gelbe Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 58. n. 74. *die gelbe*
Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 350. n. 82. Turdus
(Flavus) fulvus orbitis albis, fascia oculari ni-
gra.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 152. *die*
gelbe chinesische Amsel.

109. VIRIDIS. *Die grüne chinesische Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 339. *die Drossel Chaumi.*

Latham, Vögel, II. I. p. 60. n. 79. *die grüne*
Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 351. n. 87. Turdus
(Virens) griseo-viridis, corpore subtus, su-
perciliis maculaque suboculari albis, gula grisea
albo-maculata, pectore lateribusque rufis.

110. ATER. *Die schwarzkehlige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 134. *die schwarzkehlige do-*
mingische Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 59. n. 78. *die schwarz-*
kehlige Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 351. n. 86. Turdus
(Jugularis) griseo-fuscus, subtus flavo-virens
maculis sparsis nigris, facie, gula iuguloque ni-
gris, rufo-marginatis.

21. DOMINICUS. *Die grau und weiße domingische Drossel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 436. n. 21. *die domingische Drossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 607. *die Amsel von St. Domingo.*

Briffon, ornith. I. p. 237. n. 38. *Merle de S. Domingue.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 338. *die domingische Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 38. n. 44. *die Domingo-Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 340. n. 48. *Turdus* (Dominicus) subfuscus, subtus albus, remigibus primoribus basi albis, rectricibus 3. extimis albis.

III. BRASILIENSIS. *Die brasilianische Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 39. n. 45. *die gelbbäuchige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 340. n. 49. *Turdus* (Brasilensis) niger, subtus flavescens, dorso infimo ferrugineo, fascia alarum alba, rectricibus tribus exterioribus, apice, extimis toto albis.

22. MERULA. *Die (gemeine) Amsel. (3)*

Müller, Naturfyst. II. p. 536. n. 22. *die Merle, oder Amsel.*

Leske, Naturgesch. p. 257. n. 6. *die Amsel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 169. n. 8. *die Amsel, Schwarzdrossel.*

Blumen.

- (3) Gewicht 4. Unzen. *Penn.* Zuweilen, aber selten, finden sich Amseln mit schwarzen Schnäbeln und schwarzen Füßen. — Brütet 2. mal. Die jungen Männchen ähneln vor der ersten Mauser der Mutter mehr als dem Vater; der gelbe Schnabel kommt erst im Frühjahr zur Zeit der Paarung zum Vorschein.

- Blumenbach*, Handb. der N. G. p. 182. n. 6. Turdus (*Merula*) ater, rostro palpebrisque flavis; *die Amsel*.
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 503. n. 6. *die Schwarzdrossel*.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 612. *die schwarze Amsel*.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 234. *die Schwarzdrossel*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 129. *die Amsel*.
- Halle*, Vögel, p. 285. n. 237. *die Amsel*.
- Meyer*, Thiere, II. p. 18. tab. 68. *schwarze Amsel*.
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 395. n. 322. *die Amsel*.
- Pennant*, arch. Zool. II. p. 321. I. *die Amsel*.
- Beckmann*, Naturhist. p. 52. c. *die Amsel*.
- Neuer Schaupl. der Natur. I. p. 282. *Amsel*.
- Onomat. hist. nat. VII. p. 618. *gemeine Amsel*; *Kohlamsel*.
- Handb. der Naturgesch. II. p. 199. *die Amsel*.
- Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 126. *die Amsel*.
- Klein*, av. p. 66. n. 5. Turdus niger; *Merula simpliciter*.
- Klein*, Vorbereit. p. 125. n. 5. *Schwarze Drossel*; *Amselmeerle*.
- Klein*, verbess. Vögelhistor. p. 66. n. 5. *Amsel*; *Meerle*.
- Klein*, Stemmat. av. p. 11. tab. 13. fig. 2. a — c.
- Gesner*, Vögelb. p. 34. *Amsel*; *Merl*; *Merlaer*; *Merel*; *Lyster*. Fig. p. 35.
- Brissou*, ornith. I. p. 221. n. 10. *Merle*.
- Buffon*, Vögel, IX. p. 5. *die Amsel*; m. 2. Fig. M. u. N.
- Batsch*, Thiere, I. p. 340. *die Amsel*.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 141. Black-bird.
- Latham*, Vögel, II. 1. p. 39. n. 46. *die Schwarzdrossel*.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 340. n. 50. Turdus
(Merula) rostro, palpebris pedibusque fulvis.

Beske, Vögel Kurl. p. 74 n. 161. die Merle.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 92. n. 5. die Schwarzdrossel.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 415. die Merle.

Fischer, Liv. p. 94. n. 138. schwarze Amsel.

Cetti, Sardin. II. p. 164. die Amsel.

White, N. G. von Engl. p. 64. n. II. p. 66. n. 4.
Schwarze Amsel.

Adanson, Senegal. p. 278. Amseln?

Boswell, Besch. von Corfic. p. 45. die Amsel.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. die schwarze Amsel.

Carver, Reis. durch Nordamer. p. 391. Krähenamsel?

Scopoli, Bern. aus der N. G. I. p. 161. n. 197. die schwarze Amsel.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 4. Selsfort.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 183. Soolfort.

Georgi, Reis. I. p. 173.

Borkhausen, Magaz. I. p. 162. n. 33. die Amsel.

Naturforsch. XVII. p. 83. n. 171. die Merle.

Krünitz, Encykl. I. p. 701. Amsel.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 55. Schwarz-Amsel.

Naumann, Vogelsteller, p. 82. schwarze Amsel.

André u. Bechstein, Spazierg. III. p. 12. 16.

Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. III. 1.
p. 62. VI. 3. p. 135.

Hervieux, Canarienvög. p. 133. Amsel.

Zorn, Petinotheol. II. p. 318. die gemeine schwarze Amsel.

Geoffroy, mat. med. VII. p. 544. Amsel.

Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 5. die Amsel.

Anweis. Vögel zu fang. p. 89. Amsel.

Forst-, Fisch- u. Jagdlex. I. p. 86. Schwarzamsel.

Börner,

Börner, neue schles. ökonom. Nachr. II. p. 99.
Schwarze Amsel.

Loniceri, Kräuterb. p. 676. *Amsel.*

Lemmery, Materiallex. p. 727.

Oekon. Zool. p. 95. n. 37. *die Amsel.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 47. *Amsel.*

Zückert, Speis. aus d. Thierreich, p. 97.

Haus- u. Landbibl. II. p. 477.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Merula nigra.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. n. 2. *Merula nigra.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 170. n. 12. *Turdus (Merula) ater, rostro palpebrisque fulvis.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 241. *Turdus (Merula) ater, rostro pedibusque fulvis.*

Kramer, Austr. p. 360. n. 3. *Turdus ater, rostro palpebrisque fulvis. Amäxl.*

Brünniche, ornithol. bor. p. 66. n. 234. *Turdus Merula.*

Charleton, onom. zoic. p. 83. n. 3. *Merula.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 300. *Merula nigra. Amsel; Meerle.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 394. *Merula vulgaris.*

Sibbald, Scot. p. 214. *Merula.*

Jonston, av. p. 104. *Merula.*

Zinnan, Uov. p. 39. tab. 5. fig. 22. *Merla.*

Belon, ois. p. 30. *Merle noir.*

Salerne, hist. nat. des ois. p. 126. 176.

Heerhens, av. Fris. p. 245. *Merula.*

Hist. Prov. I. p. 491. *Merle.*

Levin, britt. Birds. II. tab. 61. *Black-bird.*

Voyage en Barbar. I. p. 272. *Merle.*

Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. c. 53. *Merulae.*

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 2. n. 52. 169. Κορυφός.

Aelian.

Aelian. de nat. anim. L. 12. c. 28. Κορρυϕος.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 351. n. 10.
die Amsel.

β. *Die weißköpfige Amsel.*

Briffon, ornith. I. p. 222. A. Merle à tête blanche.
Büffon, Vögel, IX. p. 24. *die weißköpfige Amsel.*
Latham, Syn. II. 1. p. 44. White-headed Black-bird.

Latham, Vögel, II. 1. p. 41. n. 46. Var. A. *die weißköpfige Schwarzdroffel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 341. n. 50. β. T. capite albo, pone oculos alasque supra albo variegatus, rostro, pedibus iridibusque luteis.

Aldrov. ornithol. II. L. 16. c. 6. p. 277. Merula Leucocephalos.

Charleton, onom. zoic. p. 84. n. 1. Merula Leucocephalus.

Jonston, av. p. 104. Merula Leucocephalus.

γ. *Die bunte Amsel.*

Briffon, ornithol. I. p. 222. B. Merle varié.

Büffon, Vögel, IX. p. 23. *die weißgefleckte Amsel.*

Klein, av. p. 68. n. 16. Turdus niger. Merulus variegatus.

Klein, Vorbereit. p. 129. n. 16. *schwarzgefleckte Amsel.*

Klein, verbeß. Vögelhistor. p. 68. n. 19. *schwarzgefleckte Amsel.*

Latham, Syn. II. 1. p. 44. Pied Black-bird.

Latham, Vögel, II. 1. p. 41. n. 46. Var. B. *die bunte Schwarzdroffel.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 301. Merula varia; *weißgefleckte Amsel.*

Jonston, av. p. 104. Merula ex albo et nigro maculata.

δ. *Die weiße Amsel.*

Briffon, ornithol. I. p. 223. C. Merle blanc.

Büffon, Vögel, IX. p. 23. *die weiße Amsel.*

Latham, Syn. II. 1. p. 44. White Black-bird.

Latham, Vögel, II. 1. p. 41. n. 46. Var. C. *die weiße Schwarzdroffel.*

Krünitz, Encykl. I. p. 713. *weiße Amseln.*

Hannov. nützl. Samml. 1756. St. 44. *weiße Amsel.*

Journal encycl. 1772. VII. 141.

Berlin. Samml. V. p. 177. *die weiße Amsel.*

Aldrovand. ornith. II. L. 16. p. 276. *Merula candida.*

Charleton, onomast. zoic. p. 84. n. 2. *Merula candida.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 301. *Merula candida.*

Jonston, av. p. 104. *Merula tota candida.*

Varro, de re rust. L. 3. c. 9. *Merula alba.*

Plin. hist. nat. L. 10. c. 30. *Merula candida.*

112. AURANTIUS. *Die weißkehlige Droffel.*

Klein, av. p. 69. n. 27. *Turdus fuscus.*

Klein, Vorbereit. p. 131. n. 27. *Pomeranzschnäbler; graue Amsel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 69. n. 28. *Pomeranzschnäbler.*

Briffon, ornith. I. p. 835. n. 31. *Merle de la Jamaïque.*

Büffon, Vögel, IX. p. 149. *braune jamaikanische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 41. n. 47. *die Droffel mit weißem Kinne.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 341. n. 51. *Turdus (Leucogenus) fusco-niger, gula abdomineque albis.*

β. *Latham*,

β. *Latham*, Syn. II. 1. p. 45. Var. A. — *Latham*,
Vögel, II. 1. p. 42. n. 48. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 342. n. 51. β. T.
gula corpore concolore.

γ. *Latham*, Syn. II. 1. p. 45. Var. B. — *Latham*,
Vögel, II. 1. p. 42. n. 48. Var. B.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 342. n. 51. γ. T.
corpore toto nigro, rostro pedibusque fulvis.
Fermin, Surin. II. p. 162. *die Amsel*.

δ. *Briffon*, ornith. I. p. 244. n. 51. Merle d' Ameri-
que. (4)

Latham, Syn. II. 1. p. 45. Var. C. — *Latham*,
Vögel, II. 1. p. 42. n. 48. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 342. n. 52. Turdus
(Americanus) corpore violaceo-nitente, sub-
tus obscuro, remigibus apice rufis, rostro pe-
dibusque luteis.

113. LABRADORIUS. *Die labradorische Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 316. n. 122. *der Kram-
metsvogel von Labrador.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 42. n. 48. *die Labrado-
rische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 342. n. 54. Turdus
(Labradorius) atro-nitens, caeruleo viridique
varians, rostro pedibusque nigris.

Philos. transact. LXII. p. 400. n. 22.

23. TORQUATUS. *Die Ringamsel. (*)*

Müller, Naturyst. II. p. 537. n. 23. *die Ring-
drossel.*

U 2

Leske,

(4) Nach *Briffon* eine eigne Gattung, wofür ihn auch *Latham* im
Syst. ornith. aufgenommen hat.

(*) Findet sich in Europa bis Lappland, aber weder in Rußland
noch in Sibirien. Auch an den Ufern des caspischen Meers;
und überwintert in Persien.

- Leske*, Naturgesch. p. 257. n. 7. *die Ringamsel*.
Borowsky, Thierreich, III. p. 170. n. 9. *die Ringdrossel; Ringmerle*.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 502. n. 5. *die Ringdrossel*.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 612. *die Ringamsel*.
Ebert, Naturl. II. p. 129. *die Ringmerle*.
Halle, Vögel, p. 287. n. 238. *die Dianenamsel*.
Meyer, Thiere, II. tab. 68. *Bergamsel*.
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 396. n. 323. *Ringamsel; Schildamsel; Stockziemer*.
Pennant, arch. Zool. II p. 321. H. *die Ringamsel*.
Onomat. histor. natur. VII. p. 636. *die Ringamsel*.
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 127. *Ringamsel; Meeramsel*.
Klein, av. p. 66. n. 6. *Turdus torquatus*.
Klein, Vorbereit. p. 125. n. 6. *Ringdrossel*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 66. *Ringdrossel; Schneedrossel; Rosdrossel*.
Gesner, Vögelb. p. 37. *Ringamsel; m. e. Fig.*
Briffon, ornith. I. p. 223. n. 12. *Merle à collier*.
Büffon, Vögel, IX. p. 36. *die Ringelamsel; mit e. Fig.*
Batsch, Thiere, I. p. 341. *die Berg- oder Ringamsel*.
Latham, Syn. Suppl. p. 141. *Ring-Onzel*.
Latham, Vögel, II. I. p. 43. n. 49. *die Ringdrossel*.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 343. n. 56. *Turdus (Torquatus) nigricans, torque albo, rostro flavescente*.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 39. n. 6. *die Schilddrossel*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 416. *Ringdroßfel*.

Fischer, Liv. p. 94. n. 139. *Ringdroßfel*.

White, N. G. von Engl. p. 37. p. 42. p. 61. n. 1.
Ringamsel.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 5. *Ringtroßt*.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 55. *Turdus torquatus*.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 162. n. 198. *die Ringamsel*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 319. *die Berg-Amsel*.

Naturforsch. XVII. p. 84. n. 172. *die Ringdroßfel*.

Borkhausen, Magaz. I. p. 163. n. 34. *Ringamsel*.

Numann, Vogelsteller, p. 82. *die Ringamsel*.

Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 6. *die Ringamsel*.

Krünitz, Encykl. I. p. 714. *Meeramsel; Ringel-Amsel*.

Forst., Fisch- u. Jagdlex. I. p. 87. *Meeramsel*.

Börner, neue schles. ökonom. Nachr. II. p. 100.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. n. 3. *Merula torquata*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 170. n. 13. *Turdus* (*Torquatus*) *nigricans*, *torque albo*, *rostro flavescente*.

Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 242. *Turdus* (*Torquatus*) *nigricans*, *torque albo*, *rostro flavescente*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 302. *Merula torquata; Ringamsel; Schneeamsel; Roß-Amsel*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 394. *Merula torquata*.

Sibbald, Scot. p. 215. *Merula torquata*.

Jonston, av. p. 106. *Merula torquata*.

Tavernier, voyages II. p. 24?

Hermann, tab. affin. anim. p. 200. *Turdus torquatus*.

Levin, britt. Birds II. tab. 62.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 351. n. 11.
die Ringamsel.

β. Die weiße Ringamsel.

Büffon, Vögel, IX. p. 48. die weiße Ringamsel.

γ. Die weißgefleckte Ringamsel.

Büffon, Vögel, IX. p. 49. die weißgefleckte Am-
sel.

114. SAXATILIS. Die Steindrossel. (5)

Latham, Vögel, II. I. p. 50. n. 57. die Stein-
Drossel.

Latham,

(5) Die in unserm System angeführten beyden Synonymen aus *Raj* und *Willugh.* sind auch p. 310. bey n. 25. (*Lanius infaustus*) citirt, und was *Latham's Rock Thrush* betrifft, so findet sich im *Syst. ornith.* p. 326. das er ihn mit seinem *Rock Shrike* (*Lanius infaustus Gmel.*) für einerley ausgegeben, und beyde zu seinem *Turdus infaustus* gerechnet hat. Ich beziehe mich im Ganzen hier auf dasjenige, was ich bereits im ersten Bande dieser Beyträge p. 216. not. 8. angeführt habe. Fast bey keiner Gattung findet sich eine größere Verwechselung der Synonymen, als bey *Lanius Infaustus* p. 310. n. 25. *Lanius Faustus* p. 311. n. 26. und *Turdus Saxatilis* p. 833. n. 14. Ich will zum Besten derer, die den *Latham'schen Index ornithologicus* nicht besitzen, hier ausführlich bemerken, wie dieser Ornithologe die Synonymen geordnet hat. A. *Corvus Infaustus Latham* *Syst. ornith.* I. p. 159. n. 22. = a) *Corvus Infaustus Linn.* *fn. suec.* n. 93. — b) *Corvus Infaustus Brünn.* p. 10. — c) *Corvus Infaustus Müll.* *dan. prodr.* p. 12. n. 93. — d) *Lanius Infaustus Linn.* XII. 1. p. 138. n. 25. — e) *Corvus rufescens Gmelin* *it.* p. 50. tab. 11. — B. *Turdus Infaustus Latham* I. c. p. 335. n. 32. = a) *Turdus Saxatilis Gmel.* *Syst.* I. p. 833. n. 114. — b) *Lanius Infaustus Gmel.* *Syst.* I. p. 310. n. 25. c) *Borowsky Thierr.* II. p. 84. n. 4. — d) *Merula Saxatilis, Raj.* *Syn.* p. 69. 3. e) *Will.* p. 145. tab. 36. — f) *Briffon*, II. p. 238. 13. — g) *Faun. Arragon.* p. 85. — h) *Klein*, *av.* p. 70. 32. — i) *Merle de roche Büffon*, III. p. 351. (maior). — k) *Codiroffo maggiore, Olin.* *uc.* t. p.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 335. n. 32. *Turdus* (Infaustus) nigricante fusco, rufescenteque varius, capite cinereo rufescente-maculato, rectricibus lateralibus rufis.

115. EREMITA. *Die einsame philippinische Drossel.*

Briffon, ornithol. I. p. 234. n. 32. Solitaire des Philippines.

Büffon, Vögel, IX. p. 99. *einsame philippinische Amsel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 50. n. 56. *die Einsiedler-Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 346. n. 63. *Turdus* (Eremita) fuscus, apicibus pennarum fasciis nigricante albido terminatis, subtus fordide albo rufescens fusco-striatus, remigibus rectricibusque griseo-marginatis.

116. MANILLENSIS. *Die manillische Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 233. n. 31. Solitaire de Manille.

Büffon, Vögel, IX. p. 96. *die manillische einsame Amsel*; m. e. Fig.

U 4

Latham,

47. — 1) *Zinnan*. Uov. p. 40. t. 6. f. 23. — m) *Steinböthel*, *Wirsing* Vög. tab. 16. — n) Greater Redstart, *Albin*. III. t. 55. — o) *Will.* p. 197. t. 36. — p) Rock Crow, *Arch. Zool.* II. p. 252. F. — q) Rock Shrike, *Lath. Syn.* I. p. 176. — r) Rock Thrush, *Lath. Syn.* III. p. 54. 57. — C. *Turdus Saxatilis*. *Latham* l. c. p. 336. n. 33. — a) *Lanius Infaustus minor*, *Gmel.* Syst. I. p. 310. 25. β. — b) *Turdus Saxatilis* *Linn.* Syst. XII. I. p. 294. 14. — c) *Kramer* Austr. p. 360. 2. — d) *Scopoli* ann. I. p. 199. — e) *Borowsky* Thierr. III. p. 168. 7. — f) *Merula Saxatilis minor*, *Briffon*, II. p. 240. 14. — g) *Turdus ruber cyaneo capite*, *Klein* av. p. 67. 8. — h) *Frisch* tab. 32. — i) *Merle de roche*, *Büffon*, III. p. 351. t. 23. Pl. enl. 562. — k) *Günth.* Nest. u. Ey. tab. 75. — l) Lesser Rock Shrike, *Lath. Syn.* I. p. 177. n. 27. A.

Latham, Vögel, II. i. p. 49. n. 55. *die Manillische Drossel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 345 n. 62. *Turdus* (Manillensis) fusco-caerulescens, subtus rufus, fusco albidoque maculatus, uropygio caerulescente, remigibus rectricibusque fusco-nigricantibus.

117. SOLITARIUS. *Die einsame Amsel.*

Halle, Vögel, p. 292. n. 243 *die einsame Drossel*.

Klein, av. p. 67. n. 11. *Turdus*, passer Solitarius dictus.

Klein, Vorbereit. p. 127. n. 11. *Spreedrossel*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 67. n. 16. *Spreedrossel; einsame Drossel*.

Gesner, Vögelb. p. 38. *Passer solitarius*; m. e. Fig.

Briffon, ornithol. I. p. 233. n. 30. Solitaire.

Briffon, Vögel, IX. p. 86. *die einsame Amsel*.

Latham, Vögel, II. i. p. 48. n. 54. *die einsame Drossel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 345. n. 61. *Turdus* (Solitarius) fuscus albido punctatus, genis, collo pectore alisque caeruleo adumbratis, rectricibus nigricantibus.

Cetti, Sardin. II. p. 170. *der braune Einsiedler*.

Rzeczynsky, hist. nat. Polon. p. 221. *Passer Solitarius*.

Jonston, av. p. 105. *Passer Solitarius*.

Beckmann, Bibl. VIII. p. 539. *die einsame Amsel*.

Herrmann, tab. affin. anim. p. 210. *Merula solitaria*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 352. n. 12. *die einsame Amsel*.

24. CYANUS. *Die Blauamsel.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 538. n. 24. *die blaue Merle*.

Halle,

(6) Wird häufig mit dem vorhergehenden verwechselt.

Halle, Vögel, p. 290. n. 240. *die blaue Gefangdroffel.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 615. *die einsame Droffel.*

Klein, av. p. 77. III. n. 1. *Sylvia gula caerulea, pectore rubro.*

Klein, Vorbereit. p. 145. n. 1. *Blaukehlein mit rother Brust.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 78. n. 3. *Blauvogel; Steinrötele.*

Gesner, Vögelb. p. 42. *Blauvogel.*

Briffon, ornithol. I. p. 236. n. 37. *Merle bleu.*

Büffon, Vögel, IX. p. 75. *die Blauamsel.*

Batsch, Thiere, I. p. 342. *die Blauamsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 48. n. 53. *die blaue Droffel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 345. n. 60. *Turdus (Cyanus) pennis margine cinereo - caeruleis, ore palpebrisque luteis.*

Latham, Syn. Suppl. p. 142. *Blue-Thrush.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 416. *die blaue Merle; Blauvogel.*

Cetti, Sardin. II. p. 169. *der blaue Einsiedler.*

Seligmann, Vögel, I. tab. 35. *die blaue Amsel; der einsame Sperling.*

Naturforsch. XVII. p. 84. n. 173. *die blaue Merle.*

Beckmann, Bibl. VIII. p. 537. *die blaue Stein-Amsel.*

White, N. G. von Engl. p. 87. *die Blaudroffel.*

Charleton, onom. zoic. p. 88. *Caeruleo.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 347. *Rubicilla maior Saxatilis. Blau-Vogel, Stein-Rötele; Blau-Stein-Amsel; Stein-Droffel; Klein Blau-Zimmer.*

Jonston, av. p. 106. *Passeri Solitario congener.*

Faun. Arragon. p. 85. *Turdus plumbeus.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. *Turdus Cyanus.*

25. ARUNDINACEUS. *Die Rohrdrossel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 238. n. 25. *die Rohrdrossel.*

Leske, Naturgesch. p. 258. n. 8. *die Rordrossel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 170. n. 10. *die Rohrdrossel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 504. n. 8. *die Rohrdrossel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 234. *die Rohrdrossel.*

Ebert, Naturl. II. p. 229. *die Rohrdrossel.*

Halle, Vögel, p. 304. n. 270. *die singende Rohrdrossel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 397. n.

326. *Rohrdrossel; Weidendrossel; Bruchdrossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 611. *die Rohrdrossel.*

Klein, Vorbereit. p. 133. *Bruch-, Weiden-, Rohrdrossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 70. n. 38. *Bruchdrossel.*

Briffon, ornith. I. p. 219. n. 6. Rousserolle ou Koucherolle.

Büffon, ois. III. p. 293. tab. 18. — Pl. enl. 513. Rousserolle.

Büffon, Vögel, VIII. p. 254. *die Rohrdrossel; m. e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 339. *die Rohrdrossel.*

Latham, Syn. II. I. p. 32. n. 28. Suppl. p. 141. Reed Thrush.

Latham, Vögel, II. I. p. 28. n. 28. *die Rohrdrossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 334. n. 28. Turdus (Arundinaceus) fusco-ferrugineus, subtus albedo-testaceus, remigibus fuscis apice rufescentibus.

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 416. *Rohrdrossel.*

Fischer, Livl. p. 95. n. 140. *Rohrdrossel.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 94. n. 7. *die Rohrdrossel; groote Ruhrspaarling.*

Pallas, Reis. I. p. 370. *die Schilfdrossel.*

Pallas,

Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *Rohrdrossel*. IV. p. 25. Turd. arundinaceus.

Naturforsch. XVII. p. 83. n. 170. *Bruchdrossel*.

Schrift. der danziger Gesellsch. I. p. 444.

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 170. n. 15. Turdus (Arundinaceus) griseus, subtus albidus, lineolis transversim lunatis fuscis, pedibus caeruleiscentibus.

Charleton, onom. zoic. p. 105. n. 2. Rousserolle feu Roucherolle, Gallorum, *Bellonio Alcyon vocalis*.

Jonston, av. p. 163. Junco.

Jonston, av. p. 182. Acototloquichitl, seu passer aquaticus.

Belon, hist. nat. des ois. p. 224. Alcyon vocalis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 352. n. 13. die *Rohrdrossel*.

β. *Latham*, Syst. ornith. I. p. 334. n. 28. β. T. fusco-testaceus, subtus superciliisque albidis, uropygio rectricibusque rufis, lateralibus fascia nigra, quatuor extimis apice albis.

Latham, Vögel, II. I. p. 30. n. 28. Var. A.

26. MORIO. Die gelb und schwarze afrikanische Drossel.

Müller, Naturyst. II. p. 538. n. 26. die afrikanische Drossel.

Onomat. hist. nat. VII. p. 624. die afrikanische Amsel.

Brisson, ornith. I. p. 244. n. 52. Merle du cap de bonne esperance.

Büffon, Vögel, IX. p. 101. die gelbe und schwarze afrikanische Drossel.

Latham, Vögel, II. I. p. 52. n. 58. die Afrikanische Drossel.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 346. n. 64. *Turdus* (Morio) ater nitens, remigibus primoribus rufis apice nigro.

118. BICOLOR. *Die grünlich braune capsche Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 123. *die grünlich braune capsche Amsel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 58. n. 75. *die Drossel mit weißem Steiße.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 84. *Turdus* (Bicolor) viridi fuscus, abdomine uropygioque albis.

119. ERYTHROPTERUS. *Die rothflügelige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 107. *Senegalische Podobe.*

Latham, Vögel, II. I. p. 52. n. 59. *die rothflügelige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 346. n. 65. *Turdus* (Erythropterus) ater alis rufis, crisso rectricibusque lateribus apice albis, cauda cuneiformi.

120. CHRYSOGASTER. *Die orangegrüne Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 121. *Orangengrüne senegalische Amsel; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 58. n. 73. *die orangenbäuchige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 81. *Turdus* (Chrysogaster) viridis fulvo splendens, subtus fulvus nitidus, remigibus quibusdam extus albis.

β. *Die orange-blaue Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 122. *Orangenblaue senegalische Amsel; m. e. Fig.*

Latham, Syn. II. I. p. 63. n. 73. Var. A. — Vögel, II. I. p. 58. n. 73. A.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 81. β . T. caerulelescens, pennis margine saturationibus, corpore subtus fulvo.

121. UROVANG. *Die aschfarbige madagascarische Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 239. n. 41. Merle cendrée de Madagascar.

Büffon, Vögel, IX. p. 128. die aschfarbige madagaskarische Amsel; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 59. n. 76. die aschgraue Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 351. n. 85. Turdus (Ourovang) cinereo nigricans, capite, collo, pectore, dorso tectricibusque alarum olivaceis, abdomine flavescente.

27. SURINAMUS. *Die surinamische Drossel.*

Müller, Naturyst. II. p. 539. n. 27. die surinamische Drossel.

Onomat. hist. nat. VII. p. 636. die Surinamische Amsel.

Briffon, ornithol. I. p. 251. n. 65. Merle de Surinam.

Büffon, Vögel, IX. p. 164. die Surinamische Amsel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 107. Turdus (Surinamus) ater nitens, vertice, uropygio maculaque laterali pectoris luteis.

Latham, Vögel, II. I. p. 69. n. 100. die Surinamische Drossel.

122. COLUMBINUS. *Die Taubendrossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 130. die philippinische Amsel der Taubenhäuser.

Latham, Vögel, II. I. p. 59. n. 77. die Taubendrossel.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 348. n. 70. *Turdus* (Columbinus) viridi-nitens, corpore toto viridicolore.

123. DOMINICANUS. *Die Dominikanerdrossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 156. *die philippinische Amsel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 54. n. 65. *die Dominikaner-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 348. n. 72. *Turdus* (Dominicanus) fuscus violaceo-chalybeo variegatus, capite corporeque subtus fuscescente-albis.

124. CANTOR. *Die philippinische Sangdrossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 55. n. 67. *die Muskdrossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 348. n. 74. *Turdus* (Cantor) virescenti-ater, caeruleo violaceoque nitens, remigibus caudaque nigris.

Büffon, Vögel, IX. p. 132. (mit *Turdus Columbinus* verwechselt.)

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 42. *der Sänger oder die kleine Merle, von der Insel Panai.*

125. MALABARICUS. *Die gelbstirnige Drossel.*(7)

Latham, Vögel, II. I. p. 56. n. 69. *die gelbstirnige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 349. n. 77. *Turdus* (Malabaricus) viridis nitens, fronte flava, gutture nigro, maxilla inferiore striga caerulea, tectricibus alarum caerulefcentibus.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 150. *die kleine Amsel aus Malabar.*

126. SE-

(7) Da die Trivialbenennung *T. Malabaricus*, p. 816. n. 51. schon einmal vorgekommen, so könnte man diese *T. Flavifrons* nennen.

226. SELEUCIS. *Die Seleucische Drossel.*

Forskål, faun. orient. p. 6. n. 16. Turdus Seleucis: *Grylli vora*; arab. *Samarmar*.

Büffon, Vögel, IX. p. 44. not. 9. *die Seleucische Drossel.*

28. ZEULONUS. *Die Zeylanische Drossel.*

Müller, Naturfyft. II. p. 539. n. 28. *die zeylonnesische Merle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 639. *die Ceylonische Amsel.*

Briffon; ornith. I. p. 241. n. 46. *Merle à collier du cap de bonne espérance.*

Büffon, Vögel, IX. p. 117 *Ceylonische Amsel mit schwarzem Brustschilde.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 57. n. 72. *die Zeylanische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 349. n. 80. Turdus (Zeylonus) viridis, subtus luteus, linea oculari utrinque in pectus nigrum ducto.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 11. *die grüne Aelster von der Insel Ceylon.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

p. 294. n. 14. Turdus Saxatilis.

Edit. XIII.

p. 310. n. 25. β. Lanius Infaustus minor.

Das Geschlecht ist mit acht und neunzig Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung sind vier, bey der 4ten drey, bey der 11ten zwey, bey der 12ten eine, bey der 16ten eine, bey der 19ten eine, bey der 22ten drey, bey der 25ten drey Varietäten hinzugekommen.

B. Unbe-

B. Unbestimmtere Thiere.

1. *Brissons Bergamsel.*

Briffon, ornith. II. p. 232. n. II. tab. 21. Fig. 2.

— Ed. in 8. I. p. 223. n. II. *Merula montana*;
Merle de Montagne. — *Turdus fusco nigri-*
cans, marginibus pennarum griseis, taenia su-
pra pectus transversa, ad rufum vergente, re-
ctricibus nigricantibus.

Büffon, Vögel, IX. p. 39. *Bergamsel*.

Raj. Syn. p. 67. n. 12. *Merulae* congener?

Raj. Syn. p. 65. n. 3. *Merula Saxatilis*.

Willough. orn. p. 144. tab. 30. *Merula montana*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. — Fn. Suec.
I. p. 186. *Merula montana*.

Linné, fn. suec. I. p. 186. II. p. 221. β. *Turdus*
nigricans, torque fusca, rostro flavescente.

Charleton, onom. zoic. p. 84. n. 3. *Merula Mon-*
tana Germanorum.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 301. *Merula alpina*.
Birg-Amsel; *Stein-Amsel*; *Hag-Amsel*.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Pol. p. 394. *Merula*
alpina Schwenkf.

Jonston, av. p. 106. *Merula montana*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 343. n. 56. β.

Soll, nach *Büffon*, das Weibchen — nach *Latham*
ein junger Vogel von *Turdus Torquatus* seyn.

2. *Die Port-Jackson-Drossel.*

White, voy. t. p. 157. Port Jackson Thrush.

White, Reis. n. Neu-Süd-Wallis; — in dem
Magaz. merkw. Reisebeschr. V. p. 125. *die*
Port-Jackson-Drossel.

Meyer, zoolog. Entdeck. p. 52. *Port-Jacksons-*
Drossel.

Vielleicht eine Spielart von *Turd. Novae Hol-*
landiae, p. 814. n. 42.

3. *Die*

3. *Die ockergelbe Drossel.*

Mus. Carls. IV. n. 85. *Turdus Ochrogaster.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 84. n. 134. *ockergelbe Drossel.*

4. *Die lauchgrüne Drossel.*

Mus. Carls. IV. n. 86. 87. *Turdus prasinus.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 85. n. 135. *lauchgrüne Drossel.*

C. *Neuere Gattungen.*1. *Turdus australis*; Mus. Carls. fasc. III. tab. 69.

Latham, Syst. ornith. I. p. 338. n. 43. *Turdus (Australis) corpore fusco-nigricante, pectore abdomineque albis.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 84. n. 133. *die Südindische Drossel.*

2. *Persian Thrush. Latham*, Syn. Suppl. p. 145.

Latham, Syst. ornith. I. p. 343. n. 55. *Turdus (Persicus) niger, corpore subtus cinereo, alis fuscis, sub oculis macula alba, rostro pedibusque flavis.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 82. n. 127. *die persische Drossel.*

3. *Orange-headed Thrush. Latham*, Syn. Suppl. p. 145.

Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 83. *Turdus (Citrinus) cinereus, capite, collo, pectore abdomineque fulvis, crasso maculaque alarum albis.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 83. n. 139. *die orangenköpfige Drossel.*

4. *Yellow-breasted Thrush. Latham*, Syn. II. 1. p. 78. n. 105.

Latham, Vögel, II. 1. p. 71. n. 105. *die gelbbrüstige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 112. *Turdus* (Pectoralis) fuscus, collo inferiore pectoreque rufescente-flavis.

Büffon, ois. III. p. 403. — Pl. enl. p. 641. f. 2. Petit merle brun à gorge rousse de Cayenne.

5. *Gingi Thrush*. *Latham*, Syn. Suppl. p. 144.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 662. n. 133. *Turdus* (Ginginianus) griseus, capite nigro-cristato, alis virescenti-nigris, remigibus primoribus basi caudaque apice rufis, supra oculos fascia nuda flava.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 194. Petit Martin de Gingi.

Latham, Vögel, II. 1. p. 82. n. 126. die *Gingi-sche Drossel*.

6. *Dauma Thrush*. *Latham*, Syn. Suppl. p. 145.

Latham, Syst. ornith. I. p. 362. n. 134. *Turdus* (Dauma) lunulis nigris, supra fuscus, subtus albus, rectricibus alarum minoribus nigris albo variegatis, remigibus primoribus fuscis apice castaneis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 82. n. 128. die *Cowal-Drossel*.

7. *Black and scarlet Thrush*. *Latham*, Syn. Suppl. p. 146.

Latham, Syst. ornith. I. p. 363. n. 135. *Turdus* (Speciosus) ater, abdomine, dorso postico, rectricibus alarum, intermediis maculis tribus remigum rectricibusque lateralibus coccineis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 83. n. 130. die *schwarz und rothe Drossel*.

8. *Turdus minutus*. *Mus Carlson*, fasc. III. tab. 68.

Latham, Syst. ornith. I. p. 363. n. 136. *Turdus* (Minutus) supra fusco-ferrugineus, subtus ferrugi-

rugineo-cinereus, gula albida, alis et cauda nigro ferrugineoque notatis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 84. n. 132. *die kleinste Drossel.*

108. GESCHLECHT. AMPELIS. *Der Seidenschwanz.*

Müller, Natur syst. I. p. 240. Gen. CVIII.

Leske, Naturgesch. p. 258. Gen. XL.

Borowsky, Thierreich, III. p. 171. Gen. LXVIII.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 182. Gen. XXX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 504. Gen. LXVII.

Onomat. hist. nat. I. p. 381.

Batsch, Thiere, I. p. 317. Gen. LXXII.

Latham, Vögel, II. 1. p. 86. Gen. XXXII.

Latham, Syst. ornith. I. p. 363. Gen. XXXIII.

Hermann, tab. affin. anim. p. 211.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 352. Gen. LXXV.

I. GARRULUS. *Der gemeine Seidenschwanz.* (8)

Müller, Natur syst. II. p. 540. n. 1. *der Seidenschwanz.*

Leske, Naturgesch. p. 258. *der Seidenschwanz.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 171. *der Seidenschwanz*, tab. 68.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 182. n. 1. *Ampelis* (Garrulus) occipite cristato; racheos f. costae remigum secundariorum apice coccineo com-

X 2

plana-

(8) Gewicht 3 3/4 bis 4 Loth. Die Anzahl der hornartigen Spitzen an den Flügel Federn ist sehr verschieden. Gewöhnlich hat das Männchen 9, das Weibchen nur 5. Vielleicht kommt es dabey wohl mit auf das Alter des Vogels an. Schade, daß noch Niemand bisher die Jungen gesehen hat.

planato. *Seidenschwanz, Pfeffervogel; Sterbevogel; Böhmer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 505. der gemeine Seidenschwanz; die Haubendrossel.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 614. der Seidenschwanz.

Funke, Naturgesch. I. p. 234. die Haubendrossel.

Ebert, Naturl. II. p. 130. der Seidenschwanz.

Halle, Vögel, p. 302. n. 268. das Seidenschwänzchen, Fig. 16.

Meyer, Thiere, I. tab. 70. Seidenschwanz.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 398. n. 329. der Seidenschwanz, Seidenschweif.

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 169. Seidenschwanz.

Onomat. hist. nat. I. p. 384. der Seidenschwanz; böhmische Schwätzer.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 127. der Seidenschwanz.

Klein, av. p. 70. n. 34. Turdus cristatus, rostro brevi ad ortum lato.

Klein, Vorbereit. p. 133. n. 34. Seidenschwanz.

Klein, verb. Vögelhist. p. 69. n. 33. Seidenschwanz; böhmische Haubendrossel.

Klein, Stemmat. av. p. II. tab. 13. Fig. 5. a—c.

Gesner, Vögelb. p. 29. Behemle, Zinzerelle; Seidenschwanz; m. e. fehl. Fig.

Briffon, ornith. I. p. 250. n. 63. Jaseur de Boheme.

Buffon, Vögel, IX. p. 221. der Seidenschwanz; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 336. der Seidenschwanz.

Latham, Vögel, II. I. p. 86. n. 1. der gemeine Seidenschwanz.

Latham, Syst. ornith. I. p. 369. n. 1. Ampelis (Garrulus) occipite cristato, remigibus secundariis apice membranaceo colorato.

Beseke,

- Beseke*, Vögel Curl. p. 74. n. 162. *der Seidenschwanz.*
- Siemsen*, meklenb. Vögel, p. 95. n. 1. *gemeine Seidenschwanz.*
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 417. *der Seidenschwanz.*
- Fischer*, Livl. p. 95. n. 141. *gemeiner Seidenschwanz.*
- Fischer*, Zusätze zur N. G. von Livl. p. 48.
- Lepechin*, Tageb. der rufs. Reis. II. p. 5. *Seidenschwänze.*
- White*, N. G. von Engl. p. 20. p. 62. n. 17. *Seidenschwanz.*
- Linne*, Abhandl. II. p. 301. n. 19. *der Seidenschwanz.*
- Lange*, Briefe zur Naturgeschich. p. 38. *Seidenschwanz.*
- Scopoli*, Bem. a. d. N. G. I. p. 18. n. 2. *Böhmlein.*
- Schwed.* Abhandl. XXXVIII. p. 299. *Seidenschwänze.*
- Borkhausen*, Magazin, I. p. 159. n. 28. *europäischer Seidenschwanz.*
- Götz*, Naturgesch. einiger Vögel, p. 44. *der Seidenschwanz.*
- Naturforsch.* I. p. 71. XVII. p. 85. XXII. p. 127. XXV. p. 14. *Seidenschwanz.*
- Lichtenberg*, Magaz. für das Neueste, etc. I. 3. p. 66. *Seidenschwänze.*
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 315. 559. *der Seidenschwanz.*
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 56. *Seidenschwanz.*
- Naumann*, Vogelfsteller, p. 88. *Seidenschwanz.*
- Beckmann*, Bibl. I. p. 187. VIII. p. 538. *der Seidenschwanz.*
- Samml. zur Physf. u. N. G.* II. p. 750. *der Seidenschwanz.*

Meidinger, Vorles. I. p. 148. *der gemeine Seidenschwanz.*

Anweiss, Vogel zu fang. p. 121. *Seidenschwanz.*

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 308.

Oekonom. Zool. p. 96. n. 38. *der europ. Seidenschwanz.*

Fablonsky, allgem. Lex. p. 1057. *Seidenschwanz.*

Neue Mannigfaltigk. II. p. 204. *Seidenschwanz.*

Eberhard, Thiergesch. p. 73. *der Seidenschwanz.*

Görze, Natur, Menschenl. u. Vorseh. I. p. 614.

II. p. 242. III. p. 257. *der Seidenschwanz.*

Wirsing, Vögel, tab. 4. *Seidenschwanz.*

Onomatol. forestal. I. p. 402.

Piller, element. hist. nat. I. p. 40. *Ampelis Garrula.*

Fränkische Samml. II. p. 439.

Wittenb. Wochenbl. 1777. p. 278.

Gothaisch. Hofkalender, 1780. p. 64.

Linne', Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Garrulus bohemicus.*

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 1. *Garrulus Bohemicus.*

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 95. n. 10. *Lanius* (*Garrulus*) *remigibus secundariis apice membranaceo colorato, cauda integra.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 243. *Ampelis* (*Garrulus*) *occipite cristato, remigibus secundariis apice membranaceo colorato.*

Kramer, Austr. p. 363. n. 1. *Ampelis remigibus quibusdam apice membranaceo terminatis. Zuzerl; Seidenschweifl.*

Brünniche, ornith. bor. p. 8. n. 25. 26. *Lanius Garrulus.*

Moehring, av. gen. p. 42. n. 29. *Ampelis.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 229. *Bombycilla. —*

Fullo; Galerita varia; Microphoenix; Incendiaria;

diaria; Gallulus Sylvestris. *Seidenschwanz*,
Schnee-Leschke; *Behemle*; *Schneevogel*; *Wip-*
sterz.

Charleton, onom. zoic. p. 68. n. 5. Garrulus Bo-
hemicus *Gesneri*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 381. Gar-
rulus Bohemicus.

Jonston, av. p. 44. Garrulus Bohemicus *Gesn.* f.
Ampelis *Aldrov*.

Salerne, hist. nat. des oiseaux, p. 253.

Forskål, descript. anim. p. 7. n. 6. Lanius Am-
pelis.

Gerin, ornithol. II. p. 42. tab. 106.

Levin, britt. Birds, II. tab. 65.

Hermann, tab. affin. anim. p. 211. Ampelis Gar-
rulus.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 16. Γναφαλος?

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 351. n. 1.
der gemeine Seidenschwanz.

β. *Der carolinische Seidenschwanz.* (9)

Pennant, arct. Zool. II. p. 322. n. 123. *der Prip*.

Klein, av. p. 70. n. 35. Turdus garrulus caroli-
nensis.

Klein, Vorbereit. p. 133. n. 35. *grauer Seiden-*
schwanz.

Klein, verb. Vögelhist. p. 70. n. 34. *grauer Seiden-*
schwanz, p. 166. n. 2. *carolinischer Seiden-*
schwanz.

Klein, av. p. 98. n. 11. Fringilla cristata Xomoti
dicta.

Klein, Vorbereit. p. 181. n. 11. *Strausfinke*.

Klein, verb. Vögelh. p. 87. n. 11. *Straußfinke*.

X 4

Halle,

(9) Länge, nach *Pennant* nur 7. Zoll. Auch sollen dem Weib-
chen die rothen Anhänge an den Flügeln fehlen. *Briffon* führt
ihn als eine eigne Gattung auf.

Halle, Vögel, p. 304. n. 269. *der schwarzbraune karolinische Seidenschwanz.*

Briffon, ornith. I. p. 251. n. 64. *Jaseur de la Caroline.*

Büffon, Vögel, IX. p. 249. *der karolinische Seidenschwanz des Catesby und Edwards; mit 2. Figg.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 364. n. 1. β .

Latham, Syn. II. I. p. 93. n. 1. Var. A. — Vögel, II. I. p. 88. n. 1. Var. A.

Seligmann, Vögel, II. tab. 92. *der carolinische Seidenschwanz (fig. Catesb.)*

Seligmann, Vögel, VII. tab. 32. *der carolinische Seidenschwanz. (fig. Edw.)*

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 49.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 5. n. 10. β . *Garulus carolinensis.*

2. POMPADORA. *Der Pompadour.*

Müller, Natursyst. II. p. 541. n. 2. *der Pompadur.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 172. n. 2. *der Pompadur.*

Briffon, ornith. I. p. 254. n. 5. *Cotinga pourpré.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 141. *der Pacapac oder Pompadour; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 91. n. 6. *der Pompadur - Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 365. n. 6. *Ampelis (Pompadora) purpurea, tectricibus alarum proximis ensiformibus elongatis carinatis rigidis.*

Seligmann, Vögel, IX. tab. 31. *der Pompadour.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 750. *der Pacapac.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 213. *Ampelis Pompadora.*

β . *Der*

β. *Der purpurgraue Pompadour.* ⁽¹⁰⁾

Briffon, ornithol. I. p. 255. n. 6. *Cotinga gris-pourpré.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 144. *der purpurgraue Pacapac.*

Latham, Syn. II. 1. p. 97. A. Grey Chatterer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 366. n. 6. β.

γ. *Der graubraune Pompadour.*

δ. *Der graue Pompadour.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 145. *der graue Cotinga.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 91. n. 6. Var. A. *der graue Seidenschwanz; Pacapac.*

3. CARNIFEX. *Der rothe Seidenschwanz.*

Müller, Natursystem, II. p. 542. n. 3. *der Mörder.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 173. n. 3. *der rothe Seidenschwanz.*

Halle, Vögel, p. 293. n. 244. *die rothe Surinamische Drossel.*

Klein, av. p. 68. n. 12. *Turdus totus ruber.*

Klein, Vorbereit. p. 128. n. 12. *Rothe Wittewal.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 67. n. 12. *rother Wittewal.*

Briffon, ornith. I. p. 255. n. 7. *Cotinga rouge.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 146. *Louette, oder der rothe Cotinga aus Cayenne; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 91. n. 7. *der rothe Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 366. n. 7. *Ampelis (Carnifex) ruber, fascia oculari, remigum rectricumque apicibus nigris.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 77. *der surinamische Rothvogel.*

Bankroft, N. G. von Guiana, p. 92. *der rothe Neuntödter oder Fleischervogel von Surinam.*

Samml. zur Physf. u. N. G. II. p. 751. der rothe cayennische Cotinga.

Moehring, av. gen. p. 79. n. 101. *Fringillae adfinis.*

Hermann, tab. affin. animi. p. 213. *Ampelis Carnifex.*

8. COCCINEA. *Der schillernde Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 366. n. 8. *Ampelis (Cuprea) olivacea, pennis apice cupreo-aurantiis, pileo rubro, genis aurantiis, pectore et abdomine sanguineis margine viridi. nitentibus.*

Latham, Vögel, II. I. p. 94. n. II. *der schillernde Seidenschwanz.*

4. COTINGA. *Der blaubrüstige Seidenschwanz.*

Müller, Naturfyst. II. p. 542. n. 4. *der brasiliensche Seidenschwanz.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 147. n. 4. *der Fünffack.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 166. n. 1. *purpurbrüstiger blauer Witteval.*

Briffon, ornith. I. p. 252. n. 1. *Cotinga.*

Buffon, Vögel, XIII. p. 129. *der Blaugürtel. Cotinga mit dem Orden; in e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 89. n. 2. *der rothbrüstige Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 364. n. 2. *Ampelis (Cotinga) nitidissima caerulea, subtus purpurea, alis caudaque nigris.*

Seligmann, Vögel, VII. tab. 31. *der blaue Manakin mit purpurfarbner Brust.*

Seligmann, Vögel, IX. tab. 30. *der Manakin mit purpurfarbner Brust.*

Salerne, ornith. p. 174. Grive de Rio-caneiro;
Cotinga ou Grive au cordon bleu.

5. MAYNANA. *Der Seidenvogel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 542. n. 5. *der majennische Seidenschwanz.*

Briffon, ornith. I. p. 253. n. 2. Cotinga de Maynas.

Büffon, Vögel, XIII. p. 139. *der Cotinga mit seidenartigen Federn*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 90. n. 5. *der seidenartige Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 365. n. 5. Ampelis (Maynana) nitida caerulea, gula violacea, remigibus intus albis.

Salerne, ornith. p. 174. Grive ou Cotinga de Maynas.

Hermann, tab. affin. anim. p. 213. Ampelis Maynana.

6. CAYANA. *Der cayennische Seidenschwanz.*

Müller, Naturfyst. II. p. 542. n. 6. *der cayennische Seidenschwanz.*

Halle, Vögel, p. 223. n. 161. *der mexicanische schwarzblaue Würger.*

Klein, av. p. 54. n. 6. Lanius Ocotolin dictus.

Klein, Vorbereit. p. 102. n. 6. *der Okokolin.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 53. n. 31. *Mexikaner Neuntöchter.*

Briffon, ornithol. I. p. 253. n. 3. Cotinga de Cayenne.

Büffon, Vögel, XIII. p. 134. *der Guereiva; Cayennische Cotinga*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 89. n. 3. *der rothkehlige Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 365. n. 3. Ampelis (Cayana) nitida caerulea, collo subtus violaceo, remigi-

remigibus rectricibusque nigris, caeruleo-marginatis.

Seba, thes. II. p. 102. tab. 96. n. 3. Oocolin, species pici.

De Laet, nov. orb. p. 542. Quereiva.

Forster, av. p. 180. Quereiva.

7. **TERSA.** *Der Tersinne.*

Müller, Naturfyst. II. p. 543. n. 7. der bunte Seidenschwanz.

Büffon, Vögel, XIII. p. 137. der Tersinne.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 365. n. 4. Ampelis (Tersa) nitida-caerulea, dorso nigro, abdomine albo-flavescente.

Latham, Vögel, II. I. p. 90. n. 4. der blaubrüstige Seidenschwanz.

9. **CARUNCULATA.** *Der weiße Seidenschwanz.*

Briffon, ornithol. I. p. 257. Cotinga blanc.

Büffon, Vögel, XIII. p. 152. der Guira-Panga, oder der weiße Cotinga; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 92. n. 8. der Seidenschwanz mit Fleischzapfen, tab. 41.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 366. n. 9. Ampelis (Carunculata) alba, uropygio, remigibus rectricibusque flavescente-adumbratis, fronte nudata, elongata, carunculata.

De Laet, nov. orb. p. 557. Guira-panga.

Hermann, tab. affin. anim. p. 213. Ampelis alba.

10. **VARIEGATA.** *Der Averano.* (Sommervogel).

Briffon, ornithol. I. p. 256. n. 9. Cotinga tacheté.

Büffon, Vögel, XIII. p. 155. der Averano; gefleckte Cotinga; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 93. n. 9. der bunte Seidenschwanz.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 367. n. 10. *Ampelis* (*Variegata*) cinerea, nigricante virescenteque variegata, capite obscure fusco, remigibus nigricantibus, sub gula carunculis duabus carnosiss elongatis nigris.

Pison, hist. nat. p. 93. *Guira-punga*.

Jonston, av. p. 196. *Guirapunga*, p. 197. *Ave de Verano*.

Martgrav. Brasil. p. 201. *Guira-punga* Brasilien-sibus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 211. 214. *Ampelis Averano*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 353. n. 2. *der Averano*.

II. CRISTATA. *Der gehäubte Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 368. n. 14. *Ampelis* (*Cristata*) capite cristato, alis caudaque nigris, abdomine genisque albis, dorso rubro.

Latham, Vögel, II. 1. p. 94. n. 12. *der Kronen-Seidenschwanz*.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 4. Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung sind vier Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der rothflügige Seidenschwanz; in Afrika.*

Latham, Syn. Suppl. p. 146. Red-winged Chat-terer.

Latham, Vögel, II. 1. p. 93. n. 10. *der rothflügelige Seidenschwanz*.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 367. n. 12. *Ampelis* (Phoenicia) caeruleo-nigra, alarum tectricibus minoribus fulvo-coccineis.

2. *Der goldgelbe Seidenschwanz.*

Mus. Carls. fasc. III. tab. 70. Ampelis luteus.

Latham, Vögel, II. I. p. 94. n. 13. *der gelbe Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 368. n. 13. *Ampelis* (Lutea) corpore supra fusco-olivaceo, subtus uropygio rectricibusque lateralibus luteo, macula faucium alba.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.

COLIUS. *Der Colius. (Kegelschnabel; Kegelschnäbler; Keilschwanz.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 189. Gen. LXXIV.

Brissson, ornith. I. p. 393. Gen. XXXVI.

Büffon, Vögel, XIII. p. 53. fqq.

Latham, Vögel, II. I. p. 95. Gen. XXXIII.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 368. Gen. XXXIV.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 744. fqq.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 353. Gen. LXXVI.

I. CAPENSIS. *Der capische Colius.*

Müller, Naturfyst. II. p. 549. n. 12. *der Kegelschnabel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 189. *der capische Kegelschnäbler.*

Brissson, ornith. I. p. 394. n. 1. *Coliou du cap de bonne esperance.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 59. *der kapsche Kegelschnabel; m. e. Fig.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 844. *der Emmerling mit dem langen keilförmigen Schwanze vom Vorgebürge der guten Hoffnung.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 255. *der Coliou auf dem Vorgeb. d. g. Hoffn.*

Latham; Syst. ornith. I. p. 368. n. 1. Colius (Capensis) rectricibus extimis externe albis, corpore cinereo subtus albido.

Latham, Vögel, II. 1. p. 95. n. 1. *der capische Kegelschnäbler.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 744. *der Coliou.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 354. *der capische Kegelschnäbler.*

2. SENEGALENSIS. *Der senegalische Colius.*

Müller, Naturyst. II. p. III. n. 5. *der senegallische Langschwanz.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 660. *der Würger mit dem Busche aus Senegall.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 256. *der Coliu von Senegal.*

Briffon, ornithol. I. p. 394. n. 2. Coliou hupé du Sénégal.

Büffon, Vögel, II. p. 241. *der langgeschwänzte senegalische Würger.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 61. *der gehäubte senegalische Colius; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 96. n. 2. *der Senegalische Kegelschnäbler.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 368. n. 2. Colius (Senegalensis) vinaceo-grisescens, cauda caerulefcente, capite cristato.

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. I. p. 134. n. 5. Lanius (Macrourus) cauda cuneiformi longissima caerulefcente, capite cristato.

3. ERYTHROPUS. *Der rothfüßige Colius.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 96. n. 3. *der weißrückige Kegelschnäbler*, tab. 42.

Latham, Syst. ornith. I. p. 369. n. 3. Colius (Leuconotus) cristatus cinereus subtus albus, dorso infimo uropygioque castaneo-purpureis, medio vitta longitudinali alba.

4. STRIATUS. *Der gestreifte Colius.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 63. *der gestreifte Colius.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 97. n. 4. *der gestreifte Kegelschnäbler.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 369. n. 4. Colius (Striatus) griseo-rubescens, subtus fusco transversim striatus, pectore griseo-rufo, abdomine rufo, cauda viridi.

5. PANAYENSIS. *Der Colius von Panay.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 64. *der Colius von Panay*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 97. n. 5. *der Panayische Kegelschnäbler.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 369. n. 5. Colius (Panayensis) griseo-cinereus, capite cristato, pectore striis transversis nigris, abdomine rufo.

Sonnerat, Reis. nach Neuguinea, p. 42. *der Koliu von Panai*; m. e. Fig.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 746. *der Coliu von der Insel Panay.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das ganze Geschlecht ist hier neu; findet sich aber schon bey *Brissou*. Die 1ste und 2te Gattung sind aus andern Geschlechtern hieher versetzt; die übrigen drey sind neu hinzugekommen.

B. *Neuere*

B. Neuere Gattungen.

1. Der grüne Colius in Neuholdand.

Latham, Syn. Suppl. p. 147. Green Coly.

Latham, Vögel, II. 1. p. 97. n. 6. der grüne Kegelschnäbler.

Latham, Syst. ornith. I. p. 369. n. 6. Colius (Viridis) viridis nitens, fincipite palpebrisque nigro-fericeis, remigibus rectricibusque nigricantibus.

2. Der aschgraue indianische Colius.

Latham, Syn. Suppl. p. 147. Indian Coly.

Latham, Vögel, II. 1. p. 97. n. 7. der Indische Kegelschnäbler.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 370. n. 7. Colius (Indicus) cinereus, subtus rufus, fincipite gula-que flavis, loris orbitisque nudis flavis.

109. GESCHLECHT. LOXIA. Der Kernbeißer.
(Dickschnabel).

Müller, Naturfyst. II. p. 544. Gen. CIX.

Leske, Naturgesch. p. 259. Gen. XLI.

Borowsky, Thierreich, III. p. 131. Gen. LXXI.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 183. Gen. XXXI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 506. Gen. LXVIII.

Ebert, Naturl. II. p. 131.

Halle, Vögel, p. 396. Gen. IV.

Onomat. hist. nat. IV. p. 833.

Pennant, arch. Zool. II. p. 323.

Klein, av. p. 94. Trib. IV.

Briffon, ornith. I. p. 370. Gen. XXXIV. Cocco-thraustes, p. 305. Gen. XXXVII. Pyrrhula, p. 401. Gen. XXXVIII. Loxia.

Batsch, Thiere, I. p. 317. Gen. XXXVI.

Latham, Vögel, II. 1. p. 99. Gen. XXXIV.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 370. Gen. XXXV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 216.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 354. Gen.
LXXVII.

I. CURVIROSTRA. Der Kreutzschnabel. (1)

Müller, Natursystem, II. p. 544. n. 1. der Kreutz-
schnabel.

Leske, Naturgesch. I p. 259. n. 1. der Kreutz-
schnabel.

Borowsky, Thierreich, I. p. 131. n. 1. der Kreutz-
schnabel. Tab. 61.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 183. n. 1. Loxia
(Curvirostris) rostro forficato. Kreutzschnabel;
Krummschnabel; Krünitz.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 507. n. 1. der Kreutz-
schnabel.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 595. der
Kreutzschnabel; Grünitz.

Funke, Naturgesch. I. p. 332. der Kreutzschnabel.

Ebert, Naturl. II. p. 132. der Kreutzvogel.

Halle,

- (1) Die Größe einer Lerche sagt wohl zu wenig. Er ist noch größer als ein Dompfaff. — Falsch ist es, wenn man im Allgemeinen behauptet, daß sein Gesang schlecht sey; er ist vielmehr, besonders bey abgerichteten Vögeln, der Nachtigall ihrem ähnlich. — Diejenigen, die man in den Stuben hält, geben zwar im October und November oft ein unangenehmes lautes Geschrey von sich, wovon aber wahrscheinlich ihr Naturtrieb, sich kurz vor dem Winter zu paaren, die Ursach ist — Die vornehmste Nahrung dieses Vogels ist der *Cimex abietis*, der unter den sich fest anschließenden Schuppen der Tannenzapfen Schutz wider den Winter sucht. Die Kreutzvögel brechen gegen den Winter eine Menge Zapfen ab, um aus ihnen die Wanzen hervorzuhohlen, und sie sind ihm vielleicht ein Aphrodisiacum, daß eben desfalls so früh ihre Begattungen und Geburten erfolgen. — Zuweilen finden sich auch Kreutzschnäbel, deren Oberkiefer von der rechten zur linken gebogen ist, und alsdann ist auch der Unterkiefer anders gekehrt. — Kann über 10. Jahr alt werden.

- Halle, Vögel, p. 404. n. 416. *der Tannenvogel; Tannenpapagai; Zapfenbeißer; Zapfennager. Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 398 n. 330. *der Kreutzschnabel; Krummschnabel; Grinitz.*
- Pennant, arch. Zool. II. p. 323. n. 124. *der Kreutzschnabel.*
- Beckmann, Naturhist. p. 53. d. *der Kreutzschnabel.*
Neuer Schaupl. der Nat. IV. p. 769. *Kreutzschnabel.*
- Onomat. hist. nat. III. p. 536. *der Kreuzvogel.*
Handb. der Naturgesch. II. p. 258. *der Creutzschnabel*, tab. 4.
- Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 127. *Kreutzschnabel.*
- Klein, av. p. 96. n. 13. *Coccothraustes curvirostra.*
Klein, Vorbereit. p. 178. n. 13. *Kreuzschnabel.*
Klein, verbeß. Vögelhistor. p. 96. n. 16. *Kreutzschnabel.*
- Klein, Stemmat. av. p. 19. tab. 19. fig. 19. a. b.
- Gesner, Vögelb. p. 355. *Kreutzvogel oder Krumb-schnabel*; Fig. p. 356.
- Briffon, ornith. I. p. 401. n. 1. *Bec-croisé.*
- Büffon, Vögel, IX. p. 21. *der Kreutzschnabel*; m. e. Fig.
- Batsch, Thiere, I. p. 350. *der Kreutzschnabel.*
- Latham, Vögel, II. 1. p. 99. n. 1. *der gemeine Kreuzschnabel.*
- Latham, Syst. ornith. I. p. 370. n. 1. *Loxia (Curvirostra) rostro forficato, corpore versicolore, remigibus rectricibusque fuscis, oris exterioribus viridi-olivaceis, cauda furcata.*
- Beseke, Vögel Kurl. p. 75. n. 163. *der Kreuzschnabel.*
- Siemßen, meklenb. Vögel, p. 97. n. 1. *der Kreuz-schnabel; Krüüzschnabel.*

- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 418. *der Kreutzschnabel.*
- Fischer*, Liv. p. 96. n. 142. *Kreuzschnabel.*
- White*, N. G. von Engl. p. 15. p. 62. n. 16. *Kreuzschnabel.*
- Pontoppidan*, Dännem. p. 173. n. 1. *Korsnåb.*
- Seligmann*, Vögel, VIII. tab. 93. *aer Krummschnabel; ein Er und eine Sie.*
- Pennant*, britt. Thiergesch. p. 120. *Krummschnabel.*
- Scopoli*, Bem. aus der N. G. I. p. 165. n. 200. *der Krummschnabel.*
- Naturforsch.* II. p. 66. — XII. p. 92. — XVII. p. 86. n. 176. — XXI. p. 197. n. 5. — XXII. p. 142. — XXV. p. 17. *Kreuzschnabel; Kreuzvogel.*
- Lichtenberg*, Magazin für das Neueste, etc. I. 3. p. 67. *Kreutzschnåbel.*
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 344. *der Krumm-Schnabel.*
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 57. *Grinitz; Creutzvogel.*
- Naumann*, Vogelfteller, p. 130. *Kreutzvogel.*
- André u. Bechstein*, Spazierg. I. p. 21. *der Kreutzschnabel.*
- Bechstein*, Must. schädl. Thiere, p. 134. n. 2. *der Kreutzschnabel.*
- Schwed. Abhandl.* XIX. p. 134. *Kreutzschnabel.*
- Neue schwed. Abhandl.* IV. p. 49. *Kreutzschnåbel.*
- Goeze*, nützl. Allerl. II. p. 283. n. 7. *der Kreutzschnabel.*
- Goeze*, Natur, Menschenl. und Vorf. I. p. 614. V. p. 297. *der Kreutzschnabel.*
- Smellie*, Philosoph. der Naturgesch. II. p. 255.
- Samml. zur Physf. u. N. G.* II. p. 620. *der Kreuzschnabel.*

- Borkhausen*, Magaz. I. p. 137. n. 1. *Kreuzschnabel*.
Beckmann, Bibl. V. p. 383. VI. p. 162. VIII. p. 538.
der Finnische Papagey; Kreuzvogel.
Erxleben, phys. Bibl. III. p. 278. *Kreutzschnabel*.
Oekon. Zool. p. 97. n. 93. *der Kreutzschnabel*.
Meidinger, Vorles. I. p. 148. n. 1. *der Kreuz-*
schnabel.
Jablonsky, allgem. Lex. p. 558. *Krinitz*.
Anweis. Vögel zu fang. p. 352. *der Krummschna-*
bel.
Forst Fisch- und Jagdlex. II. p. 598. *Krinitz; Grü-*
nitz; Grönitz.
Mannigfaltigk. 1776. p. 463. *Kreutzschnabel*.
Börner, schles. ökonom. Nachr. 1781. p. 100.
Loxia curvirostra.
Krinitz, Encykl. XLIX. p. 267. *Kreuz-Vogel*.
Hannov. Seltenheit. der Nat. I. p. 278.
Allgem. Gesch. d. neuesten Entdeck. in Russl. und
Perf. VI. p. 241.
Schrift der berlin. Gesellsch. N. Fr. VII. p. 465. n.
 53. *der Kreutzschnabel*.
Eberhard, Thiergesch. p. 82. *der Kreutzschna-*
bel.
Koelreuter, act. hist. acad. Palat. III. p. 62.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Loxia*.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 2. *Curvi-*
rostra.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 171. n. 1. *Loxia*
(Curvirostra) rostro forficato.
Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 244. *Loxia*
(Curvirostra) rostro forficato.
Moehring, av. gen. p. 40. n. 24. *Loxias*.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 252. *Curvirostra. Kri-*
nitz; Krinis.
Rzaczynsky, aust. hist. nat. Polon. p. 391. *Loxia;*
Crucifera, Cruciata.

Sibbald, Scot. p. 254. Loxia.

Hermann, tab. affin. anim. p. 216. 218. Loxia curvirostra.

Schaefer, element. ornithol. tab. 45.

Levin, britt. Birds II. tab. 66.

Faun. Arragon. p. 85. — Hist. prov. II. p. 317.

Bomare, dictionn. I. p. 463. Bec-croisé.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 354. n. 1. der Kreutzschnabel.

Donndorff, Natur und Kunst, I. p. 553.

β. Der braunrothe Kreutzschnabel mit rothem Kopfe.

Briffon, ornith. I. p. 403. A. Bec-croisé roussatre.

Büffon, Vögel, IX. p. 32. der pyrenäische Kreutzschnabel.

Barrere, ornithol. cl. 3. gen. 18. sp. 2. Loxia pyrenaica ex subrufo nigricans, cervice et capite coccineis.

γ. Der größere Kreutzschnabel mit dickerm und kürzerem Schnabel.

Büffon, Vögel, IX. p. 48. der große Krummschnabel; m. e. Fig.

Krünitz, Encykl. XLIX. p. 284. der große Kreuz-Vogel.

Borkhausen, Magaz. I. p. 139. Loxia (Pytyopstacus) rostro subforficato, digito medio brevior.

12. LEUCOPTERA. Der weißflüglige nordamerikanische Kernbeißer.

Pennant, arct. Zool. II. p. 323. ad n. 124. die amerikanische Art.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 371. n. 2. Loxia (Falcirostra) rostro forficato, corpore croceo-coccineo, alis nigris, fasciis duabus albis, remigibus secundariis apice albis, cauda nigra.

Latham,

Latham, Syn. Suppl. p. 148. White-winged Crossbill.

Latham, Vögel, II. 1. p. 103. *der weißflügelige Kreutzschnabel.*

50. PSITTACEA. *Der Papageykernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 371. n. 3. Loxia (Psittacea) olivaceo-fusca, capite colloque flavis, mandibula superiore adunca, inferiore subtruncata.

Latham, Vögel, II. 1. p. 104. n. 3. *der papageyschnäbelige Kernbeißer*, tab. 43.

2. COCCOTHAUSTES. *Der gemeine Kernbeißer.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 546. n. 2. *der Dick Schnabel*, tab. 25. fig. 1.

Leske, Naturgesch. p. 259. n. 2. *der Kirschfink.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 132. n. 2. *Kirschfink; Steinbeißer.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 183. n. 2. Loxia (Coccothraustes) linea alarum alba, remigibus mediis apice rhombeis, rectricibus latere tenuiore bascos nigris; *Kernbeißer, Kirschknäpper.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 510. n. 4. *der Kirschfink; Dick Schnabel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 303. *der Kernbeißer.*

Ebert, Naturl. II. p. 131. *der Kirschfink.*

Halle, Vögel, p. 396. n. 405. *der Kirschensfink; Fichtenhäcker; Fig 25.*

Meyer, Thiere, II. tab. 75. *Kernbeißer.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 399. n. 332. *der Kernbeißer; Kirschenschneller; Klepper; Kirschleske.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 329. C. *der Kernbeißer.*

- Neuer Schaupl. der Natur. V. p. 457. *Kernbeißer*.
 Onomat. histor. natur. III. p. 35. *der Kernbeißer*;
Nußbicker; *Nuß- oder Tannhäger*.
 Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 128. *Kern-*
beißer.
 Beckmann, Naturhist. p. 52. a. *der Kirschenfink*.
 Klein, av. p. 94. n. 1. *Coccothraustes*, simpli-
 citer.
 Klein, Vorbereit. p. 175. n. 1. *brauner Steinbeißer*;
Kirschleske.
 Klein, verbess. Vögelhistor. p. 94. n. 1. *brauner*
Steinbeißer; *Kirschfink*; *Klepper*.
 Klein, stemmat. av. p. 19. tab. 19. fig. II. a. b.
 Gesner, Vögelb. p. 486. *Steinbeißer*; *Klepper*;
Kernbeiß; *Bollenpick*; m. e. gut. Fig.
 Brisson, ornith. I. p. 370. n. 1. Gros-bec.
 Buffon, Vögel, X. p. 5. *der Kernbeißer*; m. 2.
 Figg. M. u. W.
 Batsch, Thiere, I. p. 348. *der gemeine Kernbeißer*.
 Latham, Syn. Suppl. p. 148. Grosbeak.
 Latham, Vögel, II. 1. p. 104. n. 4. *der gemeine*
Kernbeißer.
 Latham, Syst. ornithol. I. p. 371. n. 4. Loxia
 (*Coccothraustes*) cinereo-castanea, linea ala-
 rum alba, remigibus mediis apice rhombeis,
 rectricibus latere tenuiore baseos nigris.
 Seligmann, Vögel, VI. tab. 83. *brauner Kern-*
beißer.
 Siemssen, meklenb. Vögel, p. 98. n. 2. *der Kern-*
beißer; *Kaarnbiker*.
 Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 420. *der Dick-*
schnabel.
 Fischer, Liv. p. 96. n. 144. *Dickschnabel*.
 Cetti, Sardin. II. p. 179. *der Kernbeißer*.
 White, N. G. von Engl. p. 15. p. 62. n. 15. *Kirsch-*
fink.

Pallas,

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 15. *Dickschnabel*.
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 2. *Kirsebärfugl*.
Linne, Abhandl. II. p. 302. n. 122. *der Kirsch-*
fink.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 118. tab. 56. fig. 1.
Kernbeißer.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 166. n. 201. *der*
Kernbeißer.

Borkhausen, Magazin, I. p. 139. n. 2. *Dickschna-*
bel; *Kirschfink*.

Naturforsch. XVII. p. 87. — XXII. p. 143. —
 XXV. p. 19. *Kernbeißer*.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 620. *der Kirsch-*
fink.

Zorn, Petinotheol. II. p. 325 *der Kirsch-Fink*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 56. *Kern-Beißer*; *Kirsch-*
Schneller; *Kirsch-Knepper*.

Naumann, Vogelfsteller, p. 142. *der Kernbeißer*.
Bechstein, Muß. schädl. Th. p. 133. n. 1. *der Kirsch-*
fink.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 70. III. p. 312.

Krünitz, Encykl. XXXIX. p. 191. *Kirschfink*.

Goeze, nützl. Allert. II. p. 379. *Kernbeißer*.

Meidinger, Vorles. I. p. 148. n. 2. *der Kirsch-*
fink.

Anweis. Vögel zu fang. p. 338. *der Kernbeiß*.

Beckmann, Bibl. VIII. p. 538. *der Kirschfink*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 526. *Kernbeißer*.

Wirsing, Vögel, tab. 16. *Kernbeißer*.

Onomatol. forestal. II. p. 482.

Mannigfaltigk. 1776. p. 463. 2.

Oekonom. Zool. p. 97. n. 4. *der Kernbeißer*.

Heister, de glandulis in ingluvie Coccothraustae
 observatis. — Eph. nat. curios. I. p. 408. c.
 fig.

Linne, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. Coccothraustes.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 1. *Coccothraustes*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 171. n. 2. *Loxia* (*Coccothraustes*) *linea alarum simplici alba*, *rectricibus latere tenuiore baseos albis*.

Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 245. *Loxia* (*Coccothraustes*) *linea alarum alba*, *remigibus mediis apice rhombeis*, *rectricibus latere tenuiore baseos nigris*.

Kramer, Austr. p. 364. n. 1. *Loxia linea alarum duplici alba*. *Kernbeiß*; *Nußbeißer*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 236. *Coccothraustes*; *Leske*; *Kirsch-Leske*, *Steinbeißer*; *Lysklicker*; *Kirschfinke*; *Klepper*; *Bollenbeißer*.

Jonston, av. p. 108. *Coccothraustes*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 337. *Gros-bec*; *Pinçon royal*.

Schaefer, element. ornithol. tab. 57.

Levin, britt. Birds, II. p. 67.

Roman. orn. I. p. 151. tab. 23.

Faun. Arragon. p. 85. — *Hist. Prov. I.* p. 493.

Hermann, tab. affin. anim. p. 217. *Loxia Coccothraustes*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 355. n. 2. *der gemeine Kernbeißer*.

3. ENUCLEATOR. *Der große Kernbeißer*.

Müller, Natur Syst. II. p. 546. n. 3. *der Krappenfresser*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 133. n. 3. *der Kernfresser*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 509. n. 2. *der Kernfresser*; *Fichtenhacker*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 399. n. 331. *der große Kernbeißer*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 324. n. 125. *der Fichtendickschnabel*.

Onomat.

Onomat. hist. nat. III. p. 846. *der Canadensische Kernbeißer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 13. *Parisvogel.*

Briffon, ornith. I. p. 378. n. 15. Gros-bec de Canada.

Büffon, Vögel, X. p. 59. *der Talbit, oder canadische Kernbeißer, oder Hartschnabel; m. e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 349. *der canadische Kernbeißer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 148. Pine Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 106. n. 5. *der Fichtenkernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 372. n. 5. Loxia (Eucleator) fordide roseo fusco griseoque varia, linea alarum duplici alba, rectricibus totis nigricantibus.

Seligmann, Vögel, V. tab. 18. *der größte Dick-schnabel, der Er; tab. 19. die Sie.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 76. n. 164. *der Krappen-fresser; tab. 7. fig. 1. u. 2.*

Siemsen, meklenb. Vögel, p. 99. n. 3. *der Parisvogel.*

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 421. *Parisvogel; pomeranzenfarbiger oder rother Kernbeißer.*

Fischer, Livl. p. 96. n. 145. *großer Kernbeißer; finnischer Dompfaffe; finnischer Papagey.*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reif. I. p. 197. *der Kernbeißer.*

Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 91. *der große Rothschwanz.*

Linné, Abhandl. II. p. 302. n. 123. *der Kernbeißer.*

Schwed. Abhandl. XIX. p. 132.

Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 49. *Talbitur.*

Natur.

Naturforsch. XVII. p. 87. n. 178. *der Krappenfresser.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 622. *der Dur-bec. Pennant*, britt. Thiergesch. p. 119. *der Kernfresser.*

Männigfaltigk. 1776. p. 463. n. 3.

Meidinger, Vorles. I. p. 148. n. 3. *der kanadische Kernbeiß.*

Linne', amoenit. acad. VII. p. 127. *Loxia ENUcleator.*

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 171. n. 3. *Loxia* (Eucleator) linea alarum duplici alba, rectricibus totis nigricantibus.

Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 246. *Loxia* (Eucleator) linea alarum duplici alba, rectricibus totis nigricantibus.

Levin, britt. Birds. II. tab. 68.

Hermann, tab. affin. anim. p. 178. *Loxia ENUcleator.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 355. n. 3. *der große Kernbeißer.*

51. NAEVIA. *Der gefleckte capsche Kernbeißer.* (3)

Büffon, Vögel, X. p. 121. *der gefleckte Kernbeißer*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 373. n. 7. β. *Loxia fusca*, pennis medio nigris, subtus albida, nigro striata, tectricibus alarum uropygioque luteis.

Latham, Syn. II. I. p. 114. n. 7. Var. A. — Vögel, II. I. p. 109. n. 7. A.

52. MA-

(3) Die *Büffonschen* Synonymen sind p. 862. n. 39. β. nochmals aufgeführt, und dieser Vogel daselbst als Spielart von *Loxia Capensis* aufgenommen, wofür ihn auch *Latham* anführt.

52. MACROURA. *Der langgeschwänzte Kernbeißer.*

Büffon, Vögel, X. p. 157. 160. *der schwarze langgeschwänzte Sperling; der schwarze Sperling von Juda; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 109. n. 8. *der langschwänzige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 773. n. 9. *Loxia* (Longicauda) nigra, tectricibus alarum dorsoque inter alas fascia transversa rufo-lutea, cauda longiore cuneiformi.

53. AUREA. *Der goldrückige Kernbeißer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 110. n. 9. *der goldrückige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 373. n. 8. *Loxia* (Aurea) nigra, dorso uropygioque luteis, tectricibus alarum fuscescentibus nigro maculatis.

54. RUBICILLA. *Der caucasische Kernbeißer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 108. n. 6. *der Caucasische Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 372. n. 6. *Loxia* (Rubicilla) coccinea albo maculata, abdomine crissoque roseis, tectricibus alarum maioribus fuscis, cauda nigra.

Hermann, tab. affin. anim. p. 218. *Loxia Rubicilla.*

4. PYRRHULA. *Der Dompfaffe. (4)*

Müller, Natur Syst. II. p. 547. n. 4. *der Thumpfaffe; tab. 25. Fig. 3.*

Leske,

(4) Nährt sich hauptsächlich von allerley Saamen, Beeren, Knospen, und Insekten. Im Bauer kann man ihn mit bloßem Rübsaamen viele Jahre unterhalten. Wird sehr leicht zahm, und

- Leske*, Naturgesch. p. 260. n. 3. *der Gimpel*.
Borowsky, Thierreich, III. p. 135. n. 5. *der Dompfaff; Gimpel*.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 183. n. 3. *Loxia* (Pyrrhula) artubus nigris, rectricibus caudae remigumque posticarum albis. *Dompfaff, Blutsink; Liebig, Rothsink; Gieker*.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 509. n. 3. *der Gimpel*.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 587. *der Dompfaff; Gimpel; Hahle*.
Funke, Naturgesch. I. p. 270. *der Dompfaff*.
Ebert, Naturl. II. p. 131. *Gympel; Thumherr*.
Halle, Vögel, p. 401. n. 409. *der Blutsink, Dommherr, Dummherr*.
Meyer, Thiere, II. tab. 8. *der Blutsink*.
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 400. n. 333. *der Dompfaff; Rothscklegel; Schniegel; Goldsink; Pfäfschen*.
Beckmann, Naturhist. p. 52. b. *der Dompfaffe*.
Pennant, arch. Zool. II. p. 319. A. *der Dompfaffe*.
Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 274. III. p. 417. *Blutsink; Gimpel*.
Onomat. hist. nat. IV. p. 856. *Blutsink*.
Handb. der Naturgesch. II. p. 256. *der Thumpfaff*.
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 128. *der Dompfaff; Hoylen*.
Klein, av. p. 95. n. 5. *Coccothraustes sanguinea*.
Klein, Vorbereit. p. 176. n. 5. *Thumpfaffe; Lohfinke; Rottvogel*.
Klein,

und es gehört dazu gar nicht viel Zeit und Geduld, wie *Buffon* meint. Dafs er aber im Zimmer so leicht hecke, wie einige vorgeben, widerspricht wenigstens meiner eignen vieljährigen Erfahrung. Noch weniger ist mir ein Beyspiel bekannt, dafs sich ein Dompfaffe mit einer Kanarien-Sie gepaart habe. — Wird an 20 Jahr alt.

- Klein*, verb. Vögelhist. p. 94. n. 5. *Thumpfaffe*.
Klein, Stemmata. av. p. 19. tab. 19. Fig. 13. a. b.
Gesner, Vögelb. p. 43. *Blutfink*; p. 44. *Pfäfflein*; *Güger* (*Quetsch* das Weibch.) m. e. mit-
 telm. Fig.
Briffon, ornith. I. p. 395. *Bouvreuil*.
Buffon, Vögel, XIII. p. 6. *der Gimpel*; m. 2.
 Figg. M. u. W.
Batsch, Thiere, I. p. 349. *der Dompfaff*.
Latham, Syn. Suppl. p. 152. *Bulfinch*.
Latham, Vögel, II. 1. p. 135. n. 51. *der Gimpel*.
Latham, Syst. ornith. I. p. 387. n. 56. *Loxia*
 (*Pyrrhula*) cinerea, artubus nigris, tectricibus
 caudae remigumque posticarum albis.
Beseke, Vögel Kurl. p. 77. n. 165. *der Dompfaff*.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 101. n. 4. *der ge-*
meine Dompfaff; *Dohnpaap*.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 421. *der Thum-*
pfaffe.
Fischer, Livl. p. 96. n. 143. *Dompfaffe*.
White, N. G. von Engl. p. 30. p. 66. n. 7.
Blutfink.
Linné, Abhandl. II. p. 302. n. 120. *der Blutfink*.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 167. n. 202. *der*
Gympel.
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 3. *Dompfaffe*.
Pontoppidan, Norweg. II. p. 130. *Domherre*.
Naturforsch. XVII. p. 88. n. 179. *der Thumpfaffe*.
 XXI. p. 197. *Liebiche*.
Borkhausen, Magaz. I. p. 140. n. 3. *Blutfink*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 27. 328. *der Blut-Fink*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 56. *Gümpel*; *Rothschle-*
gel; *Schnigel*.
Naumann, Vogelsteller, p. 89. *Schniel oder Dom-*
pfaffe.
André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 308.

- Samml. zur Physf. u. N. G. II. p. 743. *der Gimpel*.
Beckmann, Bibl. VI p. 477. *Dompfaffe*.
Krünitz, Encykl. XVIII. p. 535. *Gimpel*.
Oekonom. Zool. p. 98. n. 41. *der Gimpel*.
Meidinger, Vorl. I. p. 148. n. 4. *der Gimpel*.
Jablonsky, allgem. Lex. p. 272. *Duhmpfaffe*.
Anweiss. Vögel zu fang. p. 237. *Gimpel*.
Loniceri, Kräuterb. p. 682. *Blutfink*.
Eberhard, Thiergesch. p. 82. *Blutfink*.
Forst-Fisch-u. Jagdlex. I. p. 1047. *Gimpel*.
Börner, Schles. ökon. Nachr. 1781. p. 101. *Loxia*
Pyrrhula.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Pyrrhula*.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 3. *Pyrrhula*.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 171. n. 4. *Loxia*
 (*Pyrrhula*) *artubus nigris, tectricibus caudae*
remigumque posticarum albis.
Müller, Zool. dan. prodr. p. 30. n. 247. *Loxia*
 (*Pyrrhula*) *artubus nigris, tectricibus caudae*
remigumque posticarum albis.
Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 9. *Rubicilla*.
Moehring, av. gen. p. 49. n. 25. *Pyrrhulas*.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 262. *Fringilla sanguinea*. *Blut-Finke*; *Luh-, Loh-Finke*; *Rottvogel*; *Bollenbeisser*; *Gimpel*.
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 419. *Rubicilla* seu *Pyrrhula*.
Belon, hist. nat. des ois. L. 7. c. 17. fol. 13. *Pivoine*.
Salerne, hist. nat. des ois. p. 258. *Ebourgeonneux, etc.*
Schaefer, element. ornithol. tab. 59.
Zinnan, Uov. p. 59. tab. 8. Fig. 48. *Monachino*.
Levin, britt. Birds. II. tab. 70.
Faun. Arragon. p. 86. — *Rom. orn.* I. p. 158.
 tab. 24. Fig. 2.

Jonston,

Jonston, av. p. 122. *Pyrrhula* seu *Rubicilla*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 178. *Loxia Pyrrhula*.

Romare, Dictionn. II. p. 48. *Bouvreuil*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 256. n. 4.
der Dompfaffe.

β. *Der schwarze Dompfaffe*. (5)

Briffon, ornith. I. p. 396. A. *Bouvreuil noir*.

Klein, av. p. 96. n. II. *Coccothraustes atricilla*.

Klein, Vorbereit. p. 178. n. II. *Thumdechant*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. II. *Thumdechant*.

Büffon, Vögel, XIII. p. 28. *der schwarze Gimpel*.

Latham, Syn. II. I. p. 144. n. 51. A. *Black Bulfinch*. — Vögel, II. I. p. 137. n. 51. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 387. n. 56. β.

Zorn, Petinotheol. II. p. 330. ad § 2.

Naturforsch. II. p. 2. *schwarzer Gimpel*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 77. ad n. 165.

γ. *Der weiße Dompfaffe*.

Briffon, ornith. I. p. 396. B. *Bouvreuil blanc*.

Büffon, Vögel, XIII. p. 27. *der weiße Gimpel*.

Latham, Syn. II. I. p. 144. n. 51. B. — Vögel, II. I. p. 137. n. 51. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 388. n. 56. β.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 263. *Pyrrhula candida*.

5. CAR-

- (5) *Zorn* versichert mit Gewissheit, daß ein Weibchen, mit Hanf gefüttert, davon öfters köhlischwarz werde. *Beseke* gedenkt eines schwarzen Dompfaffen, der lange im Käfig gehalten war, nachdem er aber in Freyheit gesetzt war, und in der Stube umher flog, in der Mauserzeit die schwarze Farbe verlor und seine gewöhnliche Farbe wieder annahm, die er auch mehrere Jahre, welche er wieder im Käfig zugebracht, beybehalten hat.

5. CARDINALIS. *Der Cardinalvogel.* (6)

Müller, Natur syst. II. p. 547. n. 5. *der Haubenblutfink*; tab. 25. Fig. 2.

Borowsky, Thierreich, III. p. 134. n. 4. *der Haubenblutfink*; tab. 61. B.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 184. n. 4. Loxia (Cardinalis) cristata rubra, capistro nigro, rostro pedibusque sanguineis: *der Indianische Haubenfink*; *die virginische Nachtigall*.

Halle, Vögel, p. 399. n. 407. *der Karminrothe Kirschenfink*; *Kardinalfink*; (*gehaubter kleiner Papagey* Seb.)

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 401. n. 334. *indianische Haubenfink*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 325. n. 126. *der Cardinal*; *der virginische Kernbeisser*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 838. *der karminrothe Kirschenfink*.

Klein, av. p. 94. n. 3. Coccythraustes indica cristata.

Klein, Vorbereit. p. 176. n. 3. *rother Steinbeisser*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 94. n. 3. *rother Steinbeisser*.

Brissou, ornith. I. p. 379. n. 17. Gros-bec de Virginie, dit vulgairement Cardinal hupé.

Büffon, Vögel, X. p. 74. *der Cardinal mit dem Zopf*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 350. *der Cardinal mit dem Zopf*.

Latham, Syn. Suppl. p. 150. Cardinal Grosbeak.

Latham, Vögel II. 1. p. 112. n. 13. *der Cardinal-Kernbeisser*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 375. n. 14. Loxia (Cardinalis) cristata rubra, capistro nigro, rostro pedibusque sanguineis.

Selig.

(6) Soll, nach Beseke, auch in Kurland nisten.

Seligmann, Vögel, II. tab. 76. *der Rothvogel.*

Frisch, Vögel, tab. 4. Fig. 1. *der indianische Haubenfink, oder die virginische Nachtigall.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 77. n. 166. *der Haubenblutfink.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 168. n. 203. *Loxia rubra; der rothe Dickschnabel.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 422. *rother Steinbeisser.*

Schöpf, Reif. d. Nordamer. II. p. 199. *der rothe Vogel.*

Kalm, Reif. n. Nordamer. p. 40.

Naturforsch. XVII. p. 89. n. 180. *der Haubenblutfink.*

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 172. n. 5. *Loxia (Cardinalis) rubra, facie nigra.*

Charleton, onom. zoic. p. 85. n. 5. *Coccothraustes indica, Cardinalis.*

Gentl. Magaz. XXIII. tab. p. 512. *Red bird.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 179. *Loxia Cardinalis.*

Donndorff, Handb. d. Thiergeschich. p. 356. n. 5.

94. CARLSONI. *Der ungehäubte Cardinalvogel.* (7)

Latham, Syst. ornith. I. p. 375. n. 14. β . L. rubra, mento nigro, uropygio, cauda, alis pedibusque fuscis.

Latham, Vögel, II. I. p. 114. not. i.

55. INDICA. *Der indianische Kernbeisser.*

Brisson, ornith. I. p. 379. n. 16. Gros-bec des Indes.

Latham, Vögel, II. I. p. 114. n. 14. *der Indische Kernbeisser.*

Z 2

Latham,

(7) Nach *Latham*, eine Varietät vom vorigen.

Latham, Syst. ornith. I. p. 376. n. 15. *Loxia* (Bostonensis) cristata rubra, rostri basi tectricibusque alarum obscurioribus, rostro pedibusque flavis.

6. *MADAGASCARIENSIS.* *Der madagascarische Kernbeisser.*

Müller, Naturfyst. II. p. 548. n. 6, *der Madagascarische.*

Briffon, ornith. I. p. 337. n. 20. *Cardinal de Madagascar.*

Büffon, Vögel. X. p. 175. *der Foudis.*

Latham, Syn. Suppl. p. 150. *Madagascar Grosbeak.*

Latham, Vögel, II. I. p. 114. n. 15. *der Madagascarische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 376. n. 16. *Loxia* (Madagascariensis) rubra, fascia oculari nigra, dorso nigricante-maculato.

7. *MEXICANA.* *Der mexicanische Kernbeisser.* (8)

Müller, Naturfyst. II. p. 548. n. 7. *der Mexicanische.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 852. *der Schwarzflügel; rothe Mexicanischer Vogel von Sperlingsart.*

Klein, av. p. 95. n. 8. *Coccothraustes alis nigris.*

Klein, Vorbereit. p. 177. n. 8. *Schwarzflügler.*

Klein, verb. Vögelh. p. 95. n. 18. *Schwarzflügler.*

Briffon, ornith. I. p. 380. n. 18. *Grosbec du Mexique.*

Latham, Vögel, II. I. p. 116. n. 17. *der Mexicanische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 377. n. 18. *Loxia* (Mexicana) rubra, alis caudaque nigris.

Linné,

(7) Die Trivialbenennung *L. Mexicana* kommt p. 854. n. 26. nochmals vor.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 172. n. 8. Loxia
(Mexicana) rubra, alis nigris.

56. BRASILIANA. *Der gesprengelte Kernbeisser.*

Büffon, Vögel, X. p. 82. der sprenglichte Kern-
beisser; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 116. n. 18. der Bra-
silsche Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 378. n. 19. Loxia (Bra-
siliانا) fusca, subtus rufescens, maculis albis
nigro annulatis, capite abdomineque medio ru-
bris, lunula nuchae caudaque apice albis.

8. DOMINICANA. *Der Dominicanercardinal. (9)*

Müller, Naturfyst. II. p. 548. n. 8. der Domini-
caner.

Onomat. hist. nat. IV. p. 846. der brasilianische
Finke.

Klein, verb. Vögelhist. p. 98. n. 18. Brasilianer
Fink.

Brissón, ornith. I. p. 377. n. 13. Gros-bec du
Brésil.

Büffon, Vögel, X. p. 82. 83. Guira-tirica.

Latham, Vögel, II. I. p. 117. n. 20. der Domini-
kaner-Kernbeisser.

Latham, Syn. Suppl. p. 151. Dominican Gros-
beak.

Latham, Syst. ornith. I. p. 377. n. 21. Loxia (Do-
minicana) nigra, capite gulaque coccineis, pe-
ctore, abdomine remigumque margine albis.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 22. der Dominica-
nercardinal.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 172. n. 6. Loxia
(Dominicana) nigra, capite gulaque coccineis,
pectore, abdomine remigumque margine albis.

Z 3

Jonston,

(9) Ist nicht mit *L. Dominicensis* p. 855. n. 70. zu verwechseln.

Jonston, av. p. 203. Guira tirica.

Hermann, tab. affin. anim. p. 218. *Loxia dominicana*.

β. *Der gehäubte Dominicanercardinal*. (10)

Büffon, Vögel, X. p. 190. *der gezopfte domingische Kardinal*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 123. n. 20. A. Crested dominican Grosbeak.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 378. n. 22. *Loxia* (Cucullata) cinerea, capite cristato gulaque coccineis, pectore abdomineque albis, cauda longiore, rectricibus lateralibus nigricantibus.

Latham, Vögel, II. 1. p. 117. n. 20. Var. A. *der Dominikaner - Kernbeisser mit dem Federbusche*.

γ. *Der Papst*. (1)

Pennant, arch. Zool. II. p. 325. n. 127. *der Papst*.

Briffon, ornith. I. p. 339. n. 22. Cardinal Dominiquain.

Büffon, Vögel, X. p. 189. *der domingische Sperling*.

Latham, Syn. II. 1. p. 124. n. 20. β. — Vögel, II. 1. p. 118. n. 20. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 378. n. 21. β. L. cinerea subtus nivea, capite anteriore guttureque rubris, rectricibus nigris cinereo-marginatis, extima margine exteriori alba.

Jonston, av. p. 208. Tije guacu Paroara.

57. SIBIRICA. *Der sibirische Kernbeisser*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 119. n. 21. *der Sibirische Kernbeisser*.

Latham,

(10) Nach *Latham* eine eigne Gattung. Ueberhaupt werden die Synonymen bey dieser Gattung und den dahin gerechneten Varietäten sehr verwechselt.

(1) Ist nicht mit *Emberiza Ciris*, der auch diese deutsche Benennung gegeben wird, zu verwechseln.

Latham, Syst. ornith. I. p. 378. n. 23. *Loxia* (*Sibirica*) *coccinea*, fusco-maculata, subtus pallide *coccinea*, capistro purpureo, alis albo nigroque fasciatis, rectricibus nigris, extima alba.

Pallas, Reif. Ausz. II. Anh. p. 13. n. 24. *Loxia sibirica*.

Lepechin, Tageb. d. russ. Reif. I. p. 182. *Loxia*, vertice, gula et pectore *coccineis*, dorso fusco rubro irrorato, imo abdomine fordide albo? *Duratschok; Tschetschewiza*.

58. VIRGINICA. *Der virginische Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 119. n. 22. der gelbbäuchige Kernbeisser.

Pennant, arct. Zool. II. p. 327. n. 131. der Dickschnabel mit dem gelben Bauche. Ist nach *Latham*, mit *Tanagra Missippensis*, p. 889. n. 23. β. einerley; vid. Syst. ornith. I. p. 421. n. 6.

9. CRISTATA. *Der Haubenkernbeisser.*

Müller, Naturyst. II. p. 559. n. 9. der Haubenkernbeisser; tab. 21. Fig. 1.

Onomat. hist. nat. IV. p. 845. der Finke aus *Ethiopien*.

Latham, Vögel, II. I. p. 120. n. 23. der Kernbeisser mit dem Federbusche.

Latham, Syst. ornith. I. p. 378. n. 24. *Loxia* (*Cristata*) *albicans*, fronte cristata, uropygio pedibusque rubris, rectricibus intermediis longissimis.

10. ERYTHROCEPHALA. *Der rothköpfige Kernbeisser.*

Müller, Naturyst. II. p. 549. n. 10. der Rothkopf.

Onomat. hist. nat. IV. p. 848. *der Sperling aus Angola mit dem rothen Kopfe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 14. *rothköpfiger Grünling.*

Briffon, ornith. I. p. 368. n. 69. *Cardinal d' Angola.*

Latham, Syn. Suppl. p. 150. *Paradise Grosbeak.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 116. n. 19. *der Paradies-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 377. n. 20. *Loxia (Erythrocephala) cinerascens, capite purpurascens, pectore albo-maculato.*

Seligmann, Vögel, VI. tab. 75. *der Paradies-Sperling.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 172. n. 9. *Loxia (Erythrocephala) cinerascens, capite purpurascens, pectore albo maculato.*

11. MAJA. *Der Majan. (*)*

Müller, Natursyst. II. p. 549. n. 11. *der Weißkopf.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 850. *der chinesische Finken.*

Briffon, ornith. I. p. 365. n. 65. *Maia de la Chine.*

Briffon, Vögel, XI. p. 81. *der Majan.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 144. n. 68. *der weißköpfige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 391. n. 72. *Loxia (Maja) fusca, capite albo.*

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 96. *der Kernbeisser oder Dickchnäbler aus Malacca.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 629. *der Majan.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. *Loxia Maja.*

13. FLAVICANS. *Der gelbliche Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 550 *der gelbe Kernbeisser.*

Onomat.

(*) Ist nicht mit *Fringilla Maja*, p. 924. zu verwechseln.

Onomat. hist. nat. IV. p. 848. *der gelblichte Finke.*
Bankroft, N. G. von Guiana, p. 108. *der gelbe*
Finke.

Latham, Vögel, II. 1. p. 132. n. 44. *der gelbe*
Kernbeißer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 385. n. 48. *Loxia*
(Flavicans) flava, dorso flavicante, capite fulvo.

60. *BONARIENSIS.* *Der schwarz und saffrangelbe*
Kernbeißer.

Büffon, Vögel, XI. p. 165. *der schwarz und saf-*
frangelbe Fink.

Latham, Vögel, II. 1. p. 132. n. 43. *der saffran-*
gelbe Kernbeißer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 385. n. 47. *Loxia*
(Bonariensis) nigricans, subtus flavescens, ca-
 pite colloque superiore caeruleis, iugulo pecto-
 requa fulvis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. *Noir-Souci.*

14. *ORYZIVORA.* *Der Reißvogel.*

Müller, Naturyst. II. p. 550. n. 14. *der Reißfresser.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 184. n. 5. *Loxia*
(Oryzivora) fusca, temporibus albis, rostro
 rubro.

Halle, Vögel, p. 407. n. 417. *der Reißfink.*

Neuer Schaupl. der Natur. VII. p. 88. *Reismäher.*

Onomat. hist. nat. V. p. 373. *der Reißfresser.*

Klein, av. p. 96. n. 12. *Coccothraustes caeru-*
lescens.

Klein, Vorbereit. p. 178. n. 12. *Reismäher.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 12. *Reismäher.*

Briffon, ornith. I. p. 377. n. 12. *Gros-bec cendré*
de la Chine.

Büffon, Vögel, X. p. 88. *der Padda oder Reis-*
vogel; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 349. *der Padda.*

Latham, Syn. Suppl. p. 151. Java Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 122. n. 29. *der Reiskernbeisser*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 380. n. 31. *Loxia* (*Oryzivora*) fusca temporibus albis, rostro rubro, capite caudaque nigris.

Seligmann, Vögel, III. tab. 81. 82. *der chinesische Reisvogel Padda genannt*, M. u. W.

Bankroft, Guian. p. 107. *der guianische Reisvogel*.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 622. *der Padda*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 173. n. 1. *Loxia* (*Oryzivora*) fusca, temporibus albis, rostro rubro.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 357. n. 6. *der Reissvogel*.

62. FLABELLIFERA. *Der Fächerchwanz.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 326. n. 130. *der Fächerchwanz*.

Büffon, Vögel, X. p. 87. *der Fächerchwanz*; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. 1. p. 122. n. 28. *der fächerchwänzige Kernbeisser*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 380. n. 30. *Loxia* (*Flabellifera*) rubro-fusca, subtus rubescens, remigibus caudaque fuscis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 217. *Loxia Flabellicauda*.

15. PANICIVORA. *Der weisflüglige Kernbeisser.*

Briffon, ornithol. I. p. 397. n. 4. *Bouvreuil noir d'Afrique*.

Büffon, Vögel, XIII. p. 30. *der grosse schwarze afrikanische Gimpel*.

Onomat. histor. natur. IV. p. 854. *der schwarze Africanische Domherr.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 138. n. 52. *der weisflügelige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 388. n. 57. Loxia (Panivora) nigra, alula alba, rostro incarnato.

16. MALACCA. *Der malackische Kernbeisser.*

Müller, Naturfyst. II. p. 551. n. 16. *der malackische Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 851. *der Blauschnabel aus China.*

Klein, av. p. 88. n. 5. Passer Sinensis rostro caeruleo.

Klein, Vorbereit. p. 165. n. 5. *Blauschnabel aus China.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 91. n. 5. *Blauschnabel.*

Briffon, ornith. I. p. 375. n. 8. Gros-bec de Java.

Büffon, Vögel, X. p. 108. *der Jacobiner*, p. 109. *der javanische Kernbeisser*, p. III. *der Jacobin*, p. 112. *der Jacobin*; m. e. Fig. n. 3. p. 107. *der indianische Sperling mit weißer Brust.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 133. n. 47. *der Malackische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 385. n. 51. Loxia (Malacca) ferruginea, capite abdomineque nigris, rostro caeruleo.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 45. fig. 2. *der indianische Sperling mit weißer Brust.*

β. *Der (sogenannte) chinesische Sperling.*

Klein, av. p. 90. n. 19. Passer fuscus, capite nigro.

Klein, Vorbereit. p. 168. n. 19. *brauner Sperling mit schwarzem Kopfe.*

Klein,

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 92. n. 17. *schwarzköpfiger brauner Sperling*.

Halle, Vögel, p. 377. n. 367. *der zimmetfarbne Sperling aus China*.

Briffon, ornithol. I. p. 374. n. 7. Gros-bec de la Chine.

Briffon, Vögel, X. p. 105. *die chinesischen Sperlinge*.

Latham, Syn. II. I. p. 141. Var. A. — Suppl. p. 152. — Vögel, II. I. p. 134. n. 47. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 386. n. 51. β. L. ferruginea, capite colloque inferiore nigris.

Seligmann, Vögel, II. tab. 85. *die chinesischen Sperlinge*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 183. n. 29. *Fringilla (Chinenfis) ferruginea, capite atro, rostro caeruleo*.

17. MOLUCCA. *Der moluckische Kernbeißer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 551. n. 17. *der moluckische Kernbeißer*.

Briffon, ornith. I. p. 376. n. 10. Gros-bec des Moluques.

Briffon, Vögel, X. p. 108. III. *der moluckische Domino*.

Latham, Vögel, II. I. p. 134. n. 48. *der Molukische Kernbeißer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 386. n. 52. *Loxia (Molucca) fuscescens, capite, iugulo rectricibusque nigris, subtus uropygioque albo nigroque undulata*.

18. PUNCTULARIA. *Der Gobryvogel. (2)*

Müller, Naturfyst. II. p. 551. n. 18. *der gesprenkelte Kernbeißer*.

Halle,

(2) Die Synonymen dieser und der beyden vorhergehenden Gattungen werden gar häufig verwechselt. Im *Briffon*, (loc. citr.) ist

Halle, Vögel, p. 380. n. 378. *der Tigersperling*,
Fig. 23.

Onomat. hist. nat. IV. p. 856. *rosthiger Sperling*
mit getiebertem Unterleibe.

Klein, av. p. 89. n. 6. *Passer Sinensis ferrugineus.*

Klein, Vorbereit. p. 166. n. 6. *brauner Sperling*
aus China.

Klein, av. p. 90. n. 18. *Passere vario maculato.*

Klein, Vorbereit. p. 168. n. 18. *rosthiger Sperling*
mit getiebertem Unterleibe.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 92. *rosthiger Sperling*
mit getiebertem Unterleibe.

Briffon, ornithol. I. p. 375. n. 9. *Gros-bec tacheté de Java.*

Büffon, Vögel, X. p. 108. b. p. III. n. 2. *der Jacobiner*, p. 109. *Gowry.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 135. n. 50. *der getüpfelte Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 386. n. 54. *Loxia*
(*Punctularia*) *ferruginea*, *abdomine nigro albo-maculato.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 79. *der Gobryuogel.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 173. n. 13. *Loxia*
(*Punctularia*) *ferruginea*, *abdomine nigro albo-maculata.*

19. HORDEACEA. *Der gelbsteißige Kernbeißer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 551. n. 19. *der Gerstenfresser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 849. *der Gerstenfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 133. n. 45. *der Kernbeißer mit gelbem Steiß.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 385. n. 49. *Loxia*
(*Hordeacea*) *fulva*, *temporibus albis*, *cauda pectoreque atris.*

20. SAN-

ist alles so unter einander geworfen, daß man sich gar nicht heraus finden kann.

20. SANGUINIROSTRIS. *Der rothschnäblige Kernbeißer.*

Müller, Naturfyſtem, II. p. 552. n. 20. *der Blutſchnabel.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 858. *der Finke mit dem blutrothen Schnabel.*

Latham, Syn. II. I. p. 151. n. 69. Red-billed Grosbeak.

Latham, Vögel, II. I. p. 144. n. 69. *der rothschnäblige Kernbeißer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 392. n. 73. Loxia (Sanguinirostris) grisea, subtus albida, rostro pedibusque sanguineis, gula nigra.

21. ASTRILD. *Der ſenegalische Kernbeißer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 552. n. 21. *der ſenegalische Kernbeißer.*

Onomat. hiſtor. natur. IV. p. 835. *der geſtreifte Sperling.*

Klein, verbess. Vögelhiſtor. p. 92. n. 23. *glattköpfiger Rothſchnabel.*

Briffon, ornithol. I. p. 365. n. 64 Senégali rayé.

Büſſon, Vögel, XI. p. 73. *der geſtreifte Senegali*, p. 180. *Lackſchnabel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 145. n. 71. *der geſtreifte Senegalist.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 392. n. 75. Loxia (Astrild) grisea fusco-undulata, rostro, orbitis pectoreque coccineis.

Seligmann, Vögel, VI. tab. 74. fig. 2. *glattköpfiger Rothſchnabel.*

Seligmann, Vögel, IX. tab. 44. *der Rothſchnabel.*

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 173. n. 16. Loxia (Astrild) grisea, fusco-undulata, rostro, temporibus pectoreque coecineis.

B. Büſſon,

β. Buffon, Vögel, XI. p. 77. *der Serevan.*

Latham, Syn. II. 1. p. 153. Red-rumped Grosbeak.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 392. n. 75. β. L. cinereo-fusca, subtus albida, uropygio crissoque coecineis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 145. n. 71. A. *der Kernbeißer mit rothem Steiße.*

γ. Buffon, Vögel, XI. p. 78. *der kleine senegallische Sperling.*

Latham, Syn. II. 1. p. 153. n. 71. B. White-rumped Grosbeak.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 392. n. 75. γ. L. fusca, subtus uropygioque incarnata, vertice, collo dorsoque caeruleis, per oculos fascia coccinea.

Latham, Vögel, II. 1. p. 146. n. 71. B. *der Kernbeißer mit weißem Schwanze.*

63. LEUCURA. *Der weißschwänzige Kernbeißer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 146. n. 72. *der weißschwänzige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 393. n. 76. "Loxia (Leucura) cinerea, dorso luteo, pectore abdomineque flavescentibus, cauda alba, rectricibus duabus extimis nigris.

22. CYANEA. *Der hellblaue Kernbeißer.* (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 552. n. 22. *der hellblaue Kernbeißer.*

Briffon, ornithol. I. p. 381. n. 19. Grosbec bleu d'Angola.

Onomat. hist. nat. IV. p. 845. *der kornblumfarbige Finke.*

Latham,

(3) Latham ist geneigt, ihn als Spielart von *Loxia Caerulea* anzusehen.

Latham, Syn. II. I. p. 117. n. II. B. — *Vögel*, II. I. p. 112. n. II. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 374. n. 12. *Loxia* (Cyanea) caerulea, remigibus rectricibusque nigris.

Seligmann, *Vögel*, V. tab. 20. *der blaue Dick-schnabel*, (*Azulam* portugies.)

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 170. n. 207. *der blaue Dick-schnabel*.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 174. n. 17. *Loxia* (Cyanea) caerulea, remigibus rectricibusque nigris.

23. *VIRENS. Der grünliche Kernbeißer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 553. n. 23. *der Grünling*.
Onomat. histor. natur. IV. p. 860. *der grüne Suri-namische Finke*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 392. n. 74. *Loxia* (Virens) virens humeris caeruleis.

Latham, *Vögel*, II. I. p. 144. n. 70. *der blau-schulterige Kernbeißer*.

24. *ANGOLENSIS. Der angolische Kernbeißer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 553. n. 24. *der angolische Kernbeißer*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 834. *der angolische Finke*.

Latham, *Vögel*, II. I. p. 138. n. 53. *der Angolische Kernbeißer*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 389. n. 60. *Loxia* (Angolensis) nigro-caerulea, ventre ferrugineo, macula alarum alba.

64. *FERRUGINEA. Der braunköpfige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 389. n. 62. *Loxia* (Ferruginea) nigra, marginibus pennarum flavis, subtus flavescent, pectore ferrugineo, capite gulaque fuscis.

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 138. n. 54. *der braunköpfige Kernbeißer.*

65. MELANURA. *Der schwarzschwänzige Kernbeißer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 138. n. 55. *der grauhäufige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 389. n. 63. Loxia (Melanura) cervice fusca, iugulo uropygioque griseis, abdomine rufescente, alis caudaque nigris, macula alarum, remigibus apice crissoque albis.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 155. *der chinesische Kernbeißer.*

66. AURANTIA. *Der Bouveret.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 33. *der Bouveret; m. 2. Figg. M. u. W.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 139. n. 56. *der pomeranzengelbe Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 390. n. 66. Loxia (Aurantia) fulva, pileo, alis caudaque nigris.

Samml. zur Physf. und N. G. II. p. 744. *der Bouveret.*

67. TORRIDA. *Der weissschnäblige Kernbeißer.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 34. *der weissschnäblichte Gimpel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 139. n. 57. *der weissschnäbelige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 389. n. 61. Loxia (Torrida) nigra, pectore abdomineque castaneis.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 169. n. 204. *der Amerikaner.*

Samml. zur Physf. und N. G. II. p. 744. *der weissschnäblichte Gimpel.*

25. LINEOLA. *Der weißgestreifte Kernbeißer.* (4)

Müller, Natursyft. II. p. 553. n. 25. *der gestreifte Kernbeißer.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 849. *der schwarze Finke aus Aßen, mit einer weißen Linie von der Stirne gegen den Wirbel zu.*

Latham, Vögel, II. I. p. 141. n. 63. *der Linien-Kernbeißer.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 390. n. 68. Loxia (Lineola) caeruleo-nigra, linea frontali, temporibus, macula alarum corporeque subtus albis.

68. HAMBURGICA. *Der hamburgische Gimpel.* (*)

Müller, Natursyft. II. p. 547. ad n. 4. *der hamburgische Baumläufer.*

Halle, Vögel, p. 368. n. 363. *der Baumsperling.*

Klein, av. p. 88. ad n. 2. *Hamburg-the-Creeper.*

Klein, Vorbereit. p. 164. ad n. 2.

Klein, verbeß. Vögelhistor. p. 90. ad n. 2.

Briffon, ornith. I. p. 396. n. 2. *Bouvreuil de Hambourg.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 50. *der hamburgische Gimpel; m. e. Fig.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 102. n. 5. *der hamburgische Dompfaffe.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 216. Loxia scandens.

Latham, Vögel, II. I. p. 142. n. 64. *der Hamburger Kernbeißer.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 357. n. 7. *der hamburgische Gimpel.*

26. MEXI-

(4) Latham rechnet hieher auch Büffons Bouveron IV. p. 388. und Briffons Pyrrhula africana nigra minor. (Gmel. Syft p. 865 n. 46.)

(*) Ist nach Latham mit *Eringilla montana*, p. 925. n. 37. ein-
nerley.

26. MEXICANA. *Der gelbköpfige neuspanische Kernbeißer.* (5)

Müller, Naturfyst. II. p. 553. n. 26. *der Gelbkopf.*
Onomat. hist. nat. IV. p. 853. *Mexikanischer Goldammer.*

Klein, av. p. 92. n. 9. *Emberiza flava Mexicana.*
Klein, Vorbereit. p. 172. n. 9. *mexikanischer Goldammer.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 93. n. 6. *mexikanischer Goldammer.*

Briffon, ornithol. I. p. 334. n. 12. *Moineau du Mexique.*

Biffon, Vögel, XI. p. 48. *der gelbköpfige Hänfling*; in e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 133. n. 46. *der gelbköpfige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 385. n. 50. *Loxia (Mexicana) grisea, fronte gula uropygio superciliisque luteis.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 87. *der Häufing mit dem gelben Kopf.*

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 174. n. 19. *Loxia (Mexicana) grisea, fronte, gula, uropygio superciliisque luteis.*

27. CHLORIS. *Der Grünling.* (6)

Müller, Naturfyst. II. p. 554. n. 27. *der Grünfink.*

A a 2

Leske,

(5) Man muß diesen Vogel nicht mit *Loxia Mexicana* p. 848. n. 7. verwechseln. Zum Unterschiede könnte man diesen *L. Ochrocephala* nennen.

(6) Gewicht etwas über zwey Loth. Ein stiller Vogel, der sehr leicht zahm wird, daß er so gar aus der Hand frisst. Nährt sich im Sommer von allerley Gesäme, besonders Hanf; frisst auch Raupen und andere Insekten. im Winter Wacholderbeeren und Baumknospen. Auch an Gersten kann man ihn gewöhnen. Das Fleisch ist im Herbst schmackhaft.

- Leske*, Naturgesch. p. 260. n. 4. *der Grünfink.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 135. n. 6. *der Grünfink; Grünling; Grünschwanz.*
Blumenbach, Handb. der N. G. p. 184. n. 6. *Loxia* (*Chloris*) *flavicaudi-virens*, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus lateraibus quatuor basi luteis. *Grünfink; Grünschwanz; Zwuntsche.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 511. n. 5. *der Grünling; Schwainz.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 588. *der Grünling.*
Ebert, Naturl. II. p. 132. *der Grünfink; Grünvogel.*
Halle, Vögel, p. 400. n. 408. *der grüngelbe Fink.*
Meyer, Thiere, II. tab. 28. *der Grünling.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 402. n. 337. *der Grünfink.*
Pennant, arch. Zool. II. p. 329. B. *der grüne Dickschnabel.*
Beckmann, Naturhist. p. 53. c. *der Grünfink.*
 Neuer Schaupl. der Nat. III. p. 530. *Grünfink.*
 Onomat. histor. natur. IV. p. 840. *der grüngelbe Finke.*
 Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 128. *Grünling; Wohnütz; Swunsch.*
Klein, av. p. 95. n. 4. *Coccothraustes viridis.*
Klein, Vorbereit. p. 176. n. 4. *grüngelber Dickschnäbler; Grünling; Grünvogel; Hirsvogel; Kutvogel.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 94. n. 4. *Grünling.*
Klein, stemmat. av. p. 19. tab. 19. fig. 14. a. b.
Gesner, Vögelb. p. 141. *Chloris. Grünling; Grünfink; Kuttvogel; Tutter; Rappfink; Hirsvogel; Fig. p. 142.*

- Briffon*, ornith. I. p. 359. n. 54. Verdier.
Büffon, Vögel, XI. p. 225. *der Grünfink* oder *Grünling*; m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 351. *der Grünfink*.
Latham, Syn. Suppl. p. 152. Greenfinch.
Latham, Vögel, II. 1. p. 127. n. 36. *der Grünling*.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 382. n. 39. Loxia (Chloris) flavicanti-virens, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis.
Frisch, Vögel, tab. 2. *der Grünling*.
Wirsing, Vögel, tab. 53. 54. *der Grünling*.
Günther, Nest. u. Ey. tab. 62. *Grünling*.
Beseke, Vögel Kurl. p. 77. n. 167. *der Grünfink*.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 103. *der Grünling*; *Gröönling*; *Gröönschwanz*.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 422. *der Grünfink*.
Fischer, Liv. p. 97. n. 146. *Grünfink*.
Cetti, Sardin. II. p. 183. *der Grünfink*.
White, N. G. von Engl. p. 64. n. 14. *Grünling*.
Pennant, britt. Thiergesch. p. 121. tab. 56. fig. 5. *Grünfink*.
Storr, Alpenreise, I. p. 78. *Grünfink*.
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 4. *Svenske*.
Borkhausen, Magaz. I. p. 141. *Grünling*.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 170. n. 206. *der Grünling*.
Linné, Abhandl. II. p. 302. n. 121. *der Grünfink*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 336. *der Grünling*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 62. *Schwuntz*; *Schwanschel*; *welscher Hänfling*.
Naumann, Vogelfteller, p. 66. *der Schwunsch*.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 633. *der Grüns-
fink.*

Naturforsch. XVII. p. 89. n. 181. *der Grünsfink.*

Onomatol. forestal. I. p. 1072. *Grünzling; Grinz-
ling.*

Krönitz, Encykl. XX. p. 215. *Grünsfink.*

Börner, schles. ökonom. Gesellsch. 1782. p. 101.
n. 200.

Anweiss. Vögel zu fang. p. 253. *Grünling.*

Loniceri, Kräuterb. p. 682. *der Grünsfinke.*

Meidinger, Vorles. I. p. 148. n. 5. *der Grüns-
fink.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 414. *Grünling.*

Angenehme Landlust, p. 162.

Linne', Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 2. *Chloris.*

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 174. n. 2. *Loxia*
(*Chloris*) *flavicanti-virens*, remigibus primo-
ribus antice luteis, rectricibus lateralibus qua-
tuor basi luteis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 248. *Loxia*
(*Chloris*) *flavicanti-virens*, remigibus primo-
ribus antice luteis, rectricibus lateralibus qua-
tuor basi luteis.

Kramer, Austr. p. 367. n. 5. *Fringilla* remigibus
primoribus antice luteis, rectricibus tribus late-
ralibus basi luteis. *Grünling.*

Brünniche, ornith. bor. p. 67. n. 242. 243. *Loxia*
Chloris.

Charlton, enom. zoic. p. 80. n. 5. *Chloris; Frin-
gilla viridis.*

Moehring, av. gen. p. 41. n. 26. *Chloris.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 295. *Linaria viridis;*
*welscher Hänffling; Hirsch-Fink; Hirschvo-
gel; grüner Finke.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 379 *Frin-
gilla viridis.*

Rzaczyns.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 391. *Linaria viridis*.

Sibbald, Scot. p. 18. *Chloris*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 366. Bruyan; Verdun; Verdier; Verdereule; Verdere.

Barrere, ornithol. gen. 30. sp. 6. *Passer subviridis*, alarum extremis nigricantibus.

Salerne, hist. nat. des ois. p. 255. Bruant; *Chloris*, etc.

Jonston, av. p. 101. *Chloris*.

Zinn, Uov. p. 6. tab. 19. fig. 54. *Verdone*.

Levin, britt. Birds II. tab. 69. *Greenfinch*.

Roman, ornith. I. p. 112. tab. 17. fig. 1. — *Faun. Arragon*. p. 86.

Bomare, dictionn. IX. p. 283. *Verdier commun*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. *Loxia Chloris*.

Aristot, hist. anim. L. 9. c. 20. n. 168. *Χλωρίς*.

Aelian, de nat. anim. L. 4. c. 47. *Χλωρίς*.

Plin, hist. nat. L. 10. c. 29. *Chlorion*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 357. n. 8. *der Grünfink*.

69. *SINENSIS*. *Der chinesische Kernbeißer*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 129. n. 37. *der chinesische Kernbeißer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 383. n. 40. *Loxia (Sinensis) fusca subtus rufescens, capite colloque griseo-virescentibus, remigibus rectricibusque nigris, apice albidis*.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 157. *der chinesische Grünfink*.

28. *BUTYRACEA*. *Der gelbstirnige Kernbeißer*. (7)

Müller, Naturfyst. II. p. 554. n. 28. *der Buttervogel*.

A a 4 Onomat.

(7) Ist nicht mit *Fringilla Butyracea* p. 913. n. 22. zu verwechseln.

Latham rechnet *Buffons Vert-brinet* und *Verdier du Cap de b. E.* hieher.

Onomat. histor. natur. IV. p. 837. *der grünlichte Finke.*

Büffon, Vögel, XI. p. 254. *der butterfarbige Dick-schnabel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 129. n. 38. *der gelbstir-nige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 383. n. 41. Loxia (Butyracea) virescens, fronte, superciliis, pectore abdomineque flavis, cauda apice alba.

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 174. n. 21. Loxia (Butyracea) virescens, fronte, superciliis, pectore abdomineque flavis, caudae apice alba.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. Loxia butyracea.

70. DOMINICENSIS. *Der grünbraune domingische Kernbeißer.* (8)

Büffon, Vögel, XI. p. 257. *der domingische Grün-fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 130. n. 39. *der Kern-beißer von St. Domingo.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 383. n. 42. Loxia (Dominicensis) viridi-fusca, subtus rufa fusco-maculata, regione oculorum crissoque albis.

71. AFRICANA. *Der afrikanische Kernbeißer.* (9)

Büffon, Vögel, XI. p. 258. *der capsche Grün-fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 130. n. 40. *der Afrika-nische Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 384. n. 43. Loxia (Africana) viridi-fusco-griseoque variegata, subtus alba, tectricibus alarum rufis, rectrice extima macula alba.

29. CA-

(8) Ist nicht mit *Loxia Dominicana* p. 848. n. 8. zu verwechseln.

(9) Ist nicht mit *Loxia Afra* p. 857. n. 74. zu verwechseln.

29. CANADENSIS. *Der canadische Kernbeisser.*

Müller, Naturyst. II. p. 555. n. 29. *der canadische Kernbeisser.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 328. n. 136. *der Canadische Dickschnabel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 837. *der Kernbeisser aus Canada.*

Briffon, ornith. I. p. 372. n. 4. Gros-bec de Cayenne.

Büffon, Vögel, X. p. 85. *der gelbgrüne Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 121. n. 27. *der Canadische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 379. n. 29. Loxia (Canadensis) viridi-olivacea, subtus flavo-olivacea, capistro nigro.

β. Latham, Syn. II. I. p. 128. n. 27. Var. A. — Vögel, II. I. p. 122. n. 27. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 380. n. 29. β. L.

30. SULPHURATA. *Der gelbkehlige Kernbeisser.*

Müller, Naturyst. II. p. 555. n. 30. *die Gelbkehle.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 859. *der Dickschnäbler vom Vorgebürge der guten Hoffn.*

Briffon, ornith. I. p. 871. n. 2. Gros-bec du cap de bonne esperance.

Latham, Vögel, II. I. p. 131. n. 41. *der schwefelgelbe Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 384. n. 45. Loxia (Sulphurata) fusco-olivacea gutture ventrequeluteis, superciliis flavis.

72. FLAVIVENTRIS. *Der gelbbäuchige Kernbeisser.*

Briffon, ornith. I. p. 372. n. 3. Gros-bec jaune du cap de bonne esperance.

Latham, Vögel, II. I. p. 131. n. 42. der gelb-
bandirte Kernbeisser.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 384. n. 46. *Loxia*
(*Flaviventris*) viridi-olivacea, dorso fusco-
maculato, subtus superciliisque luteis, cauda
subforcipata.

β. *Latham*, Syn. II. I. p. 138. n. 42. Var. A. —
Vögel, II. I. p. 132. n. 42. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 384. n. 46. β. *L. viri-*
di-olivacea, subtus flava, collo superiore, ge-
nis gulaque cinereis.

31. COLLARIA. Der Nonnen Kernbeisser.

Müller, Natursyst. II. p. 555. n. 31. der Kragen-
vogel.

Onomat. hist. nat. IV. p. 845. der Finke mit gel-
ber Brust und gelbem Halskragen.

Büffon, Vögel, X. p. 100. der Nonnen-Kernbeis-
ser, m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 126. n. 34. der Nonnen-
Kernbeisser.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 382. n. 37. *Loxia*
(*Collaris*) flavescens, pectore collarique flavis,
temporibus nigris.

β. *Büffon*, Vögel, X. p. 122. der gesprenkelte Kern-
beisser mit der Halsbinde; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 134. n. 34. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 382. n. 37. β.

Latham, Vögel, II. I. p. 127. n. 34. Var. A.

73. GRISEA. Der grauweiße Kernbeisser.

Pennant, arct. Zool. II. p. 328. n. 135. der graue
Dickschnabel.

Büffon, Vögel, X. p. 102. der grauweiße Kern-
beisser.

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 127. n. 35. *der graue Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 382. n. 38. Loxia (Grisea) caeruleo-grisea, facie colloque inferiore albis.

32. BENGALENSIS. *Der bengalische Kernbeißer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 555. n. 32. *der bengalische Kernbeißer.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 836. *der Bengalische Sperling.*

Klein, av. p. 88. n. 4. Passer Bengalensis.

Klein, Vorbereit. p. 165. n. 4. *Gelbkopf; bengalischer Sperling.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 90. n. 4. *Gelbkopf.*

Briffon, ornith. I. p. 333. n. 1. Moineau de Bengale.

Buffon, Vögel, X. p. 98. *der Goldkopf.* Loxia (Chrysocephala) fusca, pileo flavo, abdomine, crisso maculaque aurium albis, rostro pedibusque carnis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 126. n. 33. *der Bengalische Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 382. n. 36. Loxia (Bengalensis) grisea, pileo flavo, temporibus albidis, abdomine albido fusco-maculato.

Seligmann, Vögel, VI. tab. 84. *der gelbköpfige indianische Sperling.*

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 175. n. 23. Loxia (Benghalensis) grisea, pileo flavo, temporibus albidis, abdomine albido fusco-maculato.

33. MALABARICA. *Der malabarische Kernbeißer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 555. n. 33. *der malabarische Kernbeißer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 147. n. 74. *der Malabarische Kernbeißer.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 81. *Loxia* (*Malanica*) cinerea, remigibus rectricibusque nigris, gula crissoque albis.

74. AFRA. *Der schwarzbäuchige Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 147. n. 75. *der schwarzbäuchige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 82. *Loxia* (*Melanogastra*) lutea, fusco-contaminata, gula, pectore abdomineque nigris, alis caudaque fuscis.

75. CAFFRA. *Der Mohrenkernbeisser.*

Bisson, Vögel, XI. p. 192. *der langschwänzige Kernbeisser.*

Batsch, Thiere, I. p. 348. *der Mohrenkernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 153. n. 90. *der Mohrenkernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 393. n. 78. *Loxia* (*Caffra*) atra, remigibus fuscis, humeris sanguineis.

Lichtenberg u. Voigt, Magaz. für das Neueste etc. IV. I. p. 102. *Loxia caffra. Langschwanz.*

76. TOTTA. *Der Hotientottenkernbeisser.*

Latham, Syn. Suppl. p. 156. *Totty Grosbeak.*

Latham, Vögel, II. I. p. 153. n. 89. *der Hottentotten-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 393. n. 79. *Loxia* (*Totta*) testaceo fusca, subtus albida, remigibus rectricibusque omnibus nigris, summo apice albis.

77. ASIATICA. *Der asiatische Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 147. n. 76. *der Asiatische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 83. *Loxia* (*Asiatica*) cinereo-rubescens, subtus cinerea, abdomine

mine pallide rubro, capite, rectricibus alarum maioribus, remigibus caudaque apice nigris.

- β. *L. cinereo-caerulescens*, capite, alis caudaque nigris, remigibus rectricibusque duabus intermediis apice albis. *

Latham, Syn. Suppl. p. 153. n. 76. A. — *Vögel*, II. I. p. 148. n. 76. Var. A.

Latham, Syst. ornith. p. 394. n. 83. β.

78. *CANORA.* *Der braunwangige Kernbeisser.*

Latham, Syn. Suppl. p. 154. Brown-cheeked Grosbeak.

Latham, *Vögel*, II. I. p. 148. n. 77. *der braunwangige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 84. *Loxia* (*Canora*) *virescens*, subtus cinerea, genis fuscis flavo circumdatis.

79. *LINEATA.* *Der gestreifte Kernbeisser.*

Latham, *Vögel*, II. I. p. 148. n. 78. *der gestreifte Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 395. n. 85. *Loxia* (*Lineata*) nigra subtus alba, lateribus corporis basique remigum primorum albo nigroque transversim striatis.

80. *PERLATA.* *Der geperlte Kernbeisser.*

Latham, *Vögel*, II. I. p. 149. n. 79. *der geperlte Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 395. n. 86. *Loxia* (*Perlata*) nigra subtus fusca, postice albo nigroque varia.

81. *FASCIATA.* *Der bandirte Kernbeisser.*

Latham, *Vögel*, II. I. p. 149. n. 80. *der gebänderte Kernbeisser.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 395. Loxia (Fasciata) testaceo fusca, nigro undulata, sub gula fascia sanguinea.

Latham, Syn. Suppl. p. 154. Fasciated Grosbeak.

82. CANTANS. *Der Sangkernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 149. n. 81. *der Singkernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 395. n. 88. Loxia (Cantan-) fusca nigricante transversim lineata, subtus alba, cauda cuneiformi.

34. MELANOCEPHALA. *Der schwarzköpfige Kernbeisser.*

Müller, Natur Syst. II. p. 556. *der schwarzköpfigte Kernbeisser.*

Halle, Vögel, p. 398. n. 406. *der gelbe Kirschkink mit dem Mohrenkopfe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 852. *gelber Schwarzkopf.*

Klein, av. p. 94. n. 2. Coccythraustes citrea tota, capite nigro.

Klein, Vorbereit. p. 176. n. 2. *gelber Schwarzkopf.*

Klein, verb. Vögelh. p. 94. n. 2. *gelber Schwarzkopf.*

Briffon, ornith. I. p. 373. n. 5. Gros - bec de Gambie.

Latham, Vögel, II. I. p. 143. n. 65. *der Gambia-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 391. n. 69. Loxia (Melanocephala) lutea, capite atro.

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 175. n. 26. Loxia (Melanocephala) lutea, capite atro.

83. ERYTHROMELAS. *Der roth- und schwarze Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 143. n. 66. *der schwarzköpfige Kernbeisser.* Tab. 44.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 391. n. 70. Loxia (Erythromelas) rubra, remigibus rectricibusque obscurioribus, capite atro.

84. CORONATA. *Der schwarz gehäubte Kernbeisser.*

Klein, av. p. 95. n. 10. Coccothraustes, Phoenicuri species.

Klein, Vorbereit. p. 178. n. 10. *amerikanischer Thumherr.*

Klein, verb. Vögelh. p. 95. n. 10. *amerikanischer Thumherr.*

Briffon, ornith. I. p. 400. n. 10. Bouvreuil lupé d'Amerique.

Latham, Vögel, II. I. p. 143. n. 67. *der Kernbeisser mit schwarzem Federbusche.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 391. n. 71. Loxia (Coronata) cristata, supra coccinea, subtus cyanea, macula colli inferioris cristaque nigris.

35. CANA. *Der eisengraue Kernbeisser.*

Müller, Naturfyst. II. p. 556. n. 35. *der graue Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 837. *der graue Fink.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 92. n. 22. *lichtgrauer Sperling.*

Briffon, ornith. I. p. 369. n. 72. Pinçon cendré des Indes.

Büffon, Vögel, XI. p. 46. *der eisengraue Sperling; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 146. n. 73. *der aschgraue Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 393. n. 77. Loxia (Cana) cana remigibus rectricibusque fuscis, pedibus rubris.

Seligmann, Vögel, VI. tab. 74. *der graue Fink.*

Linné,

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 175. n. 27. Loxia (Cana) remigibus rectricibusque fuscis, pedibus rubris.

36. PHILIPPINA. *Der philippinische Kernbeisser.*

Müller, Naturfyst. II. p. 556. n. 36. *der philippinische Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 855. *der Kernbeisser von den Philippinischen Inseln.*

Briffon, ornith. I. p. 373. n. 6. Gros-bec des Philippines.

Büffon, Vögel, X. p. 95. *der Tucnam-Courvi; m. e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 350. *der Toucnam-Courvi.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 380. n. 32. Loxia (Philippina) fusca, subtus albido-flavicans, vertice pectoreque luteis, gula fusca.

Latham, Vögel, II. I. p. 123. n. 30. *der Philippinische Kernbeisser.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 622. *der Toucnam-Courvi.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 358. n. 9. *der philippinische Kernbeisser.*

β. *Der Baglasecht.*

Büffon, Vögel, X. p. 115. *der Baglasecht.*

Batsch, Thiere, I. p. 351. *der Baglasecht.*

Latham, Vögel, II. I. p. 124. n. 30. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 381. n. 32. β. Loxia cauda remigibus virescente fuscis, margine flavis.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 622. *der Baglasecht.*

35. ABYSSINICA. *Der abyssinische Kernbeisser.*

Büffon, Vögel, X. p. 117. *der abyssinische Kernbeisser.*

Batsch, Thiere, I. p. 351. *der abyssinische Kernbeisser.*

Latham,

Latham, Vögel, II. I. p. 125. n. 31. *der abyssinische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 381. n. 33. *Loxia* (Abyssinica) corpore flavo, vertice, genis, gula pectoreque nigris, alis caudaque fuscis.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 622. *der abyssinische Dickschnabel.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 358. n. 10. *der abyssinische Kernbeisser.*

86. *PENSILIS.* *Der Nelicourvi.*

Latham, Vögel, II. I. p. 125. n. 32. *der Hangnest-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 381. n. 34. *Loxia* (Pensilis) viridis subtus grisea, crisso rubro, capite colloque inferiore flavis, remigibus rectricibusque nigris.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 156. *der Nelicourvi aus Madagascar*; tab. 112.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 359. n. 11. *der Nelicourvi aus Madagascar.*

37. *STRIATA.* *Der gestrichelte Kernbeisser.*

Müller, Naturyst. II. p. 556. n. 37. *der buntgestreifte Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 858. *der Kernbeisser von der Insel Bourbon.*

Brissou, ornith. I. p. 376. n. 11. *Gros-bec de l'Isle de Bourbon, ou Jacobin.*

Latham, Vögel, II. I. p. 134. n. 49. *der gestrichelte Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 386. n. 53. *Loxia* (Striata) fusca, ferrugineo-striata, subtus alba iugulo nigro.

38. *LUDOVICIANA.* *Der louisianische Kernbeisser.*

Müller, Naturyst. II. p. 557. n. 38. *der louisianische Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 850. *der Finke aus Ludovicien.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 326. n. 128. *der Dickschnabel mit rother Brust.*

Brisson, ornith. I. p. 378. n. 14. Gros-bec de la Louisiane.

Büffon, Vögel, X. p. 80. *das Rosenkehlchen.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 120. n. 24. *der rothbrüstige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 379. n. 25. Loxia (Ludoviciana) nigra, pectore, ventre, alarum fascia basique remigum albis.

87. MACULATA. *Der gefleckte Kernbeisser.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 336. n. 129. *der gefleckte Dickschnabel; tab. 16. obere Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 120. n. 25. *der gefleckte Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 379. n. 26. Loxia (Maculata) obscure fusca, albo maculata, subtus albida maculis subfuscis, superciliis pallidis, rectricibus duabus extimis apice albo-maculatis.

88. OBSCURA. *Der dunkelbraune Kernbeisser.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 327. n. 132. *der dunkelbraune Dickschnabel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 121. n. 26. *der dunkelbraune Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 379. n. 27. Loxia (Obscura) fusco-nigricans, gula media corporeque subtus albis, lateribus fusco-maculatis, tectricibus alarum albo bifasciatis.

39. CAPENSIS. *Der capsche Kernbeisser.*

Müller, Naturyst. II. p. 557. n. 39. *der capsche Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 838. *der schwarze Sperling vom Vorgebürge der guten Hofa.*

Briffon, ornith. I. p. 354. n. 45. Pinçon du cap de bonne esperance.

Büffon, Vögel, XI. p. 161. *der schwarz und gelbe Fink.*

Latham, Syn. II. I. p. 113. n. 7. Cape Grosbeak.

Latham, Syn. Suppl. p. 149. Cape Grosbeak.

Latham, Vögel, II. I. p. 108. n. 7. *der Capsche Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 373. n. 7. Loxia (Capensis) atra, uropygio tetricibusque alarum luteis.

ß. Büffon, Vögel, X. p. 121. *der gefleckte capsche Kernbeisser.* (10)

Latham, Vögel, II. I. p. 109. n. 7. Var. A.

40. NIGRA. *Der schwarze Kernbeisser.*

Müller, Naturyst. II. p. 557. n. 40. *der schwarze Kernbeisser.*

Halle, Vögel, p. 402. n. 410. *der schwarze Domherr.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 854. *der schwarze Domherr.*

Klein, av. p. 95. n. 6. Coccothraustes nigra. Rubicilla minor nigra. Mariposa nigra.

Klein, Vorbereit. p. 177. n. 6. *Schorsteinfeger.*

Kein verb. Vögelhist. p. 95. n. 6. *Schorsteinfeger.*

Briffon, ornith. I. p. 397. n. 3. Bouvreuil noir du Mexique.

Büffon, Vögel, XIII. p. 43. *der schwarz und weiße Rundschnabel; m. e. Fig.*

Latham, Vögel II. I. p. 140. n. 60. *der schwarze Kernbeisser.*

Bb 2

Latham,

(10) Ist p. 845. n. 51. schon als eine eigne Gattung aufgeführt.

Latham, Syst. ornith. I. p. 388. n. 59. *Loxia* (*Nigra*) nigra, macula alba humeri basique remigum duarum exteriorum.

Seligmann, Vögel, III. tab. 36. das kleine schwarze Rothschwänzlein.

Bankroft, N. G. von Guian. p. 108. der kleinere schwarze Rothschwanz.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 175. n. 28. *Loxia* (*Nigra*) nigra, macula alba humeri remigumque duarum exteriorum.

89. CRASSIROSTRIS. Der dickschnäblige Kernbeisser.

Latham, Syn. Suppl. p. 152. Thick-billed Grosbeak.

Latham, Vögel, II. I. p. 141. n. 61. der dickschnäbliche Kernbeisser.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 390. n. 65. *Loxia* (*Crassirostris*) nigra, remigibus primoribus rectricibusque duabus intermediis basi albis, rostro gibbo.

β. *Loxia* pileo coccineo nitido, postice quadrato. *

Latham, Syn. Suppl. p. 152. — Syst. ornith. I. p. 390. n. 65. β. — Vögel, II. I. p. 141. ad n. 61.

90. AMERICANA. Der schwarzbrüstige Kernbeisser. (1)

Latham, Vögel, II. I. p. 141. n. 62. der schwarzbrüstige Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 390. n. 67. *Loxia* (*Pectoralis*) corpore supra fasciaque pectoris nigris, subtus fasciaque alarum gemina alba.

41. CAE.

(1) Das Vaterland ist noch nicht ganz ausgemacht.

41. CAERULEA. *Der himmelblaue Kernbeißer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 558. n. 41. *der himmelblaue Kernbeißer.*

Halle, Vögel, p. 403. n. 411. *der blaue Kernbeißer.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 327. n. 133. *der blaue Dickschnabel.*

Klein, av. p. 95. n. 7. *Coccothraustes caerulea.*

Klein, Vorbereitung. p. 177. n. 7. *blaue Dickschnäbler.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 7. *blauer Dickschnäbler.*

Briffon, ornith. I. p. 399. n. 7. *Bouvreuil bleu de la Caroline.*

Buffon, Vögel, XIII. p. 40. *der blaue amerikansche Gimpel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. p. 111. n. 11. *der blaue Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 374. n. 11. *Loxia (Caerulea) caerulea, alis fuscis, fascia baseos purpurea.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 78. *der blaue Kernbeißer.*

Schöpf, Reif. d. Nordamer. II. p. 109. *der blaue Vogel.*

Bankroft, N. G. von Guian. p. 108. *der guianische Blaufinke?*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 175. n. 29. *Loxia (Caerulea) caerulea, alis fuscis, fascia baseos purpurea.*

β. Briffon, ornith. I. p. 398. n. 6. *Bouvreuil bleu du Brésil.* (2)

Latham, Syn. II. p. 117. n. 11. Var. A. — Vögel, II. p. 111. n. 11. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 374. n. 11. β. *Loxia tota caerulea, loris macula nigra.*

Bb 3

42. ORIX.

(2) Nach Briffon eine eigne Gattung.

42. ORIX. *Der Grenadier.*

Müller, Naturfyst. II. p. 564. n. 7. *der afrikanische Ammer.*

Onomat. hist. nat. V. p. 719. *der afrikanische Ammer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 98. n. 20. *neu entdeckter Fink.*

Briffon, ornith. I. p. 338. n. 21. *Cardinal du cap de bonne esperance.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 115. n. 16. *der Grenadier-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 376. n. 17. *Loxia (Orix) fulvo-sanguinea, facie pectoreque atris, alis rectricibusque nigricantibus.*

Seligmann, Vögel, VI. tab. 72. *der Grenadier.*

Linne', Syst. Nat. Ed. X. p. 177 n. 5. *Emberiza (Orix) grisea, fronte abdomineque nigris, collo uropygioque fulvis, rostro nigro.*

β. Biffon, Vögel, X. p. 84. *der roth und schwarze Kernbeisser; m. e. Fig.*

Latham, Syn. II. 1. p. 121. n. 16. *Var. A.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 376. n. 17. *β.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 115. n. 16. *Var. A.*

91. ERYTHRINA. *Der carmoisinrothköpfige Kernbeisser. (3)*

Latham, Vögel, II. 1. p. 265. n. 29. *der karmoisinrothköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 444. n. 33. γ. *Fringilla cinereo-rubescens, subtus alba, capitis, uropygii gutturisque pennae apice ruberrimis, remigibus rectricibusque fuscis, margine lutescentibus.*

92. FLA-

(3) Nach Latham eine Varietät von *Fringilla rosea*, p. 923. n. 91.

92. FLAMENGO. *Der upsalische Kernbeißer.* (4)

Latham, Syn. Suppl. p. 155. Flamingo Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 152. n. 88. *der Flamingo Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 388. n. 56. ♂. Loxia alba, capite, collo, pectore abdomineque roseis.

43. VIOLACEA. *Der violettfarbige Kernbeißer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 558. n. 43. *der violettfarbige Kernbeißer.*

Halle, Vögel, p. 403. n. 413. *der purpurblaue Kernbeißer.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 328. n. 134. *der purpurrothe Dickschnabel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 859. *der purpurblaue Kernbeißer.*

Klein, av. p. 95. n. 9. Coccothraustes purpurea.

Klein, Vorbereit. p. 177. n. 9. *Purpurklepper.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 9. *Purpurklepper.*

Briffon, ornith. I. p. 400. n. 9. Bouvreuil violet de Bahama.

Büffon, Vögel, XIII. p. 46. *der violette Dickschnabel, oder violette Gimpel mit rother Kehle und Augenbraunen, m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 112. n. 12. *der purpurfarbene Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 375. n. 13. Loxia (Violacea) violacea, superciliis, gula crissoque rubris.

Seligmann, Vögel, II. tab. 80. *der purpurfarbene Kernbeißer.*

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 176. n. 30. Loxia (Violacea) violacea, superciliis, gula anoque rubris.

Gentl. Magaz. XXIII. tab. p. 128.

Bb 4

Donn.

(4) Nach Latham eine Varietät von *Loxia Pyrrhula*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 359. n. 12.
der violettfarbige Kernbeisser.

44. GROSSA. *Der weißkehlige Kernbeisser.*

Müller, Naturfyst. II. p. 558. n. 44. *der große Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 848. *der Amerikanische blaue Fink.*

Briffon, ornith. I. p. 381. n. 20. Gros-bec bleu d'Amerique.

Büffon, Vögel, X. p. 56. *der blaue amerikani-
sche Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 110. n. 10. *der weißkeh-
lige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 374. n. 10. Loxia (Gros-
sa) cano-caerulescens, iugulo rectricibusque
atris, gula alba, rostro rubro.

45. MINIMA. *Der kleine Kernbeisser.*

Müller, Naturfyst. II. p. 558. n. 45. *der kleine Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 853. *der kleinste Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 154. Dwarf Grosbeak.

Latham, Vögel, II. I. p. 151. n. 83. *der Zwerg-
Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 396. n. 92. Loxia
(Minima) fusca, subtus testacea, remigibus
primoribus basi, secundariis posterius albis.

β. Loxia corpore subtus cinereo-albo: inter rostrum
et oculos, marginibusque alarum flavescens. *

γ. Loxia corpore toto subtus uropygioque albis. *

Latham, Syst. ornith. I. p. 396. ad n. 92. —
Vögel, II. I. p. 151. ad n. 81. — Syn. Suppl.
p. 154.

46. FUSCA. *Der braune Kernbeißer.* (5)

Müller, Naturfyst. II. p. 559. n. 46. *der braune Kernbeißer.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 848. *der braune Krummschnabel.*

Briffon, ornithol. I. p. 398. n. 5. *petit Bouvreuil noir d'Afrique.*

Büffon, ois. IV. p. 368. Bouveron. — pl. enl. n. 319. fig. I. *Bouvreuil à plumes frisées du Brésil.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 35. *der kleine schwarze afrikanische Gimpel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 140. n. 58. *der braune Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 389. n. 64. *Loxia (Fusca) fusca, subtus albida, remigibus a tertia ad nonam basi omnino albis.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 218. *Loxia fusca.*

93. SEPTENTRIONALIS. *Der nördliche Kernbeißer.* (6)

Pennant, arct. Zool. II. p. 329. ad A. *Loxia atra.*

Latham, Vögel, II. I. p. 140. n. 59. *der nördliche Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 388. n. 58. *Loxia (Septentrionalis) atra, macula alarum alba.*

47. MINUTA. *Der kleinste Kernbeißer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 559. n. 47. *der Zwerg.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 854. *der kleine Finke.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 39. *der rothbauchigte Rundschnabel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 150. n. 83. *der kleine Kernbeißer.*

Bb 5

Latham,

(5) Die Synonymen aus Briffon und Büffon, rechnet Latham zu *Loxia Lineola*, p. 854. n. 25.

(6) Nach Pennant eine Varietät von *Loxia Pyrrhula*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 396. n. 90. *Loxia* (Minuta) grisea, uropygio subtusque ferruginea, remigibus 4, 5, 6, basi utrinque albis, cauda integra.

Bankroft, N. G. von Guiana, p. 108. *der graue Gimpel*. (7)

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 176. n. 31. *Loxia* (Minuta) grisea, uropygio subtusque ferruginea, remigibus 4, 5, 6, basi utrinque albis, cauda integra.

48. BICOLOR. *Der zweifarbige Kernbeißer*. (8)

Müller, Naturyst. II. p. 559. n. 48. *der zweifarbige Kernbeißer*.

Onomat. histor. natur. IV. p. 836. *brauner Americanischer Diefelfinke*.

Klein, av. p. 98. n. 16. *Fringilla fusca americana*.

Klein, Vorbereit. p. 183. n. 16. *brauner amerikanischer Diefelfinke*.

Klein, verbeß. Vögelhistor. p. 98. n. 16. *brauner Fink*.

Briffon, ornithol. I. p. 352. n. 40. *petit Pinçon rouge*.

Briffon, Vögel, XI. p. 145. *der kleine braune Fink*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 150. n. 82. *der orangebäuchige Kernbeißer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 395. n. 89. *Loxia* (Bicolor) fusca, subtus rubra.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 61. *das kleine braune Rothkehlchen*.

Linne,

(7) Hier heist es: er sey etwas größer als ein Rabe; das verstehe ich gar nicht. Das Original habe ich nicht zur Hand. In der Note steht *Loxia cana* Linn; der es aber nach der Beschreibung nicht seyn kann.

(8) Ist nicht mit *Fringilla bicolor* zu verwechseln.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 176. n. 32. Loxia
(Bicolor) fusca, subtus rubra.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. Loxia bicolor.

β. *Latham*, Syst. ornith. I. p. 395. n. 89 β. Loxia fu-
sca, subtus alba, gula pallide ferruginea.

49. TRIDACTYLA. *Der dreyzehige Kernbeißer.* (?)

Buffon, Vögel, X. p. 119. *der Guisso - Balito.*
(Guisso balito - dimmo - won jerck.)

Batsch, Thiere, I. p. 351. *der Guisso - Balito.*

Beckmann, Bibl. VIII. p. 540. *der Guisso - Ba-
lito.*

Latham, Vögel, II. I. p. 151. n. 85. *der dreyze-
hige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 397. n. 93. Loxia (Tri-
dactyla) nigra, capite, collo inferiore vittaque
longitudinali abdominis rubris, tectricibus ala-
rum fuscis, albo marginatis.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 623. *der
Guisso - balito.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 217. Guissobalito.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Ver-
mehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 301. n. 12. Loxia Colius. p. 842. n. 1. Colius capensis.

p. 306. n. 42. Loxia Mada- p. 305. n. 27. Lanius bico-
gascarina. lor.

Das Geschlecht ist, der Anzahl nach, um 44. Gat-
tungen vermehrt. Da aber zwey derselben in andere
Geschlechter versetzt, und an deren Stelle zwey andere
einge-

(9) Der gezähnte Schnabel und die nur mit 2. Vorder- und 1.
Hinterzehe versehenen Füße, machen einen ganz besondern
Character aus, der wohl für ein eigenes Geschlecht zurei-
chend wäre.

eingeschoben worden; so sind der neu hinzugekommenen Gattungen überhaupt 46. — Bey der 1ten Gattung sind drey, bey der 4ten drey, bey der 8ten drey, bey der 21ten drey, bey der 29ten zwey, bey der 31ten zwey, bey der 36ten zwey, bey der 39ten zwey, bey der 41ten zwey, bey der 42ten zwey, und bey der 48ten gleichfalls zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. Der graue Kernbeißer.

Latham, Vögel, II. 1. p. 155. n. 93. der graue Kernbeißer.

Mus. Carl. IV. n. 88. Loxia cinerea.

2. Der Javanische Kernbeißer.

Latham, Vögel, II. 1. p. 155. n. 94. der Javanische Kernbeißer.

Mus. Carl. IV. n. 89. Loxia javensis.

3. Der rostrothe Kernbeißer.

Latham, Vögel, II. 1. p. 155. n. 95. der rostrothe Kernbeißer.

Mus. Carl. IV. n. 90. Loxia ferruginea.

4. Der Kernbeißer mit halbem Halsringe.

Latham, Vögel, II. 1. p. 157. n. 99. der Kernbeißer mit dem halben Halsringe.

Actes de la Soc. d'hist. nat. Vol. I. p. 1. n. 81. Loxia semitorquata.

C. Neuere Gattungen.

1. Der Franziskaner in Guinea.

Latham, Vögel, II. 1. p. 157. n. 98. der Franziskaner Kernbeißer.

Isert: Schrift der berlin. Gesellsch. N. Fr. IX. p. 332.

Loxia (Franciscana) coccinea, capite abdomineque nigra, alis griseis, tab. 9.

2. Der

2. *Der hudsonische Kernbeißer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 156. n. 96. *der Kernbeißer aus der Hudson-bay.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 379. n. 28. Loxia (Hudsonia) fusca, abdomine albo, lateribus fusco-maculatis, tectricibus alarum rufo bifasciatis.

3. *Der gesellschaftliche Kernbeißer vom Cap.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 156. n. 97. *der gesellige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 381. n. 35. Loxia (Socia) rufo-fusca, subtus flavescens, capistro nigro, cauda brevi.

4. *Der gelbe Kernbeißer von Sumatra.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 154. n. 91. *der grün-gelbe Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 384. n. 44. Loxia (Hypoxantha) flavicans, fronte superciliisque luteis, remigibus rectricibusque nigris, margine flavescens.

Mus. Carlson. fasc. III. tab. 71. Loxia hypoxantha.

5. *Der braunrothe asiatische Kernbeißer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 155. Eastern Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 152. n. 87. *der östliche Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 387. n. 55. Loxia (Undulata) fusco-rubra, corpore subtus fusco-undulato, cauda pallide rubro-cinerea.

6. *Der grauköpfige indianische Kernbeißer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 155. Ash-headed Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 152. n. 86. *der grauköpfige Kernbeißer.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 80. *Loxia* (Indica) nigricans, subtus albida, capite colloque cinereis, cauda apice alba.

7. *Der grasgrüne Kernbeißer von Java.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 154. n. 92. *der lauchgrüne Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 396. n. 91. *Loxia* (Prasina) viridi-olivacea, subtus cano-flavicans, uropygio rubro, pedibus flavis. (mas.)

Mus. Carlsc. fasc. III. tab. 72. *Loxia prasina.*

β. *Loxia fusco-olivacea*, subtus cano flavicans, uropygio obsolete rubro, pedibus flavis. (femina)

Latham, loc. cit. β.

Mus. Carlson. fasc. III. tab. 73.

110. GESCHLECHT. EMBERIZA. *Der Amer.*

Müller, Naturforsch. II. p. 560. Gen. CX.

Leske, Naturgesch. p. 260. Gen. XLII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 145. Gen. LXIII.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 184. Gen. XXXII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 523. Gen. LXXII.

Funke, Naturgesch. I. p. 236.

Ebert, Naturl. II. p. 133.

Halle, Vögel, p. 383. Gen. II.

Pennant, arch. Zool. II. p. 330.

Neuer Schaupl. der Natur. I. p. 267.

Onomat. hist. nat. III. p. 771.

Klein, av. p. 91. trib. IV.

Brissou, ornith. I. p. 382. Gen. XXXV.

Buffon, Vögel, XII. p. 128. sqq.

Batsch, Thiere, I. p. 317. Gen. LXXV.

Latham, Vögel, II. 1. p. 158. Gen. XXXV.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 397. Gen. XXXVI.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219.

Donn.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 359. Gen. LXXVIII.

I. NIVALIS. *Der Schneeammer.* (10)

Müller, Naturfyst. II. p. 110. n. 1. *der Schneeammer.*

Leske, Naturgesch. p. 260. n. 1. *der Schneeammer;* tab. 5. fig. 1.

Boronsky, Thierreich, III. p. 147. n. 2. *der Schneeammer.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 184. n. 1. *Emberiza (Nivalis) remigibus albis, primoribus extrorsum nigris; rectricibus nigris, lateralibus tribus albis; der Schneeammer; Schneevogel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 526. n. 6. *der Schneeammer; Schneesperling.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 590. *der Schneeammer.*

Funke, Naturgesch. I. p. 236. *der Schneeammer.*

Ebert, Naturl. II. p. 134. *der Schneeammer; Winterling.*

Halle, Vögel, p. 387. n. 390. *der Schneevogel; nordischer Lerchenammer.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 402. n. 338. *der Schneeammer.*

Pennant,

(10) Länge 6 1/2 Zoll. Flügelweite 10. Zoll. — Gewicht eine Unze fünf Quentchen. *Penn.* Brütet in Grönland im May. Die Knaben fangen sie im Herbst, wenn sie sich, um auszuwandern, an den Küsten in großen Heerden versammeln, und sie werden getrocknet gegessen. Es scheint, daß sie die Länder innerhalb des ganzen arctischen Kreises zu ihrem Sommeraufenthalt wählen; von dort aus überschwemmen sie, wenn in der kalten Zone der Winter eintritt, die südlichen Länder in ungeheurer Anzahl. — Man hat diese Vögel zuweilen zu den Lerchen gezählet. Die Ursach giebt Linné selbst an: *fn. suec. p. 83. Rostrum cum Emberiza convenit; pollicis ungue longiore, et quod per terram cursitat, ad glandas propius accedit.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 331. n. 138. *der Schnee-ammer*.

Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 268. *Schneeammer*.

Onomat. histor. natur. I. p. 243. *Alauda hiemalis*; *Schneelerche*; *Winterlerche*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 129. *Schneeammer*.

Klein, av. p. 91. n. 4. *Emberiza varia*. *Passer hybernus*. *Avis peregrina*.

Klein, *Vorbereit.* p. 170. n. 4. *Schneeammer*; *Winterling*; *Neuvogel*; *geschleckter Emmerling*; *Wintersperling*.

Klein, *verbess. Vögelhistor.* p. 93. n. 4. *Schneeammer*.

Briffon, *ornith.* I. p. 383. n. 9. *Ortolan de neige*.

Büffon, *Vögel*, XII. p. 173. *der Schnee-Ortolan*, *oder Schnee-Ammer*; m. e. Fig.

Batsch, *Thiere*, I. p. 347. *der Schneeammer*.

Latham, *Syn. Suppl.* p. 157. *Snow-Bunting*.

Latham, *Vögel*, II. I. p. 158. n. 1. *der Schnee-Ammer*.

Latham, *Syst. ornithol.* I. p. 397. n. 1. *Emberiza (Nivalis) remigibus albis, primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris, lateralibus tribus albis*.

Seligmann, *Vögel*, V. tab. 21. *der Schneevogel aus Hudsons bay*.

Beseke, *Vögel Kurl.* p. 78. n. 168. *der Schneeammer*.

Siemssen, *meklenb. Vögel*, p. 110. n. 1. *der Schneeammer*; *Schneevogel*; *Strietvogel*.

Bock, *N. G. von Preuss.* IV. p. 423. *Schneeammer*.

Fischer, *Liv.* p. 97. n. 147. *Schneeammer*.

Fischer, *Zuf. zur N. G. von Livl.* p. 48. *Schneevogel*.

Lepechin,

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. II. p. 5. *Schneevogel*, III. p. 13. *Schneeammer*.

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 41. *Schneeammer*.

Phipps, Reis. nach d. Nordpol. p. 99. *der Schneeammer*.

Schöpf, Reis. d. Nordamer. II. p. 13. *Schneevogel*.

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 475. *Schneeammer*.

White, N. G. von Engl. p. 30. p. 44. *Schneeammer*.

Leem, Finnm. p. 135. *der Schneevogel*.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 1. *Sneefugl*; *Sneekok*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 182. *Sneefugl*; *Vinterfugl*.

Olaffen, Isl. I. p. 310. c. *Snio Tytlingar*; *Tyttings-Bilke*; *Snio-Tytling*.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 130. tab. 57. fig. 6. *Schneeammer*.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 17. *Schneeammer*.

Linné, Abhandl. II. p. 283. n. 36. p. 302. n. 124. *der Schneeammer*.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 176. n. 214. *der Schnee-Emmerling*.

Martini, Naturlex. II. p. 389. *Schneeammer*.

Naturforsch. XVII. p. 89. n. 182. *die Schneeammer*.

Schwed. Abhandl. II. p. 134. *Schneesperling*; tab. 1. fig. 9 — 11.

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 298. *Schneeammer*.

Samml. zur Physf. u. N. G. II. p. 738. *der Schneeammer*.

Berlin. Samml. IX. p. 572. *Schneeammer*.

Börner, Schles. ökon. Gesellsch. 1781. p. 101. *Emberiza nivalis*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 142. n. 5. *Schneeammer*.

Meidinger, Vorles. I. p. 149. n. 1. *der Schneeammer*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1013. *Schneevogel*.

Schrift. der Drontheim. Gesellsch. III. p. 514.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 1. *Avis nivalis*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 176. n. 1. *Emberiza (Nivalis) remigibus albis: primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris, lateralibus tribus albis*.

Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 250. *Emberiza (Nivalis) remigibus albis: primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris; lateralibus tribus albis*.

Kramer, Austr. p. 372. n. 7. *Meerstiglitz*.

Olaus M. de gent. septentr. L. 19. c. 156. *Avicula nivalis*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 256. *Emberiza varia. Winterling, Neuvogel*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 397. *Nivalis avis. Passer hibernus. Hortulanus ex albo variegatus. Snegula*.

Bomar. diction. VI. p. 273. *Ortolan de neige*.

Levin, britt. Birds, II. tab. 71.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Emberiza nivalis*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 360. n. 1. *der Schneeammer*.

- β. *Der weißfleckige Schneeammer*. (1)

Briffon, ornithol. I. p. 389. n. 9. *A. Ortolan de neige tacheté*.

Latham,

(1) *Bechstein* u. *Otto* halten *Frischens* weißfleckigen *Ammer* für ein *Gold-Ammer* Männchen. *S. Bechsteins N. G. Deutschl.* III. p. 591. — *Büffons* Vögel, XII. p. 179. not. 2.

Latham, Syn. II. 1. p. 163. Var. A. Spotted Bunting.

Latham, Vögel, II. 1. p. 160. n. 1. Var. A. der gelbgefleckte Schnee - Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 398. n. 1. β.

γ. Der schwarzbrüstige Schneeammer.

Briffon, ornithol. I. p. 389. n. 9. B. Ortolan de neige à poitrine noire.

Latham, Syn. II. 1. p. 163. Var. B. Black - breasted Bunting.

Latham, Vögel, II. 1. p. 160. n. 1. Var. B. der schwarzbrüstige Schnee - Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 398. n. 1. γ. Emberiza flavescente - alba, capisiro corporeque subtus nigricantibus, alis caudaque albo nigroque variis.

δ. Der Schneeammer mit dem Halsbände. (2)

Klein, av. p. 98. n. 10. Fringilla capite albo.

Klein, Vorbereit. p. 181. n. 10. Weißkopf.

Klein, verb. Vögelhist. p. 97. n. 10. Weißkopf.

Briffon, ornithol. I. p. 390. n. 9. D. Ortolan de neige à collier.

Büffon, Vögel, XII. p. 195. der Schneeortolan mit dem Halsbände, oder der weißköpfige; mit e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 163. Var. C.

Latham, Vögel, II. 1. p. 161. n. 1. Var. C. der bunte Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 398. n. 1. δ. E. corpore fusco - rubro, capite colloque albis, pectore macula difformi caerulecente, alis caudaque albo nigroque variis.

Cc 2

7. Mu-

(2) Albin hat diesen Vogel zuerst abgebildet. Otto hält es noch für ungewiß, ob er zu dem Schneeammer gehört, weil er in Gestalt und Farbe von ihm abweicht, und auf einer Eiche sitzend abgebildet ist.

7. MUSTELINA. *Der Eissammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 161. n. 2. *der lohgelbe Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 398. n. 2. *Emberiza* (Glacialis) nigra pennis flavo-fusco marginatis, gula uropygioque flavescens, subtus alba flavo-obscure maculata.

Linné, faun. suec. II. p. 85. n. 227. β . (Variet. *Emb. nivalis*.)

Fabric. faun. groenl. p. 119. Pulli?

Nach *Bechstein* ein sehr altes Männchen von der folgenden Gattung.

25. MONTANA. *Der Bergammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 162. n. 3. *der Bergammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 398. n. 3. *Emberiza* (Montana) cinerea, subtus flavescens undulata, capite castaneo, fronte saturatiore, gula alba, rectricibus tribus extimis albis.

2. HYEMALIS. *Der schwarze Ammer.* (3)

Müller, Naturyst. II. p. 561. n. 2. *der Wintervogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 334. n. 139. *der schwarze Ammer.*

Klein, av. p. 89. n. 8. *Passer nivalis*, cervice alba.

Klein, Vorbereit. p. 166. n. 8. *Weißnacken.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 91. n. 7. *Weißnacken.*

Briffon, ornith. I. p. 389. n. 9. *C. Ortolan de neige noir.*

Büffon,

(3) Länge 6 1/2 Zoll. Flügelweite 9. Zoll. Gewicht 1 1/2 Unze Penn. — *Briffon* und *Büffon* halten ihn für eine Abart von *Emberiza nivalis*.

Büffon, Vögel, XII. p. 194. der Jacobinortolan, und schwarze Schneeammer; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 164. n. 4. der schwarze Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 399. n. 4. Emberiza (Hyemalis) nigra, ventre albo.

Seligmann, Vögel, I. tab. 72. der Schneevogel.

Kalm, Reif. d. Nordamer. p. 49.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 360. n. 2. der schwarze Ammer.

3. MILIARIA. Der Grauammer. (4)

Müller, Naturfyst. II. p. 562. n. 3. der graue Ammer.

Borowsky, Thierreich, III. p. 149. n. 4. der graue Ammer; Gerstammer.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 185. n. 2. Emberiza (Miliaria) grisea, subtus nigro-maculata, orbitis rufis; die graue Ammer.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 524. n. 2. der graue Ammer; Strumpfwirker.

Funke, Naturgesch. I. p. 237. die graue Ammer.

Ebert, Naturl. II. p. 133. die graue Ammer.

Halle, Vögel, p. 384. n. 382. der große lorchensfarbne Ammer.

Pennant, arch. Zool. II. p. 341. B. der gemeine Ammer.

Klein, av. p. 91. n. 1. Emberiza alba.

Klein, Vorbereit. p. 169. n. 1. grauer großer Ammer; Knustknipper.

Cc 3

Klein,

- (4) Länge 7 1/2 Zoll. Flügelweite 11 1/3 Zoll. Büff. Nister selten auf der bloßen Erde, sondern 3—4. Zoll über dem Boden in dem dichtesten Grase, das stark genug ist, sein Nest zu tragen. Die Jungen verlassen das Nest, schon ehe sie fliegen können, und laufen im Grase. Wird leicht zahm.

- Klein*, verb. Vögelhist. p. 93. n. 1. *grauer Ammer*; *großer Ammer*; *Knipper*.
- Klein*, Stemmat. av. p. 18 tab. 18. fig. 5. a. b.
- Gesner*, Vögelb. p. 475. *weiße Emmeritze*.
- Briffon*, ornith. I. p. 390. n. 10. Proyer.
- Büffon*, Vögel, XII. p. 237. *der graue Ammer*; m. e. Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 346. *der graue Ammer*.
- Latham*, Vögel, II. 1. p. 169. n. 8. *der Gerstenammer*; *gemeiner Ammer*.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 402. n. 12. *Emberiza* (*Miliaria*) *grisea*, *subtus nigro-maculata*, *orbitis rufis*.
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. III. n. 2. *die graue Ammer*; *Ortolaan*.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 424. *die graue große Ammer*.
- Fischer*, Liv. p. 98. n. 148. *grauer Ammer*.
- Cetti*, Sardin. II. p. 184. *die graue Ammer*.
- Pallas*, Reif. III. p. 647. Ausz. III. p. 474. *Graummer*.
- White*, N. G. von Engl. p. 24. p. 66. n. 8. *graue Ammer*.
- Pennant*, britt. Thiergesch. p. 128. tab. 58. Fig. 7.
- Pontoppidan*, Dänneim. p. 174. n. 2. *Kornlärke*.
- Naturforsch. XVII. p. 91. n. 183. *die graue Ammer*.
- Neue Schwed. Abhandl. III. p. 109. *Emberiza Miliaria*.
- Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 740. *die Graummer*.
- Borkhausen*, Magaz. I. p. 143. n. 6. *Hirsensammer*; *Graummer*.
- Martini*, Naturlex. II. p. 374. *große graue Ammer*.
- Börner*, schles. ökon. Nachricht. 1781. p. 101. *Gerstling*.
- Günther*, Nest. u. Ey. tab. 70. *Gerstammer*.

Linné.

- Linne'*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 4. Emberiza.
- Linne'*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 176. n. 2. Emberiza (Calandra) grisea nigro-maculata. — Fn. suec. II. n. 228. Emberiza (Calandra) grisea, nigro maculata.
- Müller*, zool. dan. prodr. p. 38. n. 251. Emberiza (Miliaria) grisea, subtus nigro-maculata, orbitis rufis.
- Kramer*, Austr. p. 372. n. 6. *Bräster*.
- Brünniche*, ornith. bor. p. 68. n. 247. Emb. Calandra.
- Charleton*, exercitat. p. 84. n. 16. Cynchramus, p. 87. n. 14. Emberiza alba.
- Charleton*, onom. zoic. p. 79. n. 14. Emberiza alba. p. 75. n. 16. Cynchramus.
- Möehring*, av. gen. p. 41. n. 28. Spinus.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 290. Hordeola. *Gerstling*; *Gerst-Vogel*; *Gersthammer*, *welsche Goldammer*; *weiße Emmeritz*.
- Sibbald*, Scot. P. II. L. 3. p. 18. Emberiza alba Gesneri.
- Belon*, hist. nat. des ois. p. 266. Pruyer.
- Jonston*, av. p. 97. Emberiza alba. p. 72. Cynchramus. p. 101. Alaudæ congener.
- Zinnman*. Uov. p. 63. tab. 9. fig. 55. Strilozzo.
- Faun. Arragon. p. 680. — Roman. ornithol. I. p. 155. tab. 24. Fig. 1.
- Hist. Prov. I. p. 195. — *Levin*, britt. Birds II. tab. 75.
- Bomare*, diction. IX. p. 336. — Diction. des anim. III. p. 389.
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 360. n. 3. *der graue Ammer*.

4. HORTULANA. *Der Ortolan.* (5)

Müller, Naturfyft. II. p. 562. n. 4. *der Ortolan*;
tab. 25. Fig. 4.

Leske, Naturgesch. p. 261. n. 2. *der Gartenammer*.
Borowsky, Thierreich, III. p. 148. n. 3. *der Ortolan*; *Fettammer*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 185. n. 3. *Emberiza* (*Hortulana*) remigibus nigris, primis tribus margine albidis: rectricibus nigris, latera- libus duabus extrorsum nigris. *Ortulan*; *Korn- sink*; *windsche Goldammer*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 525. n. 4. *der Garten- ammer*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 590. *Am- merling*, *Grünzling*; *Hortulan*.

Funke, Naturgesch. I. p. 237. *der Ortolan*.

Ebert, Naturl. II. p. 135. *der Ortolan*.

Halle, Vögel, p. 385. n. 383. *der Ortolan*. Fig. 24.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 403. *der Ortolan*.

Bekmann, Naturhist. p. 53. *b. der Ortolan*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 341. D. *der Ortolan*.

Onomat. hist. nat. III. p. 776. *Fettammer*; *Gärt- ner*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 129. *Orto- lan*, *Brachamsel*.

Klein, av. p. 91. n. 2. *Emberiza miliaria pin- guescens*.

Klein, Vorbereit. p. 170 n. 2. *Fettammer*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 93. n. 2. *Fettammer*.

Beiffon, ornith. I. p. 384. n. 4. *Ortolan*.

Büffon, Vögel, XI. p. 128. *der Ortolan*; mit e. Fig.

Batsh, Thiere, I. 345. *der Ortolan*.

Latham,

(5) In Cypern wird ein beträchtlicher Handel damit getrieben, und jährlich oft an 160000 aus dieser Insel verschickt.

Latham, Syn. Suppl. p. 157. *Ortolan Bunting*.

Latham, Vögel, II. I. p. 164. n. 5. *der Gartenammer*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 399. n. 5. *Emberiza* (*Hortulana*) *remigibus nigris*, *primis tribus margine albidis*, *recitricebus nigris*, *lateralibus duabus extrorsum albis*.

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 424. *der Fettammer*.

Cetti, Sardin. II. p. 192. *Ortolan*. *

Fischer, Livl. p. 98 n. 149. *Fettammer*.

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 74. *Ortolan*.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *der Ortolan*.

Taube, Slavon. I. p. 22. *Ortolane*.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 3. *Ortulan*.

Linné, Abhandl. II. p. 286. n. 5. p. 303. n. 126. *der Ortolan*.

Naturforsch. XVII. p. 91. n. 184. *Fettammer*.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 735. *der Hortulan*.

Borkhausen, Magaz. I. p. 143. n. 7. *Ortolan*.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 177. not. n.

Martini, Naturlex. II. p. 365. *Fettammer*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 57. *Ortolahn*.

Naumann, Vogelfsteller, p. 73. *Ortolan*.

Eberhard, Thiergesch. p. 81. *der Ortolan*.

Anweis. Vögel zu fang. p. 173. 333. *Hortulan*.

Forstlex. II. p. 387. *Ortolan*.

Oekonom. Zool. p. 98. n. 42. *der Ortolan*.

Meidinger, Vorl. p. 149. n. 2. *der Gartenammer*.

Žblonsky, allgem. Lex. p. 762. *Ortolan*.

Ludovici, Kaufmannslex. IV. p. 369.

Zückert, Speis. aus dem Thierr. p. 96.

Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 101. *Emberiza Hortulana*.

Gothaisch. Hofkalender, 1780. p. 149.

Beckmann, Churmark. f. I. p. 873.

Koburgisch. Magazin, 1760. n. 11. p. 161.

Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorf. VI. p. 261.

Linne', Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 5. Hortulana.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 177. n. 3. Emberiza (Hortulana) remigibus nigris, primis tribus margine albidis, rectricibus nigris: laterali-
bus duabus extrorsum nigris.

Linne', fn. suec. I. p. 208. Fringilla remigibus nigris: primis tribus margine albidis: rectricibus nigris: lateralibus duabus extrorsum albis.

Brünniche, ornith. bor. p. 68. Hortulanus.

Raczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 386. Hortulanus. Miliaria Varronis. *Füt-vogel*.

Kramer, Austr. p. 371. n. 4. Emberiza capite virescente, annulo circa oculos gulaque flavescen-
tibus. *Ortulan*.

Zinn, Uov. p. 41 tab. 6. Fig. 25. Ortolano.

Hist. prov. I. p. 494. Ortolan.

Salerne, ois. p. 296. Hortolan; Ortolan; Jardinier.

Bomare, Diction. VI. p. 272. — Diction. des anim. III. p. 289.

Varro, de re rust. L. 3. c. 5. n. 2. Miliariae.

Aristot. hist. anim. L. 3. c. 12. Κρυχαμπος.

Donndorff, Handb. d. Thiergeschich. p. 361.
n. 4. der Ortolan.

β. Der gelbe Ortolan.

Halle, Vögel, p. 386. n. 384. der gelbliche Ortolan.

Onomat. hist. nat. III. p. 777. n. 1. eine gelbe Spielart.

Brissou, ornith. I. p. 385. n. A. Ortolan jaune.

Rüffon, Vögel, XII. p. 141. der gelbe Ortolan.

Latham, Syn. II. 1. p. 168. n. 5. A. — Vögel,
II. 1. p. 166. n. 5. A.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 399. n. 5. β . *Emberiza*
flavescens tota, remigibus margine albis.

Martini, Naturlex. II. p. 367.

Jonston, av. p. 72. *Hortulanus flavus*.

γ. Der weiße Ortolan.

Halle, Vögel, p. 386. n. 385. ganz weiße *Ortolane*.

Onomat. hist. nat. III. p. 172. eine schneeweiße
Spielart.

Briffon, ornith. I. p. 385. B. *Ortolan blanc*.

Büffon, Vögel, XII. p. 141. *der weiße Ortolan*.

Latham, Syn. II. 1. p. 168. n. 5. B. — Vögel, II.
 1. p. 166. n. 5. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 5. β . E. tota
nivea.

Martini, Naturlex. II. p. 369.

Jonston, av. p. 72. *Hortulanus albus*.

δ. Der weißschwänzige Ortolan.

Halle, Vögel, p. 386. n. 388. *Ortolan mit weißem*
Schwanze.

Onomat. hist. nat. III. p. 777. Eine Spielart mit
 einem weißen Schwanze.

Briffon, ornith. I. p. 385. C. *Ortolan à queue*
blanche.

Büffon, Vögel, XII. p. 142. *der weißgeschwänzte*
Ortolan.

Latham, Syn. II. 1. p. 168. n. 5. C. — Vögel,
 II. 1. p. 166. n. 5. C.

Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 5. δ . E. corpo-
 re ut in primo, cauda alba.

Martini, Naturlex. II. p. 369.

Jonston, av. p. 72. *Hortulanus albicilla*.

Zinman, Uov. p. 42. tab. 6. Fig. 27. *Ortolano con*
la coda bianca.

ε. *Der schwarze Ortolan.*

Halle, Vögel, p. 386. n. 387. *Ortolan mit schwarzem Leibe*, etc.

Onomat. hist. nat. III. p. 777. n. 4. *Eine Spielart mit grünem Kopf und Hals*, etc.

Briffon, ornith. I. p. 385. D. *Ortolan noir*.

Biffon, Vögel, XII. p. 142. *der schwärzliche Ortolan*.

Latham, Syn. II. i. p. 168. n. 5. D. — Vögel, II. i. p. 166. n. 5. D.

Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 5. ε. E. corpore nigricante, capite colloque virescentibus, rostro rubro, pedibus cinereis.

Martini, Naturlex. II. p. 365.

Zinnar, Uov. p. 42. tab. 6. Fig. 26. *Ortolano con il collo verde*.

26. SINENSIS. *Der chinesische Ammer.*

Latham, Vögel, II. i. p. 166. n. 6. *der chinesische Ammer*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 6. *Emberiza (Sinensis) rubro-fusca, subtus lutea, rectricibus alarum minoribus flavescens, remigibus, rectricibus strigaeque abdominis longitudinali fuscis*.

5. CITRINELLA. *Der Goldammer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 563. n. 5. *der Goldammer*.

Leske, Naturgesch. p. 261. n. 3. *der Goldammer*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 149. n. 5. *der Goldammer, Emmerling*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 185. n. 4. *Emberiza (Citrinella) rectricibus nigricantibus: extimis duabus latere interiore macula alba acuta, der Goldammer, Gelbgans*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 523. n. 1. *der Goldammer*; *Embritz*.

Funke, Naturgesch. I. p. 236. *Goldammer*.

Ebert, Naturl. II. p. 134. *Goldammer*; *Gelbling*.

Halle, Vögel, p. 383. n. 381. *der Goldammer*.

Meyer, Thiere, I. tab. 94. *der Goldammer*. M. u. W.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 405. n. 340. *die Goldammer*, *Gaalammer*, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 341. C. *der gelbe Ammer*.

Onomat. hist. nat. II. p. 831. *der Gröning*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 130. *Emmerling*; *Hämmerling*.

Klein, av. p. 92. n. 5. *Emberiza flava*.

Klein, Vorbereit. p. 171. n. 5. *Goldammer*; *Gaalammer*; *Gelbling*; *Geelgerst*; *Embritz*; *Aemmerling*; *Grünfing*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 93. n. 5. *Goldammer*.

Klein, Stemmat. av. p. 18. tab. 18. Fig. 6. a. b.

Gesner, Vögelb. p. 474. *Emmeritz*; *Embritz*; *Emmering*; *Emmerling*; *Gilbling*; *Gilberschen*; *Kornvogel*; *Geelgorst*. p. 475. *Gorse*; *Gurse*; m. e. Fig.

Briffon, ornith. I. p. 382. n. 1. *Bruant*.

Buffon, Vögel, XII. p. 206. *der Goldammer*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 346. *der Goldammer*.

Latham, Syn. Suppl. p. 157. *Yellow-Bunting*.

Latham, Vögel, II. I. p. 167. n. 7. *der Goldammer*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 7. *Emberiza* (*Citrinella*) *rectricibus nigricantibus, extimibus duabus latere interiore macula alba acuta*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 78. n. 169. *die Goldammer*.

Siemssen,

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 112. n. 3. *Goldammer*; *Geelgöschchen*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 424. *Goldammer*.

Cetti, Sardin. II. p. 193. *der Goldammer*.

White, N. G. von Engl. p. 63. n. 6. *Goldammer*.

Fischer, Livl. p. 98. n. 150. *Goldammer*.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 4. *Goldverling*; *Gulspurv*.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 17. *der gemeine Emmerling*.

Linné, Abhandl. II. p. 302. n. 125. *der Goldammer*.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 129. n. 2. *Goldammer*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 144. n. 8. *Goldammer*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 346. *der gelbe Emmerling*.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 172. n. 209. *der Goldammer*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 62. *Goldammer*; *Grünsching*.

Naumann, Vogelfsteller, p. 71. *Grünsching*; *Gehling*.

Beckmann, Naturhist. p. 53. a. *der Goldammer*.

Eberhard, Thiergesch. p. 81. *der Goldammer*.

Naturforsch. XVII. p. 91. n. 185. *Goldammer*.

Samml. zur Physf. u. N. G. II. p. 739. *die Goldammer*.

Neue Schwed. Abhandl. III. p. 109. *Emberiza citrinella*.

Goëze, nützl. Allerl. II. p. 387. n. 8. *der Goldammer*.

Krünitz, oekon. Encykl. X. p. 784. *Emmerling*.

Oekonom. Zool. p. 99. n. 43. *Goldammer*.

Martini, Naturlex. II. p. 371. *Goldammer*.

Forstlexikon. I. p. 592. *Emmerling*.

Schrift. der Drontheim. Gesellsch. III. p. 414.

Anweis.

Anweiss. Vogel zu fang. p. 172. *Emmerling*.

Meidinger, Vorlesung. I. p. 149. n. 3. *der Goldammer*.

André u. Bechstein, Spazierg. III. p. 21. 47. *Goldammer*.

Börner, schles. ökonom. Gesellsch. 1781. p. 101. *Emberiza Citrinella*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 297. *Emmerling*.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Emberiza*.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 3. *Citrinella*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 177. n. 4. *Emberiza (Citrinella) rectricibus nigricantibus: extimis duabus latere interiore macula alba acuta*.

Linné, fn. suec. I. p. 205. *Fringilla rectricibus nigricantibus, extimis duabus latere interiore alba acuminata macula*.

Kramer, Austr. p. 370. n. 1. *Emberiza rectricibus nigricantibus, extimis duabus, latere interiore, alba acuminata macula, gula pectoreque flavis. Ammering; Goldammering*.

Brünniche, ornith. bor. p. 68. n. 249. *Emberiza Citrinella*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 218. *Aureola. Gaul-Ammer; Geelgerst*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 368. *Aureola*. p. 392. *Lutea altera*.

Jonston, av. p. 101. *Lutearum genus alterum*.

Belon, ois p. 364. 365. *Verdier; Serrant*.

Barrere, ornithol. p. 56. *Passer ex cinereo flavus*.

Salerne, ornithol. p. 293. *Verdier, etc*.

Schaefer, element. ornithol. tab. 32.

Levin, britt. Birds, II. tab. 73.

Faun. Aragon. p. 86. — *Hist. Prov. I. p. 495*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 362. n. 5. *der Goldammer*.

β. *Der fahle oder weißliche Goldammer.* *

Büffon, Vögel, XII. p. 219. — Latham, Vögel, II. I. p. 168. not. y.

Zorn, Petinotheol. II. p. 53.

γ. *Der gefleckte Goldammer.* * Latham, l. c.

6. OLIVACEA. *Der olivenfarbige Ammer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 563. n. 6. *der Olivenammer.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 775. *der Ammer aus der Insel Dominique.*

Briffon, ornith. I. p. 392. n. 14. Bruant de St. Domingue.

Büffon, Vögel, XII. p. 259. *der olivenfarbige Ammer.*

Martini, Naturlex. II. p. 364. *Ammer von Domingo.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 38. *Emberiza (Olivacea) olivacea, subtus albidior, gula aurantia, fascia pectorali nigricante.*

27. PASSERINA. *Der Sperlingsammer.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 155. n. 25. *der Sperlingsammer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 528. n. 9. *die Sperlingsammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 278. *der Sperlingsammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 190. n. 35. *der Sperlingsammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 403. n. 14. *Emberiza (Passerina) griseo-fusca, subtus cinerascens, vertice medio, iugulo rectricibusque nigris, duabus extimis albo nigroque dimidiatis.*

Pallas, Reif. Ausz. I. Anh. p. 4. n. 10. *Emberiza passerina.*

28. PUSILLA. *Der kleine Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 284. *der kleine Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 210. n. 67. *der kleine Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 414. n. 54. *Loxia* (*Pusilla*) supra passerina, subtus albida, capite supra et lateribus fasciis quinque testaceis, interiectisque nigris quatuor.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 8. n. 20. *Emberiza pusilla.*

29. RUSTICA. *Der Bauernammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 285. *der Bauernammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 210. n. 68. *der Bauernammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 413. n. 51. *Emberiza* (*Rustica*) supra passerina, subtus alba, capite nigro, fasciis tribus longitudinaliter albis.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 8. n. 21. *Emberiza rustica.*

30. FUCATA. *Der geschminkte Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 287. *der geschminkte Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 210. n. 69. *der geschminkte Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 419. n. 73. *Emberiza* (*Fucata*) passerina, cervice cano-cinerea, corpore subtus lineaque supra et infra oculos alba.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 8. n. 22. *Emberiza fucata.*

31. SPODOCEPHALA. *Der grauköpfige Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 288. *der grauköpfige Ammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 211. n. 70. *der grauköpfige Ammer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 419. n. 74. *Emberiza* (*Spodocephala*) *passerina*, subtus flavescens, capite et collo cano-cinereis, capistro nigro.

Pallas, Reif. Ausz. III. Anh. p. 9. n. 24. *Emberiza Spodocephala*.

32. **CHRYSOPHRYS.** *Der Ammer mit gelben Augenbraunen.*

Büffon, Vögel, XII. p. 289. *der Ammer mit gelben Augenbraunen.*

Latham, Vögel, II. I. p. 211. n. 71. *der gelbstreifige Ammer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 419. n. 75. *Emberiza* (*Chrysophrys*) *passerina*, vertice nigro, superciliis citrinis, fascia a medio verticis ad nucham alba.

Pallas, Reif. Ausz. III. p. 9. n. 25. *Emberiza chrysophrys*.

33. **MAELBYENSIS.** *Der Ammer aus Südermannland. (*)*

Latham, Syn. Suppl. p. 160. *Maelby Bunting*.

Latham, Vögel, II. I. p. 208. n. 64. *der Maelbyische Ammer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 401. n. 8. *Emberiza* (*Maelbyensis*) capite colloque plumbeo-cinereis, gula albida, abdomine ferrugineo.

34. **RUTILA.** *Der röthliche Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 286. *der röthliche Ammer*.

Latham, Vögel, II. I. p. 211. n. 72. *der röthliche Ammer*.

Latham,

(*) Nach *Bechstein* eine Varietät von *Emberiza Hortulana*. N. G. Deutschl. III. p. 592.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 411. n. 40. *Emberiza* (*Rutila*) ex sanguineo rufa, subtus sulphurea, alis ex griseo ferrugineis.

Pallas, Reif. Ausz. III. Anh. p. 9. n. 23. *Emberiza rutila*.

35. FERRUGINEA. *Der rostfarbige Ammer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 338. n. 147. *der rostfarbige Ammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 192. n. 36. *der rostfarbene Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 411. n. 41. *Emberiza* (*Ferruginea*) ferruginea, abdomine remigumque primorum maculis duabus albis.

36. AMERICANA. *Der schwarzkehlige Ammer.* ⁽⁶⁾

Pennant, arct. Zool. II. p. 338. n. 144. *der Ammer mit schwarzer Kehle.* Tab. 17. unt. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 193. n. 37. *der schwarzkehlige Ammer*; tab. 46. Fig. 1.

Latham, Syst. ornith. I. p. 411. n. 42. *Emberiza* (*Americana*) cinerea, fusco striata, superciliis, striga sub oculis abdomineque flavis, gula alba, iugulo macula alba.

37. BRASILIENSIS. *Der brasilianische Ammer.*

Onomat. hist. nat. III. p. 772. *der brasilianische Emmerlingvogel.*

Halle, Vögel, p. 382. f. *der gelbe Gesangsperling.*

Dd 2

Briffon,

(6) *Latham* hat im Syst. ornith. I. c. noch die besondere Abtheilung gemacht, daß er *Pennants Ammer mit schwarzer Kehle* als Spielart von seinem eignen *Black-throated Bunting* (Syn. II. I. p. 197. n. 37. t. 44.) annimmt, und ihn folgender Gestalt charakterisirt: *Emberiza cinereo-fusca*, subtus albida, fronte superciliisque flavis, fascia sub oculis lunulaque frontis nigris, gula flava, medio macula triquerra nigra; und sagt von ihm: er bewohne die Hudsonsbay, sey 7 1/2 Zoll lang, niste auf der Erde, und lege weiße, schwarz gefleckte Eyer, cf. Syn. Suppl. p. 158.

Briffon, ornith. I. p. 392. n. 13. Bruant du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 252. der Guirnegat, oder brasilianische Ammer; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 194. n. 38. der Brasilische Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 43. Emberiza (Brasilienfis) virefcens, flavo fuscoque varia, subtus verticeque lutea.

Martini, Naturlex. II. p. 362. brasilianische Ammer.

Jonfton, av. p. 203. Guiranheemgatu.

38. MEXICANA. Der mexicanische Ammer.

Büffon, Vögel, XII. p. 255. der mexikanische Ammer oder die gelbe Therete.

Latham, Vögel, II. I. p. 195. n. 39. der Mexikanische Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 44. Emberiza (Mexicana) fuscescens, facie gulaque luteis, corpore subtus fordide albo fusco maculato.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 741. der gelbe mexikanische Ammer.

39. MILITARIS. Der Maltheserammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 195. n. 40. der Krieger Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 45. Emberiza (Militaris) flavescens-fusca, subtus alba, pectore dorsoque infimo flavis.

Hasselquist, Palaeft. (ed. germ.) p. 336. n. 48. Emberiza Melitenfis.

40. MELANOCEPHALA. *Der schwarzköpfige Ammer.* (7)

Büffon, Vögel, XII. p. 198. *der schwarzköpfige Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 195. n. 41. *der schwarzköpfige Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 45. *Emberiza* (Melanocephala) flava, dorso rufo, capite colloque superiore nigris, remigibus rectricibusque fuscis.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 171. n. 208. *der schwarzköpfige Emmerling.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 145. n. 10. *schwarzköpfiger Ammer.*

41. BRUMALIS. *Der Winterammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 195. n. 42. *der Winterammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 47. *Emberiza* (Brumalis) flavo-fusca, facipite corporeque subtus flavis, collo superiore cum lateribus cinereo, remigibus fuscis.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 175. n. 213. *der Winteremmerling.*

42. COCCINEA. *Der carmoisinrothe Ammer.* (8)

Büffon, Vögel, XII. p. 292. *der Ammer von Karlsruh.*

Dd 3

Latham,

(7) Was ich aus diesem Vogel machen soll, weiß ich nicht. *Scopoli* führt *Kleins Emberiza capite nigro* (prodr. p. 92. n. 10.) als Synonym an; *Klein* aber *Albins greater Bramling* III. n. 63. und dies ist *Fringilla lapponica*, p. 900. n. 1. Ein Schreibfehler ist es wohl, wenn *Latham* das *Kleinsche* Synonym zweymal, hier, und bey *Fringilla lapponica* anführt. *Bechstein* meint, es könnte wohl *Emberiza aureola*, p. 875. n. 47. seyn.

(8) Nach *Bechstein* mit *Loxia Pyrrhula* einerley. N. G. Deutschl. III. p. 591.

Latham, Vögel, II. 1. p. 213. not. u. *der Ammer von Karlsruh.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 34. *Emberiza* (Coccinea) corpore supra argenteo, subtus coccineo, crisso albo, rostro, capite remigibusque nigris, postremis, occipite et cauda ex atro caeruleis.

43. BADENSIS. *Der baadensche Ammer.* (9)

Büffon, Vögel, XII. p. 291. *der baadensche olivenfarbige Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 213. n. 77. *der Baadensche Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 411. n. 39. *Emberiza* (Badensis) olivacea, nigricante striata, subtus pallidior, gula aurantia, pectore nigricante-striato.

Borkhausen, Magaz. I. p. 145. n. 9. *badischer Ammer.*

44. ERYTHROPTHALMA. *Der rothhäugige Ammer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 582. n. 6. *das Rothauge.*

Onomat. hist. nat. III. p. 971. *der schwarze Sperling.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 334. n. 140. *das Rothauge.*

Klein, av. p. 89. n. 7. *passer niger, oculis rubris, iride nigra.*

Klein, Vorbereitung. p. 166. n. 7. *schwarzer Sperling.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 91. n. 6. *schwarzer Sperling.*

Briffon, ornith. I. p. 353. n. 44. *Pinçon de la Caroline.*

Büffon,

(9) Nach *Bechstein* l. c. mit *Fringilla Citrinella* einerley.

Büffon, Vögel, XI. p. 158. *der schwarze rothau-
gigte Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 196. n. 43. *der rothäu-
gige Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 413. n. 48. *Emberiza*
(*Erythrophthalma*) *nigra*, rubro relucens, ab-
domine rufescente, macula alarum alba.

Seligmann, Vögel, II. tab. 68. *der schwarze Sper-
ling mit rothen Augen.*

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 3. *Fringil-
la* (*Erythrophthalma*) *nigra*, rubro relucens,
abdomine rufescente, macula alarum alba.

45. *LEUCOPHRYS. Der weißgeseitelte Ammer.* (10)

Pennant, arct. Zool. II. p. 330. n. 137. *der Weiß-
kopf*; tab. 16. untere Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 159. *White - crowned
Bunting.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 196. n. 44. *der weiß-
köpfige Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 413. n. 49. *Emberi-
za* (*Leucophrys*) *ferrugineo - fusca*, subtus alba,
crisso flavo, vertice nigro, medio vitta superci-
liisque albis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 354. n. 6.
der Weißkopf.

46. *LUCTUOSA. Der Trauerammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 290. *der Trauerammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 197. n. 45. *der Trauer-
ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 414. n. 52. *Embe-
riza* (*Luctuosa*) *nigra*, barba thracia, fron-
te pectore abdomine uropygio et ani regione
albis.

Dd 4

Scopoli,

(10) Flügelweite 9. Zoll. Gewicht 3/4 Unzen. *Penn.*

Scopoli, Bern. a. d. N. G. I. p. 177. n. 215. *der Trauervogel.*

(Ist nach *Bechstein* mit *Muscicapa Atricapilla* einerley. N. G. Deutschl. III. p. 591.)

47. AUREOLA. *Der gelbbüſtige Ammer.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 156. n. 27. *der Gelbhals.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 340. A. *der Sibirische Ammer; Goldammer des Pallas.*

Büſſon, Vögel, XII. p. 282. *der ſibirische Goldammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 198. n. 46. *der gelbbüſtige Ammer.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 414. n. 53. *Emberiza (Aureola) rufa, subtus flava, fascia pectorali transversa ferruginea, vertice, genis gulaque nigris.*

Pallas, Reif. Ausz. II. Anh. p. 12. n. 23. *Emberiza Aureola.*

48. SANDWICHENSIS. *Der Ammer von Unalaſha.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 338. n. 145. *der Ammer von Unalaſha.*

Latham, Vögel, II. I. p. 198. n. 47. *der Sandwichiſche Ammer.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 414. n. 55. *Emberiza (Arctica) fusca, subtus albida fusco-striata, sub oculis striga nigra, superciliis flavis.*

49. UNALASCHENSIS. *Der nordweſtamerikaniſche Ammer. (1)*

Pennant arch. Zool. II p. 339. n. 148. *der nordweſtamerikaniſche Ammer.*

Latham,

(1) Nach *Latham* vielleicht eine Spielart vom vorigen. Cf. *Latham* Vögel, II. I. p. 199. n. 48.

Latham, Syst. ornith. I. p. 415. n. 156. *Emberiza* (*Aonafschkenfis*) rufo-fusca, subtus albidafusco-striata, abdomine medio albo.

50. *ATRICAPILLA*. *Der schwarzgescheitelte Ammer.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 338. n. 146. *der Ammer mit schwarzem Scheitel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 194. n. 49. *der bekränzte Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 415. n. 57. *Emberiza* (*Atricapilla*) rufo-fusca, subtus cinerea, gula alba, vertice luteo, sincipite strigaeque per oculos ad nucham nigris.

β. *Emberiza pectore nigro nebuloso*. *Lath. Syn. Suppl.* p. 159. — Syst. ornith. I. p. 415. n. 57. β. * — Vögel II. I. p. 200.

51. *PITHYORNUS*. *Der sibirische Fichtenammer.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 256. n. 26. *der Rostbürrzel.*

Rüfson, Vögel, XII. p. 280. *der Ammer Pithyornus.*

Latham, Vögel, II. I. p. 200. n. 50. *der Fichten-Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 413. n. 50. *Emberiza* (*Pithyornus*) rufa, abdomine cano, striga verticis cana, lateribus nigro-marginata, macula genarum, temporum pectorisque alba.

Pallas, Reif. Ausz. II. p. 290. Anh. p. 12. n. 22. *Emberiza Pithyornus.*

52. *CINEREA*. *Der aschgraue Ammer.*

Onomat. hist. nat. III. p. 772. *der Emmerlingsvogel von Canada.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 339. n. 149. *der aschgraue Ammer*; tab. 17. ob. Fig.

Briffon, ornith. I. p. 391. n. 11. Bruant de Canada.
Büffon, Vögel, XII. p. 271. *der röthliche und blaue Ammer*.

Latham, Syn. Suppl. p. 159. Cinereous Bunting.

Latham, Vögel, II. 1. p. 201. n. 51. *der aschgraue Ammer*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 415. n. 58. Emberiza (Cinerea) griseescens, fusco castaneoque varia, subtus albida, castaneo-maculata, tectricibus caudae rufo-albidis, remigibus rectricibusque fuscis.

Martini, Naturlex. II. p. 376. *die canadische Ammer*.

53. CAERULEA. *Der himmelblaue Ammer*.

Onomat. hist. nat. III. p. 773. *der himmelblaue Emmerlings-Vogel von Canada*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 339. n. 151. *der blaue Ammer*.

Briffon, ornith. I. p. 391. n. 12. Bruant bleu de Canada.

Büffon, Vögel, XII. p. 269. *der kanadische Ammer*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 201. n. 52. *der blaue Ammer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 415. n. 59. Emberiza (Caerulea) caerulea rufo-varia, subtus dilutior, vertice rufo, tectricibus alarum maioribus, remigibus caudaque fuscis.

Martini, Naturlex. II. p. 377. *der kanadische himmelblane Ammer*.

54. CYANEA. *Der Indigoammer*.

Müller, Naturyst. II. p. 574. n. 6. *die blaue Merle*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 427. *der blaue Hänfling aus Carolina*.

Pennant,

Pennant, arch. Zool. II. p. 340. n. 152. *der Indigo-Ammer; Indigo-Vogel.*

Klein, av. p. 97. n. 8. *Fringilla caerulea.*

Klein, Vorbereit. p. 181. n. 8. *blauer Diefstelfinke.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 97. n. 8. *blauer Diefstelfinke.*

Briffon, ornith. I. p. 307. n. 6. *Tanagra bleu de la Caroline.*

Büffon, Vögel, p. 54. *der Minister, oder Blauhänfling; m. c. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 202. n. 53. *der Indigo-Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 515. n. 60. *Emberiza (Cyanea) cyanea, vertice saturatiore, remigibus rectricibusque fuscis caeruleo-marginatis.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 90. *der blaue Hänfling.*

8. QUELEA. *Der rothschnäblige senegalische Ammer. (2)*

Müller, Naturyst. II. p. 564. n. 8. *der indianische Ammer.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 206. der Indianische Ammer.

Briffon, ornith. I. p. 337. n. 19. *Moineau à bec rouge du Sénégal.*

Büffon, Vögel, X. p. 153. *der rothschnäblige senegalische Sperling.*

Latham, Vögel, II. I. p. 187. n. 28. *der Ammer mit schwarzem Gesichte.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 409. n. 31. *Emberiza (Quelea) grisea, fronte nigra, rostro coccineo.*

β. *Büffon.*

(2) *Latham* rechnet hieher auch *Briff.* *Passer erythrorhynchos Capitis bonae spei*, ornith. I. p. 337. n. 18. und hält ihn für das Weibchen.

β. Buffon, Vögel, X. p. 151. *der senegalische Sperling?*

Latham, Syn. II. I. p. 193. n. 28. A. — Vögel, II. I. p. 188. n. 28. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 409. n. 31. β. *Emberiza rufo-rubra, supra fusco nigricante variegata, facie gulaque nigra.*

55. TETRIX. *Der Weberammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 188. n. 29. *der Weber-Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 409. n. 32. *Emberiza (Tetrix) rufo-fusca, saturatiore varia, subtus flava, superciliis strigaeque verticali flavis, pectore medio striga lata nigra.*

56. RUBRA. *Der Ammer von der Insel Frankreich.*

Buffon, Vögel, X. p. 152. *die Sperlinge von Isle de France; m. 2. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 189. n. 30. *der karmoisinrothe Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 409. n. 33. *Emberiza (Rubra) coccinea, cervice dorsoque olivaceo nigroque variegatis, strigis coccineis sparsis, abdomine cinereo, remigibus rectricibusque nigris.*

9. CAPENSIS. *Der capsche Ammer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 565. n. 9. *der capsche Ammer.*

Briffon, ornith. I. p. 287. n. 7. *Ortolan du cap de bonne espérance.*

Buffon, Vögel, XII. p. 171. *der capsche Ortolan; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 180. n. 23. *der Capsche Ammer.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 407. n. 28. *Emberiza* (Capensis) nigro rufescenteque varia, subtus grisea, gula albida, fascia oculari maxillarumque nigricante.

Martini, Naturlex. II. p. 377. *capsche Ammer*.

β. *Büffon*, Vögel, XII. p. 169. *der gelbbäuchigte Ortolan vom Vorgebürge der guten Hoffnung*.

Latham, Syn. II. I. p. 186. n. 23. A. — Vögel, II. I. p. 180. n. 23. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 407. n. 28. β. *Emberiza* supra varia, subtus flava, lateribus capitibus strigis tribus nigris in maculam ad nucham coeuntibus.

γ. *Büffon*, Vögel, XII. p. 169. *das Weibchen*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 186. n. 23. C. — Vögel, II. I. p. 181. n. 23. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 407. n. 28. γ. *Emberiza* supra varia, subtus alba, striga maxillari duplici, medio alarum longitudinaliter rufo.

δ. *Büffon*, Vögel, XII. p. 273. *der kayennische Ammer*; (Bonjour-Commendeur) m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 187. n. 23. D. — Vögel, II. I. p. 181. n. 23. C.

Latham, Syst. ornith. I. p. 408. n. 28. δ. *Emberiza* supra varia, subtus alba, vertice giiseo nigroque vario, striga pone oculos maxillarique nigra, pectore cinerascete.

57. FUSCA. *Der bandirte Ammer*.

Latham, Vögel, II. I. p. 181. n. 24. *der streifschwänzige Ammer*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 408. n. 29. *Emberiza* (Fasciata) fusco-nebulosa, subtus alba, naribus gula,

gula genisque fasciculis plumosis, remigibus caudaque fulcis, faturatiore fasciatis.

10. LUDOVICIA. *Der louisianische Ammer.*

Müller, Natur syst. II. p. 565. n. 10. *der louisianische Ammer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 397. n. 143. *der Ammer von Louisiana.*

Onomat. histor. natur. III. p. 780. *der Emmerling aus Ludovicien.*

Briffon, ornithol. I. p. 386. n. 6. *Ortolan de la Louisiane.*

Büffon, Vögel, XII. p. 167. *der Louisianische Ortolan; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 174. n. 13. *der Louisianische Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 404. n. 18. *Emberiza (Ludovicica) grisea, subtus pallida, pectore rufo, capite supra arcu nigro.*

Martini, Naturlex. II. p. 380. *Ammer aus Louisiana.*

11. CIA. *Der Zipammer.*

Müller, Natur syst. II. p. 565. n. 11. *der Zipammer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 150. n. 6. *der Zipammer; Wiesenammer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 526. n. 5. *der Zipammer.*

Ebert, Naturl. II. p. 135. *der Zipammer.*

Onomat. histor. natur. III. p. 781. *die Wiesenmeritze.*

Gesner, Vögelb. p. 476. *Wiesenmertz; Ceppa; m. e. Fig.*

Briffon, ornith. I. p. 383. n. 3. *Bruant de Pré.*

Büffon.

Büffon, Vögel, XII. p. 230. *der Zipammer*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 347. *der Zipammer*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 186. n. 27. *der Zipammer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 402. n. 11. *Emberiza* (Cia) rufescens, capite lineis nigricantibus sparsis, superciliis albis.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 113. n. 4. *die Zippammer*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 146. *Barthemmerling*. Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 740. *die Zipammer*.

Scopoli, Bern. a. d. N. G. I. p. 173. n. 210. *der Emmerling mit schwarzem Bart*.

Martini, Naturlex. II. p. 397. *Wiesenammer*; *Wiesenemmeritz*.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 14. *Emberiza pratenfis*.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Polon. p. 386. *Hor-tulanus cinereus*, species tertia Aldrovandi; germ. *Knipper*.

Kramer, Austr. p. 371. n. 3. *Steinemmerling*; *grauköpfige Wiesen-Ammering*.

Jonston, av. p. 97. *Emberiza pratenfis*, p. 96. *Pas-feribus congener*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 365. n. 12. *der Zipammer*.

12. CIRLUS. *Der Zirlammer*.

Müller, Naturyst. II. p. 566. *der gefleckte Ammer*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 527. n. 7. *Emberiza Elaeathorax*. *Zaunammer*.

Halle, Vögel, p. 387. n. 389. *der braunfalbe Ammer*, mit gelbem Unterleibe; *Zirlammer*; *Pfeifammer*.

Onomat.

Onomat. hist. nat. III. p. 782. *die Zaunemmeritze.*

Klein, av. p. 91. n. 3. *Emberiza* f. *Cirlus*.

Klein, Vorbereit. p. 170. n. 3. *Zirlammer*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 93. n. 3. *Zirlammer*.

Briffon, ornithol. I. p. 383 *Bruant de haye*.

Büffon, Vögel, XII. p. 223. *der Zirlus oder Zizi*; m. 2 Figg. M. u. W.

Batsch, Thiere, I. p. 347. *der Cirlus*.

Latham, Vögel, II. I. p. 184. n. 26. *der Zaunammer*. (In der Note hat *Bechstein* über diese Gattung viel merkwürdiges gesagt)

Latham, Syst. ornithol. I. p. 401. n. 10. *Emberiza* (*Cirlus*) *supra varia, subtus lutea, pectore maculato, superciliis luteis, rectricibus duabus extimis macula alba cuneata*.

Martini, Naturlex. II. p. 369. *gefleckte Ammer, Hakenammer, weißfleckige Ammer*.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 740. *die Zirlammer*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 365. *Verdier de haie*.

Jonston, av. p. 101. *Luteae primum genus*.

Diction. des anim. II. p. 290. *Bruant tacheté. Zivalo*.

Roman. ornith. I. p. 114. tab. 17. Fig. 2.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 363. n. 7. *der Zirlus*.

13. FAMILIARIS. *Der gesellige Ammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 566. n. 13. *der asiatische Ammer*.

Onomat. hist. nat. III. p. 775. *der Haus-Emmerling*.

Büffon, Vögel, XII. p. 267. *der gesellige Ammer*.

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 189. n. 31. *der gesellige Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 35. *Emberiza* (Familiaris) cinerea griseo-maculata, apicibus rectricum albis, dorso postico flavo.

Martini, Naturlex. II. p. 360. *Hausammer; Hausämmerling.*

Obeck, Reif. n. Chin. p. 134.

14. FLAVEOLA. *Der Ammer mit gelbem Gesichte.*

Müller, Naturfyst. II. p. 566. n. 14. *der Gelbling.*
Onomat. hist. nat. III. p. 776. *der gelblichte Emmerling.*

Büffon, Vögel, XII. p. 257. *der gelbliche Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 190. n. 32. *der Ammer mit gelbem Gesichte.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 36. *Emberiza* (Flaveola) grisea, facie (fascia ist wohl ein Druckfehler) flava.

Martini, Naturlex. II. p. 370. *gelbliche Ammer.*

15. AMAZONA. *Der Amazonenammer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 566. n. 15. *die Amazone.*

Büffon, Vögel, XII. p. 261. *der Amazonen-Ammer.*

Martini, Naturlex. II. p. 360. *Amazonen-Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 190. n. 33. *der Amazonen Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 410 n. 37. *Emberiza* (Amazona) fusca, vertice fulvo, crisso albido.

16. ORYZIVORA. *Der Reissammer. (3)*

Müller, Naturfyst. II. p. 567. n. 16. *der Reisdieb.*
Halle,

(3) Merkwürdig ist es, dass, wie *Pennant* sagt, unter den Myriaden dieser Vögel, die im September nach Carolina ziehen, kein einziges Männchen angetroffen wird.

Halle, Vögel, p. 389. n. 394. *der Reisortulan.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 405.
n. 341. *der Reißdieb.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 335. n. 141. *der Reis-*
ammer.

Onomat. hist. nat. III. p. 778. *der carolinische Or-*
tolan, Reisvogel.

Klein, av. p. 92. n. 6. *Emberiza Carolinensis.* cf.
p. 163. n. 5.

Klein, Vorbereit. p. 171. n. 6. *Reisammer; karo-*
linischer Fettammer. cf. p. 301. n. 5.

Klein, verb. Vögelhist. p. 93. n. 8. *Reisammer.*

Briffon, ornith. I. p. 387. n. 8. *Ortolan de la Ca-*
roline.

Büffon, Vögel, XII. p. 200. *der Reisammer; m.*
e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 347. *der Reisammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 182. n. 25. *der Reis-*
ammer. (p. 183. *Bob Lincoln; Conquendle.*)

Latham, Syst. ornith. I. p. 408. n. 30. *Emberiza*
(*Orizivora*) *fusca*, *cervice rufescente*, *abdomi-*
ne nigro, *rectricibus mucronatis.*

Seligmann, Vögel, I. tab. 28. *der carolinische Or-*
tolan oder Reisvogel.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 81. *der carolinische*
Emmerling.

Martini, Naturlex. II. p. 385. *Reißammer.*

Bartram, Reis. durch Carolina, p. 295. *der Reiß-*
vogel.

Linné, Abhandl. II. p. 281. n. 16. *Reisfink.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 739. *die Reiß-*
ammer.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 179. n. 1. *Fringil-*
la (Oryzivora) fusca, *cervice fulva*, *macula*
alarum dorsoque postico albis.

Amoenit. academ. IV. p. 576. *Fringilla oryzivora.*
Hermann,

Hermann, tab. affin. anim. p. 222. *Emberiza oryzivora*.

Donndorff, Handb. d. Thiergeschich. p. 363. n. 8. *der Reissammer*.

β. *Der louisianische Reissammer*.

Büffon, Vögel, XII. p. 204. *der louisianische Reissammer*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 189. n. 25. Var. A. — Vögel, II. I. p. 183. n. 25. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 408. n. 30. β. *Emberiza fusco-olivacea*, subtus flavescens, uropygio flavo fusco transversim lineato, tectricibus alarum maioribus remigibusque nigris albo-margi-
natis.

17. *SCHOENICLUS*. *Der Rohrammer*.

Müller, Naturfyst. II. p. 567. n. 17. *der Rohrsperling*.

Leske, Naturgesch. I. p. 261. n. 4. *der Rohrsperling*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 151. *der Moosammerling*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 524. n. 3. *der Rohrammer*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 591. *Rohrammer*.

Funke, Naturgesch. I. p. 236. *Rohrammer*.

Ebert, Naturl. II. p. 135. *Rohrsperling*.

Halle, Vögel, p. 305. *die Rohrdrossel*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 406. *Rohrammer*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 342. E. *der rothe Ammer*.

Onomat. hist. nat. III. p. 777. *der capische Gärtner*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 130. *der Rohrsperling*.

Briffon, ornithol. I. p. 386. n. 5. *Ortolan de roseau*.

Büffon, Vögel, XII. p. 149. *der Rohrammer*; m. 2. Figg. M. u. W.

Gesner, Vögelb. p. 474. *Rohrspatz*.

Batsch, Thiere, I. p. 345. *der Rohrammer*.

Latham, Syn. Suppl. p. 157. *Reed-Bunting*.

Latham, Vögel, II. I. p. 170. n. 9. *der Rohrammer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 402. n. 13. *Emberiza* (Schoenielus) capite nigro, corpore griseo nigroque rectricibus extimis macula alba cuneiformi.

Beseke, Vögel Karl. p. 78. n. 170. *der Rohrsperling*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 113. *die Rohrammer*; *Ruhrspaarling*.

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 425. *der Rohrsperling*.

Fischer, Livl. p. 98. n. 151. *Wassersperling*.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 15. *der Rohrammer*.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 5. *Rörspurv*.

Naturforsch. XVII. p. 92. n. 186. *der Rohrsperling*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 348. n. 428. *Meß-, oder Rohrammerling*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 75. *Rohrsperling*.

Naumann, Vogelfsteller, p. 72. *Schiebgen oder Rohrammer*.

Anweisung. Vögel zu fang. p. 174. *Moos-Emmerling*.

Martini, Naturlex. II. p. 387. *Rohrammer*; *Reitmaise*.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 129. t. 58. f. I. 2. *Rohrammer*; *Schilffschmätzer*.

Börner,

Börner, schlef. ökonom. Nachr. 1781. p. 102. *Emberiza Schoenicius*.

Borkhausen, Magaz. I. p. 146. n. 12. *Rohrammer*.

Meidinger, Vorlesung. I. p. 149. n. 4. *der Rohrsperling*.

Linne, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 6. *Schoenicius*.

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 182. n. 26. *Fringilla* (*Schoenicius*) *rectricibus fuscis*, *extimis duabus macula alba cuneiformi*, *corpore griseo nigroque*, *capite nigro*.

Kramer, Austr. p. 371. n. 5. *Rohrammering*; *Meerspatz*.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 323. *Passer arundinarius*. *Rohrspatzlin*; *Rohrspar*.

Charleton, exercitat. p. 86. n. 7. *Passer arundinaceus*.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 7. *Passer Junco*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 406. *Passer arundinarius*.

Hist. prov. I. p. 494. *Ortolan de roseaux*.

Levin, britt. Birds, II. tab. 75.

Bomare, Diction. VI. p. 272. *Ortolan de roseaux*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 222. *Emberiza Schoenicius*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 363. n. 9. *der Rohrsperling*.

β. *Latham*, Syn. III. p. 175. n. 9. Var. A. — *Vögel*, II. I. p. 172. n. 9. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 403. n. 13. β. *Emberiza fusca*, *subtus cinerascens*, *capite colloque nigricantibus*, *rectricibus duabus extimis toto*, *tertia a medio ad apicem albis*.

58. ARUNDINACEA. *Der astrachanische Rohrammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 213. n. 78. *der Schilf-ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 403. n. 13. 7. *Emberiza alba*, remigibus obscuris, rectricum prima utrinque alba, secunda albo nigroque dimidiata, cauda aequali.

59. PROVINCIALIS. *Der Gavotte. (*)*

Buffon, Vögel, XII. p. 160. *der Gavotte aus der Provence; Gavoué, der bärtige Chic; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 172. n. 10. *der Bart-Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 403. n. 15. *Emberiza (Provincialis) griseo nigroque varia*, subtus maculaque alarum alba, macula suboculari fasciaque maxillari nigris.

Hist. Prov. I. p. 494.

60. LESBIA. *Der lesbische Ammer.*

Buffon, Vögel, XII. p. 162. *der Chic oder Mitilene; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 172. n. 11. *der Lesbische Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 404. n. 16. *Emberiza (Lesbia) griseo nigroque varia*, subtus orbitisque alba, sub oculis albo nigroque ter striata, rectricibus lateralibus partim albis.

Hist. Prov. I. p. 494.

Hermann, tab. affin. anim. p. 222. *Emberiza Mytilene.*

61. LOTHARINGICA. *Der lothringische Ammer.*

Buffon, Vögel, XII. p. 164. *der Lothringische Ortolan; m. 2. Figg. M. u. W.*

Latham,

(*) Nach *Bechstein* eine junge *Cia*. f. N. G. Deutschl. III. p. 592.

— Cf. *Latham*, Vögel, I. c. not. p.

Latham, Vögel, II. 1. p. 173. n. 12. *der Lothringische Ammer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 404. n. 17. *Emberiza* (Lotharingica) nigro-maculata, supra rufa, subtus cinerascens, striga per oculos maxillaeque inferioris nigra, rectricibus lateralibus albo nigroque variis.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 528. n. 8. *Emberiza fusciceps? der Bergammer; braunköpfige Ammer?*

18. PSITTACEA. *Der Papageyammer.*

Müller, Naturyst. II. p. 568. n. 18. *der Papageyammer.*

Klein, av. p. 94. n. 8. *Linaria cauda longa.*

Klein, Vorbereit. p. 175. n. 8. *langgeschwänzter Hänfling aus Brasilien.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 100. *langgeschwänzter Hänfling.*

Briffon, ornith. I. p. 347. n. 35. *Linotte à longue queue du Brésil.*

Buffon, Vögel, XI. p. 219. *die braune Wittwe.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 174. n. 14. *der Papageyammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 404. n. 19. *Emberiza* (Psittacea) cinereo fusca, alis fulvis, rectricibus duabus longissimis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 178. n. 11. *Emberiza* (Psittacea) cinereo-fusca, alis fulvis, rectricibus duabus longissimis.

19. PARADISAEA. *Die Wittwe. (4)*

Müller, Naturyst. II. p. 568. n. 19. *der Paradiesammer; tab. 21. Fig. 4.*

E e 4

Borows-

(4) Der Name *Wittwe*, der dieser und noch einigen andern hieher gehörigen Gattungen gegeben wird, und der theils der schwarzen

Borowsky, Thierreich, III. p. 146. n. 1. *der Paradiesammer*; tab. 63. Fig. 1. u. 2.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 185. n. 5. *Emberiza* (*Paradisaea*) *fusca*, pectore rubro, rectricibus intermediis quatuor elongatis acuminatis, duabus longissimis, rostro rubro.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 529. n. 10. *der Paradiesammer*.

Halle, Vögel, p. 331. c. *der Schwanzspierling mit karminrother Brust*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 198. *der Indianische Schwanzspierling*.

Klein, av. p. 90. n. 22. *Passer cauda longissima et mutabili*.

Klein, Vorbereit. p. 169. n. 22. *Sperling mit sehr langem und veränderlichem Schwanze*.

Klein, verb. Vögelh. p. 92. *längstgeschwänzter Sperling*.

Briffon, ornith. I. p. 340. n. 25. *Veuve*.

Büffon, XI. p. 198. *die Wittwe mit dem goldenen Halsbande*; m. 2. Figg. im Sommer- u. Winterkleide.

Batsch, Thiere, I. p. 348. *Wittwen; Widhавogel*.

Latham, Vögel, II. I. p. 175. n. 15. *der Paradies-Ammer*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 405. n. 20. *Emberiza* (*Paradisaea*) *fusca*, pectore rubro, rectricibus inter-

zen Farbe, theils des schleppenden Schwanzes wegen, für diese Vögel schicklich zu seyn scheint, ist ihnen aus einem Irrthum beygelegt worden; denn die Portugiesen haben sie *Vögel aus Whidba* (welches eigentlich das Königreich Juda ist, aber doch mit dem portugiesischen Worte, welches eine Wittwe bedeutet, viel Aehnlichkeit hat) genennet, weil sie auf dieser afrikanischen Küste sehr gemein sind. S. Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 632.

intermediis quatuor elongatis acuminatis, duabus longissimis, rostro nigro.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 67. *der rothbrüsti-ge langgeschwänzte Fink.*

Scopoli, Rem. a. d. N. G. I. p. 177. n. 216. *der langgeschwänzte Emmerling.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 632. *die Wittwe mit dem goldnen Halsbände.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 178. n. 12. *Emberiza (Paradisaea) fusca, pectore rubro, rectricibus duabus longioribus acuminatis, intermediis duabus longissimis.*

Johnston, av. p. 96. *Passer indicus macronurus alius.*

20. SERENA. *Die Dominicanerwittwe.*

Müller, Natur Syst. II. p. 569. n. 20. *der Langschwanz.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 748. *der Ammer mit keilförmigem langen Schwanz.*

Brissson, ornith. I. p. 341. n. 26. *petite veuve.*

Brissson, Vögel, XI. p. 205. *die Dominikanerwittwe; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 176. n. 16. *der Dominicaner - Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 405. n. 21. *Emberiza (Serena) pileo nigro, vertice rubro, cauda cuneiformi, rectricibus duabus intermediis longissimis, pedibus griseis.*

21. VIDUA. *Die große Wittwe.*

Müller, Natur Syst. II. p. 569. n. 20. *die Wittwe.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 203. *langgeschwänzter Sperling.*

Brissson, ornithol. I. p. 342. n. 27. *grande veuve.*

Brissson, Vögel, XI. p. 208. *die große Wittwe.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 176. n. 17. *der langschwänzige Ammer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 405. n. 22. *Emberiza* (*Vidua*) *nigricans*, subtus albida, rectricibus intermediis quatuor elongatis acuminatis, duabus longissimis, rostro rubro.

Charleton, exercitat. p. 87. *Passer indicus macrourus*.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 13. *Passer indicus macrourus*.

Petiv. gazophyl. tab. 55. Fig. 1. *Passer indicus cauda longissima?*

Johnston, av. p. 96. *Passer indicus Macrourus* rostro miniaceo.

22. PRINCIPALIS. *Die gesprenkelte Wittwe.*

Müller, Naturfyß. II. p. 570. n. 23. *der bunte Ammer*.

Onomat. histor. natur. VII. p. 747. *der bunte Ammer*.

Briffon, ornithol. I. p. 368. n. 70. *Veuve d'Angola*.

Büffon, Vögel, XI. p. 213. *die gesprenkelte Wittwe*; m. c. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 177. n. 18. *der gesprenkelte Ammer*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 406. n. 23. *Emberiza* (*Principalis*) *variegata*, pectore rufo, rectricibus mediis quatuor longissimis, rostro pedibusque rubris.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 60. *der Sperling mit dem langen Schwanz*.

23. REGIA. *Der Königsammer.*

Müller, Naturfyß. II. p. 570. n. 23. *der Königsammer*; m. c. Fig.

Onomat.

Onomat. hist. nat. VII. p. 749. *der Königsammer*.
 Brisson, ornith. I. p. 342. n. 28. *Veuve de la co-*
te d'Afrique.

Büffon, Vögel, XI. p. 203. *die Wittwe mit vier*
Fäden; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 178. n. 19. *der Königs-*
ammer, oder die schafschwänzige Wittwe.

Latham, Syst. ornith. I. p. 406. n. 24. *Emberiza*
(Regia) rectricibus intermediis quatuor longis-
simis aequalibus, apice tantum pennatis, rostro
rubro.

62. LONGICAUDA. *Der gelbschulterige Ammer.*

Büffon, Vögel, XI. p. 211. *die Wittwe mit Ach-*
selbändern; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 179. n. 20. *der gelb-*
schulterige Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 406. n. 25. *Embe-*
riza (Longicauda) nigra, humeris fulvis albo
marginatis, rectricibus elongatis, sex interme-
diis longissimis.

63. PANAYENSIS. *Der Ammer von Panay.*

Büffon, Vögel, XI. p. 217. *die Wittwe mit der*
feuerrothen Brust.

Latham, Vögel, II. I. p. 179. n. 21. *der Panayi-*
sche Ammer, oder die Wittwe mit dem Feuer-
zeichen.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 407. n. 26. *Embe-*
riza (Panayensis) nigra, macula pectoris cocci-
nea, rectricibus quatuor intermediis longissimis
aequalibus acuminatis.

Sonnerat, Reif. nach Neuguinea, p. 42. *die Witt-*
we der Insel Panai.

Sammt zur Phys. u. N. G. II. p. 633. *die roth-*
brüstige Wittwe.

64. ANGOLENSIS. *Der angolische Ammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 179. n. 22. *der Angolische Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 407. n. 27. *Emberiza (Angolensis) nigra, capite superiore colloque flavis, cauda elongata.*

24. CIRIS. *Der gemahlte Ammer.*

Miller, Naturfyst. II. p. 570. n. 24. *der Pabstvogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 337. n. 142. *der gemahlte Ammer.* Mariposa pintada (Span.)

Onomat. histor. natur. III. p. 773. *der dreyköpfige* (mag wohl dreyfarbige heißen sollen) *Diebstelink.*

Klein, av. p. 97. n. 7. *Fringilla tricolor.*

Klein, Vorbereit. p. 180. n. 7. *blauköpfiger Diebstelink.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 97. n. 7. *blauköpfiger Diebstelink.*

Klein, av. p. 98. n. 13. *Fringilla purpurea.*

Klein, Vorbereit. p. 182. n. 13. *Kardinälchen.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 98. n. 13. *Cardinalchen.*

Briffon, ornithol. I. p. 362. n. 58. *Verdier de la Louisiane, dit vulgairement Pape.*

Büffon, Vögel, XI. p. 238. *der Pabst, oder blauköpfige Diebstelink;* m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syn. Suppl. p. 159. *Painted Bunting.*

Latham, Vögel, II. I. p. 203. n. 54. *der gemahlte Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 416. n. 61. *Emberiza (Ciris) capite caeruleo, abdomine fulvo, dorso viridi, pennis viridi-fuscis.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 88. *der dreyfarbige Fink.*

Selig-

Seligmann, Vögel, V. tab. 25. *der gemahlte Vogel.*

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 63. *der gemahlte Fink; ein Er und eine Sie.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 184. n. 222. *amerikanischer Fink; Mariposa.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 633. der blauköpfige Diebstelfink.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 179. n. 13. *Emberiza (Ciris) capite caeruleo, abdomine fulvo, dorso viridi, pennis viridi-fuscis.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 364. n. II. *der gemahlte Ammer.*

65. **QUADRICOLOR.** *Der vierfarbige Ammer.*

Büffon, Vögel, X. p. 105. *der vierfarbige Kernbeißer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 205. n. 55. *der Ammer mit rothem Steiße.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 417. n. 63. *Emberiza (Quadricolor) viridis, capite colloque caeruleis, cauda cum tectricibus abdomineque superiore rubris, pectore abdomineque infimo fuscis.*

66. **CYANOPIS.** *Der Ammer mit blauem Gesichte.*

Brisson, ornith. I. p. 361. n. 57. *Verdier de Java.*

Büffon, Vögel, XI. p. 247. *der javanische Grünfink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 205. n. 56. *der Ammer mit blauem Gesichte.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 417. n. 64. *Emberiza (Cyanopis) viridis, subtus, dorso infimo uropygioque rufa, fronte, genis gulaque caeruleis, tectricibus caudae abdomineque medio rubris.*

67. *VIRIDIS. Der grüne Ammer.*

Briffon, ornith. I. p. 361. n. 56. petit Verdier des Indes.

Büffon, Vögel, XI. p. 249. *der kleine indianische Grünfink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 206. n. 57. *der grüne Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 417. n. 65. *Emberiza (Viridis) viridis subtus alba, remigibus caudaque caeruleis.*

Jonston, av. p. 101. *Chloris indica.*

68. *PLATENSIS. Der fünffarbige Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 262. *der fünffarbige Ammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 206. n. 58. *der Ammer vom Platastrom.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 417. n. 66. *Emberiza (Platensis) fusco-virescens, subtus cinereo-alba, dorso nigro-maculato, oris alarum extus, remigibus rectricibusque flavo-marginatis.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 742. *der fünffarbige Ammer.*

69. *BORBONICA. Der Mordoré-Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 264. *der Mordoré-Ammer.*

Latham, Syn. II. I. p. 210. n. 59. *Bourbon Bunting.*

Latham, Vögel, II. I. p. 207. n. 59. *der Bourbonische Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 67. *Emberiza (Borbonica) rufo-rubra, alis caudaque fusco-rubris.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 742. *der mordoréfarbene Ammer.*

70. CALFAT. *Der Calfat-Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 276. *der Calfat-Ammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 207. n. 60. *der Calfat-Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 68. *Emberiza* (Calfat) cinerascens, capite gulaque nigris, pectore abdomineque vinaceis, regione oculorum nuda rosea, lateribus capitis fascia alba.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 742. der Calfat.

71. CHLOROCEPHALA. *Der gelbköpfige Ammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 207. n. 61. *der grauköpfige Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 69. *Emberiza* (Tunstalli) fusca, dorso tectricibusque alarum nigro variegatis, capite colloque viridi-olivaceis, cauda bifurca.

72. GRISEA. *Der Gonambuch-Ammer.*

Briffon, ornith. I. p. 393. n. 15. *Bruant de Surinam.*

Büffon, Vögel, XII. p. 265. *der Gonambuch-Ammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 208. n. 62. *der graue Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 70. *Emberiza* (Grisea) grisea, tectricibus alarum pectoreque rubro variegatis.

Martini, Naturlex. II. p. 396. *die surinamische Ammer.*

73. SURINAMENSIS. *Der surinamische Ammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 208. n. 63. *der Surinamische Ammer.*

Latham.

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 71. *Emberiza*
(*Surinamensis*) supra fusco-nebulosa, subtus
flavescent, pectore nigro maculato.

Fermin, Surin. II. p. 183. *der Hirsenvogel*.

74. CYANELLA. *Der Blauammer*. (5)

Latham, Vögel, II. I. p. 202. n. 5. *der bläuliche
Ammer*!

Latham, Syst. ornith. I. p. 416. n. 60. β. *Embe-
riza caerulea-nitens*, interscapuliis humerisque
ex caeruleo ferrugineoque variis, rennigibus re-
ctricibusque fuscis, margine caerulescentibus.

75. RUFICAPILLA. *Der rothgeseitelte Ammer*.

Latham, Vögel, II. I. p. 212. n. 74. *der roth-
kappige Ammer*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 438. n. 14. *Fringilla*
(*Ruficapilla*) corpore supra fusco, subtus cine-
reo, gula ferruginea, capistro albo, capillitio in-
super rufescente, cauda nigra.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Ver-
mehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 309. n. 7. *Emberiza Orix*. p. 863. n. 42. *Loxia Orix*.

Das Geschlecht ist überhaupt mit 51. Gattungen ver-
mehrt. Da aber zwey derselben, die 44te und 54te
aus andern Geschlechtern hierher versetzt sind, und die
7te der XIIten Edition durch eine neue ersetzt worden,
so beläuft sich die Anzahl der neu hinzugekommenen
Gattungen auf *funfzig*. — Bey der 1sten Gattung sind
vier, bey der 4ten *funf*, bey der 8ten *zwey*, bey der
9ten

(5) Nach *Latham* eine Varietät von *Emberiza Cyanea*.

9ten vier, bey der 16ten zwey, bey der 17ten zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. Neue Gattungen.

1. Der gelbflügelige Ammer, von den Falklands-Inseln.

Latham, Syst. ornith. I. p. 401. n. 9. *Emberiza* (Chrysoptera) rufo-fusca, subtus alba, pectore tectricibusque alarum minoribus flavis, iugulo fascia fusca.

2. Der graue chinesische Ammer.

Amoenit. acad. IV. p. 245 n. 20. *Emberiza mixta*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 209. n. 66. der gemischte Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 416. n. 62. *Emberiza* (Mixta) grisea, pectore gulaque caeruleis, abdomine albo.

An distincta species?

3. Der asiatische Ammer.

Latham, Syn. Suppl. p. 160. Gaur Bunting.

Latham, Vögel, II. 1. p. 209. n. 64. der Gaur Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 419. n. 72. *Emberiza* (Asiatica) cinerea, alis caudaque fuscis.

III. GESCHLECHT. TANAGRA. Der Tanager. (Merle.)

Müller, Naturfyst. II. p. 572. Gen. CXI.

Leske, Naturgesch. p. 262. Gen. XLIII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 173. Gen. LXIX.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 163. Gen. XXXIII.

Becastin, Naturgesch. I. p. 506. Gen. LXVIII.

Pennant, arct. Zool. II. p. 343.

- Onomat. hist. nat. VII. p. 424.
 Brisson, ornith. I. p. 304. Gen. XXXI.
 Buffon, Vögel, XII. p. 5. sqq.
 Latham, Vögel, II. 1. p. 214. Gen. XXXVI.
 Latham, Syst. ornith. I. p. 419. Gen. XXXVII.
 Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 633. u. 734.
 Hermann, tab. affin. anim. p. 214.
 Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 365. Gen.
 LXXIX.

I. JACAPA. *Der Silberschnabel.*

- Müller, Naturyst. II. p. 572. n. 1. *die schwarze Merle.*
 Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 186. n. 1. Tanagra (Jacapa) atra, fronte, iugulo pectoreque coccineis.
 Onomat. hist. nat. II. p. 827. *Chichiltot tl.*
 Brisson, ornithol. I. p. 317. n. 29. Cardinal pourpre.
 Buffon, Vögel, XII. p. 38. *der Silberschnabel*; n. 2. Figg. M. u. W.
 Latham, Vögel, II. 1. p. 214. n. 1. *die rothbrüstige Merle.*
 Latham, Syst. ornith. I. p. 419. n. 1. Tanagra (Jacapa) atra, fronte, iugulo pectoreque coccineis.
 Seligmann, Vögel, VIII. tab. 57. *die Amsel mit rother Brust.*
 Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 637. *der Silberschnabel.*
 Fernand. hist. nov. Hisp. p. 51. Chichiltototl Tepuzcullulae.
 Salerne, ornithol. p. 271. Cardinal pourpre-foncé.
 Gerin, ornithol. n. 279. Passer indicus capite et pectore vinaceo.

Ornithol. ital. Floren. 1771. p. 69. n. 334. Avis americana cardinalis niger dicta, brachyura, capite et inferna corporis parte vinacea.

Hermann, tab. affin. anim. p. 214. Tanagra Jacapa.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 365. n. 1. der Silber Schnabel.

2. BRASILIA. Der scharlachfarbige Tanager. (6)

Müller, Naturfyst. II. p. 573. n. 2. die scharlachfarbige Merle.

Borowsky, Thierreich, III. p. 174. n. 2. die scharlachfarbne Merle.

Onomat. hist. nat. II. p. 829. Chiltototl, VII. p. 426. rothe brasilianische Amsel.

Briffon, ornith. I. p. 315. n. 24. Cardinal.

Büffon, Vögel, p. 16. der scharlachfarbige Tanagra; m. 2. Figg. p. 18. der rothe Sperling ohne Schwanz. — ibid. der rothe Sperling mit dem Schwanz. p. 19. der Tijepiranga des Marcgruv; der Chiltototl des Fernandez; die brasilianische Amsel des Belon.

Latham, Vögel, II. 1. p. 215. n. 2. die Brasilische Merle.

Latham, Syst. ornith. I. p. 420. n. 2. Tanagra (Brasilia) coccinea, alis caudaeque nigris.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 637. der Scharlachfarbne Tanagra.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 3. Passer indicus sine uropygio. n. 4. Passer indicus porphyromelanus.

Charleton, onom. zoic. p. 84. n. 6. Merula brasiliensis Bellonii.

Jonston, av. p. 96. Passer sine uropygio erythromelanus.

(6) Ist nicht mit *Tanagra brasiliensis* p. 895. n. 15, zu verwechseln,

Jonston, av. p. 97. *Passer porphyromelanus*.

Jonston, av. p. 107. *Merula brasiliica*.

Pison, hist. nat. Bras. p. 94. *Tijepiranga*?

β. *Briffon*, ornith. I. p. 315. n. 25. *Cardinal tacheté*. (7)

Büffon, Vögel, XII. p. 21. *der gefleckte Cardinal*.

Latham, Syn. II. I. p. 216 n. 2. Var. A. — Vögel, II. I. p. 216. n. 2. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 420. n. 2. β. *Tanagra coccinea*, pectore et dorso supremo maculis lunatis virescentibus variegatis, alis caudaque nigris.

Aldrov. ornith. II. p. 629. *Merula apus*.

Charleton, onom. zoic. p. 84. n. 7. *Merula indica*, *Apos dicta*.

Jonston, av. p. 107. *Merula indica* *Apos*.

γ. *Briffon*, ornith. I. p. 316. n. 26. *Cardinal à collier*. (8)

Büffon, Vögel, XII. p. 22. *der Cardinal mit dem Halsbande*.

Latham, Syn. II. I. p. 216. n. 2. Var. B. — Vögel, II. I. p. 216. n. 2. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 420. n. 2. γ. *Tanagra coccinea*, maculis binis in utroque colli latere semilunaribus caeruleis, alis et cauda nigris, marginibus alarum caeruleis.

Aldrov. ornith. II. p. 569. *Passer indicus sine uropygio* alius *cyanerythromelas*.

Raj. Syn. av. p. 87. n. 14. *Passer indicus cyanerythromelas* sine *uropygio* *Aldr*.

Jonston, av. p. 96. *Passer indicus sine uropygio cyanerythromelanus*.

3. Ru.

(7) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

(8) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

3. RUBRA. *Der rothe Tanager.* (9)

Müller, Naturfyst. II. p. 573. n. 3. *die rothe Merle.*
 Pennant, arch. Zool. II. p. 343. n. 154. *der Canadische Tanager.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 432. *die rothe Amer aus Canada.*

Briffon, ornith. I. p. 316. n. 28. *Cardinal de Canada.*

Büffon, Vögel, XII. p. 25. *der canadische Tanagra; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 216. n. 3. *die rothe Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 420. n. 3. *Tanagra (Rubra) rubra, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis.*

Charlevoix, nouv. France, III. p. 156.

Du Pratz, hist. de la Louis. II. p. 139.

Gemelli Carreri, voy. autour du monde, VI. p. 322.

β. Seligmann, Vögel, IX. tab. 33. *der Scharlach-Sperling.* (10)

Halle, Vögel, p. 403. n. 412. *der karminfarbne Kernbeisser, mit schwarzem Schwanz und Flügel.*

Büffon, Vögel, XII. p. 17. *der Scharlachrothe Sperling des Edwards.*

Latham, Syn. II. I. p. 217. — Latham, Vögel, II. I. p. 216. n. 3. *Var. A.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 421. n. 3. β.

6. OLIVACEA. *Der olivenfarbige Tanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 54. *der olivenfarbige Tanager.*

Ff 3

Pennant,

(9) Ein scheuer Vogel, der in Neuyork im May erscheint, und im August zurück geht. Die Schwanzspitzen sind nicht allemal weiß.

(10) Nach Büffon mit *Tanagra braslica* n. 2. einerley.

Pennant, arch. Zool. II. p. 344. n. 155. *der olivenfarbige Tanager*.

Latham, Vögel, II. I. p. 217. n. 4 *die olivenfarbige Merle*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 421. n. 4. *Tanagra* (Olivacea) viridi-olivacea, subtus alba, gula pectoreque luteis, remigibus rectricibusque fuscis.

23. MISSISSIPPENSIS. *Der mississippische Tanager*.

Büffon, Vögel, XII. p. 28. *der mississippische Tanagra*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 217. n. 5. *die Mississippimerle*.

Latham Syst. ornith. I. p. 421. n. 5. *Tanagra* (Mississippensis) tota rubra.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 637. *der Tanagra aus Mississippi*.

Hermann, tab. affn. anim. p. 214. *Tanagra missippica*.

Donndorff, Handb. d. Thiergeschich. p. 366. n. 2. *der mississippische Tanager*.

β. *Latham*, Syst. ornith. I. p. 421. n. 6. *Tanagra* (Variegata) rubro virescenteque flavo variegata. (1)

Latham, Vögel, II. I. p. 218. n. 5. Var. A. *die bunte Merle*. Tab. 47.

γ. *Briffon*, ornith. I. p. 316. n. 27. *Cardinal du Mexique*. (2)

Büffon, Vögel, XII. p. 23. *mexikanischer Vogel von Papagaisfarbe*.

Latham,

(1) Nach *Latham* eine eigne Gattung. Auch rechnet derselbe die *Loxia Virginica* p. 840. nebst dem Synonym aus *Pennant* mit hieher.

(2) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Latham, Syn. II. 1. p. 219. n. 5. Var. B. Mexican Tanager.

Latham, Vögel, II. 1. p. 218. n. 5. Var. B. die Mexikanische Merle.

Latham, Syst. ornith. I. p. 421. n. 5. β. *Tanagra rubra*, capite, alis caudaque amethystinis, cervice tectricibusque alarum viridibus, scapularibus flavis virescente marginatis.

Hernandez, hist. mex. p. 709. Avis Mexicana Psittaci colore.

25. AESTIVA. *Der Sommertanager.*

Müller, Naturfyst. II. p. 590. n. 8. der rothe Fliegenfänger.

Onomat. hist. nat. V. p. 372. der rothe Fliegenfänger.

Pennant, arct. Zool. II. p. 343. n. 153. der Sommertanager.

Klein, av. p. 97. n. 9. *Fringilla rubra*.

Klein, Vorbereit. p. 181. n. 9. rother Fink.

Klein, verb. Vögelhist. p. 97. n. 9. rother Fink, p. 168. Sommer Rothvogel.

Briffon, ornithol. I. p. 277. n. 37. Gobe-mouche rouge de la Caroline.

Latham, Vögel, II. 1. p. 219. n. 6. die Sommer-Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 422. n. 7. *Tanagra* (Aestiva) rubra, rostro flavesciente, remigibus intus fuscis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 12. der rothe Fliegenstecher.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 29. der rothe Sommer-vogel.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 19. der rothe Sommervogel oder Fliegenstecher des Catesby.

Schlözer, Erdbeschreib. von Amer. p. 283. Roth-
vögel.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 181. n. 13. Frin-
gilla (Rubra) tota rubra.

26. MAGNA. *Der große Tanager.*

Buffon, Vögel, XII. p. 10. *der große Tangara;*
m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 219. n. 7. *die große*
Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 422. n. 8. Tanagra
(Magna) fusco-olivacea, fronte genisque cae-
ruleis, striga maxillari nigra, gula crissoque
rubris, superciliis maculaque gulae albis.

Samml. zur Physf. und N. G. II. p. 637. *der große*
Tangara.

4. JACARINA. *Der Jacarini.*

Müller, Natursystem, II. p. 570. n. 4. *der Gabel-*
schwanz.

Onomat. hist. nat. IV. p. 455. *Jacarine.*

Brissou, ornith. I. p. 311. Tangara noir du Brésil.

Buffon, Vögel, XII. p. 93. *der Jacarini.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 233. n. 34. *die Jacarini-*
Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 429. n. 32. Tana-
gra (Jacarina) atro-violacea, alis subtus albi-
cantibus, cauda divaricata bifurca.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 96. *der Jacarini.*

Samml. zur Physf. und N. G. II. p. 734. *der Jaca-*
rini.

Forster, av. p. 205. *Jacarini.*

Hermann, tab. afflu. anim. p. 167. 214 Tanagra
Jacarina.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 366. *der*
Jacarini.

5. VIOLACEA. *Der Teitei.*

Müller, Natur syst. II. p. 574. n. 5. *die violettfarbige Merle.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 173. n. 1. *die violettfarbige Merle*, tab. 69.

Onomat. hist. nat. III. p. 981. *der violette Fink*, VII. p. 434. *Tanagra violacea.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 506. *die violettfarbige Merle.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 191.

Briffon, ornith. I. p. 312. n. 18. *Tangara noir et jaune du Brésil.*

Büffon, Vögel, XII. p. 97. *der Teitei*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 234. n. 35. *die Gold-Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 429. n. 33. *Tanagra (Violacea) violacea subtus et sincipite flavissima, remigibus intermediis rectricibusque lateralibus intus albis.*

Schligmann, Vögel, VIII. tab. 53. *die Goldmeise.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 735. *der Teitei.*

De Laet, nov. orb. p. 557. *Guranhae-engera.*

Jonston, av. p. 106. *Teitei Brasiliensibus*; quam etiam vocant *Guiranhemgeta*, et *Guraundi.*

Salerne, ornithol. p. 290. *Teitei.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 266. n. 4. *der Teitei.*

ß. CHLOROTICA. *Der schwarz und gelbe Tanager.* (3)

Müller, Natur syst. II. p. 578. n. 23. *die schwarzgelbe Merle.*

Briffon, ornithol. I. p. 213. n. 19. *Tangara noir et jaune de Cayenne.*

Ff 5

Büffon,

(3) Nach Briffon eine eigne Gattung.

Buffon, Vögel, XII. p. 99. 126. *cayennische Tanagra*; *kleiner Ludwig*.

Latham, Syn. II. I. p. 240. n. 35. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 235. n. 35. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 430. n. 33. β . *Tanagra nigra nitens*, abdomine, pectore frontaque luteis, rectrice extima interius macula alba.

27. CAERULEA. *Der blaue Tanager.* (4)

Buffon, Vögel, X. p. 174. *der blaue Sperling*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 427. n. 27. *Tanagra* (Caerulea) tota caerulea.

Latham, Vögel, II. I. p. 230. n. 28. *die blaue Merle*.

7. GYROLA. *Der rothköpfige Tanager.*

Müller, Natursystem, II. p. 574. n. 7. *die grüne Merle*.

Halle, Vögel, p. 415. n. 430. *der grüngelbe Fink, mit rothem Kopfe und blauer Brust*.

Onomat. histor. natur. III. p. 976. *der rothköpfige Grünsink*.

Klein, av. p. 98. n. 12. *Fringilla pectore caeruleo*.

Klein, Vorbereitung, p. 182. n. 12. *blaubrüstiger Fink*.

Klein, verbeß. Vögelhistor. p. 97. n. 12. *blaubrüstiger Fink*.

Briffon, ornithol. I. p. 310. n. 13. *Tangara vert du Perou*.

Buffon, Vögel, XII. p. 80. *der grüne Tangara mit dem rothbraunen Kopfe*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 229. n. 27. *die rothköpfige Merle*.

Latham,

(4) *Buffon* scheint ihn für eine Spielart von *Tanagra Cayana* n. 8. zu halten.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 427. n. 26. *Tanagra* (Gyrola) viridis, capite rubro, collari flavo, pectore caeruleo.

Seligmann, Vögel, I. tab. 45. der rothköpfige Fink.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 639. der Rouverdin.

28. VARIABILIS. *Der veränderliche Tanager.*

Latham, Vögel, II. I. p. 230. n. 29. die Schiller-Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 428. n. 28. *Tanagra* (Variabilis) viridis caeruleo fuscoque splens, uropygio virecente, fascia per oculos nigra, remigibus rectricibusque nigricantibus.

29. TRICOLOR. *Der dreyfarbige Tanager.*

Briffon, ornithol. I. p. 318. n. 31. *Tangara* varié à tête verte de Cayenne.

Büffon, Vögel, XII. p. 65. de: dreyfarbige *Tangara*; gefleckte grünköpfige cayennische *Tangara*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 231. n. 30. die grünköpfige Merle.

Latham, Syst. ornith. I. p. 428. n. 29. *Tanagra* (Tricolor) viridis splens, subtus viridi-flavescens, rectricibus alarum violaceis, capistro dorsoque superiore nigris, uropygio fulvo.

β. *Briffon*, ornithol. I. p. 319. n. 32. *Tangara* varié à tête bleue de Cayenne.

Büffon, Vögel, XII. p. 66. gefleckte blauköpfige *Tangara*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 235. n. 30. Var. A. —

Latham, Vögel, II. I. p. 231. n. 30. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 428. n. 29. β.

18. GRISEA. *Der graue Tanager.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 344. n. 156. *der graue Tanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 67. *der graue und olivenfarbene Tangara*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 232. n. 31. *die graue Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 428. n. 30. *Tanagra* (Grisea) olivaceo-grisea, subtus grisea, alis caudaque nigricantibus, griseo-marginatis.

8. CAYANA. *Der grüne cayennische Tanager.* (1)

Müller, Natursystem, II. p. 574. n. 8. *die gelbe Merle.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 427. *die grüne Ammer aus Cayenne.*

Briffon, ornithol. I. p. 309. n. 12. *Tanagra vert de Cayenne.*

Büffon, Vögel, X. p. 173. *der grüne Sperling*; m. e. Fig.

Büffon, Vögel, XII. p. 60. *der grüne kayennische Tangara*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 228. n. 26. *die Merle mit gelbrothem Kopfe.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 427. n. 25. *Tanagra* (Cayana) fulva, dorso viridi, pileo rufo, genis nigris.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 638. *der Passerevert.*

β. *Büffon*, Vögel, XII. p. 64. *der grüne Tanagra mit blauem Kopfe.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 427. n. 25. β. *Tanagra flava*, dorso flavescente viridi, capite caeruleo, alis caudaque viridibus.

Latham,

(5) Ist nicht mit *Tanagra cayanaensis* p. 894. n. 14. zu verwechseln.

Latham, Syn. II. I. p. 232. — Latham, Vögel, II. I. p. 229. n. 26. Var. A.

9. ATRATA. *Der glänzenschwarze Tanager.*

Müller, Natursystem, II. p. 575. n. 9. der Köhler.

Onomat. histor. natur. III. p. 772. der schwarze Emmerling.

Büffon, Vögel, XII. p. 123. der glänzend schwarze Tangara.

Latham, Vögel, II. I. p. 236. n. 38. die schwarze Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 430. n. 35. Tanagra (Atrata) atra nitens, dorso subviolaceo.

10. MEXICANA. *Der mexicanische Tanager.*

Müller, Natursyst. II. p. 575. n. 10. die mexicanische Merle.

Onomat. hist. nat. VII. p. 430. die mexikanische Ammer.

Briffon, ornith. I. p. 305. n. 2. Tanagra bleu de Cayenne.

Büffon, Vögel, XII. p. 55. der schwarz und blaue kayennische Tangara.

Latham, Vögel, II. I. p. 227. n. 24. die schwarz und blaue Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 426. n. 23. Tanagra (Mexicana) nigra subtus flavicans, pectore uropygioque caeruleis.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 40. die schwarz und blaue Meise.

β. Briffon, ornithol. I. p. 305. n. 3. Tangara bleu de Barbades. (6)

Büffon, Vögel, XII. p. 74. der blaue weißbäuchigte Tangara.

Latham,

(6) Nach Briffon und Büffon eine eigne Gattung.

Latham, Syn. II. 1. p. 231 n. 24. Var. A. —

Latham, Vögel, II. 1. p. 228. n. 24. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 426 n. 23. 3 Tanagra nigra subtus alba, capite, collo inferiore pectoreque caeruleis, tectricibus caudae caeruleis.

30. GUJANENSIS. *Der grüne guianische Tanager.*

Buffon, Vögel, XII. p. 59. *der grüne Tangara mit rothbrauner Stirne.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 228. n. 25. *die grauköpfige Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 427. n. 24. Tanagra (Guianensis) viridis capite cinereo-cano, fronte fasciaque verticis duplici rufis.

11. TATAO. *Der Paradietanager.*

Müller, Naturfyst. II. p. 575. *Paradiesmerle.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 433. *der bunte Paradiesfink.*

Briffon, ornithol. I. p. 304. n. 1. Tangara.

Buffon, Vögel, XII. p. 65. *der siebenfärbige Tangara; m. 2. Figg.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 232. n. 32. *die Paradies-Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 428. n. 31. Tanagra (Tatao) violacea, dorso nigro, uropygio fulvo, capite viridi, pectore alisque violaceis.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 39. *Paradiesmeiße.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 639. *der Septicolor.*

Jonston, av. p. 209. Tangara prima Brasilienibus.

Salerne, ornith. p. 250. Tangara de Cayenne?

31. NIGRICOLLIS. *Der schwarzkehlige Tanager.* (*)

Büffon, Vögel, XII. p. 76. *der schwarzkehlige Tangara*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 233. n. 33. *die schwarzkehlige Merle.*

32. ALBIROSTRIS. *Der weißschnäblige Tanager.*

Müller, Naturfyst. II. p. 575. *Weißschnabel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 425. *der Weißschnabel.*

Büffon, Vögel, XII. p. 121. *der weißschnäblichte Tangara.*

Latham, Vögel, II. I. p. 236. n. 39. *die weißschnäblige Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 430. n. 37. *Tanagra (Albirostris) nigra, macula alarum basique caudae flavis, rostro albo.*

β. Müller, Naturfyst. II. p. 577. n. 18. *der Weißschnabel.*

13. GULARIS. *Der purpurkehlige Tanager.*

Müller, Naturfystem, II. p. 576. n. 13. *die Purpurkehle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 429. *der amerikanische Ammer mit rother Kehle.*

Briffon, ornith. I. p. 320. n. 34. *Cardinal d'Amerique.*

Büffon, Vögel, XII. p. 50. *der rothköpfige Tangara.*

Latham, Vögel, II. I. p. 226. n. 21. *die rothkappige Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 425. n. 20. *Tanagra (Gularis) nigra, subtus alba, capite rubro, iugulo purpureo.*

14. CA-

(*) Ist nach Latham mit *Motacilla Gaira*, p. 988. n. 36. einerley.

14. CAYENENSIS. *Der Negertanager.*

Müller, Naturfyst. II. p. 576. n. 34. *die cajennische Merle.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 427. *der schwarze Ammer aus Cayenne.*

Briffon, ornith. I. p. 311. n. 17. *Tangara noir de Cayenne.*

Büffon, Vögel, XII. p. 105. *der schwarze Tangara.*

Latham, Vögel, II. I. p. 235. n. 36. *die Neger-Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 430. n. 34. *Tanagra (Cayanensis) nigra nitida, pectore utrinque alisque subtus flavis.*

32. RUFICOLLIS. *Der rothkehlige Tanager.*

Latham, Vögel, II. I. p. 236. n. 37. *die rothkehlige Merle.*

Nach Latham, Syst. ornithol. I. p. 441. eine Varietät von *Fringilla noctis*.

15. BRASILIENSIS. *Der türkisblaue brasilianische Tanager. (?)*

Müller, Naturfyst. II. p. 576. n. 15. *die brasilianische Merle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 425. *der blaue Fink aus Brasilien.*

Briffon, ornith. I. p. 306. n. 4. *Tanagra bleu du Brésil.*

Büffon, Vögel, XII. p. 36. *der dunkelblaue brasilianische Tangara; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 223. n. 16. *die dunkelblaue Merle.*

Latham,

(7) Ist nicht mit *Tanagra brasilia* n. 2. zu verwechseln. Ich begreife nicht, wie Latham und Briffon, Kleins *Fringilla caerulea* hier anführen können. Dies Synonym gehört ohn-
streitig zu *Emberiza cyanea* p. 876. n. 4.

Latham, Syst. ornith. I. p. 424. n. 15. *Tanagra* (Brasilienfis) nigra, subtus alba, iugulo uropygioque caerulefcentibus, facie pectoreque nigris.

Jonfion, av. p. 203. *Guiraienoia* Brasilienfibus.

16. DOMINICA. *Der domingifche Tanager.*

Müller, Naturfyft. II. p. 576. n. 16. *die domingifche Merle.*

Onomat. hiftor. natur. VII. p. 429. *die Ammer von St. Domingo.*

Briffon, ornithol. I. p. 314. n. 21. *Tangara de S. Domingue, ou Efclave.*

Bliffon, Vögel, XII. p. 44. *der Sklave; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 224. n. 17. *die Dominigifche Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 424. n. 16. *Tanagra* (Dominica) nigro-maculata, fupra olivaceo-fufca, fubtus albida.

Samml. zur Phyf. und N. G. II. p. 638. *der domingifche Tangara.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 211. *Tanagra Mancipium.*

17. MILITARIS. *Der Kriegftanager.*

Müller, Naturfyft. II. p. 577 n. 17. *der Cardinal.*

Borowfky, Thierreich, III. p. 174. n. 3. *die braune Merle.*

Onomat. hift. nat. VII. p. 431. *der braune amerikifche Fink.*

Klein, av. p. 98. n. 16. *Fringilla fufca americana.*

Klein, Vorbereit. p. 183. n. 16. *brauner amerikifcher Dieftelfinke.*

Klein, verbeil. Vögelhiftor. p. 98. n. 16. *brauner Fink, (mit Loxia bicolor p. 865. n. 48. verwechfelt.)*

Briffon, ornithol. I. p. 317. n. 30. Cardinal brun.

Büffon, Vögel, XII. p. 114. *der braune Cardinal des Herrn Briffons.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 237. n. 40. *die Kriegs-Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 431. n. 38. Tanagra (Militaris) fusca, pectore iugulo gula humerisque sanguineis.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 59. *der größere Rothschwanz.*

Seligmann, Vögel, IX. tab. 32. *der Schirley.*

Bankroft, N. G. von Guian. p. 108. *der größere Rothschwanz des Edwards.*

33. LEUCOCEPHALA. *Der weißköpfige Tanager.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 743. Quatoztli.

Briffon, ornithol. I. p. 313. n. 20. Tangara à tête blanche du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 110. *ein kleinerer Vogel als der Stieglitz, oder der brasilianische Quatoztli des Seba.*

Latham, Syn. II. 1. p. 243. n. 21. White-headed Tanager.

Latham, Vögel, II. 1. p. 238. n. 41. *die weißköpfige Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 431. n. 39. Tanagra (Albifrons) fusco-nigra, subtus flavescent, gula iuguloque pallide rubris, pectore alisque purpureo-rubris, fronte alba.

34. FLAVA. *Der gelbe Tanager.*

Briffon, ornith. I. p. 314. n. 22. Tangara jaune du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 108. *der brasilianische Guiraperea des Marcgrave.*

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 238. n. 42. *die gelbe Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 431. n. 40. Tanagra (Flava) obscure flava, abdomine nigro maculato, collo inferiore pectoreque nigris.

Jonston, av. p. 206. Guiraperea Brasiliensibus.

Salerne, ornith. p. 273. Guiraperea.

35. AMBOINENSIS. *Der amboinische Tanager.*

Onomat. histor. natur. II. p. 399. *Calatti.*

Klein, av. p. 92. n. 7. *Emberiza Amboinensis*, *Calatti dicta.*

Klein, Vorbereit. p. 171. n. 7. *amboinischer Fettammer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 94. n. 9. *amboinischer Fettammer.*

Briffon, ornithol. I. p. 306. n. 5. *Tangara bleu d'Amboine.*

Büffon, Vögel, XII. p. III. *der Calatti des Seba.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 238. n. 43. *die Amboinische Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 431. n. 41. Tanagra (Amboinensis) nigro cyaneoque varia, subtus nivea, macula tectricum purpurea, cauda fusca, apice rufo.

36. CANORA. *Der himmelblaue Tanager.*

Briffon, ornith. I. p. 307. n. 7. *Tangara bleu de la nouvelle Espagne.*

Büffon, Vögel, XII. p. 106. *der Kräutervogel, oder der Xiuhtototl des Fernandez.*

Latham, Syn. II. 1. p. 245. n. 44. *Caerulean Tanager.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 239. n. 44. *die himmelblaue Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 432. n. 43. *Tanagra* (Canora) cyanea, maculis fulvis varia, alis cyaneis fulvo nigroque variis, rectricibus nigris, apice albis.

19. EPISCOPUS. *Der Bischoff.*

Müller, Naturfyst. II. p. 577. n. 19. *der Bischoff.*

Onomat. hist. nat. III. p. 807. *der Bischoff.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 344. n. 157. *der Bischoff.*

Briffon, ornith. I. p. 314. n. 23. Evêque.

Büffon, XII. p. 47. *der blaue Tangara oder Bischof.*

Latham, Vögel, II. I. p. 224. n. 18. *die Bischofs-Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 424. n. 17. *Tanagra* (Episcopus) cinerea, alis caudaque extus caeruleis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 367. n. 5. *der Bischoff.*

β. *Tanagra cinereo livida*, alis caudaque caeruleiscentibus, macula humerali albicante. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 424. n. 17. β.

Mus. carlson. fasc. III. tab. 54.

Bechstein, Zusätze zu Lathams Vögeln, p. 730. n. 13. *die blaue Atzel. Gracula Glauca.*

20. SAYACA. *Der Sayacu.*

Müller, Naturfyst. II. p. 577. n. 20. *die graue Merle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 432. *der bunte brasilianische Fink.*

Briffon, ornith. I. p. 308. n. 10. *Tanagra varié du Brésil.*

Büffon, Vögel, XII. p. 87. *der gefleckte brasilianische Tangara.*

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 225. n. 19. *die Sayaku-Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 425. n. 18. Tanagra (Sayaca) cana, alis subcaeruleis.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 41. *Sayacu.*

Jonston, av. p. 189. Sayacu Brasiliensibus.

21. PUNCTATA. *Der gefleckte Tanager. (8)*

Müller, Natursyst. II. p. 577. n. 21. *die gesprenkelte Merle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 432. *der punctirte Indianische Ammer.*

Briffon, ornith. I. p. 309. n. 11. Tangara verd piqueté des Indes.

Büffon, Vögel, XII. p. 85. *der Sayacu; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 225. n. 20. *die gefleckte Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 425. n. 19. Tanagra (Punctata) viridis, nigro-punctata, subtus flavescens-albida.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 52. *die grüngefleckte Meise.*

22. VIRENS. *Der grüne Tanager.*

Müller, Natursystem, II. p. 578. *der brasilianische Grünling.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 434. *der grüne brasilianische Ammer.*

Briffon, ornith. I. p. 310. n. 14. Tangara vert du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 52. *der grüne brasilianische Tangara.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 226. n. 22. *die grüne Merle.*

G g 3

Latham,

(8) Ist nach Büffon mit dem vorhergehenden einerley. Nach Latham vielleicht das Weibchen oder ein Junges davon.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 426. n. 21. *Tanagra* (Virens) viridis, subtus flavescens, loris gulaque nigris, fascia maxillari caerulea.

37. SINENSIS. *Der chinesische Tanager.* (*)

Latham, Vögel, II. I. p. 227. *die chinesische Merle.*

Latham, Syn. Suppl. p. 161.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 426. n. 22. *Tanagra* (Sinensis) viridi olivacea, subtus flava, remigibus rectricibusque flavo-marginatis, basi remigum ferruginea.

24. CRISTATA. *Der gehäubte Tanager.*

Müller, Naturfyst. II. p. 578. n. 24. *die Haubenmerle.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 174. n. 4. *die Haubenmerle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 428. *die gehäubte Amsel aus Cayenne.*

Briffon, ornith. I. p. 319. n. 33. *Tangara noir hupé de Cayenne.*

Briffon, Vögel, XII. p. 11. *der gehäubte oder kup-pichte Tangara; n. 2. Figg.*

Latham, Vögel, II. I. p. 219. n. 8. *die Haubenmerle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 422. n. 9. *Tanagra* (Cristata) nigricans, crista aurantia, gula uropigioque fulvis.

38. BONARIENSIS. *Der violette Tanager.*

Briffon, Vögel, XII. p. 14. *der violette Tangara.*

Latham, Vögel, II. I. p. 220. n. 9. *die violette Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 430. n. 36. *Tanagra* (Bonariensis) atro-violacea, alis caudaque viridinitentibus.

39. ATRA.

(*) S. die Anmerk. 2. bey *Fringilla Sinica*, n. 20.

39. ATRA. *Der Tanager mit schwarzem Gesichte.*

Büffon, Vögel, XII. p. 30. *der Tangara mit schwarzer Kappe*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 220. n. 10. *die Merle mit schwarzem Gesichte.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 422. n. 10. Tanagra (Melanopsis) cinerea, capite antierius, colloque toto inferiore nigris.

40. PILEATA. *Der Huttanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 77. *der schwarzplattige Tangara*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 221. n. 11. *die Hutterle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 423. n. 11. Tanagra (Pileata) caerulefcente-cinerea fubtus alba, vertice ftrigaeque-lateribus colli nigris, inter roftrum et oculos macula alba. (mas.)

β. Briffon, ornith. I. p. 308. n. 9. Tangara cendré du Bréfil. (9)

Büffon, Vögel, XII. p. 77. *der schwarzplattige Tangara.*

Latham, Vögel, II. I. p. 221. n. 11. *das Weibchen.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 423. n. 11. β. Tanagra caerulefcente-cinerea fubtus alba (femina).

41. MELANICTERA. *Der fchwarzkappige Tanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 124. *der fchwarzköpfige Tangara*; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. I. p. 222. n. 12. *die fchwarzkappige Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 423. n. 12. Tanagra (Melanictera) ferrugineo-fufca, fubtus lutea,

Gg 4

pileo

(9) Nach Briffon eine eigene Gattung.

pileo genisque nigris, alis albo longitudinaliter striatis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 214. *Tanagra melanictera*.

42. SIBIRICA. *Der sibirische Tanager.* (10)

Latham, Vögel, II. I. p. 239. n. 46. *die Sibirische Merle*.

Latham, Syn. Suppl. p. 177.

43. ATRICAPILLA. *Der schwarzköpfige Tanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 32. *der mordorefarbigte Tangara*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 222. n. 13. *die schwarzköpfige Merle*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 423. n. 13. *Tanagra* (Atricapilla) rufo-rubra, capite, alis caudaque nigris, striga alarum alba.

44. STRIATA. *Der Tanager mit gefurchten Klauen.*

Büffon, Vögel, XII. p. 33. *der Tangara mit gefurchten Krallen*.

Latham, Vögel, II. I. p. 222. n. 14. *die Merle mit gefurchten Klauen*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 423. n. 13. *Tanagra* (Striata) nigra subus flava, capite caeruleo nigroque striato, dorso infimo aurantio.

45. NIGERRIMA. *Der schwarze guianische Tanager.* (?)

Büffon, Vögel, XII. p. 34. *der schwarze Tangara, und der braunrote Tangara*.

Latham,

(10) Nach *Latham* mit *Alauda tatarica* p. 795. n. 15. einerley.

(11) Im Syst. ornith. hat *Latham* seinen *Guiana Tanager*; und *Büffons Tangara noir* als das Männchen; — *Büffons Tangara roux* aber als das Weibchen von *Oriolus leucopterus* p. 392. n. 40. angenommen.

Latham, Vögel, II. 1. p. 223. n. 15. *die Guianische Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 183. n. 31. β. *Oriolus fusco-cinnamomeus subtus cinerascens.*

46. CAPENSIS. *Der capsche Tanager. (2)*

Latham, Vögel, II. 1. p. 240. n. 47. *die Capsche Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 335. n. 30. β. *Turdus ferrugineo-fuscus, subtus ferrugineo alboque varius, cauda in medio nigricante lateribus fusco-rufescentibus.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 315. n. 6. *Tanagra Cyanea.* p. 876. n. 54. *Emberiza Cyanea.*

p. 316. n. 18. *T. Albirostris.* p. 894. n. 12. β. *Var.*

p. 317. n. 23. *T. Chlorotica.* p. 890. n. 5. β. *Variat.*

Das Geschlecht ist mit 22. Gattungen vermehrt. Da aber 2. der XII. Edit. in andere Geschlechter versetzt, und 1. als Var. von einer andern angenommen worden, so beträgt die Anzahl der neuhinzugekommenen Gattungen überhaupt 25. — Bey der 2ten Gattung sind drey, bey der 3ten zwey, bey der 8ten zwey, bey der 10ten zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Tanagra rudis.* Mus. Carls. IV. n. 94.

Latham, Vögel, II. 1. p. 240. n. 48. *die rostrothe Merle.*

Gg 5

2. *Tana-*

(2) Nach Latham eine Varietät von *Turdus Crassirostris* p. 815. n. 43.

2. *Tanagra ornata*. Mus. Carls. IV. n. 95.

Latham, Vögel, II. 1. p. 240. n. 49. *die geputzte Merle*.

C. Neuere Gattungen.

1. *Der stille Tanager*.

Biffon, ois. IV. p. 304. Oiseau silencieux.

Biffon, pl. enl. p. 742. Tangara de la Guiane.

Büffon, Vögel, XII. p. 119. *der stille Vogel; der guianische Tangara*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 241. n. 50. *die stille Merle*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 432. n. 42. *Tanagra* (Silens) viridis capite subtusque incana, superciliis vitta oculari, fasciaque iugulari nigris.

Hermann, tab. affin. anim. p. 214. *Tanagra taciturna*.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 735. *der stille Vogel*.

2. *Der schöne Tanager*.

Latham, Syn. Suppl. p. 162. tab. 112. Capital Tanager.

Latham, Vögel, II. 1. p. 239. n. 45. *die schöne Merle*; tab. 47. Fig. 2.

Latham, Syst. ornith. I. p. 432. n. 44. *Tanagra* (Capitalis) supra viridis, subtus flava, capite colloque inferiore nigris.

112. GESCHLECHT. FRINGILLA. *Der Fink*.

Müller, Naturfyst. II. p. 579. Gen. CXII.

Leske, Naturgesch. p. 262. Gen. XLIV.

Borowsky, Thierreich, III. p. 136. Gen. LXII.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 186. Gen. XXXIV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 512. Gen. LXXI.

Ebert,

Ebert, Naturl. II. p. 136.

Pennant, arct. Zool. II. p. 345.

Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 52.

Onomat. hist. nat. III. p. 970.

Klein, av. p. 87. Gen. X. trib. 1.

Halle, Vögel, p. 366. Gen. I. p. 390. Gen. III. p. 407. Gen. V.

Briffon, ornith. I. p. 320. Gen. XXXII. Carduelis. p. 327. Gen. XXXIII. Passer.

Büffon, Vögel, XI. p. 5. ff.

Batsch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXVII.

Latham, Vögel, II. 1. p. 242. Gen. XXXVII.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 432. Gen. XXXVIII.

Hermann, tab. affin. anim. p. 213. 218.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 367. Gen. LXXX.

1. LAPPONICA. *Der lappländische Fink.* (3)

Müller, Naturyst. II. p. 579. n. 1. *der lappländische Fink.*

Müller, Naturyst. Suppl. p. 161. n. 40. *Sporusfink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 351. n. 176. *der Lappländische Fink.*

Onomat. hist. nat. II. p. 643. *der lappländische Diebstelfink.*

Klein, av. p. 92. n. 10. *Emberiza capite nigro, luteis maculis vario.*

Klein, Vorbereit. p. 172. n. 10. *Schwarzköpfiger Goldammer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 93. n. 10. *Schwarzköpfiger Goldammer.*

Briffon, ornith. I. p. 350. n. 38. *Pinçon de montagne.*

Büffon, Vögel, XI. p. 133. *der große Bergfink.*
p. 139. *der gespornte Fink.*

Batsch,

(3) Länge 5. Zoll, Flügelweite 7 Zoll, Gewicht 1½ Unze. Penn.

Batsch, Thiere, I. p. 356. *der gespornte Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 256. n. 14. *der Lerchenfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 18. *Fringilla* (Lapponica) capite nigro, corpore griseo nigroque, superciliis albis, rectricibus extimis macula alba cuneiformi.

Pallas, Reif. Ausz. II. Anh. p. II. n. 20. *Fringilla calcarata*; Tab. E.

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 5. *Carduelis lapponica.*

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 5. *Fringilla* (Lapponica) capite nigricante maculato, macula pone oculos alba.

Müller, Zool. dan. prodr. p. VIII. *Fringilla* (Lapponica) capite nigro, corpore griseo nigroque superciliis albis, rectricibus extimis macula alba cuneiformi.

Jonston, av. p. 99. *Montifringillae congener.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 221. *Fringilla calcarata.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 367. n. 1. *der lappländische Fink.*

3. SURINAMA. *Der surinamische Fink.*

Müller, Naturfyst. II. p. 580. n. 2. *der surinamische Fink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 182. *der surinamische Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 270. n. 41. *der Surinamische Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 447. n. 47. *Fringilla* (Surinama) grisea, remigibus utrinque albis, rectricibus lateralibus intus albis.

6. LONGIROSTRIS. *Der langschnäblige Fink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 163. *der langschnäblichte Fink.*

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 271. n. 42. *der lang-schnäblige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 447. n. 48. *Fringilla* (*Longirostris*) fusco flavoque varia, subtus subfulva, capite nigro, collo torque castaneo, rectricibus olivaceis intus flavo-marginatis.

3. CAELEBS. *Der Buchfink.* (†)

Müller, Natursyst. II. p. 580. n. 3. *der Buchfink.*

Leake, Naturgesch. p. 262. n. 1. *der Fink.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 137. n. 2. *der Buchfink; Garten-, Roth-, Waldfink.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 186. n. 1. *Fringilla* (*Caelebs*) artubus nigris, remigibus utrinque albis, tribus primis immaculatis; rectricibus duabus oblique albis; *der Buchfink.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 512. n. 1. *der gemeine Fink.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 584. *der gemeine Fink.*

Funke,

- (4) Das Finkennest ist eines der künstlichsten. Es ist eine Halbkugel, oder vielmehr eine oben eingedrückte Kugel, rund wie gedrechselt, unten mit Spinngewebe und Haaren fest auf die Aeste geflochten, mit Moos und einzelnen Reischen künstlich durchwebt, inwendig mit Federn, Distelflocken, und allerhand Thierhaaren gut ausgefüttert, und auswendig mit Flechtenmoos von dem Baume, auf dem es steht, vermittelst Spinnwebgewebe so fest wie angeleimt, völlig umlegt, so, daß es Mühe kostet, das Nest von der Rinde des Baumes, auf welchem es steht, zu unterscheiden. — *Linnés* Bemerkung, daß im Winter die Weibchen nach Süden ziehen, und nur die Männchen bleiben, finde ich bey *Pennant*, *White*, *Borkhausen*, u. a. bestätigt. *Bechstein* aber leugnet die Richtigkeit dieser Beobachtung; und versichert, daß nur so viel gegründet wäre, daß im Frühjahr die Männchen in eignen Schaaren 14 Tage eher wiederkämen als die Weibchen, und daß es eine Seltenheit sey, wenn man unter einer Schaar von etlichen hundert 1. oder 2. Weibchen anträfe, und so umgekehrt.

Funke, Naturgesch. I. p. 266. *der Buchfink.*

Ebert, Naturl. II. p. 136. *der eigentliche gemeine Fink.*

Halle, Vögel, p. 407. n. 418. *der Fink; Buchfink.*
Fig. 27.

Meyer, Thiere, II. tab. 30. *der Fink.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 406.
n. 34. *der Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 355. F. *der Buchfink.*

Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 53. *gemeine Fink.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 674. *der Buchfink; eigentliche Fink.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 238. *der Fink.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 130. *gemeiner Fink; Schilafink.*

Klein, av. p. 96. n. 1. *Fringilla simpliciter.*

Klein, Vorbereit. p. 179. n. 1. *Buchfink.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 96. n. 1. *Buchfink.*

Klein, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. Fig. 9.

Gesner, Vögelb. p. 110. *Fink; m. e. mittelm.*
Fig.

Briffon, ornithol. I. p. 346. n. 36. *Pinçon.*

Büffon, Vögel, XI. p. 83. *der Fink; m. e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 355. *der Buchfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 250. n. 10. *der gemeine Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 165. *Chaffink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 437. n. 12. *Fringilla*
(*Caelebs*) *artubus nigris, remigibus utrinque*
albis, tribus primis immaculatis, rectricibus
duabus oblique albis.

Frisch, Vögel, tab. 1. Fig. 1. 2. *Fink.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 78. n. 171. *der Buchfink.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 115. n. 1. *der Buchfink; Bootfink; Dorpfink.*

Bock,

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 426. *der Buchfink.*

Fischer, Livl. p. 99. n. 152. *Buchfink.*

Cetti, Sardin. II. p. 195. *der Buchfink.*

White, N. G. von Engl. p. 23. *Buchfinken.*

Pallas, Reif. Ausz. III. p. 476. *Buchfinken.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 9. *die Finken.*

Storr, Alpenreise, I. p. 79. *Buchfink.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 1. *Buchfinke.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 130. *Bogfinke.*

Linné, Abhandl. II. p. 303. n. 127. *der Buchfink.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 178. n. 217. *der gemeine Fink.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 149. n. 15. *Buchfink.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 330. *gemeine Fink.*

Naturforsch. XVII. p. 93. n. 187. *der Buchfinke.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 62. *Fink.*

Naumann, Vogelfsteller, p. 58. *Finke.*

Krünitz, Encykl. XIII. p. 415. *Fink.*

Oekonom. Zool. p. 99. n. 44. *der Buchfinke.*

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 388. n. 9. *Fink.*

André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 258. 261.

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 294. *Buchfinke.*

Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 49. *der Buchfink.*

Meidinger, Vorl. p. 149. n. 1. *der Buchfink.*

Anweisung. Vögel zu fang. p. 189. *der Fink.*

Beckmann, Naturhist. p. 54. b. *der Buchfink.*

Hervieux, Canarienvög. p. 137. *Fink.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 629. *der Fink.*

Forst. Fisch- und Jagdlex. I. p. 745. *Finke.*

Loniceri, Kräuterb. p. 682. *Buchfink.*

Eberhard, Thiergesch. p. 80. *der Fink.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 333. *Fink.*

Naturgesch. der schönst. Vögel, II. p. 16.

Schröder, Jagdkunst, p. 138.

König, Helvetia curiosa, p. 831.

Linné,

Linne', Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Fringilla.

Linne', Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 1. Fringilla.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 179. n. 2. Fringilla (Coelebs) artubus nigris, remigibus utrinque albis, tribus primis immaculatis, rectricibus duabus oblique albis.

Charleton, exercitat. p. 88. n. 3. Fringilla.

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 3. Fringilla.

Moehring, av. gen. p. 41. n. 27. Fringilla.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 261. Fringilla. *Finke*; *Buch-Finke*; *Rotte-Finke*.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Polon. p. 379. Fringilla; *Vinelia avis Alberti*.

Sibbald, Scot. illustr. p. 18. Fringilla.

Barrere, ornith. p. 55. Passer subtus spadiceus, superne subcaeruleus et subvirescens.

Salerne, ois. p. 266. Pinson commun, fringilla, etc.

Belon, nat. des ois. p. 371. Grinon, Pinson, Quinon.

Jonston, av. p. 98. Fringilla.

Zinn, Uov. p. 61 tab. 9. Fig. 52. Frinquello.

Levin, britt. Birds, II. tab. 79.

Roman, ornith. I. p. 142. tab. 22. Fig. 11.

Faun. Arragon. p. 87. — *Russ. Alepp*. p. 70.

Bomare, Diction. VII. p. 35. Pinçon ou l'inson.

Turner, histor. av. voc. *Fringilla*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 367. n. 2. *der Buchfink*.

b. Das Weibchen.

Müller, Naturyst. II. p. 581. ad n. 3. *Waldfink*.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 6. Fringilla (Sylvatica) artubus remigibus rectricibusque nigris, duabus utrinque extremis a medio extrorsum albis.

Linne',

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. I. p. 318. n. 3. β . Fringilla Sylvia.

Linné, fn. suec. II. p. 85. n. 232. β . Fringilla *Sylvatica* artubus remigibus rectricibusque nigris; duabus utrinque extimis a medio extrorsum albis.

β . *Latham*, Syst. ornith. I. p. 433. n. 12. ϵ .

γ . *Briffon*, ornith. I. p. 348. A. Pinçon à ailes et queues noires. (5)

Büffon, Vögel, XI. p. 106. *der Waldfink*.

Latham, Syn. II. I. p. 258. n. 10. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 252. n. 10. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 437. n. 12. β . Fr. cinerascens, subtus incarnata, rectricibus alarum albis, medio nigris, remigibus rectricibusque nigris.

δ . *Briffon*, ornith. I. p. 359. C. Pinçon blanc.

Büffon, Vögel, XI. p. 112. *der weiße Fink*.

Latham, Vögel, II. I. p. 253. n. 10. Var. β .

Latham, Syst. ornith. I. p. 437. n. 12. γ .

Schwenkfeld, av. Siles. p. 262. Fringilla candida.

Gesner, Vögelb. p. 110. ganz weiße Finken.

Zorn, Petinotheol. II. p. 53. *schneeweiße Finken*.

Anweis. Vögel zu fangen, p. 191. *schloßweiße Finken*.

Angenehm. Zeitvertr. m. Vögeln, p. 101.

Angenehme Landluft, p. 135.

ϵ . *Briffon*, ornith. I. p. 349. D. Pinçon à collier.

Büffon, Vögel, XI. p. 113. *der Ringelfink*.

Latham, Vögel, II. I. p. 253. n. 10. Var. C.

Latham,

(5) Ist nach *Bechstein* ein junges Männchen, nach *Latham* eine Spielart vom Weibchen. *Briffon* rechnet die vorher bey *b* angeführten Synonymen hieher.

Latham, Syst. ornith. I. p. 437. n. 12. ♂.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 262. Fringilla torquata.

♂. Latham, Vögel, II. I. p. 253. ad Var. C. not. h.

Latham, Syst. ornith. I. p. 438. n. 12. ♂.

η. Latham, Vögel, II. I. p. 253. ad. Var. C. not. h.

Latham, Syst. ornith. I. p. 438. n. 12. η.

4. MONTIFRINGILLA. *Der Bergfink.* (6)

Müller, Naturfyst. II. p. 581. n. 4. *der Bergfink.*

Leske, Naturgesch. p. 262. n. 3. *der Bergfink.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 136. n. 1. *der Quäcker; Bergfink; Schnee-, Tannen-, Mißfink, Rowert, Gegler; tab. 62.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 186. n. 2. Fringilla (Montifringilla) alarum basi subtus flavissima; *der Bergfink; Winterfink; Quäckfink; Nikawitz; Zetscher; Gegler, etc.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 514. n. 2. *der Bergfink.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 589. *der Bergfink; Gräcker.*

Funke, Naturgesch. I. p. 265. *Bergfink.*

Ebert, Naturl. II. p. 136. *Bergfink; Waldfink.*

Halle,

(6) Ist nicht mit *Fringilla montana*, p. 925. n. 37. zu verwechseln.

— Findet sich häufig unter den gemeinen Finken, und kommt zuweilen in großen Schaaeren. In England nistet er nicht, zieht aber zuweilen dahin. Latham erzählt, daß ihm einst 12 auf einmal gebracht wären, die alle auf einen Schuß geschossen worden. In Frankreich sieht man sie zuweilen in unermeßlichen Flügen so häufig, daß der Boden von ihrem Mist ganz bedeckt wird und jede Nacht über sechs hundert Dutzend getödtet werden. In Thüringen lassen sie sich vorzüglich vom Anfang des Octobers bis zu Ende des März sehen, wo sie wieder in die nördlichen Gegenden zurück gehen. Einzeln sind sie unter den gemeinen Finken, Sperlingen und Goldammern, den ganzen Winter hindurch auf den Häusern, vor den Scheunen und Ställen anzutreffen,

- Halle*, Vögel, p. 409. n. 419. *der Bergfink.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 407.
 n. 344. *der Bergfink; Quecker; Nikabiz; Nikowiz; Zehrling*, etc.
Pennant, arct. Zool. II. p. 355. E. *der Bergfink.*
 Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 54. n. 2. *Bergfink.*
 Onomat. hist. nat. II. p. 643. *der angermannländische Diestelvogel.*
 Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 132. *der Buchfink; Bergfink*, etc.
Klein, av. p. 96. n. 2. *Fringilla hyberna; montana.*
Klein, Vorbereit. p. 179. n. 2. *Winterfinke.*
Klein, verb. Vögelh. p. 96. n. 2. *Bergfink.*
Klein, Steinmat. av. p. 19. tab. 19. Fig. 16. a—c.
Gesner, Vögelb. p. III. *Waldfinke.*
Briffon, ornith. I. p. 349. n. 37. *Pinçon d'Ardenne.*
Biffon, Vögel, XI. p. 115. *der Bergfink, oder Gägler.* p. 127. n. 7. *Bergnachtigall.*
Batsch, Thiere, I. p. 356. *der Bergfink.*
Latham, Vögel, II. I. p. 254. n. 13. *der Bergfink.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 439. n. 17. *Fringilla*
 (*Montifringilla*) *nigra*, *pennis rufo-marginatis*, *subtus uropygioque alba*, *jugulo pectoreque rufescentibus*, *rectricibus lateralibus nigricantibus*, *extus albo marginatis.*
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 116. n. 2. *der Bergfink.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 427. *der Bergfinke.*
Fischer, Livl. p. 99. n. 153. *Berg-, Tannen-, Wald-, Winterfink.*
Fischer, Zuf. zur N. G. von Livl. p. 48. *der Bergfink.*
Cetti, Sardin. II. p. 195. *Bergfink.* *
Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 41. *Bergfinken.*

- Lepechin*, Tageb. d. russ. Reis. II. p. 5. *Bergfinken*.
- Pallas*, Reis. Ausz. III. p. 474. *Tannenfinken*.
- Storr*, Alpenreise, I. p. 79. *Bergfink*.
- Linné*, Abhandl. II. p. 304. n. 128. *Bergfink*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 174. n. 2. *Quecker*,
Buchfinkens Hurkind.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 341 *Bergfink*; *Gägler*;
Quäcker.
- Borkhausen*, Magaz. I. p. 150. n. 16. *Bergfink*.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 62. *Quäcker*, *Zehring*,
Buch-Fink.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 74. *Quäcker*.
- Scopoli*, Bem. aus der N. G. I. p. 179. n. 218. *der Bergfink*.
- Krünitz*, Encykl. XIII. p. 419. *Bergfink*.
- Naturforsch.* XIII. p. 185. XVII. p. 93. *Bergfink*.
- Samml. zur Phys. u. N. G.* II. p. 630. *der Bergfink*.
- Meidinger*, Vorlesung. I. p. 150. n. 2. *der Bergfinke*.
- Anweis. Vögel zu fang.* p. 435. *Quäcker*; *Nicabit*.
- Forst-Fisch-u. Jagdlex.* I. p. 750. *Buchfink*. *Gögler*.
- Jablonsky*, allgem. Lex. p. 180. *Buchfink*, *Bergfink*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 7. *Montifringilla*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 179. n. 3. *Fringilla* (*Montifringilla*) *alarum basi subtus flavissima*.
- Kramer*, Austr. p. 367. n. 3. *Nicowitz*, a corrupta voce *Scawetz*; alibi *Quecker*, *Pienken*.
- Charleton*, onom. zoic. p. 80. n. 4. *Montifringilla*.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 262. *Fringilla hyberna*.
Οἰκοπιζή. *Wald-Finke*; *Winter-Fink*, *Dannen-Fink*.

Schwenkf-ld, av. Siles. p. 229. Aurivittis. *Queck*;
Quecker; *Golbfinke*; *Quetschfinke*; *Laubfinke*.
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 379. *Fringilla montana*. *Montifringilla*.

Jonston, av. p. 99. *Fringilla montana*.

Belon, hist. des ois. p. 372. Montan ou Montain;
 Pinson d'Ardennes, nommé par quelques-uns
 Païsse de bois, ou Moineau de bois.

Salerne, hist. nat. des ois. p. 269. Pinson de montagne, etc.

Turneri hist. av. voc. *Montifringilla*.

Amoenit. academ. IV. p. 596.

Roman. orn. p. 146. tab. 22. Fig. 2. *Fringilla montana*.

Levin, britt. Birds. II. tab. 80.

Bomare, dicton. VII. p. 36. Pinçon de montagne
 ou des Ardennes.

Dumondorff, Handb. d. Thiergesch. p. 368. n. 2.
der Bergfink.

β. *Latham*, Syn. II. 1. p. 262. n. 13. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 256. n. 13. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 439. n. 17. β. *Fringilla*
superciliis fasciaque nuchae nigris, corpore sub-
tus uropygioque albis, gula pectoreque rufe-
scens, tectricibus alarum fascia albente.

γ. *Brissou*, ornith. I. p. 330. A. Pinçon d'Ardennes
 à tête blanche.

Büffon, Vögel, XI. p. 129. *Bergfinken mit einem*
ganz weißen Kopfe.

Latham, Syn. II. 1. p. 262. n. 13. Var. B.

Latham, Vögel, II. 1. p. 256. n. 13. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 439. n. 17. β.

Aldrov. ornith. p. 131. *Montifringilla leuco-*
cephalos.

5. LULENSIS. *Der schwedische Fink.*

Müller, Naturfyst. II. p. 582. n. 5. *der schwedische Fink.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 354. B. *der Fink von Lulea.*

Onomat. hist. nat. II. p. 643. *der westgothische Diebstelfink.*

Briffon, ornithol. I. p. 324. n. 2. Chardonneret de Suede.

Bäffon, Vögel, XI. p. 296. *der Stieglitz mit vier Streifen.*

Latham, Vögel, II. I. p. 280. n. 56. *der schwedische Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 452. n. 63. Fringilla (Lulensis) fusca, pectore humerisque rufis, alis nigris macula rufa, collo corporeque subtus albis.

Schrift. der berl. Gesellsch. N. Fr. VII. p. 465. n. 54. *der schwedische Fink.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 6. Carduelis Lulensis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 4. Fringilla (Lulensis) fusca, pectore humerisque rufis, alis nigris macula rufa.

40. ERYTHROCEPHALA. *Der rothköpfige Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 279. n. 55. *der rothköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 452. n. 62. Fringilla (Erythrocephala) olivacea capite colloque coccineis, orbitis nigris, fascia tectricum duplici alba.

41. PSITTACEA. *Der Papageyfink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 279. n. 54. *der Papagey-Fink.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 451. n. 61. Fringilla (Psittacea) viridis, facie uropygio rectricibusque coccineis, lateralibus intus fuscis.

7. CARDUELIS. *Der Stieglitz.* (7)

Müller, Naturfyst. II. p. 582. n. 7. *der Diestelfink*; tab. 25. Fig. 5.

Leske, Naturgesch. p. 262. n. 3. *der Stigliz.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 138. n. 3. *der Stieglitz.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 187. n. 4. Fringilla (Carduelis) fronte iuguloque coccineis, remigibus antrorsum flavis, rectricibus duabus extremis medio, reliquisque apice albis; *der Stieglitz.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 516. n. 5. *der Stieglitz*; tab. 1. Fig. 2.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 585. *der Stieglitz.*

Funke, Naturgesch. I. p. 267. *der Stieglitz.*

Ebert, Naturl. II. p. 137. *der Stieglitz.*

Hh 4

Halle,

- (7) Hält sich des Sommers über in Gärten, Feldhölzern und Vorhölzern auf, bleibt den ganzen Winter bey uns, und zieht nur seiner Nahrung halber bald da bald dort hin. Diese besteht in allerhand Sämereyen von Diesteln, Wegbreit, Habichtskraut, Kletten, Sallat, Kohl, Rüben, Cichorien, Lein und Dotter, etc. Blattläuse aber frisst er nicht, wie man gemeiniglich glaubt. Im Käfig giebt man ihm Mohn und Hanf. Von dem Genuß des letztern soll er schwarz werden. — Wird 20. bis 24. Jahr alt. — Im Herbst versammeln sich diese Vögel familienweise aufs Höchste zu Heerden von 15 bis 20. — Selten paart sich ein Stieglitz Weibchen mit dem Kanarienvögelchen. — In Persien füttert man sie wegen Mangel des Hanfsaamens, mit Wallnüssen (*Pallas*) Dafs dieser Vogel mehr als andere mit der fallenden Sucht behaftet wird, wenn man ihn im Käfig hält, ist bekannt; dafs diese Krankheit aber von einem Wurme herrühre, der in den Schenkeln sitzt, wird von aufmerksamen Beobachtern billig geleugnet.

- Halle*, Vögel, p. 411. n. 421. *der Stieglitz.*
Meyer, Thiere, I. tab. 92. *der Stieglitz.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 408.
 n 345. *der Stieglitz, Stechlitz, Jupitersfink.*
Pennant, arch. Zool. II. p. 357. H. *der Gold-*
fink; Stieglitz.
Beckmann, Naturhist. p. 54. c. *der Stieglitz.*
Neuer Schaupl. d. N. III. p. 54. VIII. p. 573.
Stieglitz.
Onomat. hist. nat. II. p. 642. der Stieglitz.
Handb. der Naturgesch. II. p. 226. der Die-
stelfink.
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 130. Stieglitz.
Klein, av. p. 97. n. 4. *Fringilla Jovis. Carduelis.*
Klein, Vorbereit. p. 180. n. 4. *Diestelfinke; Stieg-*
litz; Rothvogel.
Klein, verb. Vögelhist. p. 96. n. 4. *Diestelfink.*
Klein, Stemm. av. p. 20. tab. 19. Fig. 18. a—c.
Klein, Vögeleyer, p. 30. tab. 9. Fig. II.
Gesner, Vögelb. p. 55. *Diestelfink; m. e. Fig.*
Briffon, ornith. I. p. 320. n. 1. *Chardonneret.*
Büffon, Vögel, XI. p. 260. *der Stieglitz; Truns,*
Rothvögelchen, Kletter, Distelfink; p. 264.
Stechlick; m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 354. *der Stieglitz.*
Latham, Vögel, II. I. p. 274. n. 51. *der gemei-*
ne Stieglitz.
Latham, Syst. ornith. I. p. 449. n. 58. *Fringil-*
la (Carduelis) remigibus antrorsum luteis, ex-
tima immaculata.
Befeker, Vögel Kurl. p. 79. n. 172. *der Diestelfink.*
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 117. n. 3. *der Stieg-*
litz.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 427. *der Stieglitz.*
Cetti, Sardin. II. p. 203. *der Stieglitz.*
Fischer, Lavl. p. 99. n. 154. *Stieglitz.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 3. *Stieglitz*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 186. *Stillitz*.

Leem, Finnm. p. 136. *der Stieglitz*.

Storr, Alpenreis. I. p. 79. *Fringilla Carduelis*.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *Stieglitze*. IV. p. 9.

Diestelfink.

Linne, Abhandlung. II. p. 304. n. 129. *der Diestelfink*.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 174. n. 211. *der Stieglitz*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 333. *der Diestel-Fink*.

Hervieux, Canarienvög. p. 179. *der Stieglitz*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 63. *Stiegelitz*.

Naumann, Vogelsteller, p. 69. *der Stieglitz*.

Eberhard, Thiergesch. p. 79. *der Diestelfink*.

André u. Reckstein, Spazierg. II. p. 320.

Naturforsch. XV II. p. 93. n. 189. *der Diestelfink*.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 634. *der Stieglitz*.

Anweis. Vögel zu fang. p. 529. *Stieglitz*.

Naturgesch. der schönsten Vögel, p. 64.

Lemmerly, Materiallex. p. 241.

Loniceri, Kräuterb. p. 682. *Diestelvogel*.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 380. *Stieglitz*.

Neu Hamburg. Magaz. St. 37.

Oekonom. Zool. p. 99. *der Stieglitz*.

Schles. ökonom. Gesellsch. 1782. p. 102. *Diestelfink*.

Reinmann, de Cardueli viginti duos annos nato, per integrum adhuc annum, pennis omnibus amissis, cantante et saltante. — Nov. act. nat. cur. II. p. 597. c. f.

Hartmanni anatome Carduelis fame peremptae. —

Eph. nat. cur. Dec. II. an. 7. obs. 18. p. 39.

Linne, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Carduelis*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 4. Carduelis vulgaris.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 180. n. 9. Fringilla (Carduelis) remigibus antrorsum luteis: extima immaculata, rectricibus duabus extimis medio, reliquisque apice albis.

Kramer, Austr. p. 365. n. 1. Fringilla remigibus antrorsum luteis, extima immaculata; rectricibus duabus extimis toto, reliquis apice albis. *Stiglitz*.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 1. Carduelis; Chrysomitris; Aurivittis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 233. Carduelis. *Stieglitz*; *Distelvogel*, *Distel-Fink*; *Rottvogel*.

Sibbald, prodr. L. 3. c. 4. p. 18. Carduelis.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 370. Carduelis seu Astralaginas; Zena *Bellonii*; Aurivittis ornithologorum, Chrysomitris.

Jonston, av. p. 97. Carduelis.

Belon, hist. nat. des ois. p. 353. Chardonneret.

Barrere, ornithol. p. 57. Carduelis capite rubro, corpore fulvo, etc.

Salerne, hist. nat. des ois. p. 274. Chardonneret, etc.

Bemare, dictionn. II. p. 355. Chardonneret.

Schaefer, element. ornithol. tab. 24.

Zinnann. Uov. p. 58. tab. 8. 42. Cardellino.

Turner, hist. av. art. *Carduelis*.

Faun. Arragon. p. 87.

Roman. ornithol. p. 132. tab. 120.

Hist. Prov. I. p. 511.

Ruffel, Alepp. p. 70.

Levin, britt. Birds. II. tab. 81.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fr. Carduelis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 369. n. 4. *der Stieglitz*.

β. Der weißköpfige Stieglitz.

Briffon, ornith. I. p. 321. A. Chardonneret à tête blanche.

Büffon, Vögel, XI. p. 284. *der Stieglitz mit weißen Augenbraunen, und weißer Stirne.*

Latham, Syn. II. 1. p. 282. n. 51. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 275. n. 51. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 450. n. 58. β.

Aldrov. ornith. II. p. 801. Carduelis ciliis et rostri ambitu niveo colore refulgentibus.

Jonston, av. tab. 36. Carduelis ciliis albis.

γ. Der Stieglitz mit gestreiftem Kopfe.

Briffon, ornith. I. p. 321. B. Chardonneret à tête rayée.

Büffon, Vögel, XI. p. 285. *der Stieglitz mit roth und gelb gestreiftem Kopfe.*

Latham, Syn. II. 1. p. 283. n. 51. Var. B.

Latham, Vögel, II. 1. p. 276. n. 51. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 450. n. 58. γ.

Browne, l. c. Fringilla subfusca, capite vario striato, striis quandoque rubris, quandoque flavis.

δ. Der schwarzköpfige Stieglitz.

Briffon, ornithol. I. p. 322. C. Chardonneret à tête jaune.

Büffon, Vögel, XI. p. 285. *der Stieglitz mit der schwarzen Kappe.*

Latham, Syn. II. 1. p. 283. n. 51. Var. C.

Latham, Vögel, II. 1. p. 276. n. 51. C.

Latham, Syst. ornith. I. p. 450. n. 58. δ.

Halle, Vögel, p. 412. n. 422. *der Schwalbenstieglitz.*

z. Der weißlichte Stieglitz.

Briffon, ornithol. I. p. 322. D. Chardonneret blanchâtre.

Büffon,

Büffon, Vögel, XI. p. 286. *der weißlichte Stieglitz.*

Latham, Syn. II. 1. p. 283. n. 51. Var. D.

Latham, Vögel, II. 1. p. 276. n. 51. Var. D.

Latham, Syst. ornith. I. p. 450. n. 58. e.

Aldrovand. orn. II. p. 801. *Carduelis subalbida.*

ζ. *Der weiße Stieglitz.*

Briffon, ornithol. I. p. 322. E. Chardonneret blanc.

Büffon, Vögel, XI. p. 286. *der weiße Stieglitz;*
m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 283. n. 51. Var. E.

Latham, Vögel, II. 1. p. 276. n. 51. Var. E.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 450. n. 58. ζ.

Aldrovand. orn. II. p. 801. *Carduelis alba, capite rubro.*

Cetti, Sardin. II. p. 205. *weiße Stieglitze.*

Jonston, av. p. 97. *Cardueles totae prorsus albae.*

η. *Der schwarze Stieglitz.*

Briffon, ornithol. I. p. 323. F. Chardonneret noir.

Büffon, Vögel, XI. p. 288. *der schwarze Stieglitz.*

Latham, Syn. II. 1. p. 284. n. 51. Var. F.

Latham, Vögel, II. 1. p. 277. n. 51. Var. F.

Latham, Syst. ornith. I. p. 450. n. 58. η.

θ. *Der schwarze, gelbköpfige Stieglitz.*

Briffon, ornith. I. p. 323. G. Chardonneret noir
à tête jaune.

Büffon, Vögel, XI. p. 290. *der schwarze Stieglitz mit orangefarbigem Kopfe.*

Latham, Syn. II. 1. p. 285. n. 51. G.

Latham, Vögel, II. 1. p. 277. n. 51. Var. G.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 451. n. 58. θ.

Aldrov.

Aldrov. ornith. II. p. 801. Cardueli congener, rostro fasciola crocea circumdato.

ι. *Der Bastardstieglitz.*

Briffon, ornithol. I. p. 323. H. Chardonneret mulet.

Büffon, Vögel, XI. p. 291. der Bastardstieglitz.

Latham, Syn. II. 1. p. 285. n. 51. Var. H.

Latham, Vögel, II. 1. p. 277. n. 51. Var. H.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 451. n. 58. ι.

κ. *Der gelbbüftige Stieglitz. **

Büffon, ois. VII. p. 283. n. 1. Chardonneret à poitrine jaune.

Büffon, Vögel, XI. p. 284. der Stieglitz mit gelber Brust.

λ. *Das Rehlein. **

Pennant, britt. Thiergesch. p. 122.

Büffon, Vögel, XI. p. 294. n. 10.

Latham, Vögel, II. 1. p. 278. not. k. Var. I.

μ. *Der Imperiale. **

Cetti, N. G. von Sardin. II. p. 203.

Büffon, Vögel, XI. p. 294. n. 11.

Latham, Vögel, II. 1. p. 278. not. k. Var. K.

8. MELBA. *Der grüne Stieglitz.*

Müller, Naturfyst. II. p. 584. n. 8. der grüne Stieglitz.

Onomat. histor. natur. V. p. 135. der grüne Fink.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 98. n. 19. grüner Stieglitz.

Briffon, ornithol. I. p. 326. n. 7. Chardonneret verd.

Büffon, Vögel, XI. p. 299. der grüne Stieglitz, oder der Maracaxao; m. e. Fig.

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 278. n. 52. *der grüne Stieglitz*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 451. n. 59. *Fringilla* (Melba) viridis, facie caudaque rubris, abdomine albo nigroque undulato.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 62. *der grüne Stieglitz*, (das Männchen.)

Seligmann, Vögel, V. tab. 23. *der grüne Stieglitz*, (das Weibchen.)

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 10. *Fringilla* (Melba) facie caudaque rubris, abdomine albo nigroque undato, dorso viridi.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Fringilla Melba*.

42. AFRA. *Der afrikanische Fink*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 279. n. 54. *der Fink mit rothem Gesichte*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 451. n. 60. *Fringilla* (Afra) fusco-viridis, genis pallide coccineis, cauda coccinea, remigibus nigricantibus extus aurantiis.

9. ALARIO. *Der capsche Fink*.

Müller, Natursystem, II. p. 584. n. 9. *der capsche Spatz*.

Klein, av. p. 90. n. 21. *Passer capensis*.

Klein, Vorbereit. p. 169. n. 21. *Kapsperling*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 92. n. 19. *Capsperling*.

Briffon, ornithol. I. p. 336. n. 17. petit moineau du cap de bonne esperance.

Latham, Vögel, II. 1. p. 305. n. 85. *der Capsche Fink*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 462. n. 95. *Fringilla* (Alario) capite collo pectoreque atris, corpore castaneo subtus albo, rectricibus quatuor latera libus lineola nigra.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 179. n. 14. Emberriza (Alario) capite pectoreque atro, abdomine albo, alis rubris.

43. LEUCOTIS. *Der weißhörige Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 304. n. 84. *der weißhörige Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 462. n. 94. Fringilla (Leucotis) capite dorso tectricibusque alarum purpureis, subtus flava, remigibus primoribus caudaque caeruleis, macula aurium alba.

β. Latham, Vögel, II. I. p. 304. n. 84. *der Erste.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94.

γ. Latham, Vögel, II. I. p. 304. n. 84. *der Zweyte.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94. β.

δ. Latham, Vögel, II. I. p. 304. n. 84. *der Dritte.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94. γ.

ε. Latham, Vögel, II. I. p. 305. n. 84. *der Vierte.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94. δ.

ζ. Latham, Vögel, II. I. p. 305. n. 84. *der Fünfte.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94. ε.

10. AMANDAVA. *Der amandavische Fink. (8)*

Müller, Natursyst. II. p. 584. n. 10. *der bengalische Spatz.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 187. n. 5. Fringilla (Amandava) fusca rufescensque albo-punctata; *der Fink von Bengalen.*

Onomat. hist. nat. III. p. 970. *der purpurfarbene ostindische Fink. Amaduvad.*

Klein, av. p. 98. n. 15. Fringilla rubra, minima.

Klein, Vorbereit. p. 182. n. 15. *rothe kleinste Snelg-litz, Diestelfinke.*

Klein,

(8) Größe eines Zaunkönigs; etwa 4. Zoll lang. Latham.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 98. n. 15. *rother kleinster Stieglitz*.

Briffon, ornith. I. p. 364. n. 62. *Bengali piqueté*.

Büffon, Vögel, XI. p. 68. *der punctirte Bengali*; m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 168. *Amadavade Finch*.

Latham, Vögel, II. I. p. 301. n. 82. *der getiegerte Bengali*, tab. 49.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 461. n. 92. *Fringilla (Amandava) fusca rufescensque albo-punctata, rectricibus nigris apice puncto albo*.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 45. fig. 1. *Amandavad*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 180. n. 11. *Fringilla (Amandava) rectricibus purpureis, medietate postica atris*.

Charleton, exercitat. p. 95. n. 2. — *Onom. zoic.* p. 89. n. 2. *Regulus indicus*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Fringilla Amandava*.

β. *Briffon*, ornith. I. p. 363. n. 61. *Bengali brun* (9)

Büffon, Vögel, XI. p. 67. *der braune Bengali; braun getiegerte, eigentliche Bengali*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 312. n. 82. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 301. n. 82. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 461. n. 92. β.

II. GRANATINA. *Der brasilianische Fink*.

Müller, Natursystem, II. p. 584. n. 11. *der Granatvogel*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 140. n. 5. *der Granatvogel*, tab. 62. B.

Onomat.

(9) Noch nicht vier Zoll lang. *Latham*. — Nach *Briffon* und *Büffon* eine eigene Gattung. *Bechstein* hat in einer Anmerk. bey der Uebersetzung des *Latham'schen* Werks I. c. aus eigener Erfahrung viel artige Bemerkungen hiebey geliefert.

Onomat. hist. nat. III. p. 671. *der brasilianische rothgelb und blaue Fink.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 98. n. 21. *rothschnäbliger Diebstelfink.*

Brissou, ornithol. I. p. 367. n. 67. Grenadin.

Büffon, Vögel, XI. p. 221. *der rothschnäblichte Diebstelfink*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 306. n. 87. *der Brasilische Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 463. n. 97. Fringilla (Granatina) cauda cuneiformi, corpore rufescente, rostro rubro, temporibus, uropygio abdomineque violaceis.

Seligmann, Vögel, VI. tab. 86. *der roth und blaue brasilianische Fink.*

Bankroft, N. G. von Guiana, p. 109. *der roth und blaue brasilische Finke.*

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 181. n. 16. Fringilla (Brasiliana) cauda cuneiformi, corpore rufescente, temporibus, uropygio abdomineque violaceis, rostro rubro.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fr. Granatina.

β. Fr. loris fuscis, corpore postice violaceo. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 97. β.

Latham, Vögel, II. 1. p. 306. n. 87. Var. A.

γ. Fr. abdomine infimo femoribusque corpore concoloribus. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 97. γ.

Latham, Vögel, II. 1. p. 306. n. 87. Var. B.

δ. Fr. cauda rubescente. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 97. γ.

Latham, Vögel, II. 1. p. 306. n. 87. Var. C.

44. ZEYLONICA. *Der zeylanische Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 306. n. 88. *der Zeylanische Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 98. Fringilla (Zeylanica) flava, dorso virescente, capite nigro, corpore subtus albo nigricante vario, remigibus rectricibusque nigricantibus.

β. Latham, Vögel, II. 1. p. 307. n. 88. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 98. β. Fr. dorso viridi, pectore abdomineque flavescente-albis, capite fusco rubro. An femina?

45. FUSCICOLLIS. *Der braunkehlige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 307. n. 89. *der braunkehlige Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 99. Fringilla (Fuscicollis) ferruginea, vertice uropygio crissoque viridibus, gula fusca macula subrubra, macula remigum rectricibusque dimidiato-flavis.

46. IGNITA. *Der Feuerfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 307. n. 90. *der Feuerfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 100. Fringilla (Ignita) fusco-rubra nitens, rostro, remigibus caudaque obscuris.

12. TRISTIS. *Der amerikanische Stieglitz.*

Müller, Naturyst. II. p. 585. n. 12. *der amerikanische Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 345. n. 159. *der Goldfink; der amerikanische Stieglitz*

Onomat. histor. natur. III. p. 980. *der amerikanische Stieglitz.*

Klein, av. p. 97. n. 5. Fringilla, Carduelis americana.

Klein, Vorbereit. p. 180. n. 5. *gelber Diebstelfinke*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 97. n. 5. *gelber Diebstelfink*.

Briffon, ornithol. I. p. 324. n. 3. Chardonneret d'Amerique.

Büffon, Vögel, XI. p. 303. *der gelbe Stieglitz*; m. e. Fig.

Halle, Vögel, p. 413. n. 423. *der gelbe Stieglitz*.

Latham, Syn. Suppl. p. 166. American Goldfinch.

Latham, Vögel, II. I. p. 230. n. 57. *der Amerikanische Stieglitz*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 452. n. 64. *Fringilla* (Tristis) flava, fronte nigra, alis fuscis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 86. *der americanische Stieglitz*.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 64. *der americanische Stieglitz*, ein Er und eine Sis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 181. n. 14. *Fringilla* (Tristis) flava, fronte nigra, alis fuscis.

Fermin, Surin. II. p. 182. *Diebstelfink oder Stieglitz*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Fringilla tristis*.

Charlevoix, nouv. France. III. p. 156.

13. ZENÄ. *Der bahamische Fink*. (10)

Müller, Naturfyst. II. p. 587. n. 13. *der bahamische Fink*.

Halle, Vögel, p. 413. n. 424. *der schwarze Fink mit gelbrothem Unterleibe und Kinne*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 347. n. 164. *der Bahamafink*.

Onomat. hist. nat. III. p. 981. *der bahamische Fink*.

Klein, av. p. 97. n. 6. *Fringilla bahamensis*.

II 2

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 180. n. 6. *der Finke von Bahama.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 97. n. 6. *bahamischer Fink.*

Brissou, ornithol. I. p. 353. n. 43. *Pinçon de Bahama.*

Büffon, Vögel, XI. p. 156. *der schwarz und weißköpfige Fink*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 270. n. 40. *der pomeranzengelbe Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 446. n. 46. *Fringilla (Zena) nigra subtus alba, linea supra infraque oculos candida, pectore fulvo, gula macula flava.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 84. *der bahamische Fink.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 181. n. 15. *Fringilla (Zena) capite nigro, fascia alba alarum supra infraque oculos, pectore fulvo.*

14. LEPIDA. *Der havanische Fink.*

Müller, Natursyst. II. p. 585. n. 14. *der havanische Fink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 183. *der havanische Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 289. n. 67. *der artige Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 167. *lepid Finch.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 455. n. 73. *Fringilla (Lepida) fusco virens, fascia supra-oculari, infra-oculari gulaque fulvis, pectore nigro.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. *Fringilla lepid.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 370. n. 5. *der havanische Fink.*

47. *CARTHAGINENSIS.* *Der Fink von Carthagena.*

Latham, Syn. Suppl. p. 169. n. 101. *Carthagena* Finch.

Latham, Vögel, II. I. p. 309. n. 99. *der Fink von Carthagena.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 108. *Fringilla* (*Carthagenensis*) tota cinerea fusco flavoque marginata, rostro pedibusque pallide fuscis.

48. *AETHIOPS.* *Der Negerfink.* (1)

Latham, Syn. Suppl. p. 165.

Latham, Vögel, II. I. p. 263. n. 21. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 25. *β. Fringilla* tota nigra, rostro pedibusque concoloribus.

15. *AUTUMNALIS.* *Der Herbstfink.*

Müller, Naturfyst. II. p. 585. n. 15. *der Herbstfink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 184. *der Herbstfink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 288. n. 66. *der Herbstfink.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 455. n. 72. *Fringilla* (*Autumnalis*) virens, pileo ferrugineo, crisso testaceo.

16. *CITRINELLA.* *Der Citronenfink.* (2)

Müller, Naturfyst. II. p. 586. n. 16. *der Citronenfink.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 139. n. 4. *der Citronenfink.*

Briffon, ornith. I. p. 357. n. 51. *Serin d'Italie.*

113

Büffon,

(1) Nach *Latham* eine Varietät von *Fringilla Nitens*, p. 909. n. 49.

(2) Ist nicht mit *Emberiza Citrinella* p. 870. n. 5. zu verwechseln.

Büffon, X. p. 199. 200. 203. *der Verturon*, oder *italienische Kanarienvogel*. *Citrinlein*, *Zitrinchen*; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. I. p. 288. n. 64. *der Citronen-Fink*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 454. n. 70. *Fringilla* (*Citrinella*) *subvirescens*, dorso fusco-maculato, pedibus incarnatis, corpore subtus flavescente.

Gesner, Vögelb. p. 142. *Citrinlein*; m. e. Fig.

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 7. *Citrinella*.

Jouston, av. p. 101. *Citrinella Gesneri*, quam Galli *Tarin* vocant.

Zinn, Uov. p. 62. tab. 9. fig. 53. *Verzellino*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Fringilla Citrinella*.

Amusemens innocens, ou le parfait Oïseleur. p. 42.

17. SERINUS. *Der Girlitz*. (3)

Müller, Naturyst. II. p. 586. n. 17. *der Grünfink*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 140. n. 6. *der Grünfink*; *Girlitz*; *Hirngrill*.

Ebert, Naturl. II. p. 138. *Hirngrillen*; *Girlitze*.

Halle, Vögel, p. 395. n. 403. *das Kanarienzeischen*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 511. n. 6. *der Hirngrill* (unter den *Loxiis*).

Gesner, Vögelb. p. 143. *Fädemlein*; *Schwäderlein*; *Girlitz*, m. e. schl. Fig.

Briffon, ornith. I. p. 356. n. 50. *Serin*.

Büffon,

- (3) Wird im Käfig an 15 Jahr alt; *Gesn.* — *Scopoli* und *Bechstein* zählen ihn des Schnabels halber unter die *Loxias*. — *Büffon* verwechselt ihn mit dem Kanarienvogel und dem Citronenfinken, und sieht alle drey als Abänderungen an. — Einige betrachten ihn so gar als einen wild gewordenen Bastard vom Kanarienvogel.

Büffon, Vögel, X. p. 199. 200. *Cini*, *Cinit*, *Cigni*.
p. 201. *der grüne Kanarienvogel aus Provence*.
p. 203. *Serin*.

Batsch, Thiere, I. p. 351. *der eigentliche Grünfink*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 287. n. 63. *der Girlitz*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 454. n. 69. *Fringilla* (Serinus) subvirescens, mandibula inferiore albidula, dorso lateribus fusco-maculatis, fascia alarum flava.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 169. n. 205. *der gelbgrüne Dickschnabel*.

Naturforsch. XII. p. 187. *Fringilla Serinus*, vergl. mit XV. p. 158. (4)

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 624. *der Cini*.
Kramer, Austr. p. 368. n. 7. *Fringilla vertice collo antice pectore et uropygio flavis, dorso virescente; remigibus rectricibusque nigricantibus margine albidis*. *Hirn-Grillerl*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 354. *Serin*.

Belon, portr. des ois. p. 90. *Serin*; *Senicle*; *Cerisin*; *Cinit*; *Cedrin*.

Jonston, av. p. 101. *Serinus Gesneri*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Fringilla Serinus*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 370. n. 6. *der Grünfink*; *Girlitz*.

18. SENEGALA. *Der senegalische Fink*:

Müller, Natursystem, II. p. 586. n. 18. *der senegalische Fink*.

Briffon, ornithol. I. p. 364. n. 63. *Sénégal rouge*.

Ii 4

Büffon,

(4) *Sander* und *Götz* fanden beyde die braunen Flecken auf dem Rücken, und an der Seite nicht. Auch *Kramer* gedenkt ihrer nicht.

Büffon, Vögel, XI. p. 71. *der Senegali; rubin-farbene Senegali*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 303. n. 83. *der Senegalische Fink*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 461. n. 93. *Fringilla* (Senegala) fusco ferruginea, vertice subtusque rufa, rostro rubro striato.

β. *Büffon*, IV. p. 100. n. 2. *le Danbick*. *

Büffon, Vögel, XI. p. 72. *der Danbick*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 304. *Danbik*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 462. n. 93. β.

19. NOCTIS. *Der Nachtfink*. (5)

Müller, Naturyst. II. p. 586. n. 19. *der Nachtfink*.

Briffon, ornith. I. p. 339. n. 23. *Pere noir*.

Büffon, Vögel, X. p. 155. *der schwarze Sperling*, p. 156. *Tohualtototl*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 262. n. 20. *der Fink mit gelbrothem Kinn*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 441. n. 24. *Fringilla* (Noctis) nigra, gula lorisque rufis, rostro nigro.

31. MARTINICENSIS. *Der martinikische Fink*. (6)

Latham, Vögel, II. 1. p. 312. n. 110. *der Martinikische Fink*.

49. NITENS. *Der glänzende Fink*. (7)

Briffon, ornithol. I. p. 340. n. 24. *Pere noir à bec rouge*.

Büffon,

(5) *Latham* rechnet auch die *Tanagra ruficollis*, p. 894. n. 32. als Varietät hieher.

(6) Nach *Latham* eine Varietät vom vorhergehenden, und mit *Tanagra ruficollis* einerley.

(7) Nach *Büffon* eine Varietät von *Fringilla Noctis*, n. 19.

Büffon, Vögel, X. p. 157. *der brasilianische Sperling*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 262. n. 21. *der glänzende Sperling*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 442. n. 25. *Fringilla* (Nitens) chalybeo - nigra, rostro pedibusque carneis.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 13. 2. *Passer indicus brachyurus*.

Jonston, av. p. 96. *Passer indicus brachyurus*.

b. *Büffon*, Vögel, X. p. 156. *der cayennische Sperling*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 262. n. 21. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 25. β . Fr. tota nigra rostro pedibusque concoloribus. (8)

50. MELANICTERA. *Der schwarz-und orange-farbene Fink*. (9)

Büffon, Vögel, X. p. 156. *der makaische Sperling*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 263. n. 22. *der schwarz-und orangefarbige Fink*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 26. *Fringilla* (Melanictera) nigra, abdomine albo-maculato, alis caudaque ferrugineo-marginatis.

51. MELANOLEUCA. *Der weißbrüstige Sperling*. (10)

Büffon, Vögel, X. p. 156. *der javanische Sperling*; m. e. Fig.

Li 5

Latham,

(8) *Latham* ist noch ungewiss, ob *Büffons* Moineau de Cayenne als Spielart hierher gehöre; rechnet aber die *Fringilla Aethiops*, p. 908. n. 48. als Spielart hierher.

(9) Nach *Büffon* eine Varietät von *Fringilla Noctis*, n. 19.

(10) Nach *Büffon* eine Varietät von *Fringilla Noctis*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 263. n. 23. *der weißbrüstige Fink*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 27. *Fringilla* (Melanoleuca) nigra, fascia pectoris alba.

52. PECORIS. *Der Kuhfink.*

Briffon, ornith. I. p. 352. n. 41. Pinçon de Virginie.

Büffon, Vögel, XI. p. 148. *der braune Fink*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 345. n. 158. *der Kuhfink*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 263. n. 24. *der Kuhfink*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 443. n. 28. *Fringilla* (Pecoris) fusca, subtus dilutior, cauda subforcipata.

Latham, Syn. Suppl. p. 165. Cowpen Finch.

Seligmann, Vögel, II. tab. 68. *der braune Sperling*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 370. n. 7. *der Kuhfink*.

20. SINICA. *Der chinesische Fink.* (1)

Müller, Natur Syst. II. p. 586. n. 20. *der chinesische Fink*.

Briffon, ornith. I. p. 355. n. 47. Pinçon de la Chine.

Büffon, Vögel, XI. p. 167. *der olivenfarbige Fink*.

Latham,

(1) Ist nicht mit *Fringilla Sinensis* p. 915. n. 66. zu verwechseln. — Im Suppl. p. 161. sagt *Latham*, daß der *chinesische Tanager* p. 897. n. 37. der größten Wahrscheinlichkeit nach, das Weibchen von diesem *chinesischen Finken* sey. Er muß aber in der Folge seine Meinung wieder geändert haben, denn er führt im Syst. ornith. nicht nur beyde als verschiedene Gattungen auf, sondern citirt auch die Stelle aus dem Suppl. nicht. — Cf. *Lath.* Vögel, II. 1. p. 227.

Latham, Vögel, II. 1. p. 271. n. 43. *der Chinesische Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 447. n. 49. Fringilla (Sinica) rufo-olivacea, subtus testacea, remigibus rectricibusque nigris basi luteis.

53. MELANOCEPHALA. *Der schwarzköpfige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 272. n. 45. *der schwarzköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 448. n. 52. Fringilla (Melanocephala) ferrugineo-fusca, capite, iugulo remigibusque nigris, cervice abdomineque albis, rostro rubro.

54. FUSCA. *Der braune Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 272. n. 46. *der braune Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 448. n. 53. Fringilla (Fusca) fusca, marginibus pennarum nigricantibus, subtus fusco-alba.

55. NAEVIA. *Der weißwangige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 272. n. 44. *der weißwangige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 448. n. 51. Fringilla (Naevia) cinerea maculis obscuris, subtus cinerea, genis albis, loris rufis, striga maxillari nigra.

56. EUSTACHI. *Der Fink von St. Eustach.*

Klein, av. p. 90. n. 15. Passer africanus eximius.

Klein, Vorbereit. p. 167. n. 15. *großer Afri-
caner.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 91. n. 14. *großer Afri-
caner.*

Briffon, ornithol. I. p. 356. n. 48. Pinçon de l'Isle de St. Eustache.

Büßon,

Buffon, Vögel, XI. p. 169. *der gelbe und rothe Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 272. n. 47. *der Fink von St. Eustach.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 448. n. 54. *Fringilla* (Eustachii) flava subtus aurantia, macula infra oculos caerulea, alis caudaque rubris.

57. **VARIEGATA.** *Der bunte Fink.*

Briffon, ornith. I. p. 356. n. 49. *Pinçon varié de la nouvelle Espagne.*

Buffon, Vögel, XI. p. 171. *der Tuite.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 273. n. 48. *der bunte Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 448. n. 55. *Fringilla* (Variegata) rubro flavo caeruleo alboque variegata, pectore lutescente-nebuloso, rectricibus apice margine albo.

21. **NIVALIS.** *Der Schneefink.* (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 587. n. 21. *der Schneefink.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 187. n. 3. *Fringilla* (Nivalis) fusca subtus nivea, remigibus secundariis tectricibusque albis; *der Schneefink.*

Briffon, ornith. I. p. 351. n. 39. *Pinçon de neige ou Niverolle.*

Buffon, Vögel, XI. p. 142. *der Schneefink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 259. n. 15. *der Schneefink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 440. n. 19. *Fringilla* (Nivalis) nigra subtus nivea, remigibus secundariis rectricibusque albis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 370. n. 8. *der Schneefink.*

β. *Latham*,

(3) Ist nicht mit *Emberiza nivalis* zu verwechseln.

β. *Latham*, Vögel, II. I. p. 259. n. 15. n. i.

Latham, Syst. ornith. I. p. 440. n. 19. β. Fr. hypochondriis nigro striatis, rectricibus extimis macula cuneiformi alba.

58. MONTICOLA. *Der canadische Bergfink* (4)

Pennant, arct. Zool. II. p. 347. n. 163. *der Baumfink; Feldsperling*.

Briffon, ornith. I. p. 335. n. 15. Moineau de Canada.

Büffon, Vögel, X. p. 137. *der canadische Sperling*.

Latham, Vögel, II. I. p. 260. n. 16. *der Bergsperling*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 434. n. 3. *Fringilla* (Canadensis) castaneo et griseo - fusco varia, subtus cinerascens, macula ad basin rostri rufescente, fascia alarum duplici alba.

59. CAPSA. *Der Dattelsperling*.

Büffon, Vögel, X. p. 161. *der Dattelsperling*.

Latham, Vögel, II. I. p. 260. n. 17. *der Dattelsperling; Capsa Fink*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 440. n. 2. *Fringilla* (Capsa) rufo grisea, facie gulaque alba, alis caudaque nigris, cauda forficata.

Shaw, Reif. p. 164. *der Capsa Sperling*.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 624. *der Dattelsperling*.

60. AR-

- (4) Ich finde bey *Pennant* in der arctischen Zoologie alle in unserm System hier und bey *Fringilla montana*, p. 925. n. 37. bemerkte Synonymen zusammen gezogen; gleichwohl scheint *Pennant* beyde für verschiedene Gattungen zu halten. Da er aber so sehr viel Aehnlichkeit mit unserm *Feldsperling* hat, so hat er die wenigen Veränderung vielleicht dem Clima zu danken, und ist weiter nichts als die amerikanische Art unsers *Feldsperlings*.

60. ARCUATA. *Der Halbmondſink.*

Briffon, ornith. I. p. 336. n. 16. Moineau du cap de bonne eſpérance.

Büſſon, Vögel, X. p. 194. *der kapsche Sperling oder Kernbeißer*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 269. n. 18. *der Halbmond Fink.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 440. n. 21. *Fringilla* (Arcuata) caſtanea, ſubtus alba, capite colloque inferiore nigris, torque taeniaque pone oculos albis.

61. ELEGANS. *Der ſchöne Fink.*

Büſſon, Vögel, X. p. 179. *der bunte afrikanische Sperling*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 261. n. 19. *der ſchöne Fink.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 441. n. 22. *Fringilla* (Elegans) ſupra viridis collo cinereo, pectore flavo, capiftro gula uropygio caudaque rubris, abdomine maculis lunatis albis.

22. BUTYRACEA. *Der gelbe Fink.* (5)

Müller, Naturſyſt. II. p. 587. n. 22. *der indianiſche Grünling.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 671. *der indianiſche Grünling.*

Klein, av. p. 89. ad. n. 13.

Klein, Vorbereit. p. 167. ad n. 13. in ſin.

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 91. ad n. 13.

Briffon, ornith. I. p. 360. n. 55. Verdier des Indes.

Büſſon, Vögel, XI. p. 251. *der indianiſche Grünling*; m. e. Fig.

Latham,

(5) Iſt wahrſcheinlich doch wohl mit *Loxia butyracea*, p. 855. einreley. *Latham* rechnet ſo gar *Büſſons Vert brünet*, und *Verdier du Cap de b. E.* zu *Loxia butyracea*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 289. n. 68. *der gelbe Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 455. n. 74. Fringilla (Butyracea) virens, superciliis pectore abdomineque flavis, remigibus primoribus margine exterioriore albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 63. *der indianische Grünling.*

Bankroft, N. G. von Guian. p. 109. *der guianische Grünling.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla butyracea.

23. CANARIA. *Der Kanarienvogel.* (6)

Müller, Naturfyst. II. p. 587. n. 23. *der Canarienvogel*; tab. 25. Fig. 7.

Leske, Naturgesch. p. 263. n. 4. *der Canarienvogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 141. n. 7. *der Canarienvogel.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 188. n. 6. Fringilla (Canaria) rostro corporeque albo-flavescente, rectricibus remigibusque virescentibus; *der Canarienvogel, ehemals Zuckervöglein.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 521. n. 9. *der Canarienvogel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 895. *der Canarienvogel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 260. *der Canarienvogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 137. *der Canarienvogel, Canariensperling, Zuckerspatz.*

Halle, Vögel, p. 369. n. 364. *der Canarienvogel.*

Meyer, Thiere, II. tab. 32. *Canarienvogel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 409. n. 346. *der Canarienvogel.*

Neuer

- Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 23. *Canarienvogel*.
 Onomat. hist. nat. II. p. 490. *Canarienvogel*.
 Handb. der Naturgesch. II. p. 239. *Canarienvogel*.
 Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 132. *Canarienvogel*.
 Klein, av. p. 88. n. 3. *Passer canarius*. *Avis canaria*.
 Klein, Vorbereit. p. 164. n. 3. *der kanarische Sperling*.
 Klein, verb. Vögelhist. p. 90. n. 3. *Canariensperling*.
 Klein, Stemmat. av. p. 17. tab. 18. Fig. 3. a. b.
 Brisson, ornith. I. p. 358. n. 52. *Serin des Canaries*.
 Buffon, Vögel, X. p. 195. *der Kanarienvogel*; m. 2. Figg. M. u. W.
 Batsch, Thiere, I. p. 351. *der Canarienvogel*.
 Latham, Vögel, II. I. p. 284. n. 62. *der Canarienvogel*.
 Latham, Syst. ornith. I. p. 454. n. 68. *Fringilla* (*Canaria*) *rostro corporeque albo - flavicante, remigibus rectricibusque virescentibus*.
 Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 427. *der Canarienvogel*.
 Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 4. *Kanarienvogel*.
 Beckmann, Naturhist. p. 54. d. *der Kanarienvogel*.
 Döbel, Jägerprakt. I. p. 68. *Canarienvogel*.
 Naturforsch. XVII. p. 94. n. 190. *der Canarienvogel*.
 Wirsing, Vögel, tab. 18. et 29. *Canarien-Vogel*.
 Zorn, Petinotheol. II. p. 356. *der Canarienvogel*.
 Oekonom. Zool. p. 100. n. 45. *der Kanarienvogel*.

Hervieux, traité des Serins des Canaries. Par.
1713. 12.

Hervieux, Nachricht von den Canarienvögeln.
Nürnb. 1771. 8.

Unterricht von den verschiedenen Arten der Canarienvögel und der Nachtigallen. Frcf. u. Lpz.
1772. 8. m. K.

Beckmann, Beytr. zur Gesch. der Erfind. I. p. 562.
Canarien-Vögel.

Beckmann, Bibl. IV. p. 468. VI. p. 476. *Canarienvogel*.

Samml. zur Physf. u. N. G. II. p. 624. *der Canarienvogel*.

Borkhausen, Magaz. I. p. 153. n. 18. *Canarienfink*.

Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. I. 3.
p. 63.

Anweif. Vögel zu fangen, p. 124. 608.

Angenehme Landluft, p. 349—406.

Angenehm. Zeitvertreib, p. 47. fqq.

Coler. oeconom. rural. et domest. Frcf. 1680. fol.
* I. p. 621.

Allgem. Gesch. von Amerika mit *Baumgartens*
Vorr. I. p. 557.

Barrington: philos. transact. LXIII. p. 249.

Krünitz, Encykl. VII. p. 576. *Canarien-Vogel*.

Smellie, Philos. der Naturgesch. I. p. 182.

Amusemens innocens, p. 51. 61.

Journal encycl. 1773. p. 538.

Gazette litter. de Berlin, 1773. p. 230.

Bresl. Samml. VII. Vers. Febr. 1719. p. 193. Vom
Canarienvögel-Handel.

H. B. D. kurze doch gründliche Nachricht von
den Canarienvögeln. — Stuttg. select. physf.
oeconom. 1749. I. p. 65.

Abhandl. von den Canarienvögeln, aus dem XIV.
B. des englischen kurzen Systems der natürlich.

Gefchichte, p. 156. — Hannöv. gel. Anz. 1754. St. 90.

Von der Canarienvögel Zucht und Lust. — Lpzg. Samml. 1758. St. 155. p. 933.

Neue lustige und vollständige Jagdkunst, so wohl von den Vögeln als auch andern Thieren, nebst einer Nachricht von den Canarienvögeln. Leipz. 1760. 8.

Eine Erfahrung über die Krankheit der Canarienvögel. Wittenb. Wochenbl. 1769. p. 350.

Le Serin de Canarie; Poeme, p. Mr. l'Abbé B. Lond. 1755. 8.

Acanthides Canariae f. Spini; gallice les Serins. Carmen Auth. Ioh. Lud. Clairambault. Paris, 1737. 8.

Von den Canarienvögeln, nach Anleitung eines lateinischen Gedichts des Herrn Clairambault.

Phys. ökonom. Patriot. Hamb. 1758. 4. p. 203.

Luc. Schroeckii obs. de raro passerum canariensium colore. Misc. nat. cur. A. 1675. et 76. obs. 230.

Naturgesch. der schönsten Vögel, p. 65.

Goese, nützl. Allerl. II. p. 389.

Von den Krankheiten und Kur der Canarienvög.

— Neues berlin. Intelligenzbl. 1785. p. 1693.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Canaria.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 9. Canaria.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 181. n. 18. Fringilla (Canaria) rostro corporeque albicante, rectricibus remigibusque virescentibus.

Brünniche, ornith. bor. p. 69. n. 259. Fringilla Canaria.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 12. Passer Canarius.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 298. Luteola Canaria. Canaria avicula. Citrina canariensis. Avicula faccha-

saccharina. *Canarien-Vogel*; *Zucker-Vogel*;
Canarien-Zeisle.

Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 303. Passer Canarius.

Jonston, av. p. 98. Passer Canarius.

Zinnan. Uov. p. 60. tab. 8. Fig. 49. tab. 9. Fig. 50.
Passere di Canaria.

Hist. Prov. I. p. 512. Serin des Canaries.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla Canaria.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 371. n. 9.
der Kanarienvogel.

β. Buffon, Vögel, X. p. 274. *der Zeisig von Mozambique*; m. 2. Figg.

Latham, Syn. II. I. p. 296. n. 62. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 286. n. 62. Var. A. *der Fink von Mozambik*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 454. n. 68. β.

γ. Brisson, ornith. I. p. 258. n. 52. A. Serin mulet.

Buffon, Vögel, X. p. 208.

24. FLAVEOLA. *Der Saffranstirnige Fink*. (7)

Müller, Naturyst. II. p. 589. n. 24. *der Gelbfink*.

Latham, Vögel, II. I. p. 288. n. 65. *der Saffranstirnige Fink*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 455. n. 71. Fringilla (Flaveola) flava, dorso virescente, fronte fulva, remigibus rectricibusque nigris, flavo-marginatis.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 428. *der Gelbfinke, Graufinke, Goldfinke*.

25. SPINUS. *Der Zeisig*. (8)

Müller, Naturyst. II. p. 598. n. 25. *der Zeisig*.

Kk 2

Leske,

(7) Latham vermuthet, es sey ein Bastardvogel.

(8) Nistet in Schwarzwäldern, besonders in Fichtenwäldern auf den äußersten Spitzen der hohen Zweige, seltener auf Erlenbäumen

Leske, Naturgesch. p. 363. n. 5. *der Zeisig*.

Borowky, Thierreich, III. p. 142. n. 8. *der Zeisig*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 188. n. 7. *Fringilla* (*Spinus*) *remigibus medio luteis: primis quatuor immaculatis, rectricibus basi flavis, apice nigris; der Zeisig; Erlensink*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 520. n. 8. *der Zeisig*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 594. *der grüne Hänfling oder Zeislein*.

Funke, Naturgesch. I. p. 268. *der Zeisig*.

Ebert, Naturl. II. p. 139. *der Zeisig*. *Ziesel, Zießchen, grüne schwarzplattige Hänfling*.

Halle, Vögel, p. 393. n. 400. *das Zeischen*.

Meyer, Thiere, II. tab. 76. *Zeislein*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 410. n. 347. *der Zeisig; Zeißig; Zinsle; Ziesel; Zifung; Erlensink; Zeisgen; Ziesgen; Zeislein; Zischen, Zeischen; Zeisichen*.

Beckmann, Naturhist. p. 54. c. *das Zeisgen*.

Pen-

bäumen, die an Waldbächen stehen. Das Nest ist auswendig mit Puppengehülsen und haarigem Corallenmoos an den Zweig befestigt. Auswendig sind einige Reischen und Würzelchen mit diesen Haarflechten, Distelbürsten und Pflanzenwolle verwebt, und die inwendige Fütterung besteht aus ganz kleinen Würzelchen. Uebrigens ist es sehr gut gebauet und halbkugelförmig. Dafs sehr selten ein solches Nest gefunden wird, kommt wohl ohnstreitig daher, weil es nicht nur sehr hoch angelegt, sondern auch klein und von den Blättern und Zweigen, besonders in der Entfernung schwer zu unterscheiden ist. Daher sagt auch *Kramer*, dafs man in den Waldungen an der Donau junge Zeisige zu tausenden anträfe, bey denen die ersten Federn noch nicht verlohren gegangen. und dafs es doch selten sey, Junge im Neste zu finden. Das Weibchen legt 5. bis 6. weifsgrüne Eyer. Brütet wahrscheinlich mehrmals im Jahre. — Das Männchen begatter sich gern mit der Kanariensie. So auch umgekehrt. — Wird etwa 10 Jahr alt. — Das Fleisch ist fet und wohlschmeckend. — In Preussen fängt man oft viele tausende.

Pennant, arch. Zool. II. p. 357. I. der Zeisig.
 Neuer Schaupl. d. N. III. p. 617. X. p. 166.
Zeisig.

Onomat. hist. nat. VII. p. 259. der Zeisig.
Handb. der Naturgesch. II. p. 228. der Zeisich.
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 131. Zeisig.
Klein, av. p. 94. n. 6. *Linaria viridis*.

Klein, Vorbereit. p. 174 n. 6. Zeisgen.

Klein, verb. Vögelhist. p. 99. n. 6. Zeisichen.

Klein, Stemmat. av. p. 20. tab. 18. Fig. 4. a—c.

Gesner, Vögelb. p. 555. Zinslein; Zeiselein; Zieslein; Zisichen; Gelbvogel; Sisgen; m. e. Fig.

Briffon, ornith. I. p. 325. Tatin.

Büffon, Vögel. XI. p. 321. der Zeisig; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 355. der Zeisig.

Latham, Syn. Suppl. p. 166. *Siskin*.

Latham, Vögel, II. I. p. 281. n. 58. der gemeine Zeisig.

Latham, Syst. ornith. I. p. 452. n. 65. *Fringilla*
 (*Spinus*) *remigibus medio luteis, primis quatuor immaculatis, rectricibus basi flavis, apice nigris*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 79. n. 173. der Zeisig.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 118. n. 4. der Zeisig,
Ziesk.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 428. das Zeischen.

Cetti, Sardin. II. p. 205. der Zeisig.

Fischer, Livl. p. 99. n. 155. Zeisig.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 178. Süsigen.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 125. n. 6. tab. 57.
 Fig. 5. Zeischen.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. Zeisige.

Linné, Abhandl. II. p. 304. n. 130. der Zeisig.

Storr, Alpenreise, I. p. 79. Zeisig.

Scopoli, Bein. a. d. N. G. I. p. 175. n. 212. das Zeisein.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 65. *Zeisig*.

Naturforsch. XVII. p. 95. n. 192. *der Zeisig*. XXV.
der Strumpfw Weber.

Naumann, Vogelsteller, p. 68. *der Zeisig*. p. 71.
der Strumpfw Weber.

Zorn, Petinotheol. II. p. 352. *das grün - gelbe*
Zeislein.

Onomat. forestal. I. p. 752. *Erlenfinke.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 635. *der Zeisig.*

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 385. 390.
Zeisig.

Oekonom. Zool. p. 100. *der Zeisig.*

Hamb. Magaz. XVIII. p. 243.

Dresdner Magazin, I. p. 7. tab. 1. (Ein Nest mit
6. Eyern.)

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 389. n. 11. *der Zeisig.*

Krinitz, Encykl. XIII. p. 419. *Erlenfink.*

Schlef. ökonom. Gesellsch. 1781. p. 103. *Fringilla*
Spinus.

Meidinger, Vorlesung. I. p. 150. n. 5. *der Zeisig.*

Eberhard, Thiergesch. p. 79. *der Zeisig.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1430. *Zeislein.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 578. *das Zeislein.*

Loniceri, Kräuterb. p. 683. *Zeislein.*

Hannöv. neue gesellsch. Erzähl. IV. p. 138.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 8. *Spinus.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 181. n. 19. *Fringilla*
(*Spinus*) *remigibus medio luteis; primis*
quatuor immaculatis, rectricibus basi flavis, api-
ce nigris.

Kramer, Austr. p. 366. n. 2. *Fringilla remigibus*
medio luteis; primis quatuor immaculatis, re-
ctricibus duabus extimis, reliquisque apice al-
bis; Zeisel; Zeislerl.

Charleton, exercitat. p. 87. *Spinus seu Ligurinus.*

Charleton, onom. zöic. p. 79. n. 2. Spinus seu Ligurinus.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 297. Luteola germanica. *Χλωρίς* Euberi et Peuceri. Serinus quasi Syren. Seris. Citrina. *Zeisich*, *Zeisel*; *Zeisgen*; *Zensle*; *Zißle*.

Rzaczymsky, auct. hist. nat. Polon. p. 420. Spinus seu Ligurinus; Serinus; Citrina; Luteola; Zizela.

Jonston, av. p. 94. Acanthis.

Belon, hist. nat. des ois. p. 355. *Θεαυπης*. Traupis, Tarin.

Barrere, ornith. p. 57. Carduelis virescens, capite et alis nigris.

Salerne, hist. nat. des ois. p. 288.

Roman. ornith. p. 118. tab. 18. Fig. 2.

Histoire. Prov. I. p. 513.

Levin, britt. Birds. II. tab. 82.

Romare, diction. VIII. p. 431. Tarin.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla Spinus.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 371. n. 10. *der Zeisig*.

β. Der schwarze Zeisig.

Klein, av. p. 93. n. 5. Linaria f. Luteola nigra?

Klein, Vorbereit. p. 174. n. 5. *schwarzer Hänfling*?

Klein, verbess. Vögelhist. p. 99. n. 5. *schwarzer Hänfling*?

Briffon, ornithol. I. p. 325. A. Tarin noir.

Briffon, Vögel, XI. p. 340. *der schwarze Zeisig*.

Latham, Syn. II. 1. p. 291. n. 58. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 283. n. 58. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 453. n. 65. β.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 297. Luteola nigra.

γ. Der Zeisig von Newyork. (9)

Pennant, arct. Zool. II. p. 346. n. 160. der Zeisig von Newyork.

Büffon, Vögel, XI. p. 338. der newyorksche Zeisig; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syn. II. 1. p. 291. n. 58. Var. B.

Latham, Vögel, II. 1. p. 283. n. 58. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 452. n. 64. β. *Fringilla* olivaceo-fusca, subtus alba, collo, pectore uropygioque flavis, remigibus rectricibusque nigris, albo marginatis.

δ. Der olivenfarbige Zeisig.

Büffon, Vögel, XI. p. 339. der olivenfarbne Zeisig.

Latham, Syn. II. 1. p. 291. n. 58. Var. C.

Latham, Vögel, II. 1. p. 283. n. 58. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 453. n. 65. γ.

ε. Der schwarzbrüstige Zeisig. Bechst. *

Latham, Vögel, II. 1. p. 283. not. m. Var. B.

ζ. Der bunte Zeisig. Bechst. *

Latham, Vögel, II. 1. p. 284. not. o. Var. C.

η. Der weiße Zeisig. Bechst. *

Latham, Vögel, II. 1. p. 284. not. o. Var. D.

θ. Der Bastardzeisig?

Büffon, Vögel, XI. p. 337. der Bastardzeisig.

62. MEXI-

(9) In der ersten Ausgabe des arct. Zool. giebt *Pennant* diesen Zeisig von Newyork für eine eigne Gattung aus. In der neuen Ausgabe 1792. aber versichert er, daß er mit *Fringilla Tristis*, p. 907 n. 12. einerley sey. *Latham* hat ihn in der Synopsf. als Varietät vom Zeisig, im Syst. ornith. aber ebenfalls als Spielart vom amerikanischen Stieglitz angeführt.

62. MEXICANA. *Der mexicanische Zeisig.*

Briffon, ornithol. I. p. 326. n. 5. *Tarin du Mexique.*

Büffon, Vögel, XI. p. 342. *der Acatechili.*

Latham, Vögel, II. I. p. 284. n. 59. *der Mexicanische Zeisig.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 453. n. 66. *Fringilla (Mexicana) fusco-virescens, subtus albida.*

Fernandez, hist. av. nov. Hisp. c. 13. *Acatechichitli seu avis confricans se ad arundines.*

63. CATOTOL. *Der schwarze mexicanische Zeisig.*

Briffon, ornithol. I. p. 326. n. 6. *Tarin noir du Mexique.*

Büffon, Vögel, XI. p. 341. *der Catotol.*

Latham, Vögel, II. I. p. 284. n. 60. *der schwarze Mexikanische Zeisig.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 453. n. 67. *Fringilla (Cacatototl) nigricante fulvoque varia, subtus candida.*

Fernand. nov. Hisp. c. 197. *Cacatototl.*

64. BARBATA. *Der bärtige Fink.*

Molin. N. G. von Chili, p. 219. *der Siu; Span. Gilghero.*

Latham, Vögel, II. I. p. 312. n. III. *der bärtige Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 456. n. 76. *Fringilla (Barbata) lutea, alis viridibus, nigro rubroque maculatis, gula barbata.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 372. n. II. *der Siu.*

65. DIUCA. *Der Diuka.*

Latham, Vögel, II. I. p. 313. n. II2. *der Diuka-Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 456. n. 77. Fringilla
(Diuca) caerulea gula alba.

66. SINENSIS. *Der chinesische Zeisig.* (10)

Latham, Vögel, II. I. p. 284. n. 61. *der Chinesische Zeisig.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 477. n. 50. Fringilla
(Asiatica) olivacea subtus flava, capite nigro,
rectricibus alarum minoribus fasciis duabus nigris,
remigibus rectricibusque nigris, basi flavis.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 157. *der chinesische Tarrain.*

26. FLAMMEA. *Der Brandfink.* (1)

Müller, Naturyst. II. p. 590. n. 26. *der Brandfink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 354. D. *der feuerfarbige Fink.*

Onomat. histor. natur. III. p. 375. *der rothgehaubte Fink.*

Klein, Vorbereit. p. 174. n. 5. *schwarzer Hänfling?*

Klein, verbeß. Vögelhist. p. 99. n. 5. *schwarzer Hänfling?*

Briffon, ornithol. I. p. 349. n. 36. E. Pinçon lupé.

Büffon, Vögel, XI. p. 110. *der Brandfink.*

Latham,

(10) Ist nicht mit *Fringilla Sinica* p. 910. n. 20. zu verwechseln.

(1) Nach Briffon eine Varietät von *Fringilla Coelebs*. — Kleins *Luteola nigra* rechnet Briffon zur Var. β . von *Fringilla Spinus*. Latham ist ihm hierin gefolgt, führt aber den Klein bey *Fringilla flammea* ebenfalls an. Eins ist wohl ein Schreibfehler. — Linné hat zwar schon in der X. Edition Kleins *Luteola nigra* zu seiner *Fringilla flammea* gerechnet. Aber Klein sagt von dem Vogel nichts weiter, als dafs er *verticem flavicantem* habe, und beruft sich auf Schwenkfeld. Wohin soll nun das Synonym gehören?

Latham, Vögel, II. 1. p. 253. n. 11. *der rothhaubige Fink*, tab. 48. fig. 1.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 438. n. 13. Fringilla (Flammea) fusca, crista flammea, corpore sub-
tus roseo.

Beske, Vögel Kurl. p. 79. n. 174. *der Brandfink?*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 428. *der Brandfinke.*

Naturforsch. XVII. p. 95. n. 193. *der Brandfink.*

Lorkhausen, Magazin, I. p. 158. n. 20. *schwarzer Hänfling; Brandfink.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 2. Fringilla crista flammea.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 182. n. 20. Fringilla (Flammea) fusca, crista flammea.

27. FLAVIROSTRIS. *Der gelbschnäblige Fink.* (2)

Müller, Naturyst. II. p. 915. n. 27. *der Gelbschnabel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 353. A. *der arctische Fink.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 176. *der braune Riset.*

Brissou, ornithol. I. p. 348. n. 36. B. Pinçon brun.

Büffon, Vögel, XI. p. 108. *der gelbschnäblichte Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 254. n. 12. *der Arktische Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 438. n. 16. Fringilla (Flavirostris) fusca, rostro flavicante, pennis pectore apice roseis, cauda subforcipata.

Fischer, Liv. p. 99. n. 156. *Gelbschnabel.*

Pallas,

(2) Nach Brissou eine Varietät von Fringilla Coelebs.

Pallas, Reif. Ausz. II. Anh. p. II. n. 21. *Fringilla flavirostris* Lin.

Borkhausen, Magazin, I. p. 158. n. 21. *Gelb-schnabel*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 3. *Fringilla fusca*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 182. n. 21. *Fringilla (Flavirostris) fusca*, rostro flavicante.

28. CANABINA. *Der Bluthänfing*. (3)

Müller, Natursystem, II. p. 590. n. 28. *der Hänfing*.

Leske,

(3) Bey dieser und den 4. folgenden Gattungen findet nicht nur eine große Verwechselung der Synonymen Statt, sondern es scheint auch nach neuern Bemerkungen noch nicht ganz ausgemacht, ob dies wirklich lauter verschiedene Gattungen oder zum Theil nur Spielarten sind. Die auffallende Verschiedenheit in den Farben der Hänfingsmännchen, die bloß im Alter und in der Jahrszeit ihren Grund hat, hat zu großen Verwirrungen Anlaß gegeben. *Bechstein* hat aus vieljährigen Beobachtungen und Erfahrungen es neuerlich sehr wahrscheinlich gemacht, daß die *Fringilla Canabina*, *Linota*, und *Montium* ein und eben derselbe Vogel sind, und auch *Fringilla Argentoratensis* als Spielart hieher gehöre. Ihm nach ist denn die *Fringilla Canabina* ein altes Männchen des gemeinen Hänfings, oder der *Linota*; und die *Fringilla montium* ein einjähriges Männchen, so im gemeinen Ausdruck grauer Hänfing, Weißhänfing, Mehlhänfing heisset, dahingegen jenem, wenn es wenigstens 3. Jahr alt ist, der Name Bluthänfing zukommt. — Steinhänfing oder gelber Hänfing, ist der graue Hänfing nach dem zweyten Mausern. S. *Lath. Vögel*, II. 1. p. 392. not. 9. — Den Bluthänfing und gemeinen Hänfing hat schon *Zorn* für einerley gehalten; und *Büffon* ist gleichfalls der Meinung, daß der Steinhänfing (*Fr. montium*) nur als Abart hieher gerechnet werden möge. So viel ist gewiß, daß die rothe Farbe der Kopfplatte und der Brust sich im Zustande der Gefangenschaft bey dem ersten Mausern verlieret, und nie wiederkommt, und daß sie bey denen, die jung in die Stube gebracht werden, niemals zum Vorschein kommt. — Der Vogel soll über 16. Jahr alt werden.

Leske, Naturgesch. p. 263. n. 6. *der Hänf-ling*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 142. n. 9. *der Hänf-ling*.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 189. n. 8. Frin-
gilla (Canabina) remigibus primoribus rectrici-
busque nigris, utroque margine albis; *der Hänf-ling*; *Leinfink*; *die Arische*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 518. n. 6. *der Hänf-ling*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 593. *der Bluthänf-ling*.

Funke, Naturgesch. I. p. 264. *der Bluthänf-ling*.

Ebert, Naturl. II. p. 138. *Hänf-ling*; *Flachsfinke*.

Haile, Vögel, p. 390. n. 395. *der Karminhänf-ling*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 411. n.
348. *Hänf-ling*, *Braunhänf-ling*; *Grauhänf-ling*;
Steinhänf-ling; *Leinfink*; *Arische*.

Neuer Schaupl. der Nat. III. p. 615. *Hänf-ling*.

Onomat. hist. nat. III. p. 671. *der große Hänf-ling*;
Stockhänf-ling.

Pennant, arct. Zool. II. p. 352. n. 178. *der größere Rothkopf*; *Hänf-ling*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 131. *Hänf-ling*.

Klein, av. p. 93. n. 1. *Linaria simpliciter*.

Klein, Vorbereit. p. 173. n. 1. *Bluthänf-ling*; *blut-rothe Brüst-ling*; *Flachsfinke*; *Krauthänf-ling*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 99. n. 1. *Bluthänf-ling*.

Klein, stemmat. av. p. 18. tab. 18. fig. 8. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. fig. 13.

Briffon, ornithol. I. p. 343. n. 30. *grande Linotte de vignes*.

Büffon, Vögel, XI. p. 5. *der Bluthänf-ling*; m.
c. Fig.

Batsch,

- Batsch*, Thiere, I. p. 353. *der Bluthänfing*.
Latham, Syn. Suppl. p. 167. greater Redpole.
Latham, Vögel, II. I. p. 294. n. 74. *der Bluthänfing*.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 458. n. 82. *Fringilla* (Canabina) fusco-castanea, subtus albo-rufescens, fascia alarum longitudinali alba, macula verticis pectoreque rubris.
Beseke, Vögel Kurl. p. 79. n. 176. *der Hänfing*.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 119. n. 5. *der Bluthänfing*; *Rothböster*; *Hemperling*.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 429. *der Hänfing*.
Fischer, Liv. p. 99. n. 157. *Bluthänfing*.
White, N. G. von Engl. p. 24. *Hänfing*.
Pallas, Reif. Ausz. III. p. 475. *Bluthänfing*.
Linné, Abhandl. II. p. 304. n. 131. *der Hänfing*.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 48. *der Hänfing*.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 180. n. 219. *der Hänfing*; *Flachsfink*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 338. *der Hänfing oder Leinfink*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 63. *Hänfing*.
Naumann, Vogelsteller, p. 70. *Hänfing*.
Hervieux, Canarienvög. p. 146. *Hänfing*.
Naturgesch. der schönsten Vögel, p. 26. *Hänfing*.
Naturforsch. XVII. p. 96. n. 195. *der rothbrüstige Hänfing*; *Krauthänfing*.
Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 627. *der Bluthänfing*.
André u. Bechstein, Spazierg. IV. p. 61. 65. 132. 136.
Günther, Nest. u. Ey. tab. 58. *Hänfing*.
Anweif. Vögel zu fang. p. 284. *Hänfing*.

Forst. Fisch- u. Jagdlex. II. p. 26. *Hänfing*; *Hanf-
finke*; *Flachsfinke*.

Krinitz, Encykl. XX. p. 686. *Hänfing*.

Linneé, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Linaria rubra*.

Linneé, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 10. *Linaria
maior*.

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 182. n. 22. *Fringil-
la* (Canabina) remigibus primoribus rectricibus-
que nigris, utroque margine albis.

Kramer, Austr. p. 368. n. 8. *Fringilla* remigibus
nigris: primoribus margine utroque albis; re-
ctricibus nigris, utroque margine albis. *Hanef-
ferl*; *Hämpfing*.

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 6. 2. *Linaria
marina* Aldrovandi

Schwenkfeld, av. Siles. p. 295. *Linaria* mitior.
Henffling; *Krauthenffling*.

Jonston, av. p. 99. *Linaria marina*.

Rzaczymsky, auct. hist. nat. Polon. p. 390. *Lina-
ria rubra maior*.

Faun. Arragon. p. 87.

Levin, britt. Birds, II. tab. 84.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Fringilla cana-
bina*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 372. n. 12.
der Hänfing.

β. *Der weiße Hänfing*. *

Büffon, Vögel, XI. p. 31. n. 1.

Latham, Vögel, II. 1. p. 293. n. 4.

Zorn, Petinotheol. II. p. 52.

Naturforsch. XIX. p. 86.

γ. *Der schwarze Hänfing*. *

Latham, Vögel, II. 1. p. 293. n. 5.

Naturforsch. II. p. 2. n. 3.

- d. *Der Hänfling mit schwarzen Füßen, grünlichem Schnabel, und gabelförmigem Schwanz.* *

Büffon, Vögel, XI. p. 31. n. 2.

Latham, Vögel, II. I. p. 294.

- e. *Der Bastardhänfling.* *

Latham, Vögel, II. I. p. 293. n. 6.

67. LINOTA. *Der gemeine Hänfling.* (4)

Briffon, ornith. I. p. 343. n. 29. Linotte.

Büffon, Vögel, XI. p. 13. *der gemeine Hänfling*,
p. 14. *der graue Hänfling*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 291. n. 73. *der gemeine Hänfling*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 457. n. 81. Fringilla
(Linota) fusco-castanea, subtus albida, fascia
alarum longitudinali alba, rectricibus nigris,
marginibus undique albis.

Halle, Vögel, p. 392. n. 398. *der gemeine graue Hänfling*, ohne Karmin.

Cetti, Sardin. II. p. 202. *der braune Hänfling?*

Beseke, Vögel Kurl. p. 79. ad n. 176. *einfärbig brauner Hänfling*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 120. n. 5. β. *der graue Hänfling*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 156. n. 23. *gemeiner grauer Hänfling*; *gemeiner Hänfling*.

Gesner, Vögelb. p. 367. Linaria. *Leinfink*; *Schöffzlein*; *Flachsfinke*; *Henffling*; *Rubin*. Fig. p. 368.

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 6. Linaria.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 294. Linaria. *Henffling*;
Leinfinke; *Flachs-Finke*.

Sibbald, Scot. prodr. P. II. L. 3. p. 18. Linaria
vulgaris.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 390. Linaria;
Aegithus; Miliaria; Linota; Papaverina.

Jonston,

(4) S. die vorhergehende Anmerkung.

Jonston, av. pag. 99. *Linaria*.

Belon, ois. p. 356. *Arydos*; *Salus*. *Linotte*; *Leinotte*; *Lunotte*; *Linette*.

Barrere, ornithol. p. 55. *Passer ex cinereo baeticus*.

Zinnan. Uov. p. 61. tab. 9. fig. 51. *Fanello*.

Hist. Prov. I. p. 511.

Levin, britt. Birds. II. tab. 83.

29. LINARIA. *Der Flachsfinck.*

Müller, *Natursystem*, II. p. 591. n. 29. *der Flachsfinck*.

Leske, *Naturgesch.* p. 264. n. 7. *der kleine rothplättige Hänfling*.

Borowsky, *Thierreich*, III. p. 143. n. 10. *der Flachsfinck*; *Citrinchen*; *Ziserinchen*.

Blumenbach, *Handb. der N. G.* p. 189. n. 9. *Fringilla* (*Linaria*) *remigibus rectricibusque fuscis, in margine obsolete pallido, litura alarum albida; das Citrinchen; Grünslein; Steinschößlein; der Bergzeisig; Meerzeisig; Flachsfinck; Carminhänfling*.

Bechstein, *Naturgesch.* I. p. 520. n. 7. *der Flachsfinck*.

Halle, *Vögel*, p. 391. n. 396. *der kleine Karminhänfling*, p. 392. n. 397. *der kleine Karminhänfling*.

Meyer, *Thiere*, II. tab. 25. *rothplättige Hänfling*.

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 412. n. 349. *der Flachsfinck*; *Zwitscherling*; *Tjchezke*; *Bluthänfling*; *Rothhänfling*; *Krauthänfling*; *Schwarzbärtchen*, etc.

Pennant, *arct. Zool.* II. p. 353. n. 179. *der kleine Rothkopf*; *Karminhänfling*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 811. *der gemeine Hänf-
ling.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 131. *Zwitscher-
lein.*

Klein, av. p. 93. n. 3. *Linaria rubra minor.*

Klein, Vorbereitung, p. 174. n. 3. *das Schwarz-
bärtchen; Zitscherlein, Tschetzke.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 99. n. 3. *Schwar-
bärtchen; rothplattiger Hänfing; Tschätschke.*

Klein, Stemmat. av. p. 18. tab. 18. fig. 10. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. fig. 14.

Gesner, Vögelb. p. 368. *Schöffzerlein; Stockhenff-
ling; Tschütscherlein; Finet, m. e. Fig.*

Briffon, ornithol. I. p. 344. n. 31. *petite linotte de
vignes.*

Büffon, Vögel, XI. p. 310. *das Zitscherlein oder
der Meerzeisig; m. e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 354. *das Zitscherlein.*

Latham, Syn. Suppl. p. 167. *Lesser Redpole.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 295. n. 75. *der Flachs-
fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 458. n. 83. *Fringilla
(Linaria) fusco griseoque varia, subtus albo ru-
fescens, fascia alarum duplici albida, vertice
pectoreque rubris.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 80. n. 176. *der Flachs-
fink.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 121. n. 7. *der Flachs-
fink.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 429. *Tschetzschke.*

Cetti, Sardin. II. p. 202. *der karmosinrothe Hänf-
ling?*

Fischer, Livl. p. 99. n. 158. *Schwarzbärtchen;
Flachsfink.*

Olaassen, Isl. I. p. 312. c. *Audna-Tytlingr?*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 6. *Graafsfinken.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 154. *Irisk?*

Lepechin,

Lepechin, Tageb. d. russ. Reif. III. p. 13. *Hänflinge*.

Egede, Grönl. p. 38. *Irsker*?

Cranz, Grönl. p. 112. *kleine Singvögel, die den Hänflingen gleichen?*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 127. n. 9. *Flachs-fink mit kleinerm Kopfe*.

Storr, Alpenreise, I. p. 79. *Flachsfink*.

Linné, Abhandlung. II. p. 304. n. 132. *der Lein-Fink*.

Naturforsch. XVII. p. 95. n. 194. *der Hänfling; grauer Hänfling; Steinhänfling*, p. 96. n. 196. *Schwarzbärtchen; Tschetzschke*.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 635. *das Zitscherlein*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 65. *Zwitscherling*, p. 66. *Zitscherling*.

Naumann, Vogelfteller, p. 69. *Schättgen, Schitscherling*.

Anweis. Vögel zu fang. p. 249. *Gräselein, oder Meerzeißelein*.

Börner, schles. ökonom. Gesellsch. 1782. p. 103. *Flachsfink*.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 314.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 10. *Linaria minor*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 182. n. 23. *Fringilla (Linaria) remigibus rectricibusque fuscis margine obsolete pallido, litura alarum albida*.

Kramer, Austr. p. 369. n. 9. *Grasel; Meerzeisel; Tschötscherl*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 343. *Querula. Zötscherlin; Schößerle; Stockhenffling; Todtenvogel; Meusevogel*.

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 6. 1. *Linaria rubra*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 391. *Linaria rubra minor*.

Jonston, av. p. 99. *Linaria rubra*.

Faun. Arragon. p. 87. —

Roman. ornithol. p. 137. tab. 21.

Barrington, miscellan. p. 217.

Levin, britt. Birds. II. tab. 85.

Bomare, dictionn. V. p. 151. petite *Linote de vigne*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Fringilla Linaria*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 373. n. 12. *das Citrinchen*.

68. MONTIUM. *Der Berghänfing*. (5)

Klein, av. p. 93. n. 2. *Linaria fera*.

Klein, Vorbereit. p. 173. n. 2. *Steinhänfing*.

Klein, verbeß. Vögelhistor. p. 99. n. 2. *Steinhänfing*.

Klein, Stemmat. av. p. 18. tab. 18. fig. 9. a. b.

Briffon, ornith. I. p. 346. *Linotte de montagne*.

Büffon, Vögel, XI. p. 33. *der Steinhänfing*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 297. n. 76. *der Berghänfing*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 459. n. 84. *Fringilla* (Montium) nigro rufescenteque varia, subtus albida, pennis in collo inferiore medio nigris, fascia alarum alba, uropygio rubro.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 627. *der Steinhänfing*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 294. *Linaria fera*; *Saxatilis*. *Stein-Henfing*.

β. *Der*

- (5) S. vorher. Anmerk. 3. cf. *Bechstein*, N. G. Deutschl. III. p. 593. 594. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 297. n. 1. — Uebri-
gens muß man sich hüten, daß man nicht wegen der Aehn-
lichkeit in der Benennung die Synonymen *Fr. Montana*, *Mon-
ticula*, *Montifringilla* und *Montium* mit einander verwechsle.

β. Der kleine Berghänfing. (6)

Klein, av. p. 93. n. 4. *Linaria pectore subluteo*.

Klein, Vorbereit. p. 174. n. 4. *gelber Quittenhänfing*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 99. n. 4. *gelber Quittenhänfing; gelbkehliger Hänfing*.

Briffon, ornith. I. p. 345. n. 32. *petite Linotte ou Cabaret*.

Büffon, Vögel, XI. p. 36. *der kleine Hänfing*; m. e. Fig.

Pennant, arct. Zool. II. p. 354. C. *der Berghänfing*.

Latham, Vögel, II. I. p. 297. n. 76. Var. A. *der kleine Hänfing*.

Leem, Finnm. p. 137. *noch eine Art von lieblich singenden Vögeln, etc.?*

Belon, hist. nat. des ois. III. p. 31. *Picaveret*.

Levin, britt. Birds. II. tab. 86.

69. ARGENTORATENSIS. Der Straßburgische Hänfing. (7)

Briffon, ornithol. I. p. 346. n. 34. *Linotte de Straßbourg*.

Büffon, Vögel, XI. p. 32. *der straßburgische Hänfing oder Gyntel*.

Gesner, Vögelb. p. 150. *Gintel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 298. n. 77. p. 293. n. 3. *der Straßburger Hänfing*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 460. n. 87. *Fringilla (Argentoratensis) fusca, subtus rufa, fuscomaculata, abdomine infimo albido*.

Aldrovand. orn. p. 825. *Gyntel*.

Ll 3

70. AN-

(6) Nach Briffon eine eigne Gattung.

(7) Nach Bechstein eine Varietät vom gemeinen Hänfing. S. vorher. Anmerk. 3.

70. *ANGOLENSIS. Der angolische Fink. (*)*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 100. n. 9. *angolischer Hänfling*.

Briffon, ornithol. I. p. 368. n. 71. Linotte d'Angola.

Büffon, Vögel, XI. p. 41. *die Vengaline*; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. 1. p. 299. n. 78. *der Angolische Fink*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 460. n. 87. *Fringilla (Angolensis) fusco-cinerea, fusco maculata, subtus spadicea, capistro gulaque nigris, genis guttureque albo-maculatis, uropygio luteo.*

Seligmann, Vögel, V. tab. 24. *zweyerley Hänflinge aus Angola*.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 628. *die Vengaline*.

Philos. Transact. LXIII. p. 254. †

71. *ATRA. Der dunkelbraune Fink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 51. 53. *der braune Hänfling*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 299. n. 79. *der dunkelbraune Fink*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 460. n. 89. *Fringilla (Obscura) fusco-nigricans, pectore uropygioque cinerascens, pennis apice dilutioribus.*

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 60. *der braune Hänfling*.

72. *MACROURA. Der langschwänzige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 300. n. 80. *der langschwänzige Fink*.

Latham,

(*) Ist nicht mit *Fringilla Angolensis* Ed. XII. p. 323. n. 31. — XIII. p. 920. n. 32. b. zu verwechseln.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 460. n. 90. *Fringilla* (Macroura) cauda elongata cuneiformi, corpore fusco-nigricante maculato, subtus cinerascens, rectricibus duabus intermediis marginibusque lateralium virescentibus.

30. PETRONIA. *Der Graufink.*

Müller, Naturfyst. II. p. 591. n. 30. *der Waldfink.*

Halle, Vögel, p. 410. n. 420. *der graubraune Fink; mit gelben Flekken an der Brust.*

Klein, av. p. 96. n. 3. *Fringilla subcana*, macula lutea in pectore.

Klein, Vorbereit. p. 179. n. 3. *Graufinke.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 96. n. 3. *Graufink.*

Klein, Stemmat. av. p. 17. tab. 18. fig. 2. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. fig. 8.

Briffon, ornithol. I. p. 331. n. 6. *Moineau de bois.*

Büffon, Vögel, X. p. 181. *der Graufink; m. e.* Fig. ii. p. 130. not. g.

Batsch, Thiere, I. p. 352. *der Graufink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 164. *Ring Sparrow.*

Latham, Vögel, II. I. p. 248. n. 4. *der Graufink; Ringsperling.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 435. n. 6. *Fringilla* (Petronia) grisea, superciliis albis, gula lutea, rectricibus lateralibus apice intus macula alba.

Cetti, Sardin. II. p. 198. *der wilde Sperling?*

Pallas, Reif. Ausz. III. p. 476. *graue Hänflinge.*

Naturforsch. XVII. p. 94. n. 191. *der Graufinke.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 624. *der Graufink.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 183. not. q. *ein anderer rarer Sperling.*

Jonston, av. p. 96. *passer torquatus.*

Belon, hist. des ois. p. 362. Moineau à la Sulcie ou à collier jaune.

Zinnan. Uov. p. 80. tab. II. fig. 71. *Passera marina*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 218. 219. Fringilla Petronia.

Douudorff, Handb. d. Thiergesch. p. 273. n. 14. der *Waldfink*.

β. Fringilla supra nigro et rufescente varia, subtus cinereo-alba, fascia alarum alba, rectricibus griseo-fuscis extus rufescentibus. * (8)

Latham, Syst. ornithol. I. p. 435. n. 6. β.

Briffon, ornithol. I. p. 329. n. 3. Passer campestris.

Moineau de campagne ou *Friquet*.

Klein, av. p. 88. n. 2. Passer arboreus, montanus ferus.

Klein, Vorbereit. p. 164. n. 2. *Baumesperling*, *Gersten-Felddieb*; *Wald-Weidensperling*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 90. n. 2. *Baumesperling*.

Raj. av. p. 88. 16. Passer Sylvestris.

Albin, orn. III. tab. 65. Red-headed Sparrow.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 5. Passer sylvestris.

Jonston, av. p. 96. Passer in juglandibus degens.

Rzaczyusky, hist. nat. Polon. p. 291. Passer campestris; poln. *Ir*.

Frisch, Vögel, tab. I. fig. 2. *Baumesperling*?

γ. *Passer torquatus*. Briss. ornith. I. p. 330. n. 4. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 436. n. 6. γ.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 6. | *Passer torquatus*.

Schwenk.

(8) *Briffon* nimmt diese und die folgende Var. γ. als eigne Gattungen an; *Latham* aber als Spielarten von *Fringilla Petronia*. Die Ornithologen mögen hier entscheiden.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 323. Passer torquatus.
Ringel-Sperling; Ringelspatz; Feld-Sperling; Wald-Sperling.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 405. Passer torquatus, seu passer campestris. Passer Sylvaticus; poln. *Wrobel lesny, polny, Mazurek.*

73. STULTA. *Der dumme Sperling. (*)*

Briffon, ornith. I. p. 330. n. 5. Moineau fou.

Büffon, Vögel, X. p. 167. *der italienische Sperling.*

Latham, Vögel, II. I. p. 249. n. 5. *der dumme Sperling.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 436. n. 7. Fringilla (Stulta) griseo-rufescens, ferrugineo maculata, subtus flavescens, fascia alarum duplici alba.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 10. Passer stultus.

Jonston, av. p. 96. Passer stultus Bononiensium.

Rom. ornith. I. p. 108.

74. BONONIENSIS. *Der gesprenkelte Sperling.*

Briffon, ornith. I. p. 332. n. 7. Moineau de Bologne.

Latham, Vögel, II. I. p. 249. n. 6. *der gesprenkelte Sperling.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 436. n. 8. Fringilla (Bononiensis) alba nigro subflavoque maculata, subtus albo flavescens, capite albo maculis subluteis vario, rectricibus subflavis.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 2. Passer maculatus, flava cauda.

(*) Nach Büffon eine Varietät von *Fringilla montana*, p. 925. n. 37.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 406. *Passer montanus*, tricolor. *Moschowitz-Sperling*.

Jonston, av. p. 95. *Passer maculatus*.

75. **LEUCURA.** *Der weißschwänzige Sperling.*

Briffon, ornith. I. p. 332. n. 8. Moineau de Bologne à queue blanche.

Latham, Vögel, II. I. p. 249. n. 7. *der weißschwänzige Sperling*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 436. n. 9. *Fringilla* (*Leucura*) *flavicans*, *castaneo-maculata*, *lineolis candidis variegata*, *subtus capiteque albolutescens*, *rectricibus cinereo candicantibus*.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 4. *Passer Albicilla*.

Jonston, av. p. 96. *Passer Albicilla*.

76. **BRACHYURA.** *Der kurzschwänzige Sperling.*

Briffon, ornith. I. p. 332. n. 9. petit moineau de Bologne.

Latham, Vögel, II. I. p. 250. n. 8. *der kurzschwänzige Sperling*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 436. n. 10. *Fringilla* (*Brachyura*) *flavesceus*, *pectore abdomineque magis albicantibus*, *remigibus rectricibusque flavescentibus*.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 9. *Passer brachyurus nostras*.

Jonston, av. p. 96. *Passerculus brachyurus nostras*.

77. **DALMATICA.** *Der dalmatische Sperling.* (9)

Briffon, ornith. I. p. 333. n. 10. Moineau d'Esclavonie.

Latham.

(9) *Latham* vermuthet, daß diese, und die vier vorhergehenden Gattungen vielleicht bloße Spielarten von einer andern, z. E. von *Fringilla Domestica*, *Montana*, oder *Petronia* seyn möchten.

Latham, Vögel, II. 1. p. 250. n. 9. *der Dalmatische Sperling.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 437. n. 11. Fringilla (Dalmatica) rufescens, subtus albida remigibus rectricibusque rufescentibus.

Raj. Syn. p. 87. n. 5. Passer Illyricus.

32. BENGALUS. *Der bengalische Fink.*

Müller, Naturfyst. II. p. 591. n. 32. *der bengalische Fink.*

Briffon, ornith. I. p. 363. n. 6. Bengali.

Büffon, Vögel, XI. p. 62. *der Bengali.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 300. n. 81. *der blaubäuchige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 461. n. 91. Fringilla (Benghalus) dilute caerulea, capite dorsoque griseis, lateribus capitis purpureis.

b. Müller, Naturfyst. II. p. 591. n. 31. *der angolische Spatz.*

Onomat. hist. nat. III. p. 671. *der angolische Fink mit blauem Bauch.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 100. n. 12. *Purpurhänfling.*

Büffon, Vögel, XI. p. 64. *Azulinha.* (portugies.)

Seligmann, Vögel, V. tab. 26. *der Fink mit dem blauen Bauch.*

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 182. n. 24. Fringilla (Angolensis) dorso fusco, abdomine caudaque caeruleis.

33. JAMAICA. *Der Pifang-Fink.*

Müller, Naturfyst. II. p. 591. n. 33. *der jamaikaische Fink.*

Klein, av. p. 89. n. 12. Passer caeruleo-fuscus.

Klein, Vorbereit. p. 167. n. 12. *blaubunter Sperling.*

Klein,

Klein, verb. Vögelhist. p. 91. n. 11. *blaubunter Sperling*.

Briffon, ornith. I. p. 352. n. 42. Pinçon de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XI. p. 151. *der Banana*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 264. n. 25: *der Pisan-Fink*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 443. n. 29. Fringilla (Jamaica) grisea pectore viridi-caerulescente, remigibus rectricibusque nigris.

78. CANA. *Der grauköpfige Fink*.

Klein, av. p. 89. n. 13. Passer Serino affinis, e cinereo luteo et fusco varius.

Klein, Vorbereit. p. 167. n. 13. *Kanarienbastard*,

Klein, verb Vögelh. p. 91. n. 12. *Canarienbastart*,
mit *Muscitapa atricapilla*, p. 935. n. 10. ver-
wechselt.

Briffon, ornith. I. p. 359. n. 53. Serin de la Jamaïque.

Latham, Vögel, II. 1. p. 264. n. 26. *der grauköpfige Fink*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 443. n. 30. Fringilla (Cana) luteo-fusca subtus lutea, capite gulaque griseis, rectricibus fuscis lineolis albis.

79. SAVANNARUM. *Der Erdfink*.

Klein, av. p. 89. n. 11. Passer pratorum.

Klein, Vorbereit. p. 166. n. 11. *Erd-, Wiesen-sperling*.

Klein, verb. Vögelh. p. 91. n. 10. *Wiesensperling*.

Briffon, ornith. I. p. 334. n. 13. Moineau de la Jamaïque.

Latham, Vögel, II. 1. p. 265. n. 27. *der Erdfink*.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 443. n. 31. *Fringilla* (Savannarum) nebulosa abdomine albo, iugulo pectoreque fuscescentibus, remigibus apice superciliisque luteis.

80. COCCINEA. *Der Scharlachfink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 265. n. 28. *der Scharlachfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 444. n. 32. *Fringilla* (Coccinea) fulvo-coccinea, alis caudaque nigris, remigibus fulvo-marginatis, rectricibus apice nigris.

81. PUNICEA. *Der rothbrüstige Fink.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 346. n. 162. *der Fink mit der rothen Brust.*

Latham, Vögel, II. I. p. 266. n. 30. *der rothbrüstige Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 444. n. 34. *Fringilla* (Punicea) nigra, genis corporeque toto subtus coccineis, tectricibus alarum fasciis duabus albis.

82. FERRUGINEA. *Der rostfarbige Fink.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 349. n. 168. *der rostfarbige Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 266. n. 31. *der rostfarbige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 445. n. 35. *Fringilla* (Ferruginea) fusca ferrugineo-marginata, subtus pallida, pectore maculis obscuris, regione oculorum alba.

83. ALBICOLLIS. *Der weißkehlige Fink.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 348. n. 165. *der Fink mit weißer Kehle.*

Briffon, ornith. I. p. 367. n. 68. Moineau de Pensilvanie.

Latham, Vögel, II. 1. p. 267. n. 32. *der weißkehlig Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 166. White-throated Finch.

Latham, Syst. ornith. I. p. 445. n. 36. *Fringilla* (Pensilvanica) nigricans rufo varia, subtus genisque cinereo-alba, fascia oculari nigricante, superciliis fulvis, gula alba.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 94. *der Sperling mit weißer Brust.*

84. FASCIATA. *Der bandirte Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 349. n. 169. *der bandirte Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 267. n. 33. *der bandirte Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 445. n. 37. *Fringilla* (Fasciata) maculata, supra ferruginea, subtus alba, cauda fusca, fasciis numerosis nigricantibus.

85. GRAMINEA. *Der Grasfink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 349. n. 170. *der Grasfink; graue Grasvogel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 268. n. 34. *der Grasfink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 445. n. 38. *Fringilla* (Graminea) cinereo ferrugineo nigroque varia, subtus alba, pectore lateribusque maculatis, genis remigibus rectricibusque fuscis.

86. CINEREA. *Der aschgraue Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 352. n. 177. *der aschgraue Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 268. n. 35. *der aschgraue Fink.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 445. n. 39. Fringilla (Cinerea) fusca, ferrugineo-marginata, capite lateribus lineis duabus gulaque griseis, iugulo griseo, abdomine medio albo.

87. NORTONIENSIS. *Der Fink von Nortonsund.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 350. n. 173. *der Fink von Nortonsund.*

Latham, Vögel, II. I. p. 268. n. 36. *der Nortonsundfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 446. n. 42. Fringilla (Nortonienfis) nigra subtus alba, iugulo ferrugineo-maculato, remigibus caudaque nigricantibus, rectrice extrema linea longitudinali alba.

88. HIEMALIS. *Der Winterfink.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 350. n. 171. *der Winterfink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 269. n. 37. *der Winterfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 446. n. 43. Fringilla (Hiemalis) fusca, nigro-nebulosa, subtus alba, collo inferiore pectore lateribusque fusco-maculatis.

89. STRIATA. *Der gestreifte Fink.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 348. n. 167. *der gestreifte Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 269. n. 38. *der streifköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 446. n. 44. Fringilla (Striata) fusca nebulosa, subtus genis gulaque alba, capite vittis tribus nigris, fronte lorisque flavis.

90. PURPUREA. *Der Purpurfink.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 351. n. 175. *der purpurrothe Fink.*

Briffon, ornithol. I. p. 399. n. 8. *Bouvrenil violet de la Caroline.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 269. n. 39. *der Purpurfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 446. n. 45. *Fringilla (Purpurea) subviolacea, ventre candido, remigibus intus, caudaque a medio ad apicem fuscis.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 82. *der purpurfarbne Fink.*

91. ROSEA. *Der rosenfarbige Fink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 186. *der rosenfarbige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 311. n. 105. *der rosenfarbige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 444. n. 33. *Fringilla (Rosea) rosea, capistro argenteo, dorso lituris ex griseo fuscescentibus vario, alis caudaque nigricantibus, rectricum margine exteriori roseo.*

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 9. n. 26. *Fringilla rosea.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 351. ad n. 174. *Fringilla rosea.*

β. *Fringilla nigricans, pennis margine rubris, capite pectoreque coccineis, priore maculis fuscis, abdomine incarnato. **

Latham, Syst. ornith. I. p. 444. n. 33. β.

Latham, Vögel, II. 1. p. 311. ad n. 105.

Pennant, arch. Zool. II. p. 350. n. 174. *der Fink mit carmoisinrothem Kopfe.*

92. *ILIACA. Der Drosselfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 313. n. 113. *der Drosselfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 438. n. 15. *Fringilla* (*Iliaca*) cinereo-olivacea, pennis apice fuscis, subtus alba, pectore maculis griseo-fuscis, remigibus fuscis margine rufis, uropygio caudaque rufis.

34. *TRICOLOR. Der dreyfarbige Fink.*

Müller, Naturyst. II. p. 592. n. 34. *der dreyfarbige Fink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 185. *der dreyfarbigte Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 307. n. 91. *der Fink mit blauem Gesichte.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 101. *Fringilla* (*Tricolor*) nigra, capite uropygioque cyaneis, humeris viridibus, abdomine flavescente.

Bankroft, N. G. von Guian. p. 110. *der amerikanische Sperling des Seba.*

93. *CYANOMELAS. Der blauköpfige Fink.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 172. *der schwarz und blaue Zartschnabel; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 508. n. 92. *der blauköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 102. *Fringilla* (*Cyanomelas*) caerulea, linea frontali gula lunulaque dorsali nigris, remigibus fuscis, cauda nigricante.

94. *PICTA. Der azurköpfige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 308. n. 93. *der azurköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 103. *Fringilla* (*Picta*) purpurascens, vertice alis caudaque

caeruleis, uropygio flavo, collo pectore crisso-
que rubris.

95. *CYANOCEPHALA.* *Der blauhaubige Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 308. n. 94. *der blauhaubi-
ge Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 104. *Fringilla*
(*Cyanocephala*) rubro fusca, vertice uropy-
gioque cyaneis, subtus flava, nucha rubra, or-
bitis albis.

96. *TORQUATA.* *Der Ringelfink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 308. n. 95. *der Rin-
gelfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 105. *Fringilla*
(*Torquata*) subrubra, uropygio caeruleo, lu-
nula gulari nigra, remigibus nigris, caeruleo
terminatis, ad apicem macula alba.

97. *MULTICOLOR.* *Der vielfarbige Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 309. n. 96. *der Fink mit
grünem Steiße.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 106. *Fringilla*
(*Multicolor*) nigra, subtus flavescens, dorso
infimo femoribusque viridibus, tectricibus ala-
rum macula remigumque secundariarum fascia
alba.

35. *MAJA.* *Der Maja.* (10)

Müller, Naturfyst. II. p. 592. n. 35. *der Purpur-
fink.*

Briffon, ornithol. I. p. 366. n. 66. *Maia de Cuba.*

Buffon, Vögel, XI. p. 79. *der Maja*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 315. n. 86. *Cuba Finch.*

Latham, Vögel, II. I. p. 305. n. 86. *der Fink von
Cuba.*

Latham,

(10) Ist nicht mit *Lexia Maja*, p. 849. n. 11. zu verwechseln.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 462. n. 96. *Fringilla*
(*Maia*) *purpurascens fascia pectorali saturat-*
tiore.

Samml. zur Physf. u. N. G. II. p. 629. *der Maia.*
Charleton, onom. zoic. p. 112. n. 4. *Maja.*

Jonston, av. p. 171. *Maia.*

36. DOMESTICA. *Der gemeine Sperling.* (1)

Müller, Naturyst. II. p. 592. n. 36. *der Sperling.*

Leske, Naturgeschichte. p. 364. n. 8. *der Haus-*
sperling.

Borowsky, Thierreich, III. p. 144. n. 11. *der Sper-*
ling; Spatz.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 189. n. 10. *Fringil-*
la (Domestica) remigibus rectricibusque fuscis,
gula nigra, temporibus ferrugineis; der Sper-
ling; Lüning.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 514. n. 3. *der Haus-*
sperling.

Funke, Naturgesch. I. p. 304. *der Sperling.*

Halle, Vögel, p. 366. n. 361. *der Hausperling.*

Meyer, Thiere, II. tab. 87. *Sperling. M. u. W.*

Min 2

Gatte-

(1) Brütet gewöhnlich vier Mal im Jahr, und legt zwar gemeinlich nur 5. bis 6. zuweilen aber auch wohl 8. Eyer. Die Männchen streiten so heftig um die Weibchen, daß sie oft zur Erde niederfallen. Man hat gesehen, daß sie sich wohl 20. Mal nach einander begatten. Vielleicht ist daher der Vogel so sehr zu Krämpfen geneigt. Sechszehn Paar Sperlinge in einem Dorfe, geben 12800. Junge, oder 6400. Paar Sperlinge. Man will auch berechnet haben, daß jeder Sperling jährlich für einen Gulden Gerraide und Feldfrüchte verzehre, und daß in einem Lande von 300. Dörfern sechs Millionen Sperlinge befindlich sind, die jährlich sechs Millionen Gulden Schaden thären. Dem ohnerachtet steht der Nutzen des Sperlings mit dem Schaden den er thut, im Verhältniß. Man hat beobachtet, daß zwey Sperlinge zur Fütterung ihrer Jungen in einer Woche 3260. Raupen gebraucht haben. Das Fleisch ist essbar.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 413.
n. 351. *der Sperling; Spatz; Felddieb; Haus-*
dieb; Gerstendieb; Hausperling; Kornsp r-
ling; Lüning; Speicherdieb; Kornwerfer.

Pennant, arch. Zool. II. p. 356. *G. der Sperling.*
Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 341. Hausperling.
Onomat. hist. nat. VI. p. 200. der gemeine
Sperling.

Handb. der Naturgesch. II. p. 230. der Sperling.
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 132. Sperling.
Klein, av. p. 88. n. 1. *Passer domesticus.*
Klein, Vorbereit. p. 163. n. 1. *Speicherdieb, Korn-*
werfer, Spatz.

Klein, verb. Vögelhist. p. 90. n. 1. *Spatz.*
Klein, Stemmat. av. p. 17. tab. 18. Fig. 1. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. Fig. 7.

Gesner, Vögelb. p. 469. *Spatz; Spar; Hauspar;*
Sperck; Sperlingk; m. e. mittelm. Fig.

Briffon, ornith. I. p. 327. n. 1. *Moineau franc.*

Büffon, Vögel, X. p. 124. *der Hausperling; m.*
2. Figg.

Batsch, Thiere, I. p. 352. *der Hausperling.*

Latham, Syn. Suppl. p. 163. *Houfe Sparrow.*

Latham, Vögel, II. I. p. 242. n. 1. *der Haus-*
sperling.

Latham, Syst. ornith. I. p. 432. n. 1. *Fringilla*
(*Domestica*) *remigibus rectricibusque fuscis,*
corpore griseo nigroque, fascia alarum alba
solitaria.

Beseke, Vögel Kurl. p. 80. n. 177. *der Sperling.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 122. n. 8. *der Haus-*
sperling; Spaarling; Lüning.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 429. *der Sperling.*

Cetti, Sardin. II. p. 197. *der Hausperling.*

Fischer, Livl. p. 100. n. 159. *Sperling.*

Pallas, Reise Ausz. III. p. 373. *Sperlinge.*

Pontop.

- Pontoppidan*, Dännem. p. 174. n. 7. *Spurv.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 185. *Spurre; Haas-*
Kald.
S. G. Gmelin, Reif. d. Rufsl. III. p. 327. 328.
Linné, Abhandl. II. p. 305. n. 133. *der Sperling.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 181. n. 220. *der*
Hausperling.
Günther, Nest. u. Ey. tab. 57. *Rauch-Sperling.*
Sander, oekonom. Naturgesch. II. p. 34. *Sperling.*
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 623. der Haus-
sperling.
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 391. n. 12. *der Sperling.*
Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorf. III. p. 165.
Sperling.
Bechstein, Must. schädl. Th. p. 135. n. 3. *der*
Hausperling.
André u. Bechstein, Spazierg. VI. p. 360. *der*
Hausperling.
Naturforsch. XVII. p. 96. n. 197. der Sperling;
Faulsperling.
Zorn, Petinotheol. II. p. 349. *Haus-Sperling.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 66. *Haus-, Hof-Sper-*
ling.
Naumann, Vogellsteler, p. 201. *Sperling.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 1103. *Sperling.*
Breidenstein, Naturgesch. des Sperlings deutscher
Nation. Gief. 1779. 8.
Borkhausen, Magaz. I. p. 158. *Sperling; Dorf-*
sperling.
Forst-u. Jagdlex. III. p. 437. Sperling.
Neue Mannigfalt. 1776. p. 468. Spatz.
Geoffroy, mater. med. VIII. p. 593. *der Haus-*
sperling.
Anweis. Vögel zu fang. p. 302. Sperling.
Merklein, Thierreich, p. 362. *Sperling.*
Kraft, Ausrott. graus. Th. I. p. 564. *Spatz.*

- Beckmann*, Naturhist. p. 54. a. *der Sperling*.
Schrift. der berlin. Gesellsch. N. Fr. V. p. 153.
Sperlinge.
Allgemein. Magaz. II. p. 104. *Sperlinge*.
Bresl. Nat. u. Kunstgesch. XXIX. Verf. p. 71. XVIII.
Verf. p. 70.
Bresl. Samml. II. p. 97. 180.
Leche: Schwed. Abh. VII. p. 154.
Wittenberg. Wochenbl. IV. p. 245. n. 257. XIII.
p. 89.
Berlin. Intell. Bl. 1784. p. 625.
Berlin. Samml. VIII. p. 278. V. p. 493.
Beckmann, phys. ökon. Bibl. XVI. p. 391. X.
p. 392.
Loniceri, Kräuterb. p. 680. *Spatz*; *Spar*.
Eberhard, Thiergesch. p. 80. *der Sperling*.
Linne, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Passer domesticus*.
Linne, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 12. *Passer domesticus*.
Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 183. n. 27. *Fringilla (Domestica) remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, fascia alarum alba solitaria*.
Kramer, Austr. p. 369. n. 10. *Fringilla remigibus rectricibusque fuscis, gula nigra, temporibus ferrugineis, uropygio testaceo. Hauspatz*.
Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 1. *Passer domesticus*.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 321. *Passer domesticus. Sperling; Sparg*.
Sibbald, Scot. p. 159. *Passer domesticus*.
Rzaczyński, hist. nat. Pol. p. 297. — Auct. p. 406. *Passer domesticus*.
Belon, hist. des ois. p. 361. Moineau.
Prosp. Alpin. Aegypt. I. p. 197. *Passer*.
Jonston, av. p. 98. *Passer domesticus*.

- Schaefer*, element. ornithol. tab. 53.
Roman. ornith. I. p. 99. tab. 16. Fig. 1.
Faun. Arragon. p. 87.
Hist. Prov. I. p. 518.
Ruffel, Alepp. p. 70.
Chefeld. Anatom. cap. 5. ad init. (Scelet.)
Levin, britt. Birds. II. tab. 77.
Zinnar, Uov. p. 79. tab. 11. Passera domestica.
Bomare, diction. V. p. 421. Franc-moineau.
Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla domestica.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 36. L. 30. c. 3. c. 11. c. 15.
 Passeres.
Aelian. de nat. anim. L. 4. c. 38. Στρούθοι.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 373. n. 15.
 der Sperling.

β. *Der weiße Sperling.*

- Briffon*, ornith. I. p. 328. A. Moineau blanc.
Büffon, Vögel, X. p. 128. weiße Sperlinge.
Latham, Syn. II. 1. p. 250. — Suppl. p. 163.
 White Sparrow.
Latham, Vögel, II. 1. p. 243. Var. A. der weiße Sperling.
Latham, Syst. ornith. I. p. 433. n. 1. β.
Beseke, Vögel Kurl. p. 80. n. 177.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 123. n. 8. β.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 182.
Fischer, N. G. von Livl. p. 100.
Naturforsch. I. p. 62. n. 6. — XVI. p. 48. n. 3
 XVII. p. 97. XIX. p. 86.
Zorn, Petinotheol. II. p. 51.
Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 117. n. 6.
Borkhausen, Magaz. I. p. 158.
Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. VI.
 2. p. 118.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 1. *Passer albus*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 322. *Passer niveus*.

Müller, zool. dan. prodr. p. 32. ad n. 263. *Variat. alba*.

Brünniche, ornith. bor. p. 69. *Passeres albi*.

Mus. Wormian. p. 310. *Passer niveus*.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Polon. p. 407.

Jonston, av. pag. 95. *Passer albus*.

γ. *Der gelbe Sperling*.

Briffon, ornith. I. p. 328. B. Moineau jaune.

Büffon, Vögel, X. p. 129. *gelbe Sperlinge*.

Latham, Syn. II. 1. p. 251. Yellow Sparrow.

Latham, Vögel, II. 1. p. 244. Var. B. *der gelbe Sperling*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 433. n. 1. γ. Fr. flava, supra castaneo adumbrata.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 1. *Passer flavus*.

Jonston, av. p. 95. *Passer flavus*.

δ. *Der schwarze Sperling*.

Büffon, Vögel, X. p. 129. ganz schwarze *Sperlinge*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 244. Var. C. *der schwarze Sperling*.

Latham, Syn. Suppl. p. 163. Black Sparrow.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 433. n. 1. δ. Fr. tota nigra.

Müller, zool. dan. prodr. p. 32. ad n. 263. Var. tota nigra.

Brünniche, ornith. bor. p. 69. n. 266. Var. tota nigra.

Aldrov. ornith. II. p. 556. f.

ε. *Der blaue Sperling*. *

Latham, Vögel, II. 1. p. 245. not. p. Var. D.

Scopoli,

Scopoli, Rem. a. d. N. G. I. p. 182. not. q. *schwarzblauer oder dunkelbleyfarbiger Sperling.*

ζ. *Der aschgraue Sperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 245. not. p. Var. E.

η. *Der bunte Sperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 244. not. l.

Naturforsch. I. p. 63. n. 7.

θ. *Der lohgelbe Sperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 245. not. p. Var. G.

Lapeirouse: neue Schwed. Abhandl. III. p. 109.

ι. *Der blaßsemmelfarbene Sperling.* *

Naturforsch. I. p. 63. n. 8.

κ. *Der dunkelbleyfarbene oder mattschwarze Sperling.*

Naturforsch. II. p. 2. n. 2.

λ. *Der Bastardsperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 245. not. p. Var. H. et I.

37. MONTANA. *Der Feldsperling.* (2)

Müller, Natursystem, II. p. 593. n. 37. *der Baumsperling.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 145. n. 12. *der Baum-Bergsperling.*

Mm 5

Bechstein,

(2) Wohnt nicht so wohl in, als neben den Dörfern und Städten, und nistet in den hohlen Bäumen, in Gärten und Weiden, die an Bächen stehen. Findet sich doch aber auch oft in Dörfern auf dem Mithof unter den Hausperlingen. Brütet 2. bis 3. Mal des Jahrs, und legt jedesmal 5, 6, auch 7. Eyer. Die Eyer sind bläulich weiß, und haben dunkel purpurfarbene Flecken, die am stumpfen Ende zusammenfließen. Das Fleisch schmeckt noch angenehmer, als das vom Hausperling. — Nach Latham gehört auch die *Loxia Hamburgensis* hieher.

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 515. n. 4. *der Feldsperling; Feldspatz.*
- Halle*, Vögel, p. 367. n. 362. *der Feldsperling.*
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 409. n. 352. *der Feldsperling; Rothsperling; Bergsperling; Baumsperling; Holzsperling; Muschelsperling.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 347. n. 163. *der Baumsfink; Feldsperling?*
- Neuer Schaupl. d. Nat. VIII.* p. 342. *Feld- Baums- Rothsperling.*
- Onomat. histor. natur. VI.* p. 204. *der Baumsperling.*
- Klein*, av. p. 90. n. 20. *Passer montanus, minimus.*
- Klein*, Vorbereit. p. 168. n. 20. *Bergsperling.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 92. n. 18. *Bergsperling.*
- Briffon*, ornith. I. p. 328. n. 2. *Moineau de montagne.*
- Büffon*, Vögel, X. p. 163. *der Feldsperling.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 353. *der Feldsperling.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 163. *Tree Sparrow.*
- Latham*, Vögel, II. 1. p. 245. n. 2. *der Feldsperling.*
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 433. n. 2. *Fringilla (Montana) remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, alarum fascia alba gemina.*
- Seligmann*, Vögel, VIII. tab. 59. *zwey Gebirgsperlinge; ein Er und eine Sie.*
- Siemsen*, meklenb. Vögel, p. 124. n. 9. *Feldsperling; Feldspaarling; Boomsparling.*
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 431. *Wald- Weiden- Berg- Baumsperling.*
- Fischer*, Liv. p. 100. n. 160. *Bergsperling.*
- Pontop.*

- Pontoppidan*, Dännem. p. 174. n. 8. *Skovspurv*.
Pennant, britt. Thiergesch. p. 124. *Baumsperling*.
Naturforsch. XVII. p. 97. n. 198. *der Baumsperling*; *Zätschker*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 352. *Feld- oder Roth-sperling*.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 183. n. 221. *der Feldsperling*.
Samml. zur Physf. und N. G. II. p. 624. *der Baumsperling*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 67. *Holzmuschel, oder wilder Sperling*.
Bechstein, Must. schädl. Th. p. 137. n. 4. *der Feldsperling*.
André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 232. *Feldsperling*.
Frisch, Vögel, tab. 7. fig. 2. *der Baumsperling*.
Forst- u. Jagdlex. III. p. 437. *Sperling*.
Anweiss. Vögel zu fang. p. 515. *Feldsperling*.
Borkhausen, Magazin, I. p. 158. n. 27. *Feldsperling*.
Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 183. n. 28. *Fringilla* (Montana) remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, alarum fascia alba gemina.
Kramer, Austr. p. 370. n. 11. *Fringilla* remigibus rectricibusque fuscis, vertice spadiceo, uropygio virescente. — *Passer* vertice rubro in cavitatibus arborum nidulans. *Alberti*. — *Feldspatz*; *Rohrspatz*.
Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 3. *Passer montanus*.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 322. *Passer montanus*; *Wald-Sperling*; *Weiden-Sperling*.
Rzaczyns-

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 406. *Passer montanus*.

Jonston, av. p. 95. *Passer montanus*.

Belon, hist. des ois. p. 363. *Friquet*.

Roman. ornith. p. 105. tab. 16. Fig. 2.

Histoire. Prov. I. p. 519.

Zinnan. Uov. p. 81. tab. 12. Fig. 72. *Passera montanino*.

Levin, britt. Birds, II. tab. 78.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 374. n. 16. *der Feldsperling*.

β. *Der weiße Feldsperling*. *

Latham, Vögel, II. I. p. 247. not. z. Var. A.

γ. *Der bunte Feldsperling*. *

Latham, Vögel, II. I. p. 247. not. z. Var. B.

δ. *Der gehaubte Feldsperling*. *

Latham, Vögel, II. I. p. 247. not. z. Var. C.

ε. *Der Bastard-Feldsperling*?

Latham, Vögel, II. I. p. 247. not. z. Var. D.

98. PINETORUM. *Der Fichtensink*. (3)

Lepechin, Tageb. der russ. Reis. II. p. 188. *der Bergspatz*; (russ. *Gornaja Owfsjanka*) tab. 7. fig. 1.

Büffon, Vögel, XI. p. 187. *der Bergspatz*; m. c. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 314. n. 115. *der Fichtensink*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 445. n. 40. *Fringilla* (Pinetorum) supra ex rufescente-testacea, subtus flava, fascia pectorali transversa ferruginea.

99. SYL-

(3) Ist nach *Bechstein* mit *Emberiza Aureola* einerley. S. N. G. Deutschl. III. p. 596.

99. SYLVATICA. *Der Waldfink.* (4)

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. II. p. 189. *der Waldsperling*; (russ. *Ljesnoi Worabei*.) tab. 7. fig. 2.

Büffon, Vögel, XI. p. 190. *der Waldsperling*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 314. n. 116. *der Waldfink*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 446. n. 41. *Fringilla* (*Sylvatica*) capite fasciato, corpore supra griseo nigroque vario, pectore atque imo abdomine canis.

100. HUDSONIA. *Der Fink aus der Hudsons-bay.* (5)

Latham, Vögel, II. 1. p. 313. n. 114. *der Fink aus der Hudsons-bay*.

101. FLAVICOLLIS. *Der gelbkehlige Fink.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 348. n. 166. *der Fink mit gelber Kehle*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 309. n. 97. *der gelbkehlige Fink*.

Latham, Syn. Supplem. p. 168. Yellow-throated Finch.

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 107. *Fringilla* (*Flavicollis*) cinerea subtus albicans, gula alba macula flavescente, remigibus obscuris.

102. CRISTATA. *Der Fink mit schwarzem Gesichte.* (6)

Pennant, arch. Zool. II. p. 350. n. 172. *der Mohr*.
Büffon,

(4) Ist nach *Bechstein* mit *Emberiza Pithyornus* einerley. S. N. G. Deutschl. I. c.

(5) Ist nach *Pennant* und *Latham* mit *Emberiza Hyemalis* einerley.

(6) *Büffon* nimmt die 2te Fig. in den Pl. enl. n. 181. (*Moineau de la Caroline*) als das Weibchen der erstern an. *Pennant* scheint

Büffon, Vögel, X. p. 177. *der gezopfte Sperling aus Karolina*; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syn. Suppl. p. 164.

Latham, Vögel, II. I. p. 247. n. 3. *der Fink mit schwarzem Gesichte*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 434. n. 4. *Fringilla* (Cristata) cristata rubro-fusca, corpore subtus uropygio cristaque coccineis.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 435. n. 5. *Fringilla* (Carolinensis) rubro-fusca, abdomine albo, facie fasciaque pectoris nigra, iugulo uropygioque coccineis.

38. BICOLOR. *Der Bahama-Fink.* (7)

Müller, Natursystem, II. p. 594. n. 38. *der zweyfärbige Sperling*.

Halle, Vögel, p. 377. n. 369. *der schwarze Waldsperling, mit grünlichem Hinterleibe*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 347. n. 164. *der Bahamafink*.

Klein, av. p. 89. n. 9. *Passerculus bicolor, Bahamensis*.

Klein, Vorbereit. p. 166. n. 9. *Grünsperling aus Bahama*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 91. n. 8. *Grünsperling*.

Briffon, ornithol. I. p. 363. n. 59. *Verdier de Bahama*.

Büffon, Vögel, XI. p. 255. *der bahamische Grünsfink*.

Latham,

scheint dies zu bezweifeln. *Latham* macht zwey verschiedene Gattungen daraus; rechnet *Büffons Friquet hupé*, und *Moineau de Cayenne* zu seiner *Fringilla Cristata*; — *Büffons Moineau de Caroline* aber und *Pennants black-faced Finch* zu seiner *Fringilla Carolinensis*. In der Synopf. hielt er noch beyde für einerley.

(7) Ist nicht mit *Loxia Bicolor* zu verwechseln.

Latham, Vögel, II. 1. p. 290. n. 69. *der Bahamafink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 456. n. 75. *Fringilla* (Bicolor) capite pectoreque nigris, dorso alis caudaque obscure virescentibus.

Seligmann, Vögel, II. tab. 74. *der bahamische Sperling.*

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 183. n. 31. *Fringilla* (Zena) capite pectoreque nigris, dorso alis caudaque obscure virescentibus.

103. ABYSSINICA. *Der Worabé.*

Büffon, Vögel, X. p. 279. *der Worabé.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 290. n. 70. *der Fink mit schwarzem Halsbände.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 457. n. 79. *Fringilla* (Abyssinica) flava, subtus collarique cervicis nigra, alis caudaque nigris marginibus flavescens.

104. ULTRAMARINA. *Der Lasur-Vogel.*

Büffon, Vögel, X. p. 281. *der Lasur-Vogel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 290. n. 71. *der Ultramarinfink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 457. n. 78. *Fringilla* (Ultramarina) tota intense caerulea, rostro albo, pedibus rubris.

105. SYRIACA. *Der Habesch.*

Büffon, Vögel, X. p. 282. *der Syrische Habesch.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 291. n. 72. *der Tripolische Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 457. n. 80. *Fringilla* (Syriaca) fusco nigricante flavoque varia, subtus albida maculis obscuris, vertice rubro.

39. CRISPA. *Der Krausfink.*

Müller, Naturfyst. II. p. 594. n. 39. *der Krausfink.*

Briffon, ornithol. I. p. 370. n. 74. Pinçon frisé.

Büffon, Vögel, XI. p. 173. *der gekrausste Fink;*
m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 273. n. 49. *der krause Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 449. n. 56. Fringilla
(Crispa) olivacea subtus lutea, capite nigro,
pennis plurimis recurvatis.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 61. *der gekrausste
gelb und schwarze Sperling.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla crispa.

106. INDICA. *Der indianische Fink.*

Briffon, ornith. I. p. 369. n. 73. Pinçon à collier
des Indes.

Büffon, Vögel, XI. p. 175. *der Fink mit doppel-
tem Halsbände.*

Latham, Vögel, II. I. p. 273. n. 50; *der Fink mit
dem Halsbände.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 449. n. 57. Frin-
gilla (Indica) cinereo-fusca, subtus rufo-alba,
capistiro iugulo torque colli albis, fascia pecto-
rali alis caudaque nigris.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 62. *der Fink mit
einem Halsstreif.*

107. OCHRACEA. *Der ockergelbe Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 169. Oker Finch.

Latham, Vögel, II. I. p. 310. n. 101. *der ocker-
gelbe Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 109. Fringilla
(Ochracea) alba, capite collo inferiore pectore
tectricibusque alarum ochraceis, rostro pedibus-
que flavis.

108. TESTACEA. *Der ziegelrothe Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 169. Testaceous Finch.

Latham, Vögel, II. 1. p. 310. n. 102. *der ziegelrothe Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 110. Fringilla (Testacea) testaceo-ferruginea, nigro nebulosa, remigibus rectricibusque fuscis, rostro pedibusque carnis.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 318. n. 6. Fringilla Erythrophthalma.

p. 874. n. 44. Emberiza Erythrophthalma.

p. 323. n. 31. Fr. Angolenfis.

p. 920. n. 32. Fr. Bengalus. b.

Das Geschlecht ist mit *neun und sechs*zig Gattungen vermehrt. Da aber 2. Gattungen der XII. Edit. anderswohin versetzt, und an deren Stelle neue eingeschaltet worden, so beträgt die Anzahl der neuhinzugekommenen Gattungen überhaupt *ein und sieben*zig. — Bey der 3ten Gattung sind *sieben*, bey der 4ten *drey*, bey der 7ten *neun*, bey der 2iten *zwey*, bey der 23ten *drey*, bey der 25ten *vier*, bey der 36ten *vier* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*I. *Der niedliche Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 168. Lovely Finch.

Latham, Vögel, II. 1. p. 309. n. 98. *der niedliche Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 441. n. 23. Fringilla (Formosa) viridis, gula iuguloque flavescens, abdo-

abdomine albo nigroque fasciato, rostro pedibusque rubris.

Vielleicht das Weibchen von *Fringilla Elegans*, p. 912. n. 61.?

2. *Der Nootka-Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 170. Nootka Finch.

Latham, Vögel, II. 1. p. 310. n. 104. *der Nootka-Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 35. β . *Fringilla tota nigra rostro albo.*

Vielleicht eine Spielart von *Fringilla Nitens*. p. 909. n. 49.?

3. *Der ostindische Sperling.* *Fringilla Inda.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 312. n. 108. *der ostindische Sperling.*

Lichtenstein, hamburgisches Naturalienverzeichniss 1793. p. 46. n. 446.

4. *Der rothschwänzige Fink.* *Fringilla Phoenicurus.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 312. n. 109. *der rothschwänzige Fink.*

Lichtenstein, Naturalienverzeichniss, p. 47. n. 447.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der spitzschwänzige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 311. n. 106. *der spitzschwänzige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 459. n. 85. *Fringilla* (Caudacuta) fusco rufoque varia, superciliis, gula cerviceque rufis, cauda integra, rectricibus omnibus apice acutis.

2. *Der georgische Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 311. n. 7. *der Georgische Fink.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 460. n. 86. *Fringilla* (Georgiana) fusca subtus albida, tectricibus alarum minoribus toto, remigibus rectricibusque extus rufis, gula iuguloque murinis, striga submaxillari divaricata nigra.

3. *Der Kaiserfink*; (in China.)

Latham, Vögel, II. I. p. 310. n. 100. *der Kaiserfink*.

Latham, Syn. Suppl. p. 169. Imperial Finch.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 466. n. III. *Fringilla* (Imperialis) ferrugineo-fusca, vertice subtusque flava, remigibus caudaque brevioribus obscuris.

4. *Der Fink mit rostfarbenem Halsbände*; (auf Terra del Fuego)

Latham, Vögel, II. I. p. 310. n. 103. *der Fink mit rostfarbenem Halsbände*.

Latham, Syn. Supplem. p. 170. Rusty-collared Finch.

Latham, Syst. ornith. I. p. 466. *Fringilla* (Australis) fusca, collari ferrugineo.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.

PHYTOTOMA. *Der Pflanzensäger*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 511. Gen. LXX.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 189. Gen. LXXVI.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 466. Gen. XXXIX.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 375. Gen. LXXXI.

I. RARA. *Die Rara*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 512. *der seltene Pflanzensäger*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 190. *der seltene Pflanzenmäher*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 466. n. 1. *Phytotoma Rara*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 375. *die Rara*.

113. GESCHLECHT. MUSCICAPA. *Der Fliegenfänger. (Fliegenschnäpper.)*

Müller, Naturfyst. II. p. 595. Gen. CXIII.

Leske, Naturgesch. p. 268. Gen. XLIX.

Borowsky, Thierreich, III. p. 175. Gen. LXX.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 190. Gen. XXXV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 529. Gen. LXXIII.

Pennant, arct. Zool. II. p. 358.

Neuer Schaupl. der Nat. III. p. 127.

Onomat. hist. nat. V. p. 668.

Briffon, ornithol. I. p. 257. Gen. XXIV.

Büffon, Vögel, XIV. p. 5. ff.

Batsch, Thiere, I. p. 359.

Latham, Vögel, II. 1. p. 314. Gen. XXXVIII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 467. Gen. XL.

Hermann, tab. affin. anim. p. 228.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 375. Gen. LXXXII.

1. PARADISI. *Der paradiesartige Plattschnabel oder Katondieb.*

Ist schon p. 445. n. II. unter dem Namen *Todus Paradiseus* vorgekommen, und muß also hier wegfallen. — S. zool. Beytr. II. 1. p. 559. n. II. not. 4.

2. MUTATA. *Der veränderliche Fliegenfänger.*

Müller, Naturfyst. II. p. 596. n. 2. *der madagaskarische Fliegenfänger.*

Onomat.

Onomat. hist. nat. IV. p. 371. *der Fliegenfänger aus Madagascar.*

Briffon, ornith. I. p. 276. n. 36. Gobe-mouche à longue queue de Madagascar.

Büffon, Vögel, XIV. p. 113. *der Fliegenfänger Schet*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 336. n. 45. *der veränderliche Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 481. n. 55. Muscicapa (Mutata) capite cristato, cauda cuneata, rectricibus intermediis longissimis, palpebris caeruleis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 116. *der madagaskarische Schet.*

β. *Der Schet-all.* (8)

Briffon, ornithol. I. p. 275. n. 34. Gobe mouche à longue queue de Madagascar.

Büffon, Vögel, XIV. p. 115. *der Schet-all.*

Latham, Syn. II. I. p. 348. n. 45. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 377. n. 45. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 481. n. 55. β.

γ. *Der Schet-Vululu.* (9)

Briffon, ornithol. I. p. 276. n. 35. Gobe mouche à longue queue blanche de Madagascar.

Büffon, Vögel, XIV. p. 116. *der Schet-Vululu.*

Latham, Syn. II. I. p. 348. Var. B.

Latham, Vögel, II. I. p. 337. n. 45. Var. B.

Latham, Syst. ornith. II. p. 481. n. 55. γ.

7. STRIATA. *Der gestreifte nordamerikanische Fliegenfänger.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 363. n. 194. *der gestreifte Fliegenfänger.*

Nn 3

Latham,

(8) Nach Briffon eine eigne Gattung.

(9) Nach Briffon eine eigne Gattung.

Latham, Vögel, II. I. p. 338. n. 46. *der gestreifte Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 481. n. 56. *Muscicapa* (Striata) cinereo-virens, dorso nigro striato, subtus flavescens, gula lateribusque pectoris fusco-maculatis, rectricibus extimis tribus apice albis.

3. MARTINICA. *Der martinikische Fliegenfänger*.

Müller, Naturyst. II. p. 596. n. 3. *der martinikische Fliegenfänger*.

Onomat. hist. nat. V. p. 371. der Martinikische Fliegenfänger.

Briffon, ornithol. I. p. 259. n. 3. *Gobe-mouche hupé de la Martinique*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 49. *der martinikische geschopfte Fliegenfänger*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 341. n. 52. *der Martinikische Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 483. n. 62. *Muscicapa* (Martinica) capite cristato, corpore fusco subtus cinereo, remigum margine exteriori alido.

8. FUSCA. *Der schwarzkappige Fliegenfänger*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 360. n. 186. *der Schwarzkopf*.

Klein, av. p. 74. n. 5. *Luscinia nigricans*. *Muscipeta nigrescens*.

Klein, Vorbereit. p. 139. n. 5. *schwarze Grasmücke*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 75. n. 5. *schwärzliche Grasmücke*.

Briffon, ornithol. I. p. 260. n. 6. *Gobe mouche brun de la Caroline*.

Büffon,

Büffon, Vögel, XIV. p. 52. *der schwärzliche carolinische Fliegenschnäpper*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 341. n. 53. *der schwarzkappige Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 483. n. 63. *Muscicapa (Fusca) fusca subtus albo flavicans, pileo nigro, cauda subforficata*.

Seligmann, Vögel, II. tab. 6. *schwarzer Fliegenstecher*.

4. TYRANNUS. *Der gabelschwänzige Fliegenfänger*.

Müller, Natursystem, II. p. 597. n. 4. *der Tyrann*.

Onomat. histor. natur. V. p. 374. *der Tyrann*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 359. n. 182. *der Gabelschwanz*.

Briffon, ornithol. I. p. 268. n. 2. *Tyrann à queue fourchue*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 93. *der Savannenfliegenfänger*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 343. n. 59. *der gabelschwänzige Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 484. n. 69. *Muscicapa (Tyrannus) cauda longissima forficata, corpore nigro, subtus albo*.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 114. *der Savanna*.

Sander, Groß. u. Schön. d. Nat. III. p. 172. *der Tyrann*.

22. FORFICATA. *Der schwalbenschwänzige Fliegenfänger*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 108. *der Fliegenfänger mit gespaltenem Schwanz*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 344. n. 60. *der schwalbenschwänzige Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 485. n. 70. *Muscicapa* (Forficata) cauda longissima forficata, corpore pallide griseo, subtus albo, tectricibus alarum cinereis albido undulatis, inferioribus rubris.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 115. *der mexikanische Fliegenschnäpper*.

5. *SURINAMA. Der surinamische Fliegenfänger.*

Müller, Naturfyst. II. p. 597. n. 5. *der surinamische Fliegenfänger*.

Onomat. hist. nat. V. p. 374. *der surinamische Fliegenfänger*.

Latham, Vögel, II. I. p. 348. n. 69. *der Surinamische Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 487. n. 78. *Muscicapa* (Surinama) cauda rotundata, apice albo, corpore nigro subtus albo.

23. *FULIGINOSA. Der dunkelbraune Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 54. *der braune Fliegenschnäpper von Cayenne*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 348. n. 70. *der dunkelbraune Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 487. n. 79. *Muscicapa* (Fuliginosa) fusca, flavescente-marginata, subtus albida, pectore subrufo.

24. *AURANTIA. Der orangenbrüstige Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 48. *der gelbrothe Fliegenschnäpper mit pomeranzfarbiger Brust*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 348. n. 71. *der orangenbrüstige Fliegenfänger*.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 487. n. 80. *Muscicapa* (*Aurantia*) rufo virescens, subtus alba, pectore pallide-aurantio, capite cerviceque olivaceo fuscis.

Berlin. Samml. IX. p. 196. *der pomeranzenfarbige Fliegenschnäpper*.

25. *CORONATA. Der gekrönte Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 80. *der rubinrothe geschopfte Fliegenschnäpper*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 348. n. 72. *der gekrönte Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 487. n. 81. *Muscicapa* (*Coronata*) crista erecta rotundata, corpore supra fusco, subtus crista lateribusque capitatis coccineis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 112. n. 9. *der rothe gehäubte Fliegenschnäpper*.

26. *RUFESCENS. Der gelbrothe Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 82. *der gelbrothe Fliegenschnäpper von Cayenne*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 349. n. 73. *der gelbrothe Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 487. n. 82. *Muscicapa* (*Rufescens*) rufescente-nitens, subtus rufo-alba, remigibus nigris, vertice macula rufa.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 111. n. 4. *der braune cayennische Fliegenschnäpper*.

27. *CINEREA. Der aschgraue Fliegenfänger.*

Briffon, ornith. I. p. 277. n. 38. *Gobe-mouche roux de Cayenne*.

Latham, Vögel, II. I. p. 349. n. 74. *der grauhälfige Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 488. n. 83. *Muscicapa* (*Cinerea*) rufo-fusca, abdomine rufescente, capite colloque cinereis, uropygio pectore caudaque rufis.

28. PYGMAEA. *Der Zwergfliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 88. der kleine gefleckte Fliegenvogel von Cayenne. — der kleinste Mückenfänger; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 349. n. 75. der Zwergfliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 488. n. 84. *Muscicapa* (*Pygmaea*) fusco-cinerea, subtus flavescens, capite cerviceque rufis nigro maculatis sub oculis fascia pallida.

29. MINUTA. *Der kleinste Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 88. die erste Art Mückenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 350. n. 76. der kleinste Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. I. p. 488. n. 85. *Muscicapa* (*Minuta*) olivaceo-grisea, dorso supremo corporeque subtus viridi adumbratis, striis alarum flavescens sparsis.

30. BARBATA. *Der bärtige Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 46. der bärtige Fliegenschnäpper; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. I. p. 350. n. 77. der bärtige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 488. n. 86. *Muscicapa* (*Barbata*) olivaceo-fusca, subtus uropygioque virescente flava, vertice aurantio.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. III. n. 3. der bärtige cayennische Fliegenschnäpper.

Dom-

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 176. n. 1.
der bärtige Fliegenschnäpper.

31. RUBRICOLLIS. *Der Piauhau.*

Briffon, ornith. I. p. 265. n. 15. Grand Gobe-
mouche noir de Cayenne.

Büffon, Vögel, XIV. p. 149. *der Piauhau*; m.
e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 350. n. 78. *der purpurkeh-
lige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 489. n. 87. Muscica-
pa (Rubricollis) nigra iugulo maris speciosa
purpureo-coccinea.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 119. *der
Piauhau.*

6. CRINITA. *Der amerikanische Fliegenfänger.* (10)

Müller, Naturfyst. II. p. 597. n. 6. *der amerikani-
sche Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 370. *der amerikanische
Fliegenfänger.*

Klein, av. p. 69. n. 28. Turdus cristatus. Musci-
capa cristata, ventre luteo.

Klein, Vorbereit. p. 132. n. 28. *Schuppdrossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 59. n. 29. *Schopfdrossel.*

Briffon, ornithol. I. p. 272. n. 28. Gobe-
mouche hupé de Virginie.

Büffon, Vögel, XIV. p. III. *der grünggezopfte
Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 360. n. 184. *der Flie-
genfänger mit dem Federbusche.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 344. n. 61. *der Fliegen-
fänger mit dem Federbusche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 485. n. 71. Muscica-
pa (Crinita) capite cristato colloque caerule-
scenti-

(10) Gewicht 1. Unze. Penn.

scintibus, abdomine flavescente, dorso vire-
scente, remigibus rectricibusque rufis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 4. *der gehaubte Flie-
genstecher mit gelbem Bauch.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 116. *der virgini-
sche Fliegenschnäpper mit grüner Kuppe.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 170. n. 10.

Turdus (Crinitus) capite colloque caerule-
scente, abdomine flavescente, dorso virescen-
te, rectricibus remigibusque rufis, capite cri-
llato.

Gentl. Magaz. XXII. tab. p. 556.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 376. n. 2.
der amerikanische Fliegenschnäpper.

32. FEROX. *Der Tyrannenfliegenfänger.*

Briffon, ornith. I. p. 268. n. 21. Tyran de Ca-
yenne.

Büffon, Vögel, XIV. p. 137. *der Tyrann von Ca-
yenne; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 345. n. 62. *der Tyran-
nen Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 485. n. 72. Muscica-
pa (Ferox) fusca, subtus flavescens, collo in-
feriore pectoreque coccineis.

13. *Der kleine cayennische Tyrann.*⁽¹⁾

Briffon, ornith. I. p. 269. n. 22. petit Tyran de
Cayenne.

Büffon, Vögel, XIV. p. 138. *der kleine cayenni-
sche Tyrann.*

Latham, Syn. II. I. p. 358. n. 62. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 345. n. 62. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 485. n. 72. β.

33. Lu-

(1) Nach Briffon eine eigne Gattung.

33. LUDOVICIANA. *Der louisianische Fliegenfänger.*

Buffon, Vögel, XIV. p. 141. *der Louisianische Tyrann.*

Latham, Vögel, II. I. p. 345. n. 63. *der Louisianische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 73. Muscicapa (Ludoviciana) griseo fusca, subtus flavescens, gula cinerea, rectricibus alarum maioribus albo variegatis, remigibus rectricumque marginibus rufis.

Samml. zur Phys. u. Naturgesch. III. p. 118. *der louisianische Tyrann.*

34. AUDAX. *Der Caudec.*

Buffon, Vögel, XIV. p. 139. *der Tyrann Caudec*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 345. n. 64. *der gelbkappige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 74. Muscicapa (Audax) nigricans rufo undulata, subtus flavicans, vertice flavo, capistro albo, uropygio caudaque rufis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 118. *der Caudec.*

9. ATRICAPILLA. *Der gemeine Fliegenschnäpper. (2)*

Müller, Naturyst. II. p. 598. n. 9. *der schwarze Fliegenfänger.*

Leske,

(2) Die richtige Auseinandersetzung der zu dieser Gattung, und den dahin gerechneten Varietäten, gehörigen Synonymen ist mir vielen Schwierigkeiten verbunden. Ich habe sie indeß so geordnet, wie sie nach Anleitung unsers Systems geordnet werden mußten. Neuerlich aber hat *Bechstein* durch die Bekanntmachung vieljähriger eigener Beobachtungen hierüber ein ganz neues Licht verbreitet, daß ich also nothwendig seine Bemerkungen

Leske, Naturgesch. p. 268. n. 1. der schwarzrückige Fliegenfänger.

Borowsky, Thierreich, III. p. 176. n. 2. der schwarze Fliegenfänger.

Blumen-

kungen hier mittheilen muß. Er macht aus diesen Vögeln drey verschiedene Gattungen. 1) Der Fliegenfänger mit dem Halsbände, den er *Muscicapa collaris* genannt wissen will. Dieß ist *Muscicapa atricapilla* Gmel. n. 9. γ. — Pied Fly-catcher Lath. Var. B. — Gobe-mouche noir à collier Buff. — Er ist oben schwarz, um den Hals geht ein weißer Kragen, und die äußere Schwanzfeder hat einen weißen Streifen. Findet sich nur einzeln in Europa und Deutschland. Kommt unter den Vögeln seines Geschlechts zuerst in Thüringen an. Fliegt einzeln, bis zur Mitte des Mayes in den Gärten am Fuß des Thüringer Waldes herum, begiebt sich alsdann tief in die Berge in die Buchwälder, und zieht zu Ende des Augusts wieder weg. Nistet in hohlen Eichen oder auf niedrigen Buchstäen jährlich Einmal. Das Nest besteht aus Moos und Thierhaaren. Legt 4. bis 6. bläulich grüne braungefleckte Eyer. Brütet 14. Tage. — 2) Der schwarzrückige Fliegenfänger. *Muscicapa atricapilla* Linn. — Gobe-mouche de Lorraine Buff. — Pied Fly-catcher Lath. — Frisch tab. 24. Fig. 2. — Ist oben schwarz, unten und an der Stirn weiß, und die beyden äußersten Schwanzfedern haben einen weißen Streifen. — Er ist der dümmste Vogel unter seinen Verwandten, der sich fast mit Steinen todt werfen läßt. Kommt in Thüringen zu Ausgange des Aprills oder zu Anfange des Mayes, etliche Tage nach der vorhergehenden Art in Gesellschaft von 12. bis 20. an, und verschwindet im Septeember unvermerkt. Nistet in hohlen Eichen, Buchen und besonders Aspen. Das Nest besteht nur aus einer Unterlage von Moos und Haaren. Legt 4. bis 6. braunlich gewässerte Eyer. — 3) Der schwarzgraue Fliegenfänger. *Muscicapa Muscipeta* Bechst. — Traquet — Ist am Oberleibe graubraun, und die drey äußersten Schwanzfedern haben einen weißen Fleck. Er kommt in der ersten Hälfte des Mayes etliche Tage nach dem vorhergehenden an, und wird einzeln auf den Feldbäumen, in Alleen und Gärten, und in gebürgigen Gegenden, wo Hölzer, Bäume und Hecken sind, angetroffen. Ist sehr scheu, und versteckt sich gern in den belaubten

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 190. n. 1. Muscicapa (*Atricapilla*) nigra, subtus frontisque macula alarumque speculo albis, recitricibus lateralibus extus albis; *der Fliegenschnäpper*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 530. n. 2. *der schwarze rückige Fliegenfänger*.

Funke, Naturgesch. I. p. 269. *der Fliegenschnäpper*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 364. B. *der scheckige Fliegenfänger*.

Onomat. hist. nat. V. p. 668. *der schwarze Fliegenfänger*.

Klein, av. p. 75. n. 12. *Luscinia alis variegatis*.

Klein, Vorbereit. p. 141. n. 12. *schwarze Grasmücke mit bunten Flügeln*.

Klein, verb. Vögelh. p. 76. n. 12. *schwarze Grasmücke mit bunten Flügeln*.

Brissou, ornithol. I. p. 431. n. 27. *Traquet d'Angleterre*.

Büffon, Vögel, XV. p. 249. *das englische Weißkehlchen*.

Martini, Naturlex. V. p. 50. *englische Bachstelze*.

Halle, Vögel, p. 343. n. 323. *der schwarze Fliegenstecher?*

Latham, Vögel, II. 1. p. 316. n. 2. *der bunte Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 467. n. 2. Muscicapa (*Atricapilla*) nigra, subtus frontisque macula

laubten Aesten, wo ihm die Insecten, die im Schatten ihre Zuflucht suchen, zur Beute werden. Er nistet in Hecken, Büsche und die dichten Zweige der Bäume, z. E. in Lindenalleen, auch in hohle ofne Bäume. Sein Nest besteht aus Moos, zarten Wurzeln, und ist inwendig mit Haaren gefüttert. Er hat unter allen Fliegenfängern noch den meisten Kunsttrieb. Legt 3. bis 5. Eyer, die auf weißem Grunde braune Punkte haben. S. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 317. not. v. — Ist nicht mit *Motacilla atricapilla* zu verwechseln.

cula alarumque speculo albis, rectricibus lateralibus extus albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 59. *die schwarze Grasmücke mit bunten Flügeln*. M. u. W.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 125. n. 1. *der schwarze Fliegenfänger*.

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 432. *der schwarze Fliegenfänger*.

Naturforsch. XVII. p. 97. n. 200. *der schwarze Fliegenfänger*. (Lauter Mischmasch.)

Fabric. Reis. nach Norwegen, p. 334. *Muscicapa atricapilla?*

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 50. *Muscicapa atricapilla*.

Sander, *Groß. u. Sch. in der Nat.* III. p. 171. *der schwarze Fliegenschnapper*.

Borkhausen, *Magaz.* I. p. 172. n. 44. *der schwarze, braune Fliegenfänger*.

Hermann, *tab. affin. anim.* p. 228. 229. *Muscicapa Atricapilla*.

Müller, *zool. dan. prodr.* p. 32. n. 268. *Motacilla* (*Leucomela*) *nigra*, subtus macula alarum lineaque transversa pone rostrum albis?

Levin, *britt. Birds.* III. tab. 88.

Donndorff, *Handb. d. Thiergesch.* p. 376. n. 3. *der gemeine Fliegenschnapper*.

β. *Briffon*, *ornith.* I. p. 264. n. 13. *Gobe-mouche noir*. (3)

Latham, *Vögel*, II. 1. p. 316. n. 2. *Var. A.* cf. not. 1. et p. 319. n. 3.

Latham, *Syst. ornith.* II. p. 468. n. 2. β.

Linne', *Syst. Nat. Ed. VI.* p. 31. n. 17. *Ficedula secunda*.

Jonston, *av.* p. 311. *Ficedula tertia Aldrovandi*.

γ. *Büffon*,

(3) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

γ. Buffon, Vögel, XIV. p. 17. *der schwarzplattige Fliegenfänger*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 316 n. 2. Var. B. cf. p. 318. n. 2.

Latham, Syst. ornith. II. p. 468. n. 2 γ.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 110. *der schwarzrückige, oder der lothringische Fliegenschneider*.
Neueste Mannigfalt. IV. p. 199. *Meerschwarzplättchen*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 383. *der schwarz und weißschreckigte schmätzende Fliegenvogel*.

Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 104. *Muscicapa atricapilla*.

Kramer, Austr. p. 377. n. 16. *Motacilla, fronte, torque, pectore et alarum macula albis, vertice tergo et cauda nigris*. *Meerschwarzplattl; Baumschwalbl*.

10. RUTICILLA. *Der rothschwänzige Fliegenfänger*.

Müller, Naturyst. II. p. 598. n. 10. *der Rothschwanz*.

Onomat. hist. nat. V. p. 373. *der Rothschwanz*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 370. n. 199. *der Schwarzkopf*.

Brissou, ornith. I. p. 264. n. 14. *Gobe-mouche d'Amerique*.

Buffon, Vögel, XIV. p. 73. *der rothschwänzige Fliegenschneider*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 473. n. 22. *Muscicapa (Ruticilla) nigra subtus alba, pectore macula alarum basique remigum rectricumque flavis*.

Seligmann, Vögel, III. tab. 34. *amerikanisches Rothschwänzlein*.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 55. *das kleine amerikanische Rothschwänzlein.*

Pallas, Naturgesch. merkwl. Th. VI. p. 20. *die fünfte Art Plattschnabel.*

β. Seligmann, Vögel, VII. tab. 47. *der Fliegenfänger mit gelbem Schwanz. (das Weibch.)*

Büffon, Vögel, XIV. p. 77 *Edwards Fliegenschnäpper mit gelbem Schwanz.*

II. VIRENS. *Der grünliche Fliegenfänger. (4)*

Müller, Naturyst. II. p. 599. n. II. *der grüne Fliegenfänger.*

Halle, Vögel, p. 324. n. 288. *die falbe Grasmücke, mit braunen Flügeln.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 361. n. 187. *der aschgraue Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 375. *der grüne Fliegenfänger.*

Klein, av. p. 74. n. 7. *Luscinia, Muscicapa fusca.*

Klein, Vorbereit. p. 140. n. 7. *Fahle Grasmücke mit braunen Flügeln.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 75. n. 7. *Falbe Grasmücke mit braunen Flügeln.*

Briffon, ornithol. I. p. 261. n. 7. *Gobe-mouche cendré de la Caroline.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 66. *der braune Fliegenschnäpper aus Carolina; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 339. n. 47. *der aschgraue Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 482. n. 57. *Muscicapa (Virens) fusco-virens, subtus lutea, superciliis albis.*

Seligmann, Vögel, III. tab. 8. *der kleine braune Fliegenstecher.*

35. VIRI.

(4) Gewicht, nach Pennant, neun Pfenniggewicht.

35. VIRIDIS. *Der geschwätzige Fliegenfänger.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 359. n. 183. *der Schwätzer.*

Klein, av. p. 69. n. 26. *Turdus pectore luteo.*

Klein, Vorbereit. p. 131. n. 26. *gelbbrüstige Drossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 69. n. 27. *gelbe Drossel.*

Briffon, ornithol. I. p. 245. n. 55. *Merle vert de la Caroline.*

Büffon, Vögel, IX. p. 157. *die grüne karolinische Amsel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 339. n. 48. *der geschwätzige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 482. n. 58. *Muscicapa (Viridis) obscure viridis, subtus lutea, superciliis maculaque sub oculis candidis, imo ventre fordide albo, rectricibus fuscis.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 100. *die gelbbrüstige Drossel.*

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 171. n. 16. *Turdus (Virens) subtus lutescens, superciliis albis.*

36. SIBIRICA. *Der sibirische Fliegenfänger.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 364. A. *der braune Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 340. n. 49. *der Sibirische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 482. n. 59. *Muscicapa (Sibirica) fusca subtus cinerea, gula crissoque albo maculatis.*

37. ERYTHROPIS. *Der rothstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 340. n. 50. *der Fliegenfänger mit rothem Gesichte.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 482. n. 60. *Muscicapa (Erythropis) supra varia subtus alba, fronte rubra, sub alis rufa.*

12. CAYANENSIS. *Der cayennische Fliegenfänger.*

Müller, Naturfyst. II. p. 599. *der cajennische Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 360. *der Cajennische Fliegenfänger.*

Briffon, ornith. I. p. 270. n. 24. Gobe-mouche de Cayenne.

Büffon, Vögel, XIV. p. 84. *der Fliegenschnäpper mit gelbem Bauche; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 343. n. 58. *der Cayennische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 346. n. 65. *der gelbbäuchige Fliegenfänger.*

Latham, Syn. Suppl. p. 173. Cayenne Fly-catcher.

Latham, Syst. ornith. II. p. 484. n. 68. Muscicapa (Cayanensis) fusca, subtus lutea, superciliis albis, vertice sabaurantio.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. III. n. 4. *der braune cayennische Fliegenfänger.*

13. CANADENSIS. *Der canadische Fliegenfänger.*

Müller, Naturfyst. II. p. 599. n. 13. *der canadische Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 369. *der canadische Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 362. n. 190. *der Canadische Fliegenfänger.*

Briffon, ornith. I. p. 270. n. 25. Gobe-mouche cendré de Canada.

Latham, Vögel, II. I. p. 342. n. 55. *der Canadische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 484. n. 65. Muscicapa (Canadensis) cinerea subtus lutea, loris luteis, vertice nigro maculato.

38. CINNAMOMEA. *Der zimmetfarbige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 342. n. 56. *der zimmetbraune Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 484. n. 66. Muscicapa (Cinnamomea) flavo-cinnamomea nebulosa, subtus uropygio fasciaque rectricum flavescentibus, rectricibus obscuris ferrugineo maculatis.

39. SPADICEA. *Der Fliegenfänger mit gelbem Steiße.*

Latham, Vögel, II. I. p. 342. n. 57. *der Fliegenfänger mit gelbem Steiße.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 484. n. 67. Muscicapa (Spadicea) rubro-fusca, subtus obscure flavesceus, uropygio flavo, remigibus rectricibusque fuscis.

14. OLIVACEA. *Der olivenfarbige Fliegenfänger.*

Müller, Natursystem, II. p. 599. n. 14. *der olivenfarbige Fliegenfänger.*

Onomat. histor. natur. V. p. 372. *der olivenfarbige Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 361. n. 188. *das Rothauge.*

Klein, av. p. 74. n. 6. Luscinia, Muscicapa oculis rubris.

Klein, Vorbereit. p. 139. n. 6. *die bunte Grasmücke mit rothen Augen.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 75. n. 6. *Rothauge*, p. 167. n. 2. *olivenfarbiger Fliegenstecher.*

Brissou, ornithol. I. p. 271. n. 27. *Gobe-mouche de la Jamaïque.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 57. *der olivenfarbige Fliegenfänger von Jamaika; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 340. n. 51. *der rothhängige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 482. n. 61. *Muscicapa* (Olivacea) olivacea, subtus albidior, superciliis albis, oculis rubris.

Seligmann, Vögel, III. tab. 8. *der rothaugige Fliegenstecher.*

Seligmann, Vögel, IV. tab. 43. *der olivenfarbige Fliegenstecher.*

Browne, Jam. p. 476. *Oriolus subolivaceus*, canorus, rostri apice attenuato, adunco.

β. *Briffon*, ornith. I. p. 271. n. 26. *Gobe-mouche olive de Canada.* (†)

Latham, Vögel, II. 1. p. 341. n. 51. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 483. n. 6. β.

15. *SENEGALENSIS.* *Der senegalische Fliegenfänger.*

Müller, Natur Syst. II. p. 600. n. 15. *der Senegalische Fliegenfänger.*

Onomat. histor. natur. V. p. 373. *der Senegallische Fliegenfänger.*

Briffon, ornithol. I. p. 262. n. 10. *Gobe-mouche à poitrine rouge du Sénégal.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 34. *der senegalsche Fliegenschnäpper mit rother Brust.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 321. n. 5. *der Senegalische Fliegenschnäpper.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 470. n. 8. *Muscicapa* (Senegalensis) varia, superciliis albis, rectricibus extimis dimidiato-albis.

β. *Briffon*, ornithol. I. p. 263. *Gobe-mouche à poitrine noire du Senegal.* (†)

Büffon,

(†) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

(6) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Büffon, Vögel, XIV. p. 35. *der Senegalsche Fliegenschnäpper mit schwarzer Brust.*

Latham, Syn. II. 1. p. 329. n. 5. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 322. n. 5. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 470. n. 8. ♂.

40. CRISTATA. *Der gehäubte Senegalsche Fliegenfänger.*

Briffon, ornithol. I. p. 274. n. 33. Gobe-mouche hupé du Senegal.

Büffon, Vögel, XIV. p. 37. *der geschopfte Senegalsche Fliegenschnäpper*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 322. n. 6. *der gehäubte Senegalsche Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 470. n. 9. Muscicapa (Cristata) cristata castanea, subtus cinerea, capite colloque inferiore nigro-virescentibus, rectricibus castaneo-purpureis, cauda elongata.

Samml. zur Physf. und N. G. III. p. 110. *der gehäubte senegallische Fliegenschnäpper.*

41. BORBONICA. *Der bourbonische Fliegenfänger. (7)*

Briffon, ornithol. I. p. 274. n. 32. Gobe-mouche hupé de l'isle de Bourbon.

Büffon, Vögel, XIV. p. 37. *der geschopfte Fliegenschnäpper von der Insel Bourbon*; m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 171. Bourbon Flycatcher.

Latham, Vögel, II. 1. p. 322. n. 7. *der Bourbonische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 470. n. 10. Muscicapa (Borbonica) cristata spadicea, subtus cinerea, capite nigro-virescente, rectricibus pallide spadiceis.

(7) Nach *Büffon* eine Abart vom vorigen.

42. MELANOPTERA. *Der braunkehlige Fliegenfänger.*

Briffon, ornithol. I. p. 261. n. 8. Gobe-mouche à collier du Sénégal.

Büffon, Vögel, XIV. p. 42. *der braunkehlige Fliegenschnäpper*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 323. n. 8. *der braunkehlige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 471. n. 11. *Muscicapa* (Collaris) plumbeo-cinerea, subtus fasciaque alarum alba, collo inferiore subcastaneo, rectricibus nigris, lateralibus apice albis.

43. NIGRIFRONS. *Der schwarzstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 323. n. 9. *der schwarzstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 471. n. 12. *Muscicapa* (Nigrifrons) fusca, subtus fusco-olivacea, fronte lateribusque capitis nigris, gutture flavo.

44. LEUCURA. *Der weißschwänzige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 323. n. 10. *der weißschwänzige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 471. n. 13. *Motacilla* (Leucura) cinereo-grisea, subtus alba, rectricibus lateralibus nigro alboque oblique dimidiatis.

45. PONDICERIANA. *Der coromandelische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 324. n. 11. *der Coromandelische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 471. n. 14. *Muscicapa* (Pondiceriana) cinereo-grisea, subtus alba, superciliis albis, tectricibus alarum albo-maculatis,

tis, rectricibus lateralibus griseo alboque dimidiatis.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 154. *die Grasmücke von Pondichery; Indianische Nachtigall.*

46. AFRA. *Der gelbgefleckte Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 324. n. 12. *der gelbgefleckte Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 472. n. 15. Muscicapa (Afra) fordide flava, maculis obscuris, vertice rufo nigro striato, alis caudaque rufis.

47. CANA. *Der Kinki-Manou.*

Briffon, ornithol. I. p. 266. n. 17. Grand gobe-mouche cendré de Madagascar.

Büffon, Vögel, XIV. p. 142. *der Kinki-Manou;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 324. n. 13. *der aschfarbige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 472. n. 16. Muscicapa (Cana) cinerea, capite saturatiore, rectricibus nigris, duabus extimis apice cinerascens, remigibus intus albis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 119. *Kinkimanou.*

48. MADAGASCARIENSIS. *Der Viva-ombé.*

Briffon, ornith. I. p. 442. n. 46. grand Figuier de Madagascar.

Latham, Vögel, II. I. p. 325. n. 14. *der Madagaskarische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 472. n. 18. Muscicapa (Madagascariensis) viridi-olivacea, gutture flavo, collo inferiore pectoreque flavescens.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 154. der
Vira-ombé aus Madagascar.

49. **UNDULATA.** *Der wellenförmig gezeichnete
Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 32. der *Fliegenschnäpper*
von der Insel Frankreich.

Latham, Vögel, II. I. p. 325. n. 15. der wellen-
förmige *Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 472. n. 19. Musci-
capa (Undulata) albido fuscoque undulatim va-
ria, capite fusco-nigricante, alis rufo-fuscis.

50. **TECTEC.** *Der Tectec.*

Briffon, ornithol. I. p. 258. n. 2. Gobe-mouche
de l'isle de Bourbon.

Büffon, Vögel, XIV. p. 38. 39. not. 1. Muscicapa
borbonica.

Latham, Vögel, II. I. p. 325. n. 16. der *Indische*
Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 473. n. 20. Musci-
capa (Tectec) fusca, pennis rufescente-margi-
natis, subtus rufescens, collo inferiore sordide
albo.

51. **RUFIVENTRIS.** *Der Fliegenfänger mit gelb-
rothem After.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 38. not. o.

Latham, Vögel, II. I. p. 326. n. 17. der *Fliegen-
fänger mit gelbrothem After.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 473. n. 21. Muscicapa
(Rufiventris) nigra, abdomine crisso macula ala-
rum basique caudae fulvo-rufis.

52. **COMATA.** *Der koppige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 326. n. 18. der *koppige*
Fliegenfänger.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 474. n. 25. Muscicapa (Comata) nigra, capite cristato, corpore subtus, uropygio rectricibusque duabus intermediis apice albis, crisso flavo.

53. HAEMORRHUSA. *Der Fliegenfänger mit rothem After.*

Latham, Vögel, II. I. p. 326. n. 19. *der Fliegenfänger mit rothem After.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 475. n. 26. Muscicapa (Haemorrhusa) fusco-undulata, capite subcristato caudaque nigris, pectore abdomineque albis, crisso rubro.

β. *Latham*, Vögel, II. I. p. 326. n. 19. Var. A. *Der Fliegenfänger mit gelbem After.*

Latham, Syn. II. I. p. 335. n. 19. Var. A. Yellow-vented Flycatcher.

Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 26. β. Muscicapa fronte verticeque cristato nigris, lateribus colli, pectore abdomineque albis, crisso flavo.

54. PSIDII. *Der Guava-Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 326. n. 20. *der Guava-Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 27. Muscicapa (Psidii) fusca, subtus superciliisque albis, crisso flavescente, fascia suboculari nigra.

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 24. *der kleine Kujavier.*

55. MELANICTERA. *Der Malkala-kourla.*

Latham, Vögel, II. I. p. 327. n. 21. *der gelbbirgige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 28. Muscicapa (Melanictera) cinereo-fusca luteo mixta, pectore luteo, capite nigro, remigibus rectricibusque obscuris flavescente-marginatis.

56. **NITENS.** *Der grünglänzende Fliegenfänger.*
Latham, Vögel, II. I. p. 337. n. 22. der grüne Fliegenfänger.
Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 29. Muscicapa (Nitens) viridis nitens, gutture pectoreque rufis, uropygio abdomineque flavis, cauda longiore.
57. **SINENSIS.** *Der chinesische Fliegenfänger.*
Latham, Vögel, II. I. p. 327. n. 23. der bekränzte Fliegenfänger.
Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 30. Muscicapa (Sinensis) virescenti-grisea, subtus flavescens capite nigro, superciliis gulaque albis, collo inferiore pectoreque griseis.
58. **GRISEA.** *Der graukehlige Fliegenfänger.*
Latham, Vögel, II. I. p. 328. n. 24. der graukehlige Fliegenfänger.
Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 31. Muscicapa (Grisea) nigra subtus rubescens, collo inferiore faturate-griseo, fascia alarum alba.
59. **FLAVICOLLIS.** *Der gelbhälfige Fliegenfänger.*
Latham, Vögel, II. I. p. 328. n. 25. der gelbhälfige Fliegenfänger.
Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 32. Muscicapa (Flavicollis) viridis, fronte mystacibusque nigris, vertice orbitis collo inferiore maculisque tribus abdominis flavis, rectricibus 2. intermediis apice albis.
60. **FLAMMEA.** *Der pomeranzenfarbige Fliegenfänger,*
Latham, Syn. Suppl. p. 171. Flammeous Flycatcher.
Latham, Vögel, II. I. p. 328. n. 26. der pomeranzenfarbige Fliegenfänger.

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 474. n. 23. Muscicapa (Flammea) nigra, corpore subtus dorso postico fascia alarum caudaque apice fulvis.

61. FUSCESCENS. *Der Fliegenfänger mit orangefarbenem Aftcr.*

Latham, Vögel, II. I. p. 329. n. 27. *der Fliegenfänger mit orangefarbenem Aftcr.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 33. Muscicapa (Fuscescens) subcristata fuscescens, subtus albidula, uropygio crissoque fulvis, cauda subforficata.

62. LUZONIENSIS. *Der Tefscourbé.*

Latham, Vögel, II. I. p. 329. n. 28. *der schwarze Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 34. Muscicapa (Luzoniensis) violaceo-atra, subtus obscure grisea, macula alarum alba.

Sonnerat, Reis. nach Neuguinea, p. 24. *der schwarze Fliegenschnapper.*

63. PHILIPPENSIS. *Der philippinische Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 110. *der philippinische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 330. n. 29. *der Philippinische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 35. Muscicapa (Philippensis) griseo-fusca, subtus alba superciliis albis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 115. *der philippinische Fliegenfänger.*

64. CAERULEA. *Der azurblaue Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 44. *der blaue philippinische Fliegenschnapper.*

Latham,

Latham, Syn. Suppl. p. 172. Azure Flycatcher.

Latham, Vögel, II. I. p. 330. n. 30. *der azurblaue Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 36. *Muscicapa* (Caerulea) caeruleo-nitens, subtus caerulescenti-alba, macula occipitis pectorisque nigra.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. III. der blaue philippinische Fliegenfänger.

65. CYANOCEPHALA. *Der blauköpfige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 330. n. 31. *der blauköpfige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 477. n. 37. *Muscicapa* (Cyanoccephala) saturate rubra, pennis apice nigris, subtus fuscescens, capite atro-caeruleo, cauda forficata, apice nigro.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 23. *der blauköpfige Fliegenschnäpper von der Insel Luçon.*

66. MANILLENSIS. *Der gelbkehlige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 330. n. 32. *der gelbkehlige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 477. n. 38. *Muscicapa* (Manillensis) grisea subtus flava, dorso alisque castaneis, fascia genarum duplici, alarum solitaria, rectricibusque lateralibus albis.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 23. *der gelbkehlige Fliegenschnäpper der Insel Luçon.*

67. FLABELLIFERA. *Der Fächerchwänzige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 331. n. 33. *der Fächerchwänzige Fliegenfänger*, tab. 50.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 477. n. 39. *Muscicapa* (Flabellifera) fusco-olivacea, capite tor-
queque

queque colli nigris, corpore subtus superciliis
macula alarum rectricibusque lateralibus albis.

68. SUPERCILIOSA. *Der Fliegenfänger mit Augenbraunen.*

Latham, Vögel, II. I. p. 332. n. 34. *der Fliegenfänger mit Augenbraunen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 477. n. 40. Muscicapa (Superciliofa) cinerea, subtus incarnata, superciliis rectricibusque duabus intermediis nigris, lateralibus albis.

69. CALEDONICA. *Der neucaledonische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 232. n. 35. *der olivenfarbige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 45. Muscicapa (Caledonica) viridi-olivacea, subtus flavo-albida, gula crissoque flavis, remigibus ferrugineis.

70. LUTEA. *Der dunkelgelbe Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 232. n. 36. *der dunkelgelbe Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 46. Muscicapa (Lutea) obscure-flava, tectricibus alarum remigibusque nigricante-nebulosis, cauda ad apicem nigricante.

71. OCHROCEPHALA. *Der gelbköpfige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 232. n. 37. *der gelbköpfige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 479. n. 47. Muscicapa (Ochrocephala) flavescente viridis subtus alba, capite collo pectoreque aureo-flavis.

72. FLAVIFRONS. *Der gelbstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 333. n. 38. *der gelbstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 479. n. 48. Muscicapa (Flavifrons) flavo olivacea, subtus frontaque flava, pone oculos lunula alba, alis caudaque fuscis.

73. NAEVIA. *Der gesprenkelte Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 333. n. 39. *der gesprenkelte Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 479. n. 49. Muscicapa (Naevia) nigricans subtus pallidior, dorso medio humerisque albo nebulosis.

74. MULTICOLOR. *Der rothbäuchige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 333. n. 40. *der rothbäuchige Fliegenfänger*; tab. 51.

Latham, Syst. ornith. II. p. 479. n. 50. Muscicapa (Erythrogaster) nigra fronte fasciaque alarum albis, pectore abdomineque coccineis.

75. SANDWICHENSIS. *Der Sandwichische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 333. n. 41. *der Sandwichische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 479. n. 51. Muscicapa (Sandvicensis) fusca subtus superciliisque albidis, pectore ferrugineo, rectricibus alarum remigibus rectricibusque lateralibus apice albis.

76. OBSCURA. *Der dunkelfarbige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 334. n. 42. *der dunkelfarbige Fliegenfänger.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 479. n. 52. *Muscicapa* (Obscura) fusca subtus cinerascens, abdomine rufo imbuto, cauda longiore integra, rectricibus apice acutiusculis.

77. MACULATA. *Der gefleckte Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 334. n. 43. *der buntflügelige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 480. n. 53. *Muscicapa* (Maculata) ferrugineo-fusca, subtus fusco-rufescens, rectricibus alarum apice ferrugineo-albis, rectrice extima apice intus alba.

16. CAPENSIS. *Der capische Fliegenfänger.* (").

Müller, Natursystem, II. p. 600. n. 16. *der capische Fliegenfänger.*

Onomat. histor. natur. V. p. 369. *der Capische Fliegenfänger.*

Brissou, ornithol. I. p. 262. n. 9. Gobe-mouche du Cap de bonne espérance.

Latham, Syn. II. 1. p. 327. n. 3. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 320. n. 3. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 468. n. 3. β . M. fusca subtus alba pectore nigro, fascia alarum rufa, rectricibus apice albis.

17. TORQUATA. *Der Fliegenfänger mit dem Halsbande.*

Müller, Natursystem, II. p. 600. n. 17. *der Ringkragen.*

Onomat. hist. nat. V. p. 774. *der Fliegenfänger mit dem Ringkragen.*

Brissou, ornithol. I. p. 263. n. 12. Gobe-mouche à collier du Cap de B. E.

Latham,

(8) Nach *Latham* eine Spielart vom Folgenden.

Latham, Vögel, II. I. p. 318. n. 3. *der Capsche Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 468. n. 3. *Muscicapa* (Torquata) nigra subtus alba, pectore rufo, remigibus intimis apice albis.

78. BICOLOR. *Der schwarz und weiße Fliegenfänger*.

Buffon, Vögel, XIV. p. 63. *der weißbäuchige Fliegenschnäpper von Cayenne*; — *der schwarz und weiße Fliegenfänger des Edwards*; mit e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 320. n. 4. *der schwarz und weiße Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 469. n. 4. *Muscicapa* (Bicolor) corpore subtus fronte orbitis uropygio fascia alarum rectricibusque apice albis.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 38. *der schwarz und weiße Fliegenfänger*.

β. *Buffon*, Vögel, XIV. p. 62. *der Gillit von Cayenne*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 328. n. 4. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 321. n. 4. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 469. n. 4. β. M. alba, occipite cervice alis uropygio caudaque nigris.

18. CAROLINENSIS. *Der Katzenvogel*.

Müller, Natursystem, II. p. 600. n. 18. *der Carolinische Fliegenfänger*.

Onomat. histor. natur. V. p. 360. *der Carolinische Fliegenfänger*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 362 n. 189. *der Katzenvogel*.

Briffon, ornithol. I. p. 260. n. 6. *Gobe-mouche brun de la Caroline*.

Buffon,

Büffon, Vögel, XIV. p. 104. *der virginische Fliegenfänger*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 341. n. 54. *der Katzen-Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 483. n. 64. Muscicapa (Carolinensis) fusca, subtus cinerea, capite nigro, crisso rubro.

Seligmann, Vögel, III. tab. 32. *der Fliegenschnapper mit schwarzer Platte; der Katzenvogel*.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 15.

Bartram, Reis. durch Carolina, p. 297. *der Katzenvogel*.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 15. *der virginische Fliegenschnapper*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 377. n. 4. *der Katzenvogel*.

29. OCHROLEUCA. *Der goldkehlige Fliegenfänger*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 363. n. 193. *die Goldkehle*.

Latham, Syn. Suppl. p. 173. Goldentthroat Flycatcher.

Latham, Vögel, II. I. p. 351. n. 80. *der goldkehlige Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 489. n. 89. Muscicapa (Ochroleuca) olivacea, subtus albida, gula marginataque alarum fulvis, remigibus rectricibusque olivaceo-viridibus.

30. ATRA. *Der Phoebus-Fliegenfänger*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 363. n. 192. *der dunkelbraune Fliegenfänger*.

Latham, Syn. Suppl. p. 173. Phoebe Flycatcher.

Latham, Vögel, II. I. p. 351. n. 79. *der Phoebus-Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 489. n. 88. Muscicapa (Phoebe) cinereo-olivacea subtus flavescens, pectore cinerascens, rectrice extrema latere exteriori alba.

81. NOVEBORACENSIS. *Der Fliegenfänger von Newyork.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 362. n. 191. *der grüne Fliegenfänger.*

Latham, Syn. Suppl. p. 174. Hanging Flycatcher.

Latham, Vögel, II. I. p. 352. n. 83. *der blaßgrüne Fliegenfänger; kleiner grüner Hängenvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 489. n. 92. Muscicapa (Noveboracensis) pallide viridis, capite cinerascens, abdomine medio albo, fascia alarum duplici alba, macula narium lateribusque corporis flavis.

82. ACADICA. *Der neuschottländische Fliegenfänger.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 360. n. 185. *der Neuschottländische Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 174. Lesser crested Flycatcher.

Latham, Vögel, II. I. p. 352. n. 82. *der Neuschottländische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 489. n. 91. Muscicapa (Acadica) subcristata cinereo-viridis, subtus flavescens-alba, fascia alarum duplici alba.

83. AEDON. *Der rothgraue Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 357. n. 95. *der rothgraue Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 42. Muscicapa (Aedon) fusco-ferruginea, subtus flavescens-alba, cauda elongata, rectricibus intermediiis

diis subaequalibus, extrema utrinque longe brevior.

Pallas, Reif. Ausz. III. Anh. p. 5. n. 11 * *Muscicapa Aëdon*.

84. *FERRUGINEA. Der braunrothe Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 357. n. 96. *der braunrothe Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 477. n. 41. *Muscicapa (Ferruginea) fusco-murina*, subtus flavo-alba, gutture candido, alis nigris, pennarum margine ferrugineo.

85. *NIGRA. Der Societäts-Fliegenfänger.*

Latham, Syn. Suppl. p. 174. *Society-Flycatcher.*

Latham, Vögel, II. I. p. 352. n. 84. *der Societäts-Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 474. n. 24. *Muscicapa (Nigra) nigra*, corpore toto nigro, rostro capite interscapulio pedibusque atris.

86. *OCHRACEA. Der afrikanische Fliegenfänger.*

Latham, Syn. Suppl. p. 175. *African Flycatcher.*

Latham, Vögel, II. I. p. 353. n. 87. *der Afrikanische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 472. n. 17. *Muscicapa (Ochracea) collo et pectore cinereo-ferrugineis, alis caudaque nigro-cinereis.*

87. *ALBIFRONS. Der weißstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Syn. Suppl. p. 175. *White-fronted Flycatcher.*

Latham, Vögel, II. I. p. 353. n. 85. *der weißstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 469. n. 5. *Muscicapa (Albifrons) supra nigro-fusca, iugulo et pectore*

fordide albis, abdomine dilute ferrugineo, fronte albida, pedibus nigris.

88. MELANOLEUCA. *Der schäckige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 357. n. 97. *der schäckige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 469. n. 6. *Muscicapa* (Melanoleuca) nigra, dorso albo, femoribus albo nigroque annulatis, rectricibus albis apice nigris.

89. PETECHIA. *Der Peteschen-Fliegenfänger. (*)*

Müller, Naturfyst. II. p. 601. n. 19. *der gefleckte Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 772. *der gefleckte Fliegenfänger.*

Briffon, ornithol. I. p. 259. n. 4. Gobe-mouche brun de la Martinique.

Büffon, Vögel, XIV. p. 106. *der braune martinikische Fliegenfänger*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 347. n. 66. *der Peteschen-Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 75. *Muscicapa* (Petechia) fusca subtus cinerea rufo-maculata, gutture crissoque rufis.

89. VIRGATA. *Der gestrichelte Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 71. *der gefleckte Fliegen-schnäpper von Cayenne*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 347. n. 67. *der gestrichelte Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 76. *Muscicapa* (Virgata) subcristata fusca, subtus sordide alba fusco-striata, fascia alarum duplici rufa.

90. AGI-

(*) Ist nicht mit *Motacilla Petechia*, p. 983. n. 30. zu verwechseln.

90. AGILIS. *Der geschäftige Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 69. *der olivenfarbige Fliegenschnäpper aus Cayenne; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 347. n. 68. *der geschäftige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 77. *Muscicapa (Agilis) fusco-olivacea subtus albida, gutture subrufo, remigibus caudaque nigricantibus.*

20. GRISOLA. *Der gestreifte europäische Fliegenfänger.*

Müller, Naturyst. II. p. 601. n. 20. *der gestreifte Fliegenfänger.*

Leske, Naturgesch. p. 268. n. 2. *der gestreifte Fliegenfänger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 176. n. 3. *der gestreifte Fliegenfänger.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 530. n. 1. *der gestreifte Fliegenfänger.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 606. *der graue Fliegenfänger.*

Onomat. histor. natur. V. p. 371. *der gestreifte Fliegenfänger.*

Klein, av. p. 79. n. 12. *Sylvia pestilentialis.*

Klein, Vorbereit. p. 147. n. 12. *Todtenvogel; Pestilenzvogel; Nosselfinke.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 79. n. 16. *Todtenvogel.*

Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. fig. 9. a — c. *Sylvia fusca.*

Klein, Vögeleyer, p. 25. tab. 10. fig. 7. 8.

Briffon, ornithol. I. p. 257. n. 1. *Gobe-mouche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 10. *der graue gestreifte Fliegenschnäpper; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 314. n. 1. *der gestreifte Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 467. n. 1. *Muscicapa* (Grisea) subfusa subtus albicans, collo longitudinaliter maculato, crisso rufescente.

White, N. G. von Engl. p. 11. *Stopparola?*

White, N. G. von Engl. p. 34 n. 19. p. 49. *Fliegenschnäpper*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 432. *der Todtenvogel*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 126. n. 2. *der gestreifte Fliegenfänger*; *Graag Hüting*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 172. n. 45. *graubrauner Fliegenfänger*.

Naturforsch. XVII. p. 98. n. 202. *der gestreifte Fliegenfänger*.

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 50. *Muscicapa Grisola*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 382. *der Hauß-Schmätzer*.

Samml. zur Physf. und N. G. III. p. 110. *der gemeine oder gestreifte Fliegenschnäpper*.

Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 104. *Muscicapa Grisola*.

Levin, britt. Birds. III. tab. 87.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 277. *der gestreifte Fliegenschnäpper*.

21. VARIEGATA. *Der bunte Fliegenfänger*. (9)

Müller, Naturyst. II. p. 607. n. 21. *der bunte Fliegenfänger*.

Onomat. hist. nat. V. p. 375. *der bunte Fliegenfänger*.

Latham, Vögel, II. I. p. 317. n. 2. *Var. C.*

Latham,

(9) Nach *Latham* eine Spielart von *Muscicapa Atricapilla*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 468. n. 2. d. M. fusca, subtus fronte lateribus capitis lineaque longitudinali ab humero ad dorsum albis.

91. DICHROA. *Der zweyfarbige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 355. n. 91. *der zweyfarbige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 490. n. 94. Muscicapa (Dichroa) corpore supra cinereo subtus ochraceo, cauda et rectricibus ochraceis cinereisque.

92. DESERTI. *Der rusige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 355. n. 92. *der rusige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 44. Muscicapa (Deserti) corpore ex ferrugineo nigricante fuliginoso, alis caudaque nigricantibus, rostro flavicante.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

p. 324. n. 1. Muscicapa Paradisi.

p. 326. n. 7. Muscicapa Emeria.

p. 326. n. 8. Muscicapa Rubra.

Edit. XIII.

p. 445. n. 11. Todus Paradiseus.

p. 305. n. 23. Lanius Emeria.

p. 889. n. 25. Tanagra Aestiva.

Das Geschlecht ist um 71. Gattungen vermehrt. Da aber die 1ste Gattung, weil sie schon anderswo aufgeführt worden, hier wegfallen muß; zwey hingegen in andere Geschlechter versetzt, und an deren Stelle neue aufgenommen worden, so beträgt die Anzahl der

neu hinzugekommenen Gattungen überhaupt zwey und siebenzig. — Bey der 2ten Gattung sind drey, bey der 9ten drey, bey der 10ten zwey, bey der 14ten zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. Muscicapa Meloxantha. *Mus. Carlsf.* IV. n. 97.

Latham, Vögel, II. 1. p. 346. n. 5. der gelbbäuchige Fliegenfänger.

- a. Der weiße Fliegenfänger.

Mus. Carlson. III. tab. 74. Muscicapa alba.

Latham, Vögel, II. 1. p. 354. not. q. der weiße Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 490. n. 96. Muscicapa (Alba) tota alba, capite sulphureo-flavicante.

Vielleicht eine Spielart von *Motacilla Flava*?

3. Muscicapa superciliosa. *Mus. Carlsf.* IV. n. 96.

Latham, Vögel, II. 1. p. 335. n. 90. der stolze Fliegenfänger. Muscicapa superba.

4. Der dunkle Fliegenfänger.

Lichtenstein, hamburg. Naturalienverzeichniß, 1793. p. 48. n. 462. Muscicapa obscura.

Latham, Vögel, II. 1. p. 358. n. 98. der dunkle Fliegenfänger.

5. Der fuchsköpfige Fliegenfänger.

Lichtenstein, l. c. p. 48. n. 463. Muscicapa adf. milis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 358. n. 99. der Fuchsköpfige Fliegenfänger.

6. Der grünbeinige Fliegenfänger.

Lichtenstein, l. c. p. 48. n. 464. Muscicapa Chloropus.

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 358. n. 100. *der grünbeinige Fliegenfänger.*

7. *Der weißgefranzte Fliegenfänger.*

Lichtenstein, l. c. p. 48. n. 462. *Muscicapa Striata.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 358. n. 101. *der weißgefranzte Fliegenfänger.*

8. *Der Fliegenfänger mit weißem Gesichte.*

Lichtenstein, l. c. p. 49. n. 466. *Muscicapa Cristallina.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 358. n. 102. *der Fliegenfänger mit weißem Gesichte.*

9. *Der blaubunte Fliegenfänger.*

Lichtenstein, l. c. p. 49. n. 467. *Muscicapa naevia.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 358. n. 103. *der blaubunte Fliegenfänger.*

10. *Der kleine Todtenvogel.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 432. n. 202.

Naturforsch. XVII. p. 98. n. 202.

Borkhausen, Magazin, I. p. 174. ad n. 45.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der neuholländische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 354. n. 88. *der Neuholländische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 43. *Muscicapa (Novae Hollandiae) fusca subtus albida, sub oculis utrinque ad aures striga flava.*

White, voy. to New South-Wales. tab. p. 161. *Yellow-eared Flycatcher.*

White, Reis. n. Neusüdwallis; in dem Magaz. merkw. Reisebeschr. V. p. 188. *der gelbhörige Fliegenfänger.*

Meyer,

Meyer, Ueberf. der zool. Entdeck. p. 53. n. 1. *Muscicapa novae Hollandiae*.

2. *Der nette Fliegenfänger*; in China.

Latham, Syn. Suppl. p. 173. Nitid Flycatcher.

Latham, Vögel, II. 1. p. 352. n. 81. *der nette Fliegenfänger*

Latham, Syst. ornith. II. p. 489. n. 90. *Muscicapa* (Nitida) pallide viridis, tectricibus alarum margine albo, remigibus rectricibusque nigricantibus, margine flavo.

3. *Der Sperlingsfliegenfänger*; auf der Insel Tanna.

Latham, Syn. Suppl. p. 175. Passerine Flycatcher.

Latham, Vögel, II. 1. p. 353. n. 86. *der Sperlingsfliegenfänger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 490. n. 93. *Muscicapa* (Passerina) nigricans subtus alba, cauda nigra.

4. *Der javanische Fliegenfänger*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 354. n. 89. *der Javanische Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 490. n. 95. *Muscicapa* (Javanica) cauda longissima rotundata, corpore nigro ferrugineoque vario subtus albo, iugulo nigro, superciliis albis.

Mus. Carlson. III. tab. 95. *Muscicapa Javanica*.

5. *Der cambajische Fliegenfänger*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 556. n. 93. *der Cambajische Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 490. n. 97. *Muscicapa* (Cambaiensis) nigra nitens dorso viridiflavescente, corpore subtus fulvo-flavo, tectricibus alarum fascia duplici alba.

6. *Bechsteins kleiner Fliegenfänger*.

Bechst. in, Naturgesch. I. p. 531. n. 4. *der kleine Fliegenfänger*.

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 356. n. 94. *der kleine Fliegenfänger*. *Muscicapa parva*. Abbild. auf dem Titelblatt.

114. GESCHLECHT. MOTACILLA. *Die Motacille. (Bachstelze; Wedelschwanz; Sänger.)*

Müller, Naturfyst. II. p. 602. Gen. CXIV.

Leske, Naturgeschichte, p. 269. Gen. L.

Borowsky, Thierreich, III. p. 183. Gen. LXXII.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 190. Gen. XXXVI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 531. Gen. LXXIV.

Ebert, Naturl. II. p. 140.

Halle, Vögel, p. 317. Gen. I. p. 327. Gen. II. p. 330. Gen. III.

Pennant, arct. Zool. p. 370.

Onomat. hist. nat. V. p. 259.

Klein, av. p. 73. trib. I. *Luscinia*. p. 76. trib. II. *Troglodytes*. p. 77. trib. III. *Sylvia*.

Briffon, ornith. I. p. 413. Gen. XL. *Ficedula*.

Büffon, Vögel, XV. u. XVI. B.

Batsch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXX.

Latham, Syst. ornith. II. p. 501. Gen. XLII. *Motacilla*. p. 506. Gen. XLIII. *Sylvia*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 225. sqq.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 377. Gen. LXXXIII.

1. LUSCINIA. *Die Nachtigall.* (10)

Müller, Naturfyst. II. p. 602. n. 1. *die Nachtigall*.

Leske, Naturgesch. p. 269. n. 1. *die Nachtigall*.

Borows-

(10) Kommt in Deutschland in der Mitte des Aprils an, wenn die Knospen des Weißdorn gebrochen sind. Die Männchen treffen etwa 8 Tage eher als die Weibchen ein, zuweilen noch etwas

Borowsky, Thierreich, III. p. 185. n. 2. *die Nachtigall*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 190. n. 1. *Motacilla* (*Luscinia*) *rufo-cinerea*, *armillis cinereis*; *die Nachtigall*; *Philomele*.

Bechst in. Naturgesch. I. p. 531. n. 1. *die Nachtigall*; *Rothvogel*.

Funk, Naturgesch. I. p. 253. *die Nachtigall*.

Ebert, Naturl. II. p. 141. *die Nachtigall*.

Halle, Vögel, p. 317. n. 281. *die Nachtigall*; *Tagphilomele*; *Rothvogel*; Fig. 18.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 421. n. 357. *die Nachtigall*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 388. A. *die Nachtigall*.

Neuer-Schaupl. d. Nat. VI. p. 11. *Nachtigall*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 885. *die Nachtigall*; *Tag-schläger*; *Dörbling*; *Rothvogel*. Andov.

Handb. der Naturgesch. II. p. 264. *die Nachtigall*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 133. *die Nachtigall*.

Klein,

etwas früher, und singen alle des Nachts vor und nach Mitternacht, um die bey hellen Nächten vorüber streichenden Weibchen an sich zu locken. Nachher hört man sie nicht alle mehr des Nachts schlagen, sondern nur bey dem herannahenden Morgen, und den Tag über abwechselnd; am fleißigsten zu der Zeit, wenn die Weibchen brüten; nachher haben sie mit Fütterung der Jungen zu thun. Die Singzeit dauert etwa drey Monate. Jede Nachtigall hat ihren eignen Stand, den sie alle Jahre wieder aufsucht, und duldet in der Nähe keine andere. In ihrem Gesange hat man 16. verschiedene Absätze gezählt; und der Kreis, den ihre Stimme erfüllt, mag, wenn die Luft stille ist, an eine englische Meile im Durchmesser betragen. Dafs das Weibchen so gut als das Männchen singe, ist eine alte aber irrige Behauptung. Der Gesang ist das einzige untrügliche unterscheidende Zeichen des männlichen Geschlechts. Sonst sind M. u. W. dem äufsern Ansehen nach, nicht zu unterscheiden. Zu Anfang des Septembers ziehen die Nachtigallen wieder weg. — Wird im Käfig 10—17. Jahr alt.

- Klein*, av. p. 73. n. 1. *Luscinia simpliciter*. *Avis rubicunda*.
- Klein*, Vorbereit. p. 138. n. 1. *kleine Nachtigall*; *Rothvogel*; *Dörfling*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 74. n. 1. *kleine Nachtigall*.
- Klein*, Stemmat. av. p. 13. tab. 16. Fig. 1. a. b.
- Klein*, Vögeleyer, p. 24. tab. 10. Fig. 5.
- Gesner*, Vögelb. p. 380. *Nachtigall*; m. e. Fig.
- Briffon*, ornith. I. p. 420. n. 13. *Rosignol*.
- Büffon*, Vögel, XV. p. 7. *die Nachtigall*; m. e. Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 360. *die Nachtigall*.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 180. *Nightingale*.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 506. n. 1. *Sylvia* (*Luscinia*) *rufo-cinerea*, *subtus cinereo-alba*, *rectricibus fusco-rufis*, *armillis cinereis*.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 80. n. 178. *die Nachtigall*.
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 127. n. 1. *die Nachtigall*.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 433. *die Nachtigall*.
- Cetti*, Sardin. II. p. 210. *die Nachtigall*.
- Fischer*, Livl. p. 101. n. 161. *Nachtigall*.
- White*, N. G. von Engl. p. 33. n. 7. p. 59. n. 7. p. 62. n. 1. p. 65. n. 4. p. 77. *die Nachtigall*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 174. n. 1. *Nachtigall*.
- Kämpf*, Japan; in *Du Halde Chin*. IV. p. 142. *Nachtigallen*.
- Isert*, Reif. n. Neuguinea, p. 117. *Nachtigall*.
- Linné*, Reif. d. Schwed. I. p. 320.
- Hasselquist*, Palaeft. p. 343. n. 13. *Motacilla Luscinia*.
- Pallas*, nord. Beytr. III. p. 15. *Nachtigall*.
- Linné*, Abhandl. II. p. 283. n. 38. p. 305. n. 134. *Nachtigall*.
- Pennant*,

Pennant, britt. Thiergesch. tab. 54. *Nachtigall*.
Dieskau, Naturgesch. der Nachtigall. Römh.
 1779. 8.

Scopoli, Bem. aus der N. G. p. 189. n. 227. *die*
Nachtigall.

Beckmann, Naturhist. p. 55. a. *die Nachtigall*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 150. 369. 688. *Nachtigall*.

Aedologie, ou traité du Rossignol franc, ou Chan-
 teur. Paris, 1751. 12.

Aedologie oder Abhandl. von der Nachtigall.
 Strasb. 1752. 12. c. f.

Eberhard, Thiergesch. p. 84. *die Nachtigall*.

Unterricht von den verschiedenen Arten der Ca-
 narienvögel und Nachtigallen. Frcf. u. Lpzg.
 1732. 8.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 63. *Nachtigall*.

Naumann, Vogellsteler, p. 143. *Nachtigall*.

Hervieux, von Canarienvög. p. 162. *die Nach-
 tigall*.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 203. 223. *die Nach-
 tigall*.

Allerneueste Mannigfalt. II. p. 714.

Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. II. 1.
 p. 110. *die Nachtigall*.

Berl. Samml. X. p. 156. *die Nachtigall*.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 226.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 394. n. 13.

Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorseh. III. p. 193.

Beckmann, phys. ökon. Bibl. IV. p. 468. XVI.
 p. 37.

Anweis. Vögel zu fang. p. 396.

Naturforsch. XVII. p. 98 n. 203.

Merklein, Thierreich, II. p. 318.

Börner, Stadt- u. Landwirtsch. II. p. 249.

Neu hamburg. Magaz. XIV. p. 459.

Beckmann, Churmark Brandenb. I. p. 614.

Elshol.

Elsholzens Tischbuch, p. 164.

Tänzer, notabil. venatoris, p. 96. n. 121.

André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 238. 240.

Olla potrida, 1785. p. 70.

Allgemein. Magaz. der Nat. etc. XII. p. 95.

Preufs. Sammler, II. p. 1616.

Wittenberg. Wochenbl. 1777. p. 267.

Neue Anmerk. über alle Theile der Naturl. III.
p. 565.

Hannöv. Magazin, 1778. p. 379.

Aldrov. encomium Lusciniae, — in Donav.

Amph. I. p. 386.

Petri Fradelii laus Lusciniae, 4.

Bresl. Nat. und Kunstgesch. VIII. Verf. p. 453.

Loniceri, Kräuterb. p. 681.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 715.

Oekonom. Zool. p. 100. n. 46.

Meidinger, Vorles. I. p. 153. n. 1.

Schlesf. ökonom. Gesellsch. 1781. p. 104.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. VIII. p. 708.

Onomatol. forestal. II. p. 891.

Zückert, mater. aliment. p. 113.

Wirsing, Vögel, tab. 55. — *Günther*, Nest.
u. Ey. tab. 65. *Nachtigall*.

Hist. Prov. I. p. 498.

Voy. en Barbarie, I. p. 273.

Zinnan. Uov. p. 54. tab. 8. fig. 42. *Rufignuolo*.

Ruffel, Alepp. p. 7.

Gentl. Magaz. XXII. tab. p. 265.

Bomare, dictionn. X. p. 95. — Dictionn. des
anim. III. p. 714. — Cours d'hist. nat. IV.
p. 48.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Luscinia*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 8. *Lusci-
nia*.

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 1. Motacilla (Luscinia) rufo-cinerea, genuum annulis cinereis.

Kramer, Austr. p. 375. n. 9. Motacilla rufo-cinerea, genuum annulis cinereis; *Au-Vogel*; *Auen-Nachtigall*.

Kramer, Austr. p. 376. n. 10. Motacilla toto corpore rufo, subtus pallidiore. *Wald-Nachtigall*; *Wald-Vogel*.

Charleton, onomast. zoic. p. 92. n. 14. Luscinia.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 295. Luscinia, p. 296. Luscinia minor. *Dörling*.

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 286. Luscinia seu Philomela, Aedon, Acredula.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 391. Luscinia minor seu montana.

Belon, hist. nat. des ois. p. 335. Rossignol; Roussignol.

Moehring, av. gen. p. 44. n. 34. Luscinia.

Sibbald, Scot. III. 2. p. 18. obs. 12. Luscinia seu Philomela.

Barrere, ornithol. p. 42. G. 18. sp. 5. Ficedula tota fulva, canora.

Salerne, hist. nat. des ois. p. 230. Rossignol franc; rossignol chanteur; rossignol de bois.

Jonston, av. p. 123. Luscinia.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 29 Luscinia.

Turner, histor. av. voc. Luscinia.

Aelian. de nat. animal. L. 1. c. 43. L. 3. c. 40. L. 5. c. 38. L. 12. c. 28. *Andov.*

Aristot. hist. anim. L. 4. c. 9. L. 5. c. 9. L. 9. c. 15. 49. *Andov.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 377. n. 1. die Nachtigall.

3. Die große Nachtigall. (1)

Borowsky, Thierreich, III. p. 185. *der Sprosser*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 534. n. 2. *der Sprosser*;

Winternachtigall. Motacilla Philomela.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604. b. oben.

Onomat. hist. nat. IV. p. 886. *Nachtphilomele*;
Sprosser; *Sproßvogel*; *Nachtsänger*; *Schläger*;
Φιλομνη.

Halle, Vögel, p. 318. n. 282. *die Nachtphilomele*;
Sprosser.

Klein, av. p. 73. n. 1. *Nacht-Schläger*.

Klein, Vorbereit. p. 138. n. 1. *Sproßvogel*; *Sprosser*;
Nachtschläger.

Klein, verb. Vögelhist. p. 74. n. 1. *große Nachtigall*;
Nachtschläger.

Briffon, ornithol. I. p. 421. A. grand Rossignol.

Büffon, Vögel, XV. p. 59. *die große Nachtigall*.

Latham, Syn. II. 2. p. 411. Var. A. Greater Nightingale.

Latham, Syst. ornith. II. p. 506. n. 1. β. Luseinia maior.

Siemsen, meklenb. Vögel, p. 128. n. 1. β. *der Sprosser*.

Fischer, Livl. p. 101. n. 161. *der Nachtschläger*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 63. *Sprosser*.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 229. *der Sprosser*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 177. n. 50. *die große Nachtigall*.

Anweif. Vögel zu fang. p. 594. *Sprosser*.

Dieskau, Naturgesch. der Nachtigall, p. 12. *der Sprosser*.

Frisch, Vögel, tab. 21. fig. 1. a.

Qq 2

γ. Die

(1) Nach Halle, Bechstein, Borkhausen, u. a. eine eigene Gattung.

γ. Die weiße Nachtigall. (2)

Briffon, ornithol. I. p. 421. B. Rossignol blanc.

Büffon, Vögel, XV. p. 62. die weiße Nachtigall.

Latham, Syn. II. 2. p. 412. Var. B. White Nightingale.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 507. n. 1. β. Luscinia candida.

Naturforsch. XVI. p. 49. weiße Nachtigall.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 229.

Allerneueste Mannigfaltigk. IV. p. 250.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. Luscinia candida.

2. CALIDRIS. Die jamaicaische Motacille.

Müller, Naturfyst. II. p. 604. n. 2. die Grasmücke.

Onomat. hist. nat. V. p. 262. die amerikanische Nachtigall.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 76. n. 18. Jamaicanische Nachtigall.

Briffon, ornithol. I. p. 457. n. 75. grand Figurier de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XVI. p. 163. der große Jamaikaische Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 134. Sylvia (Calidris) fusco-virescens, subtus fulva, linea oculari subocularique nigra, rectricibus apice luteis.

Seligmann, Vögel, V. tab. 16. die amerikanische Nachtigall.

Martini, Naturlex. V. p. 143. amerikanische Nachtigall.

Neueste

(2) Büffon will im *Plinius* gelesen haben, daß eine weiße Nachtigall in Rom 6000. Sesterzien gekostet habe. In einigen Exemplaren, die ich nachgeschlagen habe, lese ich nur sechs Sesterzien.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 248. *amerikanische oder spanische Nachtigall.*

Naturgesch. mit Merian. Kupf. p. 798. n. 35. *der große Feigenvogel von Jamaika.*

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 2. Motacilla (Calidris) supra fusco-virescens, subtus fulva, linea oculari subocularique nigra.

52. BONARIENSIS. *Die Motacille mit weißem Kinne.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 174. *der schwarz und rothgelbe Zartschnabel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 135. Sylvia (Bonariensis) nigra subtus ferruginea, gula loris abdomine medio rectricibusque extimis apice albis.

53. PALMARUM. *Der Bimbele. (3)*

Büffon, Vögel, XVI. p. 176. *der Bimbele, oder unächte Hänfling.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 544. n. 136. Sylvia (Palmarum) fusca, subtus albo-flavescent, uropygio olivaceo, remigibus rectricibusque fuscis.

54. BANANIVORA. *Der Bananist.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 179. *der Bananist.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 544. n. 137. Sylvia (Bananihora) griseo-nigricans, subtus uropygioque flavescente, fascia per oculos nigra, superciliis macula alarum rectricibusque apice albis.

55. VERMIVORA. *Der Wurmfresser.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 378. n. 217. *der Wurmfresser.*

Qq 3

Briffon,

(3) Flügelweite 7. Zoll. Gewicht noch nicht 2 1/2 Drachmen.

Briffon, ornithol. I. p. 457. n. 76. Figuier de Pennsylvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 169. *der Wurmfreßer*.
Onomat. hist. nat. III. p. 903. *die Bachstelze aus Pennsylvanien*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 544. n. 138. Sylvia (Vermivora) viridi-olivacea subtus albida, capite collo subtus pectoreque aurantiis, fascia per oculos arcuque supra nigris, superciliis albis.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 95. *der Wurmfreßer*.

Martini, Naturlex. V. p. 151. *pennsylvanische Bachstelze*.

Naturgesch. mit Merian. Kupf. p. 800.

Encycl. meth. Oiseaux, I. p. 666.

§6. MADAGASCARIENSIS. *Der Foudi-jala*. (4)

Briffon, ornithol. I. p. 422. n. 14. Rossignol de Madagascar.

Latham, Syst. ornith. II. p. 507. n. 2. Sylvia (Madagascariensis) fusco-olivacea, subtus rufofusca, capite rufo, gutture albo, macula pone oculos fusca.

3. MODULARIS. *Die Winternachtigall*. (5)

Müller, Natursyst. II. p. 604. n. 3. *die Baumnachtigall*.

Leske,

(4) Die Trivialbenennung *Madagascariensis*, kommt p. 981. n. 28. nochmals vor.

(5) Nährt sich im Frühjahr von Insekten und Würmern. Im Herbst von Beeren, sonderlich Wacholderbeeren; frisst auch Hanfsamen, und anderes kleines Gesäme. Zahm kann man sie mit Brodt, gekochtem Fleisch, Hirsenkleyen mit Milch, und dergl. unterhalten. Nistet jung aufgezogen, auch im Zimmer. Soll die Blattern bekommen und häufig daran sterben.

- Leske, Naturgesch. p. 269. n. 2. die braungefleckte Grasmücke.
- Borowky, Thierreich, III. p. 186. die Braunelle; Baumnachtigall.
- Bechstein, Naturgesch. I. p. 536. n. 7. die Braunelle: Ifferling.
- Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604. n. 6. braunfleckige Grasmücke.
- Halle, Vögel, p. 322. n. 283. die graufalbe Gesanggrasmücke, Baumnachtigall. *Curruca canora*.
- Halle, Vögel, p. 336. n. 308. das Bleikehlchen.
- Halle, Vögel, p. 336. n. 309. der braune Fliegenstecher.
- Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 424. n. 358. Baumnachtigall; Braunelle; Wollentramper.
- Pennant, arch. Zool. II. p. 391. H. die Baumnachtigall.
- Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 950. Braunelle; Braunellchen.
- Onomat. histor. natur. V. p. 267. die schön singende Bachstelze.
- Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 136. Braunkehlchen, Braunellein.
- Klein, av. p. 77. n. 4. *Sylvia gula plumbea*.
- Klein, Vorbereit. p. 145. n. 4. Bleykehlelein mit gelbgefleckten Augen.
- Klein, verb. Vögelhist. p. 79. n. 6. Bleykehlelein mit gelbgefleckten Augen.
- Gesner, Vögelb. p. 474. *Prunella*.
- Briffon, ornith. I. p. 420. n. 12. Fauvette de Haye ou Passe-buse.
- Büffon, Vögel, XV. p. 129. die Prunell-Grasmücke, oder die Winternachtigall, p. 130. Wintergrasmücke, p. 131. wilder Sperling; Strauch-

Strauchgrasmücke; Falkensperling, p. 132. *Zaun-
sperling*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 360. *die Baumnachtigall*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 511. n. 13. *Sylvia* (Modularis) supra griseo-fusca, tectricibus alarum apice albis, pectore caerulecente-cinereo.

Beseke, Vögel Kurl. p. 80. n. 579. *die Baumnachtigall*.

Fischer, Liv. p. 101. n. 163. *Baumnachtigall*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 436. *die Baumnachtigall*.

Cetti, Sardin. II. p. 212. *die braune Grasmücke*.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 2. *Graairisk; grauer Hänfling?*

Leem, Finnin. p. 136. * * *Graairisk*.

Naturforsch. XVII. p. 100. n. 204. *die Baumnachtigall*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 153 390 *die Brunelle*.

Martini, Naturlex. V. p. 17. *die Baumnachtigall*.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 234. *die braunfleckigte Grasmücke, oder Brunelle*.

Sander, Gross. u. Sch. in der Nat. II. p. 77. *das Braunellein*.

Neueste Mannigfaltigk. III. p. 775. *Baumnachtigall*.

Neues hamburg. Magaz. St. 37. *Baumnachtigall*.

Linne', Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 10. *Passer canus*.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 3. *Motacilla* (Modularis) supra griseo-fusca, tectricibus alarum apice albis, pectore caerulecente-cinereo.

Charleston, onomast. zoic. p. 89. n. 3. *Curruca Hypolais; Passer separius*.

Kramer, Austr. p. 376. n. 14. *Motacilla fusca*, capite cinereo, pectore ochraceo-testaceo, iridibus croceis? — *Braunellerl*, *Prunellerl*.

Rzaczymsky, auct. hist. nat. Polon. p. 416. *Prunella*.

Jonston, av. p. 121. *Muscicapa altera*, *Muscicapa quinta*.

Belon, hist. des ois. p. 375. petit mouchet; m. e. schl. Fig.

Zinnan. Uov. p. 45. tab. 6. fig. 30. *Magnanima Aldr.*

Bomare, diction. IV. p. 370. — Diction. des anim. II. p. 174.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 378. n. 2. die *Winternachtigall*.

57. JUNCORUM. *Der Buschfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 397. n. 240. *der Buschfänger.*

Klein, av. p. 89. n. 10. *Passerculus simpliciter.*

Klein, Vorbereit. p. 166. n. 10. *brauner Zwerg.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 91. n. 9. *brauner Zwerg.*

Briffon, ornithol. I. p. 335. n. 14. *Moineau de Virginie.*

Büffon, Vögel, XI. p. 51. *der kleine braune Sperling des Catesby.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 511. n. 14. *Sylvia (Juncorum) fusca tota, subtus dilutior, cauda subforcipata.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 70. *der kleine Sperling.*

58. AQUATICA. *Die Wassermotacille. (6)*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 510. n. 11. *Sylvia (Aquatica) rufescens, fusco-maculata, abdomine,*

Qq 5

(6) Ich weiß keinen Grund von dieser Benennung anzugeben. *Scopoli* hält den Vogel für die *Binsennachtigall*.

mine, uropygio, maculaque pone oculos albidis, fascia alarum alba.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 195. n. 235. *Sylvia Schoenobaenus*.

4. **SCHOENOBÆNUS.** *Die Binsennachtigall.*

Müller, Natursystem, II. p. 604. n. 4. *die Binsennachtigall*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 391. I. *die Binsennachtigall*.

Briffon, ornithol. I. p. 419. n. 11. Fauvette de bois, ou Rouffette.

Büffon, Vögel, XV. p. 106. *die Waldgrasmücke, oder Rouffette*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 510. n. 10. *Sylvia* (*Schoenobaenus*) testaceo-fusca, subtus pallide testacea, capite maculato, remigibus extus ruf-marginatis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 232. *die Waldgrasmücke*.

Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 52. *M. Schoenobaenus*.

Neueste Mannigfaltigk. III. p. 779. *Binsennachtigall*.

Forškål, fn. arab. p. 6. n. 17. *Abussaej*. — *Descript. anim.* p. 6. n. 17. *Motacilla* (*Schoenobaenus*) supra nigro cinereoque maculata, rectricibus, intermediis exceptis, basi albis.

Hasselquist, Palæst. (Ed. germ.) p. 37. n. 50. *Motacilla* (*Yvica*) corpore fusco-viridescente, pectore ferrugineo.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 9. *Schoenobaenus*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 4. *Motacilla* (*Schoenobaenus*) testaceo-fusca, subtus pallide testacea, capite maculato.

Charlton,

Charleton, exercitat. p. 97. *Lusciniola Bellonii*.

Charleton, onom. zoic. p. 92. *Lusciniola Bellonii*.

Jonston, av. p. 123. *Lusciniola*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 338. Rouffette; m. e. schl. Fig.

Bomare, diction. X. p. 114. — Dict. des anim. III. p. 725.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 379. n. 3. die Binsennachtigall.

5. CAMPESTRIS. Die Feldnachtigall.

Müller, Naturyst. II. p. 608. n. 5. die jamaicaische Nachtigall.

Onomat. histor. natur. V. p. 262. die Grasmücke aus Jamaika.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 81. n. 31. Heckenwenzel.

Briffon, ornithol. I. p. 456. n. 74. Fauvette de Haye de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XVI. p. 185. der einfarbige Zartschnabel; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 544. n. 139. *Sylvia* (Campestris) grisea, capite virescente-cinereo, rectricibus concoloribus, abdomine albido.

Seligmann, Vögel, V. tab. 17. die americanische Grasmücke.

Martini, Naturlex. V. p. 144. Jamaikaische Nachtigall; Feldnachtigall.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 249. Feldnachtigall.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 184. n. 5. *Motacilla* (Campestris) grisea, capite cinereo, rectricibus concoloribus, abdomine albido.

59. MACROURA. Die langschwänzige capsche Motacille.

Büffon, Vögel, XV. p. 147. die gefleckte Grasmücke vom Vorgeb. d. g. H. m. e. Fig.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 545. n. 140. *Sylvia* (*Macroura*) fusca, subtus albo-flavescens, maculis nigricantibus, superciliis albis, cauda cuneiformi elongata.

Martini, Naturlex. V. p. 96. *capische Bachstelze*.

60. LONGICAUDA. *Die langschwänzige chinesische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 545. n. 141. *Sylvia* (*Longicauda*) olivaceo-virescens, vertice rufescente, remigibus fuscis, cauda cuneiformi elongata.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 161. *die kleine langgeschwänzte Grasmücke aus China.*

6. CURRUC. *Die Grasmücke. (7)*

Müller, Natursyst. II. p. 605. n. 6. *der Nachtsänger.*

Leske, Naturgesch. p. 269. n. 3. *die fahle Grasmücke.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 187. n. 4. *der Nachtsänger; große graue Grasmücke; Spottvogel.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 191. n. 2. *Motacilla* (*Curruca*) supra fusca, subtus albida, rectricibus fuscis, extima margine tenuiore alba; *die Grasmücke, der Heckenschmatzer, Weidenzeißig.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 535. n. 5. *die gemeine Grasmücke.*

Funke, Naturgesch. I. p. 256. *die fahle Grasmücke.*

Ebert, Naturl. II. p. 142. *die Grasmücke.*

Halle, Vögel, p. 323. n. 284. *die gemeine Grasmücke; Kuckuksommer; schnarrende schwarz-röthliche Grasmücke.*

Gatterer,

(7) Von ihr werden die meisten Kuckukseier ausgebrütet. Kann über 10. Jahr alt werden.

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere II.
p. 424. n. 359. *die Grasmücke; Grasmücke;
Grasemünke, etc.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 395. U. *die Grasmücke.*

Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 507. *Grasmücke.*

Onomat. hist. nat. III. p. 532. *die Grasmuck.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 892. *die Baumnachtigall;
Grasmücke schlechtweg; hochgelbe Grasmücke;
Grasmücke mit Nachtigallen Gesang.*

Klein, Vorbereit. p. 139. n. 3. *braungefleckte Grasmücke.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 75. n. 3. *braungefleckte Grasmücke.*

Klein, stemmat. av. p. 13. tab. 16. fig. 3. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 24. tab. 10. fig. 6.

Briffon, ornithol. II. p. 417. n. 7. *Fauvette babillarde.*

Briffon, Vögel, XV. p. 97. *die graue oder die geschwätzige Grasmücke; m. e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 361. *die graue Grasmücke.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 509. n. 9. *Sylvia (Curruca) supra fusca, subtus albida, rectricibus fuscis, extrema margine tenuiore alba.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 80. n. 181. *der Nachtsänger.*

Siemsen, meklenb. Vögel, p. 130. n. 2. *die Grasmücke; Grasmügg.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 436. *die Grasmücke; fahlgelbe Grasmücke.*

Fischer, Liv. p. 101. n. 162 *braungefleckte Grasmücke; Nachtigallsknecht.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 3. *Gräßmutte.*

Linné, Abhandl. II. p. 283. n. 38. *Baumnachtigall.*

White, N. G. von Engl. p. 60. n. 3. p. 63. n. 5.
Grasmücke.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 189. n. 228. die
graue Grasemücke; der Spottvogel.

Martini, Naturlex. V. p. 148. *Grasmücke.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 375. *der dem Mönch nicht
unähnliche Dornreich oder Hecken-Schmätzer.*

Naturforsch. XVII. p. 100. n. 205. *der Nacht-
sänger.*

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 51. *die fahle Gras-
mücke; Krukan.*

Samml. zur Physf. und N. G. III. p. 232. *die fahle
Grasmücke.*

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 397. n. 14. *graufleckige
Grasmücke.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 250. *Nachtsänger.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 65. *die Grasemücke.*

Loniceri, Kräuterb. p. 684. *Graßmück.*

Elsholz, Tischb. p. 169. *Grasmücke.*

Zückert, mater. aliment. p. 114.

Seibiz. de aliment. fac. p. 894.

Tänzer, notab. venat. p. 100. n. 126. *Graß-
Mücke.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 409. *Grasmücke.*

Eberhard, Thiergesch. p. 84. *die Grasmücke.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 179. n. 52. *Graß-
mücke.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 21. *Curruca.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 6. *Motacilla
(Curruca) supra fusca, subtus albida, rectrici-
bus fuscis, extrema margine tenuiore alba.*

Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 12. *Canneva-
rola.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 255. *Curruca. Graße-
mücke; Grasemüsche.*

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 17. *Curruca.*

Rzaczyns-

Rzaczyński, hist. nat. Pol. p. 278. Curruca, Anthusia, Hypolais, Passer lepiarius.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Pol. p. 377. Curruca seu passer gramineus.

Jonston, av. p. 125. Hypolais seu Curruca.

Belon, hist. nat. des ois. p. 340. Fauvette brune; m. e. zieml. gut. Fig.

Barrere, ornithol. Cl. 3. Gen. 18. Sp. 2. Ficedula rostro et pedibus luteis maior.

Barrere, l. c. Gen. 24. Sp. 6. Parus subviridis seu Curruca.

Zinnann. Uov. p. 57. tab. 8. Fig. 46. Cannevarola, Faun. Arragon. p. 88.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 6. n. 82. Ὑπολαΐς.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 379. n. 4. die Grasmücke.

61. PASSERINA. Die kleine Grasmücke.

Onomat. histor. natur. III. p. 533. die kleine Grasmücke.

Briffon, ornith. I. p. 414. n. 3. petite Fauvette.

Büffon, Vögel, XV. p. 72. die kleine Grasmücke; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 508. n. 5. Sylvia (Passerina) grisea, subtus cinereo-alba, rufescente varia, abdomine albo, superciliis albidis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 230. die kleine Grasmücke.

Histoir. Prov. I. p. 507. Passerinette.

Zinnann. Uov. p. 46. tab. 6. Fig. 31.

7. HIPPOLAIS. Die Bastardnachtigall. (8)

Müller, Natursyst. II. p. 605. n. 7. die Gelbb Brust.

Bechstein,

(8) Ich habe die Synonymen dieser und der folgenden Gattung so geordnet, wie sie nach Anleitung unsres Systems geordnet werden

Bechstein, Naturgesch. I. p. 542. n. 20. *die Bastardnachtigall*.

Onomat. hist. nat. V. p. 266. *die Grasmücke*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 390. G. *die Bastardnachtigall*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 507. n. 4. *Sylvia* (Hippolais) virescente - cinerea, subtus flavescens, abdomine argenteo, artubus fuscis, superciliis albidis.

Fischer, Zusätze zur N. G. von Livl. p. 50. n. 499. *Gelbbrust; Bastardnachtigall*.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 4. *Motacilla Hippolais*.

Martini, Naturlex. V. p. 70. *Gelbbrust*.

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 51. *Motacilla Hippolais*.

Bechstein: Naturforsch. XVII. p. 39. n. 1. *die Bastardnachtigall*.

Borkhausen, Magaz. I. p. 180. n. 53. *grünlichgraue Grasmücke*.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 56. *Gelbbrust*.

Naumann,

werden mußten; muß aber bemerken, daß *Bechstein* beyde für einerley hält. Auch *Büffon* ist der Meinung, und *Briffon* giebt *Linnés Motacilla Hippolais* als Synonym von seiner *Curruca* an. So ordnete auch *Linné* die Synonymen in der XII. Edition p. 330. n. 7. So viel ist wohl richtig, daß *Bechsteins* Meinung, die *Hippolais* des *Linné*, die *Curruca* des *Briffon*, die *Petty-Chaps* des *Pennant*, und die *Fauvette* des *Büffon* mit einander zu vereinigen, die größte Wahrscheinlichkeit hat, und ich trage kein Bedenken, meine vorige Meinung, da ich beyde trennte, zurückzunehmen. Ihm nach kommt der Vogel als Zugvogel in den letzten Tagen des Aprils, wenn schon die Knospen der Bäume völlig ausgebrochen sind, an, und zieht in den letzten Tagen des Augsts wieder weg. Macht ein sehr niedliches Nest auf kleine Fichten oder hohe Büsche in eine Gabel, legt 5. dunkelfleischfarbene ganz ovale, mit einzelnen dunkelrothen Punkten, besonders nach der Spitze zu, bestreute Eyer, und brütet jährlich nur einmal.

Naumann, Vogellsteler, p. 148. *Schackruthgen*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 19. *Ficedula septima*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X.I. p. 185. n. 7. *Motacilla* (Hippolais) *virescente-cinerea*, subtus *flavesens*, abdomine albido, artubus fuscis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 32. n. 270. *Motacilla* (Hippolais) *virescente-cinerea*, subtus *flavesens*, abdomine albido, artubus fuscis, superciliis albidis.

Kramer, Austr. p. 377. n. 18. *Motacilla* subtus albidia, supra fusca? *braune Grasmücke; kleiner Spottvogel?*

Zinnan, Uov. p. 44. tab. 6. fig. 29?

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 379. n. 5. *die Bastardnachtigall*.

62. HORTENSIS. *Die Gartengrasmücke.* (9)

Briffon, ornith. I. p. 414. n. 2. Fauvette.

Büffon, Vögel, XV. p. 64. *die grüngelbe Grasmücke, oder Bastard-Nachtigall; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 507. n. 3. *Sylvia* (Hortensis) *griseo-fusca*, subtus *rufescente-alba*, superciliis albidis, rectricibus fuscis, extus *griseo-marginatis*, extima oblique dimidiato alba.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 229. *die Grasmücke.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 379. n. 6. *die Gartengrasmücke.*

63. RUF A. *Die kleinste Grasmücke.* (10)

Briffon, ornith. I. p. 418. n. 8. Fauvette rousse. Büffon,

(9) S. die vorhergehende Anmerkung.

(10) Nach Bechstein gehört Frisch kleinste Grasmücke, tab. 24. nicht hieher. Vgl. Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. — Naturforsch. XXVII. p. 50.

Briffon, Vögel, XV. p. 118. *die kleine gelbrothe Grasmücke, oder der Weidenzeisig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 516. n. 27. Sylvia (Rufa) griseo-fusca, subtus superciliisque rufescentibus.

Samml. zur Physf. u. N. G. III. p. 234. *die rothe Grasmücke.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 181. n. 54. *kleinste Grasmücke.*

Jonston, av. p. 115. Passer Troglodytes Bellonii.

Belon, hist. nat. des ois. p. 348 Petite fauvette; Fauvette rousse.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 380. n. 7. *die kleinste Grasmücke.*

8. SALICARIA. *Der Rohrsänger.*

Müller, Naturfyft. II. p. 606. n. 8. *der Rohrsänger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 184. n. 1. *der Rohrsperling; Rohrsänger; Schilfschmätzer; Weidengucker.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 513. n. 22. *der Weiderich.*

Halle, Vögel, p. 323. n. 285. *die kleine braungelbe Grasmücke.*

Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 508. n. 3. *kleine graugelbe Grasmücke.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 392. M. *der Weiderich; Rohrsänger.*

Klein, Vorbereit. p. 139. n. 4. *Weidenmücke; Weidenzeisig; kleine graugelbe Grasmücke.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 75. n. 4. *Weidenmücke.*

Klein, Stemmat. av. p. 13. tab. 16. fig. 2. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 25. tab. 10. fig. 10.

Gesner, Vögelb. p. 548. *Weidenguckerlein; m. e. Fig. fehl.*

Briffon,

Briffon, ornith. I. p. 415. n. 5. Fauvette de roseau.

Büffon, Vögel, XV. p. 112. die Rohrgrasmücke;
Weiderich; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 362. der Rohrsperling oder
Schilfschmatzer.

Latham, Syn. Suppl. p. 118. Sedge Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 516. n. 26. Sylvia
(Salicaria) cinerea subtus alba, superciliis albis.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 436. die Weiden-
mücke.

Fischer, Zuf. zur N. G. von Livl. p. 50. n. 500.
Weidenmücke; *Weidenzeisig*.

White, N. G. von Engl. p. 40. p. 59. n. 16. p. 64.
n. 15. *Weiderich*.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 25. Curruca arundi-
nacea *Briss*.

Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 52. M.
Salicaria.

Bechstein: Naturforsch. XXVII. p. 45. der *Wei-*
derich, p. 47. *Rohrsänger*; *Schilfschmätzer*;
Weidengucker; *Rohrsperling*; *Rohrgrasmücke*;
Rohrschliffer; *Schilfdornreich*; *Weidenmücke*;
Wyderle; *Zyste*.

Naturforsch. XVII. p. 101. n. 206. der *Rohrsänger*.
Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 233. der *Rohr-*
sänger.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 322. *Rohrsänger*.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 185. n. 8. Motacilla
(Salicaria) cinerea subtus alba, superciliis albis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 330. Petronella? *Stein-*
fletsche?

Rzaczymsky, auct. hist. nat. Polon. p. 419. Sali-
caria.

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 17. Avis Stopparolae
similis.

Jonston, av. p. 121. Stopparola alia.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 380. n. 8.
der Rohrsänger.

9. SYLVIA. *Der Waldsänger.* (')

Müller, Naturfyst. II. p. 606. n. 9. *der Waldsänger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 188. n. 5. *der Waldsänger.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 536. n. 6. *das Müllerchen; kleine graue Grasmücke.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604. *die fahle Grasmücke.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 394. S. *das Weißkehlchen; die Steinflötsche.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 309. *der Waldsänger.*

Briffon, ornith. I. p. 415. n. 4. *Fauvette grise ou Grifette.*

Büffon, Vögel, XV. p. 91. *der Waldsänger oder die graue Grasmücke; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 514. n. 23. *Sylvia (Cinerea) supra cinerea, subtus alba, rectrice prima longitudinaliter dimidiato alba, secunda apice alba.*

Frisch, Vögel, tab. 21. Fig. 2. a. *die fahle Grasmücke.*

Bock,

- (1) Die *M. Curruca* und *M. Sylvia* sind einander so ähnlich, daß sie leicht verwechselt werden können. Beyde sind oben grau und unten weiß, mit einiger Beymischung von roth. Sie unterscheiden sich aber 1) durch die Größe. Denn *Mot. Sylvia* ist größer als die *Curruca*. 2) *M. Sylvia* ist am Kopfe aschgrau, am Rücken grau, rostfarbig. Die Schwungfedern an der äußersten Kante sind rostfarbig. *M. Curruca* hat nur eine Farbe, am Kopf und Rücken aschgrau und keine Beymischung von Rostfarbe; ausserdem noch einen kleinen dunklern Fleck hinter dem Ohre, der gar nicht bey der *Sylvia* ist. Beyde halten sich in Gärten auf, und werden *Erbseuvögel* genannt, weil die Gärtner meinen, daß sie den Erbsen Schaden thun. Tengmalm.

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 437. *der Waldsänger.*

Fischer, Livl. p. 102. n. 168. *Waldsänger.*

White, N. G. von Engl. p. 34. n. 9. p. 59. n. 10. p. 64. n. 12. p. 66. n. 5. *Weißkehlchen.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 25. *Motacilla Sylvia.*

Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 51. *Motacilla Sylvia.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 181. n. 56. *der Waldsänger.*

Naturforsch. XVII. p. 101. n. 207. *der Waldsänger.*

Martini, Naturlex. V. p. 195. *Waldsänger.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 231. *die graue Grasmücke. Stopparola.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 415. *Waldsänger.*

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 15. *Cinerea.*

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 185. n. 9. *Motacilla (Sylvia) supra cinerea, subtus alba, rectrice prima longitudinaliter dimidiato alba, secunda apice alba.*

Jonston, av. p. 121. *Stopparola pectore et ventre fere candido.*

Faun. Arragon. p. 83. n. 5.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 380. n. 9. *der Waldsänger.*

B. Brisson, ornithol. I. p. 463. n. 4. *Mefange cendrée.* (2)

Büffon, Vögel, XVII. *die weißkehllichte Meise.*

R r 3

Latham,

(2) Nach Brisson eine eigne Gattung. — Latham hat die Synonymen hier dergestalt geordnet, daß er zur *Motacilla Sylvia Linnei*, Brünn. u. Müll. *M. Sylvia*, Sepp. *Turdus Calamoxenus*, Briss. *Parus cinereus*, Büff. *mesange cendrée* u. a. rechnet; Brissons *Curruca cinerea* aber als Spielart davon annimmt, und dazu die in unfrem System bemerkten Synonymen aus Aldrov. Raj. Büffon, Salerne, Pennant und Willoughb. zählt.

Latham, Syst. ornith. II. p. 515. n. 23. β . *Sylvia* supra rufo-cinerea, subtus rufo-alba, gula alba, rectrice extima extus toto, intus dimidiato, alba.

Raj. Synopf. p. 77. A. 6. *Ficedulae* affinis?

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 25. *Parus cinereus* *Briss*.

γ . *Büffon*, Vögel, XV. p. 96. *die Boufcarle*; m. e. Fig.

10. FICEDULA. *Die Beccafige*. (3)

Müller, Naturyst. II. p. 606. n. 10. *der Feigeneßer*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 191. n. 4. *Motacilla* (*Ficedula*) subfusca, subtus alba, pectore cinereo maculato; *die Beccafige*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 536. n. 8. *der Feigeneßer*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 605.

Pennant, arch. Zool. II. p. 391. K. *der Feigeneßer*.

Klein, av. p. 79. n. 13. *Sylvia* rectricibus alarum macula alba.

Klein, Vorbereit. p. 147. n. 13. *Braunellchen*; *brauner Fliegenschnepfer mit einem weißen Flügelflecken*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 80. n. 17. *Braunellchen*.

Brissou, ornith. I. p. 413. n. 1. *Beccafique*.

Büffon,

- (3) Ist schon lange als ein sehr schmuckhafter Vogel berühmt, und besonders von der Insel Cypern, in Töpfen mit Wein-essig und wohlriechenden Kräutern eingemacht, zu 1000. bis 1200 Töpfen alle Jahr versendet. — *Bechstein* vermuthet, ob es wohl nicht der schwarzgraue Fliegenfänger seyn möge. — S. vorher die Not. 2. bey *Muscicapa Atricapilla* n. 9. ingl. *Lath*. Vögel, II. 1. p. 320, not. v.

Büffon, Vögel, XV. p. 196. der gemeine Feigen-
fresser.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 517. n. 28. Sylvia
(Ficedula) subfusca, subtus alba, pectore cine-
reo-maculato.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 437. der Wüß-
ling; Rothauge; Feigenesser. (sogar mit *Mu-
scicapa Olivacea* p. 938. n. 14. verwechselt)

Fischer, L. vl. p. 101. n. 165. kleine Grasmücke.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 6. Spitzlerke,
tab. 12.

Martini, Naturlex. V. p. 53. der Feigenesser.

Naturforsch. XVII. p. 101. n. 208. der Feigen-
esser.

Borkhausen, Magaz. I. p. 182. n. 57. Feigenfres-
ser; Braunnelle.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 240. der braune
Fliegenschnäpper.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 49. Braunnellchen.

Günther, Nest. u. Ey. tab. 59. Wüßling.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 18. Ficedula
quarta.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 185. n. 11. Mota-
cilla (Ficedula) subfusca, subtus alba, pectore
cinereo maculato.

Charleton, onom. zoic. p. 81. n. 9. Ficedula; m.
s. unricht. Abbild.

Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 280. Ficedula.

Barrere, ornithol. Cl. 3. gen. 18. sp. 1. Ficedula
rostro et pedibus luteis.

Jonston, av. tab. 33. Ficedula.

Forskål, fn. orient. — descr. anim. p. 8. n. 13.
Becquefigue?

Bomare, diction. II. p. 5. — Diction. des anim.
I. p. 64. Becfigue.

Hermann, tab. affin. anim. p. 228. Motacilla Ficcedula.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 381. n. 10. die *Beccafage*.

64. *NAEVIA*. Die gefleckte Grasmücke.

Onomat. hist. nat. III. p. 534. die gefleckte Grasmücke.

Briffon, ornithol. I. p. 418. n. 9. Fauvette tachetée.

Büffon, Vögel, XV. p. 126. die graufleckige Grasmücke.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 517. n. 29. Sylvia (Naevia) fusco-rufescens, flavicante-varia sub-tus alba, pectore flavicante maculis albis, rectricibus nigricantibus albo extus marginatis.

Martini, Naturlex. V. p. 95. bunte Grasmücke.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 234. die gefleckte Grasmücke.

Jonston, av. p. 121. Boarina.

65. *ALPINA*. Die Alpengrasmücke. (4)

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 191. n. 3. Motacilla (Alpina) griseo-ferruginea, gula alba maculis lunatis fuscis, rectricibus alarum nigricantibus, versus apicem linea punctatis alba; die Flüe. (d. h. Felsen-) Lerche.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 546. n. 27. die Alpengrasmücke; Flüelerche.

Büffon, Vögel, XV. p. 141. die Alpengrasmücke.

Andrä, Briefe aus der Schweiz, p. 102. tab. 13. Flüelerche.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 335. die Grasmücke der Alpen.

Martini,

- (4) Ist nach *Blumenbach* (l. c.) *Bechstein* (N. G. Deutschl. III. p. 715.) und selbst nach *Latham* mit *Sturnus Montanus*, p. 804. n. 7. und *Sturnus collaris*, p. 805. n. 16. einerley.

Martini, Naturlex. V. p. 9. *Bachstelze der Alpen*.
Neue schwed. Abhandl. III. p. 110. *Motacilla al-*
pina.

Storr, Alpenreise, I. p. 79. *Fringilla gularis*.

Manetti, ornith. tab. 338. fig. 1. *Fringilla* seu *Pa-*
ser in *Etruria Sordone* dict.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 381. n. 11.
die Alpen-Grasmücke.

66. PATAGONICA. *Die patagonische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 517. n. 30. *Sylvia*
(*Patagonica*) *cinerea subtus albo-maculata*, *su-*
perciliis albis, *alarum maculis fasciaque fusca*,
rectricibus extimis albis.

67. PROVINCIALIS. *Der Pitchou.*

Büffon, Vögel, XV. p. 145. *der Pitchou*; mit
c. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 181. *Dartford Warbler*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 517. n. 31. *Sylvia*
(*Dartfordiensis*) *saturate rufo-fusca*, *subtus fer-*
ruginea, *abdomine medio albo*, *palpebris iri-*
dibusque coccineis, *pedibus flavis*.

Martini, Naturlex. V. p. 155. *Pitschou*.

Samml. zur Phys. u. Naturgesch. III. p. 236. der
Pitchou.

68. AFRICANA. *Die schwarze afrikanische Mota-*
cille. ()*

Onomat. hist. nat. III. p. 534. die Capische gefleckte
Grasmücke.

Briffon, ornith. I. p. 419. n. 10. *Fauvette tachetée*
du Cap de bonne Espérance.

Büffon, Vögel, XV. p. 147. *die gefleckte Gras-*
mücke vom Vorgeb. d. g. H.

Rr 5

Latham,

(*) Ist nicht mit *Motacilla afra*, p. 962. n. 83. zu verwechseln.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 518. n. 32. *Sylvia* (Africana) nigra rufescente-varia, subtus alba-rufescens, fascia utrinque sub gula nigra, re-
ctricibus fuscis, rufo-marginatis.

Martini, Naturlex. V. p. 96. *capische Grasmücke*.

69. NOVEBORACENSIS. *Die Motacille von Newyork.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 381. n. 225. *der Sän-
ger von Newyork.*

Büffon, Vögel, XV. p. 150. *die gefleckte Louisia-
nische Grasmücke; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 518. n. 33. *Sylvia* (Noveboracensis) cinerea fusco-varia, subtus
flavescens nigro striata, superciliis albis.

70. UMBRIA. *Die dunkelbraune Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 382. n. 226. *der dunkel-
braune Sänger.*

Büffon, Vögel, XV. p. 151. *die dunkelfarbige
Louisianische Grasmücke.*

Martini, Naturlex. V. p. 65. *die schattirte Loui-
sianische Bachstelze.*

71. FLAVICOLLIS. *Das Gelbkehlchen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 372. n. 203. *das Gelb-
kehlchen.*

Klein, av. p. 87. n. 14. *Parus americanus, gutture
luteo.*

Klein, Vorbereit. p. 162. n. 14. *gelbkehlige Meise
aus Amerika.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 39. n. 14. *gelbkehlige
Meise.*

Briffon, ornithol. I. p. 467. n. 10. *Mefange grise
de la Caroline.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 150. *die graue gelbkeh-
lige Meise; m. e. Fig.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 518. n. 35. *Sylvia* (Flavicollis) grisea subtus alba, gutture luteo, fronte superciliis lateribusque colli nigris, fascia alarum duplici alba.

Seligmann, Vögel, III. tab. 24. *die americanische Meise mit gelber Kehle.*

Naturgesch. a. d. best. Schr. Vögel, p. 849. n. 4.

72. **RUFICAUDA.** *Die braunrothschwänzige Motacille.*

Büffon, Vögel, XV. p. 154. *die Cayennische Grasmücke mit rothgelbem Schwanze.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 519. n. 37. *Sylvia* (Ruficauda) rufo-fusca, subtus alba, gula rufo circumdata fusco maculata, tectricibus alarum caudaque rufis.

Martini, Naturlex. V. p. 43. *cayennische Bachstelze mit röthlichem Schwanze.*

73. **FUSCICOLLIS.** *Die gelbbäuchige cayennische Motacille.*

Büffon, Vögel, XV. p. 155. *die Cayennische Grasmücke mit brauner Kehle und gelben Bauch.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 38. *Sylvia* (Fuscicollis) fusco-virescens pectore abdomineque fulvo-flavis, alis fuscis, rubescente marginatis.

Martini, Naturlex. V. p. 43. *Cayennische Bachstelze mit brauner Kehle und gelben Bauche.*

74. **CAERULESCENS.** *Die blaugraue Motacille.*

Büffon, Vögel, XV. p. 156. *die blaulichte Dominigische Grasmücke.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 39. *Sylvia* (Caerulescens) cinereo-caerulescens, subtus alba, gula nigra, alis fuscis, tectricibus macula alba, remigibus extus cinereo-caerulescentibus.

Martini,

Martini, Naturlex. V. p. 29. die blaulichte Domingische Bachstelze.

75. AMERICANA. Die gelbrückige amerikanische Motacille. (5)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 40. Sylvia (Americana) cinereo-caerulescens, interscapularibus olivaceo-flavis, iugulo pectoreque flavis, abdomine fasciaque alarum albis.

76. PENSILIS. Die gelbhäufige Grasmücke.

Büffon, Vögel, XV. p. 158. die gelbhäufige Grasmücke; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 41. Sylvia (Pensilis) grisea abdomine superciliisque albis, collo subtus flavo, alis albo nigroque fasciatis, rectricibus lateralibus quatuor albo-maculatis.

Martini, Naturlex. V. p. 80. Gelbhals.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 381. n. 12. die gelbhäufige Grasmücke.

II. ALBA. Die gemeine Bachstelze. (6)

Müller, Natursystem, II. p. 607. n. II. die weiße Bachstelze.

Leske, Naturgesch. p. 270. n. 10. die weiße Bachstelze.

Borowsky, Thierreich, III. p. 188. n. 6. die weiße Bachstelze; Wassersterz.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 191. n. 5. Motacilla (Alba) pectore nigro, rectricibus duabus lateralibus dimidiato-oblique albis; das Ackermännchen; weiße oder graue Bachstelze.

Bechstein,

(5) *Latham* rechnet auch *Büff. Figuiet cendré de la Caroline* (*Gmel* Syst. p. 1007 n. 4) mit hieher. Im System steht Habitat in Europa, durch einen Schreibfehler, für America.

(6) In den Eingeweiden hat man Iaspis und Porphyry gefunden. S. Schrift. der berlin. Gesellsch. N. Fr. VI. p. 400.

Bechstrin, Naturgesch. I. p. 539. n. 14. *die weiße Bachstelze.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 607. *die weiß und schwarze Bachstelze.*

Funke, Naturgesch. I. p. 258. *Ackermännchen.*

Ebert, Naturl. II. p. 141. *die sogenannten weißen Bachstelzen.*

Halle, Vögel, p. 336. n. 310. *die gemeine Bachstelze.*

Meyer, Thiere, II. p. 21. tab. 77. *weiße und schwarze Bachstelze.* M. u. W.

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere II. p. 426. n. 362. *die Bachstelze; weiße blaue oder graue Bachstelze; Wasserstelze; das Ackermännchen; Stiftsfräulein; Klosterfräulein; Wegesterz; Quecksterz; Wackelstört; Wackstört; Wippstört.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 368. E. *die weiße Bachstelze.*

Beckmann, Naturhist. p. 55. b. *die Bachstelze.*

Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 473. Bachstelze.

Onomat. hist. nat. V. p. 259. die gemeine Bachstelze.

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 135. graue Bachstelze; schwarzkehlichte Bachstelze.

Klein, av. p. 78. n. 6. *Sylvia pectore nigro.*

Klein, Vorbereit. p. 146. n. 6. *Klosterfräulein; Quecksterze.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 79. n. 9. *Klosterfräulein; graues Schwarzkehlein.*

Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. fig. 6. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 26. tab. 10. fig. 19.

Gesner, Vögelb. p. 545. *weiße oder graue Wasserstelz; m. e. mittelm. Fig.*

Briffon, ornith. I. p. 437. n. 38. *Lavandiere.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 28. *die weiße Bachstelze*;
m. 2. Figg. M. u. W.

Batsch, Thiere, I. p. 362. *die weiße Bachstelze*.

Latham, Syn. Suppl. p. 178. White Wagtail.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 501. n. 1. Motacilla (Alba) pectore nigro, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 131. n. 3. *die weißbunte Bachstelze*; *witte Weepstirten*; *Queekstaart*; *Wippstaart*; *Schwienhierd*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 437. *die weiße Bachstelze*.

Fischer, Livl. p. 102. n. 166. *weiße Bachstelze*; *Bebeschwanz*; *Wipssteert*.

Cetti, Sardin. II. p. 208. not. 223.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 7. *Steenpikker*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 137. *Erle?*

Olaffen, Reis. d. Isl. I. p. 310. *Marin-Erla*.

White, N. G. von Engl. p. 60. n. 4. *weiße Bachstelze*.

Fermin, Surin. II. p. 163. *Bachstelze?*

Adanson, Senegall. p. 97. *Bachstelzen?*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 186. n. 224. *die graue Bachstelze*.

Naturforsch. XVII. p. 102. n. 209. *die weiße Bachstelze*.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 251. *die weiße Bachstelze*.

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 234. *weiße Bachstelze*.

Neue schwed. Abhandl. I. p. 299. *weiße Bachstelze*.

Linné, Abhandl. II. p. 287. n. 53. p. 305. n. 125. *weiße Bachstelze*.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 178.

Zorn, Petinotheol. II. p. 432. *die blauliche Bachstelze.*

Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. IV. 4. p. 143. Besch. einer weissen Bachstelze mit vier Füßen.

Martini, Naturlex. V. p. 87. *gemeine Bachstelze.*

Krinitz, Encykl. III. p. 329. *schwarzkehlige Bachstelze.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 65. *Bachstelze oder Ackermännlein.*

Naumann, Vogelfsteller, p. 153. *Bachstelze.*

Angen. Landluft, p. 97. *schwarzkehlige Bachstelze.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 174. n. 46. *gemeine Bachstelze.*

André u. Bachstein, Spazierg. I. p. 213. *gemeine Bachstelze.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 761. *die weisse Bachstelze.*

Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 105. *Motacilla alba.*

Anweil. Vögel zu fang. p. 106. *schwarzkehlige Bachstelze.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 130. *gemeine Bachstelze.*

Tänzer, notabil. Venator. p. 108. n. 136. *Bachstelze.*

Loniceri, Kräuterb. p. 677. *Bachstelz.*

Geoffroy, mater. med. VII. p. 551. *die gemeine Bachstelze.*

Merklein, Thierreich, p. 251. *Bachstelze; Queckstelze; Kloster-Nonne.*

Lemmery, Materiallex. p. 756.

Elsholz, Tischbuch, p. 165.

Zückert, mater. aliment. p. 113.

Onomatol. forestal. I. p. 182.

Onomat. oeconom. pract. I. p. 391.

Fablonsky, allgem. Lex. p. 98. *Bachstelze*.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Motacilla.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 1. Motacilla alba.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 185. n. 12. Motacilla (Alba) pectore nigro, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis.

Kramer, Austr. p. 373. n. 1. Motacilla pectore nigro; *graue Bachstelze*.

Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 1. Motacilla alba, albicula, *Aristoteli* Cnipologus.

Moehring, av. gen. p. 44. n. 33. Motacilla.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 306. Motacilla alba; *Bachstelze*; *weiße, graue Wasserstelze*.

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Motacilla alba.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 396. Motacilla alba seu Codatremula, *Cnipologus* *Turneri*, *Cinclus* *Sipontini*.

Jonston, av. p. 120. Motacilla alba.

Barrere, ornithol. Cl. III. gen. 19. sp. 1. Motacilla alba.

Belon, hist. nat. des ois. p. 349. Lavandiere.

Bellon. observat. p. 16. Culicilega.

Zinnan. Uov. p. 51. tab. 7. fig. 38. Coda tremola.

Hist. Prov. I. p. 498.

Bomare, diction. II. p. 53. — Diction. des anim. I. p. 274.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 382. n. 13. das *Ackermännchen*.

β. Die *Bachstelze* von der Insel *Luçon*.

Latham, Syn. II. 2. p. 396. Collared Wagtail.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 502. n. 1. γ. M. cinerea, pectore nigro, capistro gula genis fascia alarum rectricibusque duabus extimis albis.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 24.

77. ALBIDA. Die weißliche Bachstelze. (7)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 501. n. 1. β . M. albida, dorso, tectricibus alarum caudaque cinerascens, rostro pedibusque purpurascens.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. * 1.

78. MADERASPATENSIS. Die Bachstelze von Madras. (8)

Briffon, ornithol. I. p. 440. n. 44. Bergeronette de Madras.

Büffon, Vögel, XVI. p. 75. der Sticherling von Madras.

Latham, Syst. ornith. II. p. 502. n. 2. Motacilla (Maderaspatensis) nigra, ventre albo, fascia alarum longitudinali alba, rectricibus duabus intermediis nigris, lateralibus albis.

79. CINEREA. Die aschgraue Bachstelze. (9)

Briffon, ornithol. I. p. 437. n. 39. Bergeronette grise.

Büffon, Vögel, XVI. p. 46. der graue Sticherling: m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 502. n. 3. Motacilla (Cinerea) cinerea, subtus alba, fascia pectorali fusca, rectrice prima alba, secunda basi apiceque alba.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. * 2.

White,

(7) Nach Latham und Bechstein eine Varietät, oder vielmehr eine junge *Motacilla alba*.

(8) Ist nicht mit *Motacilla Maderaspatana*. Edit. XII. p. 334. n. 28. zu verwechseln, welches eigentlich *Madagascariensis* heißen soll.

(9) Besteht, nach Bechstein, theils nur aus den Jungen der *Motacilla alba*, theils *Boarula*, p. 997, n. 51.

White, N. G. von Engl. p. 60. n. 6. *graue Bachstelze*?

Schwenkfeld, av. Siles. p. 307. *Muscicapa* I. *Crucilega cinerea*. *Sticherling*; *Fliegenstecher*; *Mückenstecher*.

Martini, Naturlex. V. p. 102. *graue Bachstelze*.
Naturgesch. mit Merian. Kupf. p. 765.

Barrere, ornithol. Cl. III. gen. 19. sp. 2. *Motacilla cinerea*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 351. Autre sorte de *Lavandiere*?

80. INDICA. *Die Indianische Bachstelze.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 503. n. 7. *Motacilla* (Indica) griseo-virescens, subtus flavescens, pectore lunulis duabus nigris confluentibus, rectricibus duabus extimis femoribus crissoque albis.

Soumerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 162. *die graue indische Bachstelze*.

81. VIRIDIS. *Die grüne Bachstelze.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 505. n. 13. *Motacilla* (Viridis) pallide viridis, subtus alba, capite cinereo, alis caudaque cinereis, albo marginatis.

82. TSCHUTSCHENSIS. *Die Tschutschische Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 369. H. *die Tschutschische Bachstelze*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 505. n. 12. *Motacilla* (Tschutschensis) olivaceo-fusca, subtus loris fasciaeque duplici alarum alba, rectrice prima tota, secunda latere interiore alba.

83. AFRA. *Die gelbbraune afrikanische Motacille.* ⁽¹⁰⁾
Büffon, Vögel, XVI. p. 72. *die kleine kapsche Bachstelze.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 505. n. 11. Motacilla (Afra) flavescente-fusca, subtus flava, crisso albo, superciliis, alis caudaque nigris.
Martini, Naturlex. V. p. 110. *die kleine kapsche Bachstelze.*
 Naturgesch. aus den best. Schriftst. p. 771. *die kleine Bachstelze vom Vorgeb. der gut. Hoffnung.*
84. CITREOLA. *Die gelbköpfige Bachstelze.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 369. G. *der Gelbkopf.*
Büffon, Vögel, XVI. p. 69. *die zitrongelbe Bachstelze.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 504. n. 9. Motacilla (Citreola) cinereo-caerulescens, capite, collo corporeque subtus flavis, nucha lunula nigricante.
Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 6. n. 14. Motacilla Citreola.
Lepechin, Tageb. der russ. Reis. II. p. 187. *die Bachstelze mit dem gelben Bauch.* (russ. *Shel-tobrjuschka*.) Motacilla pectore abdomine capiteque flavo, nucha nigra, rectricibus duabus lateralibus dimidiato-albis.
12. FLAVA. *Die gelbe Bachstelze.* ⁽¹⁾
Müller, Natursyst. II. p. 608. n. 12. *die gelbe Bachstelze.*

Ss 2

Leske,

(10) Ist nicht mit *Motacilla africana*, p. 958. n. 68. zu verwechseln.

(1) Die Synonymen und Beschreibungen dieser und der 5ten Gattung (*Motacilla Boarula*, p. 997.) werden dergestalt verwechselt, daß man oft gar nicht herauskommen kann. Der eine sagt das von der *Flava*, was der andere von der *Boarula* sagt.

Leske, Naturgesch. p. 271. n. 11. *die gelbe Bachstelze*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 189. n. 7. *die gelbe Bachstelze*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 540. n. 15. *die gelbe Bachstelze*.

Funke, Naturgesch. I. p. 258. *die gelbe Bachstelze; Kuhstelze*.

Ebert, Naturl. II. p. 258. *Kuhstelzen*.

Meyer, Thiere, II. tab. 78. *gelbe Bachstelze*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 369. F. *die gelbe Bachstelze*.

Onomat. hist. nat. V. p. 264. die gelbe Bachstelze.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 135. die gelbe Bachstelze.

Klein, verb. Vögelhist. p. 168. n. 4. *gelbe Bachstelze*.

Briffon, ornith. I. p. 438. n. 40. *Bergeronette du Printems*.

Büffon, Vögel, XVI. p. 54. *der Frühlings-Sticherling; m. e. Fig.*

Gesner, Vögelb. p. 545. *gelbe Wasserstelze; m. e. schl. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 362. *die gelbe Bachstelze*.

Latham,

sagt, und so umgekehrt. So gehts auch mit Bestimmung der Charactere und Ordnung der Synonymen. Sie passen größtentheils auf beyde. In der XII. Edit. p. 331. rechnete Linné die Synonymen von *M. Boarula* zu seiner *Motacilla flava*. Jetzt hat man beyde getrennt, aber sie sind gewiß noch nicht gehörig vertheilt. *Bechstein* rechnet sogar *Büffons Bergeronette jaune* zur *Motacilla flava* Linn und die *Bergeronette de Printems* zur *M. Boarula*. Mir ist es sehr wahrscheinlich, daß, da vieles von dem, was von der einen gesagt wird, nach Verschiedenheit des Alters, des Geschlechts und der Jahreszeit, auch auf die andern paßt, daher diese Verwirrung und Verwechselung entstanden seyn möge.

Latham, Syn. Suppl. p. 179. Yellow Wagtail.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 504. n. 8. Motacilla (Flava) pectore abdomineque flavis, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 132. n. 4. die gelbe Bachstelze; das geele Wähpstierten; de Lämmerhierd.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 438. die gelbe Bachstelze; Kuhstelze.

Fischer, Liv. p. 102. n. 167. Kuhstelze.

Fischer, Zusätze zur N. G. von Livl. p. 49. gelbe Bachstelze; Kuhstelze.

Beseke, Vögel Kurl. p. 80. n. 180. die gelbe Bachstelze.

Cetti, Sardin. II. p. 208. Bachstelze mit gelbem Bauch?

White, N. G. von Engl. p. 60. n. 5. gelbe Bachstelze.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 8. Gulspink.

Samml. zur Physf. und N. G. III. p. 253. die gelbe Bachstelze.

Naturforsch. XVII. p. 102. n. 210. die gelbe Bachstelze.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 48. die gelbe Bachstelze.

Martini, Naturlex. V. p. 75. Frühlingsbachstelze.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 187. n. 225. die gelbe Bachstelze.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 57. gelbe Bachstelze.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 767. die Frühlingsbachstelze.

Anweiss. Vögel zu fang. p. 108. die gelbe Bachstelze.

Borkhausen, Magazin, I. p. 176. n. 48. gelbe Bachstelze.

André n. Bechstein, Spazierg. II. p. 178. *die gelbe Bachstelze?*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 2. *Motacilla flava*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 185. n. 13. *Motacilla* (Flava) pectore abdomineque flavo, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 307. *Muscipeta*. II. *Crucilega flava*. *Gelber Sticherling*; *Ixlin*.

Jonston, av. p. 121. *Motacilla flava altera*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 383. n. 14. *die gelbe Bachstelze*.

β. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 74. *der Sticherling von Timor*.

Latham, Syn. II. 2. p. 401. n. 6. Var. A. *Timor Wagtail*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 504. n. 8. β. M. *eine-reo-grisea*, subtus flava, superciliis flavis, remigibus rectricibusque nigris, fascia alarum alba.

Martini, Naturlex. V. p. 194. *Bachstelze von Timor*.

γ. *Büffon*, Vögel, XVII. p. 182. *die gelbe Meise des Gmelin*; m. e. Fig. (2)

Latham, Syst. ornith. II. p. 504. n. 8. γ.

δ. *Büffon*, Vögel, XVII. p. 185. *die kaspische Meise*. (3)

Latham, Syst. ornith. II. p. 504. n. 8. δ.

ε. *Büffon*,

(2) Zieht im Anfang des Frühlings heerdenweise nach Astrachan; nistet aber daselbst nicht, sondern begiebt sich über die Wolga nach Rußland, um da zu brüten, und kommt im Herbst nach den Ufern der kaspischen See zurück. Nährt sich hauptsächlich von Samen; frisst aber auch Insekten.

(3) Ist vorzüglich bey Enpeli häufig vorhanden. Hält sich bey den Häusern, auf den Straßen, und am Strande heerdenweise auf;

2. *Buffon*, Vögel, XVII. p. 187. die gesprengte Meise.
Latham, Syft. ornith. II. p. 504. n. 8. 2.

13. **TIPHIA.** *Die Wasserstelze.* (4)

- Müller*, Naturfyft. II. p. 608. n. 13. die Wasserstelze.
Onomat. histor. natur. III. p. 892. die Bachstelze aus Benghala; der grüne indianische Sperling.
Klein, av. p. 75. n. 17. *Luscinia Bengalensis*.
Klein, Vorbereit. p. 142. n. 17. die bunte Grasmücke von Bengala.
Klein, verbess. Vögelhistor. p. 76. n. 17. bengalische Nachtigal.
Briffon, ornithol. I. p. 442. n. 47. *Figuier de Bengale*.
Buffon, Vögel, XVI. p. 78. der grün und gelbe Feigenfresser; m. e. Fig.
Latham, Syft. ornithol. II. p. 532. n. 91. (Siehe nachher *Motacilla Zeylonica*, n. 87.)
Seligmann, Vögel, IV. tab. 53. der grüne indische Fliegenschnäpper.
Martini, Naturlex. V. p. 196. *Wasserstelze*.
Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 775: der grüne und gelbe Feigenvogel.
Neueste Mannigfalt. IV. p. 449. die *Wasserstelze*.
Linné, Syft. Nat. Ed. X. I. p. 186. n. 14. *Motacilla* (*Tiphia*) *viridis*, *subtus flavescens*, *alis nigris fasciis duabus albis*.

85. **SINENSIS.** *Die chinesische Motacille.*

- Latham*, Syft. ornithol. II. p. 533. n. 93. *Sylvia* (*Sinensis*) *viridis*, *subtus incarnata*, *macula aurium*

Ss 4

rium

auf, so dass ihrer oft mehr als zehn auf einen Schuss getödtet werden.

(4) Ist, nach *Latham*, mit *Motacilla Zeylonica*, p. 964. n. 87. einerley.

rium poneque oculos pallida, rectricibus mucronatis.

86. SINGALENSIS. *Die cingalesische Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II, p. 533. n. 92. Sylvia (Cingalensis) viridis variegata, subtus flava, collo inferiore fulvo.

87. ZEYLONICA. *Die schwarz gescheitelte zeylonische Motacille.* (5)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 91. Sylvia (Zeylonica) viridis subtus flavescens, vertice nucha alisque nigris, fascia alarum bifida alba.

Latham, Syn. Suppl. p. 474.

88. OLIVACEA. *Die olivenfarbige zeylonische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 90. Sylvia (Olivacea) olivacea, corpore subtus albo, capistro flavescente.

89. CARYOPHYLLACEA. *Die nelkenfarbige Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 352. n. 89. Sylvia (Caryophyllacea) dilute caryophyllea, alis caudaque obscuris, rostro pedibusque rubris.

90. ALBICAPILLA. *Die weißgekrönte Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 87. Sylvia (Albicapilla) viridis, subtus albida, gula macula verticis subocularique albis.

91. GRISEA. *Der cayennische Grauling.* (6)

Büffon, Vögel, IX. p. 180. der cayennische Grauling; m. e. Fig. — XIII. p. 184. der Grisein von Cayenne.

Latham,

(5) Nach *Latham* mit *Motacilla Tiphia* p. 961. n. 13. einerley.

(6) Nach *Büffon* eine Abart von *Turdus Cirrhatus* p. 826. n. 91.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 88. *Sylvia* (Grisea) cinereo-grisea, subtus fasciaque per oculos alba, vertice, collo inferiore pectoreque nigris.

92. MACULATA. *Die Ortolanenpivote.*

Büffon, Vögel, XV. p. 208. *die Ortolanenpivote*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 86. *Sylvia* (Maculata) nigro-maculata, supra fusca, subtus cinereo-alba, alis caudaque nigris, rectricibus duabus extimis margine exteriori apiceque toto albis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 241. *die Pivote.*

93. MASSILIENSIS. *Der Fift.*

Büffon, Vögel, XV. p. 207. *der Fift von Provence*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 531. n. 85. *Sylvia* (Massiliensis) fusco rufoque varia, subtus rufo-alba, pectore nigro-maculato, sub oculis macula flavescente, rectricibus duabus extimis albis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 241. *der Fift.*

94. PILEATA. *Die schwarzkappige Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 531. n. 84. *Sylvia* (Pileata) rufo-fusca, capite pectoreque nigris, fronte, gula, superciliis, uropygio rectricibusque lateralibus a basi ad medium albis.

95. AURANTIA. *Die orangebrüftige Motacille.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 23. *der grünbraune Steinschmätzer*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 531. n. 83. *Sylvia* (Aurantia) nigricans, viridi nebulosa, subtus fulve-

fulvescens, gula macula tectricum tectricibus
caudae rectricibusque lateralibus apice albis.

Martini, Naturlex. V. p. 189. *grünbrauner kapscher
Steinschmätzer*.

*Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 250. der braun-
grünlichte Weißschwanz.*

96. **HOTTENTOTTA.** *Die Hottentottenmotacille.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 21. *der große Capsche
Steinschmätzer*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 531. n. 82. *Sylvia*
(Hottentotta) fulvo-fusca, subtus gulaque albi-
da, vertice pectoreque nebulosis, abdomine
superiore uropygioque fulvis, rectricibus late-
ralibus basi albis.

*Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 249. der kapsche
Weißschwanz.*

Martini, Naturlex. V. p. 188. *großer Steinschmaz-
zer vom Kap.*

97. **LEUCORHOA.** *Der senegalische Weißschwanz.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 25. *der senegalische Weiß-
schwanz.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 531. n. 81. *Sylvia*
(Leucorhoa) rufo-fusca, subtus albo-flave-
scens, pectore rubescente, uropygio basique
caudae albis.

Martini, Naturlex. V. p. 190. *Senegalischer Stein-
schmätzer.*

*Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 251. der senega-
lische Weißschwanz.*

114. **STAPAZINA.** *Die spanische Motacille.*

Müller, Naturyst. II. p. 608. n. 14. *die spani-
sche Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 394. Q. *der röthlichbraune Weißschwanz.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 756. *das schwarzkehlchen; rothe Bachstelze.*

Klein, av. p. 80. n. 26. *Sylvia* f. *Nigricilla*, gutture nigro nigrisque alis, corpore aeruginoso.

Klein, Vorbereit. p. 150. n. 26. *schwarzkehliger Schwarzwanz.*

Klein, verb. Vögelh. p. 81. n. 29. *Schwarzkehliger Schwarzwanz.*

Briffon, ornithol. I. p. 436. n. 37. Cul-blanc roux.

Büffon, Vögel, XIV. p. 17. et 19. *der rothe Weißschwanz.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 530. n. 80. *Sylvia* (*Stapazina*) ferruginea, area oculorum alis caudaque fuscis, rectricibus extimis latere albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 61. *die röthlichbraune Grasmücke.*

Martini, Naturlex. V. p. 162. *die rothe Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 325. *die rothe Bachstelze.*

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 186. n. 16. *Motacilla* (*Hispanica*) ferruginea, area oculorum alis caudaque fuscis, rectricibus extimis latere albis.

β. *Briffon*, ornith. I. p. 435. n. 36. Cul-blanc rous-fatre. (?)

Büffon, Vögel, XVI. p. 18. *der rothgelbliche Weißschwanz.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 755. *die röthliche Bachstelze.*

Latham, Syn. II. 2. p. 469 n. 76. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 530. n. 80. β. *Sylvia* rufescens, subtus albida, taenia per oculos nigra,

(7) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

nigra, rectricibus 2. intermediis nigris, lateralibus albis utrinque versus apicem nigro fimbriatis.

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. p. 332. ad n. 14. oben.

15. OENANTHE. *Der Weißschwanz.*

Müller, Naturfyst. II. p. 609. n. 15. *der Weißschwanz.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 192. n. II. *das Weißkehlchen.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 541. n. 17. *der Weißschwanz; Steinkletsche; Steinschwacker.*

Bechstein, N. G. Deutschl. III. p. 605. *der gelbbüßige Fliegenvogel mit oberhalb weißem Schwanz; der Weißschwanz.*

Funke, Naturgesch. I. p. 258. *der Steinschwacker.*

Halle, Vögel, p. 339. n. 314. *das Weiskehlchen.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 426. n. 364. *das Weißkehlchen.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 393. P. *der Weißschwanz.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 752. *der Steinschmatzer.*

Klein, av. p. 78. n. 9. *Sylvia buccis nigris.*

Klein, Vorbereit. p. 147. n. 9. *schwarzrückige Grasmücke; Weißkehlchen mit schwarzen Backen.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 79. n. 12. *Weißkehlchen mit schwarzen Backen.*

Gerner, Vögelb. p. 387. *Oenanthe?*

Briffon, ornith. I. p. 434. n. 1. *Cul. blanc, ou Vitrec, ou Moteux.*

Biffon, Vögel, XVI. p. 5. *der große Steinschmätzer oder Weißschwanz; m. 2. Figg. M. u. W.*

Batsch, Thiere, I. p. 362. *das Weißkehlchen.*

Latham, Syn. Suppl. p. 182. *Wheat-ear.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 529. n. 79. *Sylvia (Oenanthe) dorso cano, fronte linea supra oculos,*

los, uropygio basique caudae albis, per oculos fascia nigra.

Beseke, Vögel Kurl. p. 81. n. 182. *der Weißschwanz*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 183. n. 5. *die weißgeschwänzte Bachstelze*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 211. *Grasmücke mit schwarzem Rücken*.

Cetti, Sardin. II. p. 221. *der Weißbürtel*.

Pontoppidan, Dannem. p. 174. n. 9. *Steendolp; Steensprette*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 185. *Steendulp, Steensquette; Quicastiert*.

White, N. G. von Engl. p. 25. *Steinquäcker*.

Olassen, Reif. d. Isl. I. p. 311. *Steindepill*.

Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 285. *Weißschwänze*.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 14. *der Steinquäcker*.
IV. p. 22. *Motacilla Oenanthe*.

Linne, Abhandl. II. p. 305. n. 136. *das Weißkehlchen*.

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 294 *fahle Grasmücke*.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 115. tab. 54. Fig. 5. 6.

Naturforsch. XVII. p. 103. n. 211. *der Weißschwanz*.

Borkhausen, Magaz. I. p. 183. n. 58. *Steinschmätzer*.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 190. n. 230. *der Steinschmätzer*.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 248. *der gelbbrüstige Fliegenschnäpper*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 378. *der größere Steinschmätzer*.

Tänzer, notab. Venat. p. 100. n. 127. *Steinklatzche*.

Martini,

Martini, Naturlex. V. p. 185. *Steinschmacker*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 65. *Steinklatfsche*.

Naturgesch. m. merian. Kupf. p. 756. *Weißschwanz*.

Landluft. p. 302. *Steinbeißer*.

Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 227. Mot.
Oenanthe.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 410. *Weißschwanz*.

Linne', Syst. Nat. Ed. II. p. 57. Oenanthe.

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 4. Oenanthe.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 186. n. 17. Motacilla (Oenanthe) dorso cano, fronte alba, oculorum fascia nigra.

Kramer, Austr. p. 374. n. 4. Motacilla dorso cano, fronte, uropygio et linea supra oculos albis.
Steinschwatzer; *Steinschnapperl*.

Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 13. Oenanthe,
Vitiflora f. Vitifera.

Belon, nat. des ois. p. 352. Cul-blanc ou Vitrec.

Hist. provenc. I. p. 498.

Voy. en Barbar. I. p. 273.

Zinnan, Uov. p. 41. tab. 6. Fig. 24. Culo-bianco.

Bomare, diction. III. p. 507. — Diction. des
anim. I. p. 806.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. Oenanthe?

Aelian. de nat. animal. L. 12. c. 9. Κίγκλος?

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 49. Οὐρανθή?

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 283. n. 15.
der *Weißschwanz*.

β. Der graue *Weißschwanz*. (8)

Briffon, ornith. I. p. 434. n. 34. Cul-blanc gris.

Büffon, Vögel, XVI. p. 15. der graue *Weißschwanz*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 754. die graue Bachstelze.

Latham,

(8) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.

Latham, Syn. II. 2. p. 467. n. 75. Var. A. Grey Wheat - ear.

Latham, Syst. ornith. II. p. 530. n. 79. β. *Sylvia* corpore supra fulvo albidoque vario, collo infimo griseo maculato, rectricibus duabus intermediis toto nigris.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 186. n. 17. β. *Motacilla* subtus pallida, rectricibus introrsum albis, dorso undulato.

γ. *Der aschgraue Weißschwanz*. (9)

Briffon, ornith. I. p. 435. n. 35. Cul. blanc cendré.

Büffon, Vögel, XVI. p. 16. *der aschgraue Weißschwanz*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 753. *die aschgraue Bachstelze*.

Latham, Syn. II. 2. p. 468.

Latham, Syst. ornith. II. p. 530. n. 79. γ. *Sylvia* supra cinerea, griseo-fusco varia.

Martini, Naturlex. V. p. 14. *aschgraue Bachstelze*.

Neueste Mannigfalt. III. p. 773. *aschgraue Bachstelze*.

δ. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 530. n. 79. δ. *Sylvia* supra alba, gula alis rectricibus intermediis fere totis, aliarumque maculis binis atris.

Scopoli, Rem. a. d. N. G. I. p. 191. ad n. 230. *der oben weiße Steinschmatzer*.

16. RUBETRA. *Das Braunkehlchen*.

Müller, Naturfyst. II. p. 609. n. 16. *das Braunkehlchen*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 192. n. 12. *das Braunkehlgen; Todtenvogel; Pfäfigen*.

Bech.

(9) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 541. n. 18. *das Kohl-
vögelchen.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 605. *das
Krautvögelchen.*

Halle, Vögel, p. 338. n. 313. *das schwarzbraune
Braunkehlchen, Todtenvogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 394. R. *das Braun-
kehlchen.*

Onomat. hist. nat. V. p. 272. *das schwarzbraune
Braunkehlchen.*

Klein, av. p. 78. n. 11. *Sylvia Petrarum.*

Klein, Vorbereit. p. 147. n. 11. *Steinfletsche;
Steinpatzsche.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 79. n. 14. *Stein-
fletsche.*

Gesner, Vögelb. p. 504. *Todtenvögelein; mit
e. Fig.*

Briffon, ornithol. I. p. 430. n. 26. *grand Traquet
ou Tarier.*

Büffon, Vögel, XV. p. 452. *der kleine Steinschmät-
zer oder Braunkehlchen; m. e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 362. *das Braunkehlchen.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 525. n. 58. *Sylvia (Ru-
betra) nigricans, superciliis albis, macula ala-
rum alba, gula pectoreque flavescente.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 81. n. 183. *das Braun-
kehlchen.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 134. *der Steinschmät-
zer; Steenbicker.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 439. *das Braun-
kehlchen.*

Fischer, Livl. p. 101. n. 164. *Braunkehlchen; Flic-
genschnäpper.*

Fischer, Zus. zur N. G. von Livl. p. 50. n. 501. *Braunkehlchen.*

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 8. *Motacilla Rubetra*.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 10. *Motacilla Rubetra*.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 22. *der Steinschmätzer*.

Pennant, britt. Thiergeschichte, p. 116. tab. 55. fig. 3. 4.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 195. n. 237. *der bräunlichte Fliegenvogel*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 183. n. 59. *Gelbbrüstchen; Gelbkehlchen; Steinflötsche*.

Naturforsch. XVII. p. 103. n. 212. *das Braunkehlchen*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 380. *der kleine Steinschmätzer*.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 245. *das Braunkehlchen*.

Martini, Naturlex. V. p. 36. *Braunkehlchen; Fliegenstecher; Nosselsink; Nesselsink; schwarzbraune Braunkehlchen*.

Neueste Mannigfalt. III. p. 804. *Braunkehlchen*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 5. *Rubetra*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 186. n. 18. *Motacilla (Rubetra) nigricans superciliis albis, macula alarum alba, gula pectoreque flavescence*.

Kramer, Austr. p. 375. n. 5. *Motacilla capite et dorso griseo nigroque variis; pectore testaceo, uropygio rufescente. Gestettenschlager*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 307. *Muscipeta III. Nosselsinke; Todten Vogel*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 397. *Muscipeta IV. Jonstoni*.

Jonston, av. pag. 121. *Muscicapa quarta. Todten vogel*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 361. *Tatier*.

Onomat. forestal. III. p. 490.

Bomare, diction. XI. p. 134. — Diction. des anim.
IV. p. 272. 416.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 383. n. 16.
das Braunkehlchen.

98. FERVIDA. *Das Senegalische Weißkehlchen.*

Büffon, Vögel, XV. p. 260. das Senegalische
Weißkehlchen, der Steinschmützer.

Latham, Syst. ornith. II. p. 525. n. 59. Sylvia (Fer-
vida) fusca rufo-marginata, subtus flavescent-
te - alba, pectore rufescente, maculis alarum
duabus albis.

99. MONTANELLA. *Die Sibirische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 60. Sylvia
(Montanella) testacea, fusco-maculata, subtus
superciliisque flavescentibus, macula aurium
nigra.

Pallas, Reif. Ausz. III. Anh. p. 5. n. 12. Motacil-
la montanella.

100. MAGNA. *Das große Weißkehlchen.*

Büffon, Vögel, XV. p. 270. das große Weiß-
kehlchen.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 525. n. 57. Sylvia
(Magna) fusca, subtus rufescens, gula albe-
scente, remigibus rectricibusque rufo fuscoque
dimidiatis, exterioribus duabus extus albis.

Martini, Naturlex. V. p. 201. großer Weiß-
kehlchen.

Samml. zur Physf. u. N. G. III. p. 246. das große
Braunkehlchen.

101. PHILIPPENSIS. *Der große philippinische Steinschmätzer.* ⁽¹⁰⁾

Briffon, ornith. I. p. 433. n. 32. grand Traquet des Philippines.

Büffon, Vögel, XV. p. 266. *der große philippinische Steinschmätzer.*

Latham, Syn. II. 2. p. 453. n. 52. Philippine Warbler.

Latham, Syst. ornith. II. p. 525. n. 56. Sylvia (Philippensis) nigro-violacea, subtus capiteque rufo-albo, pectore caerulescente, rectrice extima extus rufescente alba.

Martini, Naturlex. V. p. 154. *philippinische große Bachstelze.*

Neuelle Mannigfalt. IV. p. 256. *große pensylvanische Bachstelze.*

102. COROMANDELICA. *Die coromandelische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 524. n. 55. Sylvia (Coromandelica) nigra flavescente-maculata, subtus nigro fasciata, uropygio et abdomine rufescentibus, remigibus caudaque nigris.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 161. *der kleine indianische schwarzrückige Fliegenfänger.*

103. PERSPICILLATA. *Die Brillenmotacille.*

Büffon, Vögel, XV. p. 274. *der Clignot, oder der Blinzer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 524. n. 54. Sylvia (Perspicillata) nigra, macula alarum alba, orbitis nudis carunculatis flavis.

Martini, Naturlex. V. p. 31. *der Blinzer.*

(10) Vielleicht eine Spielart von Motacilla fulicata. p. 996.
n. 39.

17. RUBICOLA. *Das Weißkehlchen.*

Müller, Naturfyst. II. p. 610. n. 17. *das Weißkehlchen*; tab. 26. Fig. 1.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 542. n. 19. *der Steinpicker; Weißkehlchen; Christöffelchen.*

Halle, Vögel, p. 343. n. 323. *der schwarze Fliegenstecher, mit weißem Halsringe?*

Onomat. hist. nat. VI. p. 845. *das Weißkehlchen; der Fliegenstecher.*

Klein, av. p. 78. n. 8. *Sylvia lutea, capite nigro,*

Klein, Vorbereit. p. 146. n. 8. *gelber Sticherling,*

Klein, verb. Vögelh. p. 79. n. 11. *Gelbschwarzkehlchen,*

mit *M. Rubetra* und *Flava* verwechselt.

Klein, Vögeleyer, p. 25. tab. 10. fig. 14.

Briffon, ornith. I. p. 429. n. 25. Traquet.

Büffon, Vögel, XV. p. 259. *das Weißkehlchen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 523. n. 49. *Sylvia (Rubicola) grisea, subtus rufescens, iugulo fascia alba, loris nigris, uropygio maculaque alarum albis.*

Fischer, Zus. zur N. G. von Livl. p. 50. n. 502. *Weißkehlchen.*

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 9. *Steinschmatzer.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 244. *das Weißkehlchen.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 184. *der Schollenhüpfer.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 194. n. 236. *der schwarze und weiße Fliegenschnäpper.*

Martini, Naturl. V. p. 198. *Weißkehlchen.*

Pennant, britt. Thiergeschichte. p. 118. tab. 55. Fig. 5. 6.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 450. *Weißkehlchen.*

Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 7. *Rubetra.*

Charleton, exercit. p. 79. n. 7. *Rubetra.*

Kramer, Austr. p. 375. n. 6. *Motacilla nigricans*, macula alarum magna, superciliis albis, pectore et gula ochreis. *Christöffl.*

(Mit *Mot. Rubetra* verwechselt.)

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. *Oenanthe tertia*.

Jonston, av. p. 121. *Muscicapa*.

Belon, nat. des ois. p. 360. Traquet; Groulard, Tharier, Thyon.

Hist. Prov. I. p. 508.

Zimman, Uov. p. 52. tab. 7. fig. 40. Occhio di Bue.

Donndorff, Handb. d. Thiergeschich. p. 384. n. 17. das *Weißkehlchen*.

β. *Lepechin*, Tageb. d. russ. Reis. II. p. 186. *Motacilla superne nigricans*, torque albo interrupto, interne ferruginea, capite atro, nucha albicante, macula alarum oblonga candida, dorso nigro, marginibus pennarum rufescentibus. *Tschekantschik*. tab. 7. das Männch.

18. ATRICAPILLA. Der Klosterwenzel. (1)

Müller, Naturfyst. II. p. 610. n. 18. der *Klosterwenzel*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 193. n. 13. der *Klosterwenzel*; *Mönch*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 192. n. 6. *Motacilla* (*Atricapilla*) testacea, subtus cinerea, pileo obscuro; der *Klosterwenzel*; *Mönch*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 534. n. 3. der *Mönch*; schwarzköpfige Grasmücke.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 606. der *Mönch* mit der schwarzen Platte. p. 607. der *Mönch* mit der röthlichen Platte.

Halle, Vögel, p. 340. n. 315. der *Mönch* mit schwarzer Platte.

Tt 3

Halle,

(1) Ist nicht mit *Muscicapa atricapilla* zu verwechseln.

Halle, Vögel, p. 341. n. 317. *der Mönch mit rothbrauner Platte?*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 427. n. 366. *der Mönch; Schwarzkopf; Graspatz; Schwarzkäppchen*, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 390. F. *die Schwarzkappe*.

Onomat. hist. nat. II. p. 43. die schwarzköpfige Bachstelze.

Klein, av. p. 79. n. 14. *Sylvia atricapilla*.

Klein, Vorbereit. p. 148. n. 14. *Mönch, Schwarzkopf; Graspatz; Mönch mit schwarzer Platte*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 80. n. 18. *Klosterwenzel; Schwarzkopf*, etc.

Klein, av. p. 79. n. 15. *Sylvia vertice subrubro*. (das Weibch.)

Klein, Vorbereit. p. 148. n. 15. *Mönch mit röthlicher Platte. Cardinälchen*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 80. n. 19. *Mönch mit röthlicher Platte. Cardinal*.

Klein, Vögeleyer, p. 26. tab. 10. Fig. 17.

Gesner, Vögelb. p. 140. *Schwarzkopf; Münchlein*.

Brissou, ornithol. I. p. 416. n. 6. *Fauvette à tête noire*.

Büffon, Vögel, XV. p. 75. *die schwarzplattige Grasmücke*; m. 2. Fig. M. u. W.

Batsch, Thiere, I. p. 362. *der Mönch*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 508. n. 6. *Sylvia (Atricapilla) testacea, subtus cinerea, pileo obscure*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 81. n. 184. *der Klosterwenzel*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 135. n. 7. *der Mönch*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 439. *der Schwarzkopf; Mauskopf*.

Cetti, Sardin. II. p. 213. *der Schwarzkopf*.

White,

- White*, N. G. von Engl. p. 12. p. 34. n. 8. p. 58. n. 6. p. 63. n. 9. *der Klosterwenzel*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 174. n. 1. *Havskade*.
- Scopoli*, Bem. a. d. N. G. I. p. 190. n. 229. *der Mönch mit der schwarzen Platte*.
- Martini*, Naturl. V. p. 112. *Klosterwenzel*; *Afternachtigall*; *Grasmückchen*, *Graspatz*; *Kardinalchen*; *Mönchlein*, etc.
- Pennant*, britt. Thiergesch. p. 112. tab. 53. Fig. 5.
- Tengmalm*: neue Schwed. Abhandl. IV. p. 52. *Motacilla Atricapilla*.
- Naturforsch.* XVII. p. 103. n. 213. *der Klosterwenzel*.
- Borkhausen*, Magaz. I. p. 189. n. 68. *Klosterwenzel*.
- Frisch*, Vögel, tab. 23. Fig. 1. et 2. *Mönch mit schwarzer (M.) — und mit röthlicher Platte. (W.)*
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 372. *der Mönch, mit dem schwarzen Ober-Kopf, oder Platte*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 373. *der Mönch mit der röthlich-oder braunen Platte*.
- Samml. zur Physf. u. N. G.* III. p. 231. *der Mönch mit der schwarzen Platte*.
- Neueste Mannigfalt.* IV. p. 142. *Klosterwenzel*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 16. *Atricapilla*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 187. n. 19. *Motacilla (Atricapilla) testacea, subtus cinerea, pileo obscuro*.
- Kramer*, Austr. p. 377. n. 15. *Motacilla testacea subtus subcinerea pileo obscuro. Schwarzplattl.*
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 227. *Atricapilla. Münchlin; Schwarzkopf; Grasespatz*.
- Rzaczynsky*, auct. hist. nat. Polon. p. 366. *Atricapilla*.

Jonston, av. p. 125. *Atricapilla*. p. 126. *Atricapilla alia castaneo vertice*.

Zinnan, Uov. p. 56. tab. 8. Fig. 45. *Capinero*.

Belon, obs. p. 19. *Atricapilla*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 384. n. 18. *der Klosterwenzel*.

β. *Briffon*, ornith. I. p. 417. n. 6. *A. Fauvette noire et blanche*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 509. n. 6. β.

Zinnan, Uov. p. 44. tab. 12. Fig. 29. 1.

γ. *Büffon*, Vögel, XV. p. 89. *die kleine Colombade*.

Latham, Syn. II. 2. p. 416.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 509. n. 6. γ. *Sylvia supra nigricans, lateribus griseis, gula alba*.

δ. *Büffon*, Vögel, XV. p. 152. *die grünliche louisianische Grasmücke*.

Latham, Syn. II. 2. p. 417.

Latham, Syst. ornith. II. p. 509. n. 6. δ. *Sylvia fusco-virescens, pileo nigricante, cervice cinereo, superciliis albis, alis caudaque nigricantibus*.

104. MELANOCEPHALA. *Die schwarzköpfige Motacille*.

Cetti, Sardin. I. c. *noch eine kleinere Art Schwarzkopf*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 509. n. 7. *Sylvia (Melanocephala) ex virescente cinerea, subtus grisea, vertice nigro, oculorum fascia rubra*.

105. MOSCHITA. *Die Moschita*.

Cetti, Sardin. I. c. *Moschita oder Nofchita*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 509. n. 8. *Sylvia (Moschita) plumbea, pileo rufescente*.

19. PENNSYLVANICA, *Das Blutrothkehlchen.*

Müller, Naturfyst. II. p. 610. n. 19. *die pensylvanische Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 377. n. 215. *das Blutrothkehlchen.* (Ed. angl. II. N. 298. Bloody fide Warbler.)

Onomat. hist. nat. III. p. 905. *die Bachstelze aus Pensylvanien mit einem gelben Kopf.*

Onomat. hist. nat. V. p. 268. *die Pensylvanische Bachstelze.*

Briffon, ornithol. I. p. 458. n. 78. *Figuier à tête jaune de Pensilvanie.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 140. *der rothbrüstige Feigenesser; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 540. n. 120. *Sylvia (Pensylvanica) pileo flavescente, hypochondriis sanguineis.*

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 91. *Fliegenschnäpper mit rother Brust.*

Martini, Naturlex. V. p. 84. *die gelbköpfige Bachstelze aus Pensylvanien.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 663. *gelbköpfige Bachstelze.*

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 792. *der Feigenvogel mit der rothen Brust.*

26. RUFICAPILLA. *Die martinikische Motacille.*

Onomat. histor. natur. III. p. 902. *die Bachstelze von der Insel Martinique.*

Briffon, ornithol. I. p. 444. n. 50. *Figuier de la Martinique.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 137. *der Martinikische Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 540. n. 119. *Sylvia (Ruficapilla) viridi-olivacea, subtus flava, collo subtus pectoreque strigis fuscis, vertice rufo,*

rectricibus duabus exterioribus intus lutescentibus.

Martini, Naturlex. V. p. 123. *die Martinikische Bachstelze*.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 199. *die Martinikische Bachstelze*.

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 791. *der rothköpfige Feigenvogel*.

Feuillée obs. p. 113. *Chloris Eritachoïdes?*

20. CHRYSOPTERA. *Die goldflüglige Motacille.*

Müller, Natursystem, II. p. 611. n. 20. *der Gelbflügel*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 905. *die Bachstelze aus Pensylvanien mit einer schwarzen Kehle*.

Onomat. hist. nat. V. p. 263. *die Pensylvanische Bachstelze mit gelben Flügeln*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 376. n. 212. *der Goldflügel*.

Briffon, ornithol. I. p. 458. n. 77. *Figuier à gorge noire de Pensylvanie*.

Büffon, Vögel, XVI. p. 145. *der goldflügelichte Feigenfresser; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 541. n. 123. *Sylvia (Chrysoptera) fusca, subtus alba, pileo maculaque alarum luteis, gula fasciaque per oculos nigris*.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 89. *der Fliegenschnäpper mit goldnen Flügeln*.

Martini, Naturlex. V. p. 79. *Gelbflügel*.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 61. *Gelbflügel*.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 794. *der Feigenvogel mit goldnen Flügeln*.

107. **CHRYSOCEPHALA.** *Die Motacille mit orangefarbigem Kopf.*
Büffon, Vögel, XVI. p. 150. *der pomeranzenfarbige Feigenfresser.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 541. n. 124. *Sylvia* (Chrysocephala) rufo-fusca subtus alba, capite anterius colloque subtus fulvis, tectricibus alarum albo nigroque variegatis, cauda nigra.
Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 795. der orangefarbige Feigenvogel.
108. **CRISTATA.** *Die gezopfte Motacille.*
Müller, Naturyst. Supplem. p. 176. n. 57. *der Hayduck.*
Büffon, Vögel, XVI. p. 151. *der gezopfte Feigenfresser.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 541. n. 125. *Sylvia* (Cristata) virescens, supra fusca, subtus grisea, capite crista plicatili fusca albo marginata.
Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 55. die gehäubte Bachstelze.
109. **MULTICOLOR.** *Die schwarz und gelbe Motacille.*
Büffon, Vögel, XVI. p. 152. *der schwarze Feigenfresser; m. e. Fig.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 541. n. 126. *Sylvia* (Multicolor) nigra, subtus alba, colli pectorisque lateribus cauda a basi ad medium fasciaque alarum rufis.
110. **AEQUINOCTIALIS.** *Die olivenfarbige Ceynische Motacille.*
Büffon, Vögel, XVI. p. 143. *der olivenfarbige Feigenfresser; m. e. Fig.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 542. n. 127. *Sylvia* (Aequinoctialis) fusco-viridis, subtus flavescente-alba,

te-alba, gutture pectoreque pallide flavis, remigibus rectricibusque fuscis.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 796. *der olivenfarbene Feigenvogel.*

III. PROTONOTARIUS. *Der Protonotar.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 382. n. 227. *der Protonotar.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 154. *der Protonotaire.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 542. n. 128. *Sylvia* (Protonotarius) flava, dorso olivaceo, uropygio cinereo, remigibus rectricibusque cinereo et nigricante variis.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 796. *der Protonotair.*

III2. SEMITORQUATA. *Die Motacille mit halbem Halsbände.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 382. n. 228. *der Sänger mit dem halben Halsbände.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 156. *der Feigenfresser mit halben Halsbände.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 542. n. 129. *Sylvia* (Semitorquata) fusca, subtus flavo-cineraescens, cervice infima lunula flava, rectricibus quatuor extimis intus albis.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 797. *Feigenvogel mit der halben Halsbinde.*

III3. FULVA. *Die orangegegelbbäuchige Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 383. n. 229. *der Sänger mit orangengelbem Bäuche.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 158. *der gelbkehlige Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 542. n. 130. *Sylvia* (Fulva) fulvo-olivacea, subtus rufa, collo inferiore, crissoque flavis.

Naturge-

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 797. *der Feigen-
vogel mit gelber Kehle.*

114. FUSCA. *Die olivenbraune louisianische Motacille.*
Müller, Naturyst. Suppl. p. 175. n. 55. *der Flü-
gelfleck.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 383. n. 230. *der oliven-
braune Sänger.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 159. *der olivenbraune
Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 131. Sylvia
(Fusca) fusco-olivacea, subtus albo-flavescens,
collo subtus griseo alboque nebulofo, rectrici-
bus duabus extimis intus ad apicem albo-macu-
latis.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 797. *der
olivenbraune Feigenvogel.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 53. *der Flügelfleck.*

115. PINGUIS. *Der Fettling. (2)*

Pennant, arct. Zool. II. p. 383. n. 231. *der Mönch.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 161. *der fette Feigen-
fresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 132. Sylvia
(Pinguis) griseo-olivacea, subtus albida, ma-
cula verticis uropygioque flavis, rectricibus
quatuor extimis intus albo maculatis.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 798. *der Fett-
ling.*

116. CANA. *Das Graukehlchen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 283. n. 232. *das Grau-
kehlchen.*

Büffon,

(2) Die Benennung *Fettling*, (*Grassets*) wird in Louisiana ausser
dieser, auch den drey vorhergehenden, und der nächstfolgen-
den Gattung, wegen ihrer ausnehmenden Fettigkeit gegeben.
Sie halten sich häufig auf den Tulpenbäumen auf, besonders
aber lieben sie die große Magnolie. (*Magnolia grandiflora* Linn.)

Büffon, Vögel, XVI. p. 162. *der aschgraue Feigenfresser mit aschgrauer Kehle.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 133. Sylvia (Cana) cinerea, subtus grisea, cauda nigra, rectricibus 1, 1, toto, 2, 2, 3, 3, apice albis.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 798. *der aschfarbene Feigenvogel mit der aschfarbenen Kehle.*

21. CORONATA. *Die gekrönte Motacille.*

Müller, Naturfyst. II. p. 611. n. 21. *die gekrönte Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 375. n. 211. *die Goldkrone.*

Onomat. hist. nat. III. p. 904. *die aschgraue gefleckte Bachstelze aus Pensylvanien.*

Onomat. hist. nat. V. p. 263. *die pensylvanische Bachstelze mit gelbem Kopfe.*

Briffon, ornith. I. p. 460. n. 81. Figuier cendré tacheté de Pensylvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 174. *der gekrönte Feigenfresser; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 538. n. 115. Sylvia (Coronata) nigro-maculata, pileo hypochondriis uropygioque flavis, fascia per oculos gulaque nigra.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 88. *zwey Fliegenschnäpper mit goldenen Kronen, ein Er und eine Sie.*

Martini, Naturlex. V. p. 67. *die gekrönte Bachstelze.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 55. *gekrönte oder pensylvanische Bachstelze mit gelbem Kopfe.*

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 794. *der Feigenvogel mit der goldenen Krone.*

22. **SENEGALENSIS.** *Die braune Senegalische Motacille.*

Müller, Naturfyft. II. p. 611. n. 22. *die Senegalische Bachstelze.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 849. *die Bachstelze von Senegal.*

Briffon, ornith. I. p. 432. n. 29. Traquet du Sénégal.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 61. Sylvia (Senegalensis) fusca, remigibus intus rufis, rectricibus nigris, apice albis.

117. **LEUCOMELA.** *Die schwarz und weiße Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 469. n. 7. Muscicapula (Leucomela) nigra, pileo nucha uropygio abdomine rectricibusque maxima parte albis.

118. **ERYTHROGASTRA.** *Die rothbäuchige Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 513. n. 18. Sylvia (Erythrogastrea) nigra, subtus abdomine uropygio caudaque castanea, pileo cinerascens, macula remigum alba, armillis nigris.

119. **MAURA.** *Das Mohrenköpfchen.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 174. n. 52. *das Mohrenköpfchen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 62. Sylvia (Maura) nigra griseo marginata, subtus alba, gula ferruginea, macula alarum uropygio basi- que caudae albis.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 9. n. 17. Motacilla maura.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 202. *Mohrenköpfchen.*

β. Latham,

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 526. n. 62. β. *Sylvia* rufo-fusca, subtus albida, superciliis rufis, gula abdomine uropygio basique caudae albis.

120. SUPERCILIOSA. *Die Motacille mit gelben Augenbraunen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 63. *Sylvia* (Superciliosa) virescens subtus pallida, superciliis flavis, lineola verticis pallida.

121. FERRUGINEA. *Die braunrothkehlige Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 64. *Sylvia* (Ferruginea) cinerea, subtus albida, gula colloque ferrugineis.

122. CYANURA. *Die blauschwänzige Motacille.*

Müller, Naturyst. Suppl. p. 155 n. 53. *der Blauschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 527. n. 65. *Sylvia* (Cyanura) cinereo-flavescent, subtus superciliisque flavo-albis, alis caudaque fuscis, uropygio rectricumque marginibus caeruleis.

Pallas, Reif. Ausz. II. Anh. p. 10. n. 18. *Motacilla cyanurus.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 801. *Blauschwanz.*

123. AUROREA. *Die daurische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 125. n. 66. *Sylvia* (Aurorea) nigra, vertice griseo albo, fronte maculaque alarum albis, corpore subtus rectricibusque lateralibus fulvis, 2. intermediis nigris.

Pallas, Reif. Ausz. III. Anh. p. 6. n. 13. *Motacilla aurorea.*

124. STRIATA. *Der Seegler.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 373. n. 207. *der Schwarzkopf*, p. 374. (in Neuyork *der Seegler.*)

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 527. n. 67. *Sylvia* (Striata) nigro striata, supra cinerea, subtus alba, fascia alarum duplici alba, rectricibus duabus extimis apice macula alba.

125. INCANA. *Der Graukopf.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 374. n. 208. *der Graukopf.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 527. n. 68. *Sylvia* (Incana) laete grisea, subtus fasciaque alarum duplici alba, iugulo aurantio, gula pectoreque flavis.

126. FLAVIFRONS. *Die gelbstirnige Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 376. n. 213. *der Sänger mit der gelben Stirn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 527. n. 69. *Sylvia* (Flavifrons) griseo-caerulescens, subtus alba, pileo maculaque alarum flavis, iugulo fasciaque oculorum nigris, rectricibus extimis albo maculatis.

127. BLACKBURNIAE. *Die blackburnische Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 384. n. 234. *der Blackburnische Sänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 527. n. 17. *Sylvia* (Blackburniae) pileo atro, linea verticali et suboculari, loris pectoreque medio flavis, fascia alarum crisso rectricibusque extimis tribus albis, per oculos vitta magna.

128. MITRATA. *Die schwarzkappige Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 372. n. 204. *der Sänger mit der Kappe.*

Klein, av. p. 85. n. 5. *Parus cucullo nigro.*

Klein, Vorbereit. p. 159. n. 5. *schwarzgekappte Meise*.

Klein, verbeß. Vögelhist. p. 38. n. 5. *schwarzgekappte Meise*.

Briffon, ornithol. I. p. 471. n. 16. Mesange à collier de la Caroline.

Büffon, Vögel, XVII. p. 146. *die Meise mit dem Halsbande*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 528. n. 71. *Sylvia* (Mitrata) olivacea, subtus capite antice gulaque luteis, torque nigro.

Seligmann, Vögel, III. tab. 20. *schwarzgekappte Meise*.

Naturgesch. a. d. best. Schr. Vögel, p. 848.

β. *Büffon*, Vögel, XIV. p. 56. *der citrongelbe Fliegenschnäpper*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 528. n. 71. β. *Sylvia* griseo-virescens, subtus flava, capite colloque inferiore nigro-sericeis, fronte lateribus capitis corporeque subtus flavis.

129. CALLIOPE. *Die rubinkehlige Motacille*. (3)

Latham, Syn. Suppl. p. 140. tab. in tit.

Pallas, Reif. Ausz. III. p. 211. *die sangreiche Motacilla Calliope*.

Pallas, Reif. Ausz. III. Anh. p. 7. n. 17. *Motacilla Calliope*.

130. LITTOREA. *Die Strandmotacille*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 163. *Sylvia* (Littorea) supra obscure viridis, subtus ochroleuca, remigibus rectricibusque nigricantibus.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 413. *die Strandbachstelze*.

131. LON-

(3) Ist nach *Latham* mit *Turdus Camtschakenensis* p. 317. n. 58. einerley.

- 131. LONGIROSTRIS.** *Die langschnäblige Motacille.*
Büffon, Vögel, XVII. p. 34. — p. 35. *Rapisch-*
kin pers.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 165. *Sylvia*
(Longirostris) cinerea subtus atra, rostro longo.
Martini, Naturlex. V. p. 119. *die langschnäblige*
Bachstelze, oder der persische Langschnabel.
 Neueste Mannigfalt. IV. p. 196. *langschnäblichte*
Bachstelze.

- 132. OCHRURA.** *Die gelbschwänzige persische Mo-*
tacille. (4)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 668. not.
 2. et 3.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 165. *Sylvia*
(Ochrura) capite cinereo, cervice et dorso an-
tice atro, iugulo et pectore splendide nigris,
abdomine flavo.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 129. *persischer Gelb-*
schwanz.

- 133. OBSCURA.** *Die graubraune Motacille.*

S. unten die Anmerk. n. 4.

- 134. SUNAMISICA.** *Die sunamische Motacille.* (5)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. not. 4.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 166. *Sylvia*
(Sunamifica) ex cinereo rufescens, mente gula-
que nigris, pectore et abdomine rufescentibus,
pennarum apice albo, crisso niveo, rectrici-
bus intermediis fuscis, lateralibus fulvis.

Uu 2

135. Mu.

(4) *Latham* verwechselt Character und Synonymen bey dieser und der folgenden Gattung. Die *Mot. obscura* fehlt in seinem *Index ornithol.* ganz; und die Synonymen aus *Gmelin* und *Pallas* hat er zur *Mot. Ochrura* gezogen. *Bechstein* hält die *Mot. Ochrura* für eine alte *Motacilla atrata* s. *Eritacus*.

(5) Nach *Bechstein* eine junge *Motacilla Phoenicurus*.

135. MURINA. *Die mauſefahle Motacille.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 528. n. 73. Sylvia (Murina) murina, ſubtus fasciaque per oculos alba, capite collo abdomineque medio nigris.

136. SPINICAUDA. *Die ſtachelſchwänzige Motacille.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 528. n. 74. Motacilla (Spinicauda) fusca, ſubtus humerisque alba, pileo flavo nebuloſo, cauda cuneiformi, rectricibus apice nudis ſubulatis.

137. MAGELLANICA. *Die magellaniſche Motacille.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 528. n. 75. Sylvia (Magellanica) fusco flavescens, nigro undulata, ſubtus cinereo-flava, nigricante transverſim ſtriata, cauda brevior nigra lineis transverſis.

138. CITRINA. *Die citrongelbe Motacille.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 529. n. 76. Sylvia (Citrina) flava, ſtriis nigricantibus, ſubtus uropygioque flavo, genis collo inferiore pectoreque albis, cauda brevior nigra apice flavescente.

139. LONGIPES. *Die langfüßige Motacille.*

Latham, Syn. Suppl. p. 181. Long-legged Warbler.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 529. n. 77. Sylvia (Longipes) pallide viridis, ſubtus cinerascens, fronte genis colloque lateribus cinereis, ſupra oculos lunula alba, cauda brevissima.

23. VARIA. *Die bunte Motacille.*

Müller, Natursystem, II. p. 612. n. 23. die bunte Bachstelze.

Pennant, arct. Zool. II. p. 375. n. 210. *der Weißkopf.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 896. schwarz und weißbunte Grasmücke; schwarze Grasmücke mit weißgestreiftem Rücken.

Klein, av. p. 75. n. II. *Luscinia*, quae *Muscicapa* ex fusco et albo varia, *Sloan.*

Klein, *Vorbereit. p. 141. n. II. schwarz und weißbunte Grasmücke.*

Klein, *verbess. Vögelhistor. p. 76. n. II. schwarz und weiße Grasmücke.*

Briffon, *ornith. I. p. 454. n. 69. Figuier varié de S. Domingue.*

Büffon, *Vögel, XVI. p. 133. der bunte Feigenfresser; m. e. Fig.*

Latham, *Syst. ornithol. II. p. 539. n. 118. Sylvia (Varia) albo nigroque maculata, fasciis alarum duabus albis, cauda bifida.*

Seligmann, *Vögel, VIII. tab. 90. der schwarz und weiße Baumhacker.*

Martini, *Naturlex. V. p. 40. die bunte Bachstelze von Domingo.*

Neuesse Mannigfalt. IV. p. 807. bunte Bachstelze von St. Domingo.

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 791. der gescheckte Feigenvogel.

24. CAPENSIS. *Die capsche Bachstelze.*

Müller, *Naturyst. II. p. 612. n. 24. die capsche Bachstelze.*

Onomat. hist. nat. V. p. 263. die Bachstelze vom Vorgeb. d. g. H.

Briffon, *ornithol. I. p. 440. n. 43. Bergeronette du Cap de b. E.*

Büffon, *Vögel, XVI. p. 70. der Kapsche Sticherling; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 505. n. 10. *Motacilla* (*Capensis*) fusca subtus albida, fascia pectorali fusca, superciliis albis, cauda nigra, rectricibus lateralibus oblique albis.

Martini, Naturlex. V. p. 110. *Bachstelze vom Kap.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 141. *kapische Bachstelze.*

Naturgeschichte aus den besten Schriftst. Vögel, p. 770.

25. **ICTEROCEPHALA.** *Die gelbgescheitelte Motacille.*

Müller, Naturyst. II. p. 612. *Gelbkopf.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 380. n. 222. *der Sänger von Quebec.*

Onomat. hist. nat. III. p. 896. *die Bachstelze mit einem gelben Kopf von Canada.*

Briffon, ornithol. I. p. 451. n. 64. *Figuier à tête jaune de Canada.*

Büffon, Vögel, XVI. *der gelbköpfige Feigenfresser; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 538. n. 113. *Sylvia* (*Icterocephala*) grisea, subtus albida, pileo luteo, fascia oculari nigra, duabusque alaribus flavis.

Martini, Naturlex. V. p. 83. *die gelbköpfige Bachstelze aus Kanada.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 787. *der Feigenvogel mit gelbem Kopf.*

26. **DOMINICA.** *Die domingische Motacille.*

Müller, Naturyst. II. p. 612. n. 26. *die domingische Bachstelze.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 894. *die Harlekingsgrasmücke; die gelb, braun und blaue Grasmücke.*

Halle,

Halle, Vögel, p. 326. n. 296. *Harlehinsgrasmücke.*

Klein, av. p. 75. n. 16. *Luscinia diversicolor.*

Klein, Vorbereit. p. 142. n. 16. *gelb. braun. und blaue Grasmücke.*

Klein, verbeß. Vögelhist. p. 76. n. 16. *gelbraune und blaue Grasmücke.*

Briffon, ornith. I. p. 462. n. 65. *Figuier cendré de S. Domingue.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 122. *der aschgraue Feigenfresser mit gelber Kehle; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 538. n. 114. *Sylvia (Dominica) cinerea, subtus alba, macula ante oculos lutea, pone alba, infra nigra.*

Martini, Naturlex. V. p. 44. *die Domingoische aschgraue Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. III. p. 809 *domingoische aschgraue Bachstelze.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. m. Merian. Kupf. Vög. p. 788. *der aschfarbene Feigenvogel mit gelber Kehle.*

27. CINCTA. *Die Motacille mit dem Gürtel.* (6)

Müller, Naturfyst. II. p. 613. n. 27. *die canadische Bachstelze.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 381. n. 223. *der Sänger mit dem Gürtel.*

Onomat. histor. natur. III. p. 894. *die aschgraue Bachstelze von Canada.*

Briffon, ornithol. I. p. 453. n. 67. *Figuier cendré de Canada.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 127. *der Canadische Feigenfresser; m. e. Fig.*

Uu 4

Latham,

(6) Da in der XII. Edition die Trivialbenennung *M. Canadensis* Nro. 42. nochmals vorkommt, so ist zu Vermeidung einer Zweydeutigkeit hier dafür *Cincta* gesetzt worden.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 539. n. 116. *Sylvia* (Cincta) cinerascens, subtus alba, vertice fasciaque abdominali lutea, pectore fusco maculato.

Martini, Naturlex. V. p. 14. *die aschgraue kanadensische Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. III. p. 774. *aschgraue kanadensische Bachstelze.*

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 789. *der Feigenvogel mit dem Gürtel.*

28. MADAGASCARIENSIS. *Der Cherik.* (7)

Müller, Natur Syst. II. p. 613. n. 28. *die madagascarische Bachstelze.*

Onomat. hist. nat. V. p. 267. *Motacilla Maderaspatana.*

Briffon, ornith. I. p. 446. n. 55. *petit Figuier de Madagascar.*

Rüffon, Vögel, XVI. p. 80. *der Cherik; Tcherik; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 533. n. 94. *Sylvia* (Madagascariensis) virescens, subtus albida, gula anoque flavis, palpebris albis.

Martini, Naturlex. V. p. 121. *maderaspatanische Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 198. *grünliche madagascarische oder maderaspatanische Bachstelze.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. m. Merian. K. Vög. p. 776. *der Cherik.*

140. BORBONICA. *Die bourbonische Motacille.*

Onomat. histor. natur. III. p. 893. *die Bachstelze von der Insel Bourbon.*

Briffon,

(7) In der XII Edition steht hier durch einen Schreib- oder Druckfehler *Maderaspatana*, welcher Fehler auch in die *Onomat. hist. nat.* übertragen worden. Uebrigens ist die Trivialbenennung *Madagascariensis*, p. 952. n. 56. schon einmal vorgekommen.

Briffon, ornith. I. p. 419. n. 60. Figuier de l'Isle de Bourbon, ou petit Simon.

Büffon, Vögel, XVI. p. 82. *der kleine Simon*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 533. n. 95. *Sylvia* (Borbonica) griseo-fusca, subtus griseo-flavescens, remigibus rectricibusque griseo marginatis.

Martini, Naturlex. V. p. 41. *Bächstelze der Insel Bourbon*.

Neueste Mannigfalt. III. p. 808. *Bachstelze der Insel Bourbon*.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 777. *der kleine Simon*.

141. MAURITANA. *Die blaugraue Motacille.* (8)

Büffon, Vögel, XVI. p. 84. *der blaue Feigenfresser*; *Feigenfresser der Insel Frankreich*; mit e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 534. n. 96. *Sylvia* (Mauritana) griseo-caerulescens, subtus alba, remigibus rectricibusque nigris, margine albis.

142. LIVIDA. *Die blaue madagascarische Motacille.* (9)

Büffon, Vögel, XVI. p. 84. *der blaue Feigenfresser*; *madagascarische Feigenfresser*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 534. n. 97. *Sylvia* (Livida) griseo-caerulescens, crisso albido, remigibus caudaque nigris, rectricibus duabus exterioribus albis.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 777. *der blaue Feigenfresser*.

(8) Nach *Büffon* das Weibchen von der folgenden Gattung.

(9) Nach *Büffon* das Männchen der vorhergehenden Gattung.

143. FLAVESCENS. Die gelbbäuchige senegalische Motacille. (10)

Büffon, Vögel, XVI. p. 85. der Senegalische Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 534. n. 98. Sylvia (Flavescens) fusca, subtus citrina, genis albidis, remigibus rectricibusque fuscis.

β. Büffon, Vögel, XVI. p. 86. der Feigenfresser Nro. 3. (1)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 534. n. 99. Sylvia (Rufigastrea) olivaceo-fusca, subtus rufo-flavescens, remigibus rectricibusque fuscis.

144. UNDATA. Die gefleckte Motacille. (2)

Büffon, Vögel, XVI. p. 86. der gefleckte Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 534. n. 100. Sylvia (Undata) nigra, marginibus pennarum uropygioque rufis, subtus alba, remigibus caudaque cuneata fuscis.

145. FUSCATA. Die braunrückige Motacille.

Büffon, Vögel, XVI. p. 87. der braune Senegalische Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 535. n. 101. Sylvia (Fuscata) fusca, subtus grisea, lateribus rufescentibus, remigibus rectricibusque obscurioribus, cauda elongata.

146. SUB-

(10) Nach Büffon eine Abart von *Motacilla Undata*.

(1) Nach Büffon eine Abart des Geschlechts oder des Alters von *Motacilla Undata*. Nach Latham eine eigne Gattung.

(2) Ist nach Büffon das Männchen, wovon N. 143. α und β Abarten seyn sollen.

146. SUBFLAVA. *Die blonde Motacille.* (3)

Büffon, Vögel, XVI. p. 87. *der blonae senegalische Feigenfresser*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 535. n. 102. *Sylvia* (Subflava) rufo-fusca, subtus grisea, uropygio pallido, lateribus corporis rufescentibus, cauda cuneiformi.

ß. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 87. *der graubäuchige Senegalische Feigenfresser*; m. e. Fig. (4)

29. AUROCAPILLA. *Die goldfarbig gescheitelte Motacille.*

Müller, Natursyst. II. p. 613. n. 29. *der Goldkopf.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 315. n. 119. *der Goldkopf.*

Onomat. histor. natur. V. p. 261. *die gelbköpfige Bachstelze aus Pensylvanien.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 166. n. 4. *goldgekrönte Drossel.*

Brissou, ornithol. I. p. 448. n. 57. *Figuier à tête d'or de Pensilvanie.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 315. *die kleine domingosche Drossel*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 328. n. 6. *Turdus* (Aurocapillus) olivaceus, subtus albus, vertice aureo, superciliis nigris, pectore nigro-maculato.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 42. *die goldgekrönte Drossel.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 64. *die gelb- oder goldköpfige Bachstelze.*

30. PE.

(3) Nach *Büffon* eine Abart von *Motacilla Fuscata*.

(4) Nach *Büffon* das Weibchen von *Motacilla Fuscata*. Was für eine große Unbestimmtheit herrscht noch unter allen diesen Gattungen!

30. PETECHIA. *Die rothköpfige Motacille.*

Müller, Naturyst. II. p. 613. n. 30. *die gefleckte Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 373. n. 206. *der Rothkopf.*

Onomat. hist. nat. III. p. 904 *die Bachstelze aus Pensylvanien mit einem rothen Kopf.*

Klein, verbeß. Vögelhistor. p. 167. n. 4. *gelber Rothkopf.*

Brissou, ornithol. I. p. 443. n. 49. *Figuier à tête rouge de Pensilvanie.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 91. *der rothköpfige Feigenfresser; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 535. n. 103. *Sylvia (Petechia) olivacea, subtus flava, rubro guttata, pileo rubro.*

Seligmann, Vögel, VII. tab. 46. *der Rothkopf mit gelbem Leib.*

Martini, Naturlex. V. p. 65. *gefleckte Bachstelze.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. p. 780. *der Feigenvogel mit rothem Kopfe.*

147. ALBICOLLIS. *Die olivenfarbige weißkehlige Motacille.*

Brissou, ornithol. I. p. 445. n. 52. *Figuier de S. Domingue.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 94. *der weißkehlige Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 535. n. 104. *Sylvia (Albicollis) viridi-olivacea, subtus albo-flavicans strigis rufescentibus, rectricibus lateralibus intus dimidiato-sulphureis.*

Martini, Naturlex. V. p. 46. *domingoische olivenfarbige und schwefelgelbe Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. III. p. 810. *domingoische olivenfarbige, und schwefelgelbe Bachstelze.*

Naturgesch. a. d. best. Schrift. p. 780. *der Feigenvogel mit der weißen Kehle.*

148. LUDOVICIANA. *Die louisianische Motacille. (5)*

Pennant, arct. Zool. II. p. 380. n. 220. *der louisianische Sänger.*

Onomat. hist. nat. III. p. 900. *die ludovicianische Bachstelze.*

Briffon, ornith. I. p. 446. n. 55. *Figuier de la Louisiane.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 96. *der gelbkehlige Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 535. n. 105. *Sylvia* (Ludoviciana) viridi-olivacea, subtus alba luteo varia, collo subtus flavo, fascia alarum duplici alba, rectricibus duabus exterioribus apice intus albis.

Naturgesch. a. d. best. Schrift. p. 780. *der Feigenvogel mit gelber Kehle.*

149. CHLOROLEUCA. *Die grün und weiße Motacille.*

Onomat. hist. nat. III. p. 900. *die kleine Bachstelze von der Insel Dominique.*

Briffon, ornithol. I. p. 445. n. 53. *petit Figuier de S. Domingue.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 98. *der grün und weiße Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 536. n. 106. *Sylvia* (Chloroleuca) viridi-olivacea, subtus flavicans, capite

(5) *Briffon* verwechselt diesen Vogel mit *Edw. Pine-creeper* (*Certhia Pinus*, p. 478. n. 16.)

capite colloque superius cinereis, rectricibus lateralibus intus dimidiato-luteis.

Martini, Naturlex. V. p. 45. *kleine Domingoische Bachstelze*.

Neueste Mannigfalt. III. p. 10. *Domingoische kleine Bachstelze*.

Naturgesch. a. d. best. Schrift. p. 782. *der grün und weiße Feigenvogel*.

150. AURICOLLIS. *Die pomeranzenkehlige Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 380. n. 221. *der Sänger mit orangengelber Kehle*.

Onomat. hist. nat. III. p. 896. *die größere Bachstelze aus Canada*.

Briffon, ornith. I. p. 449. n. 59. *grand Figuier de Canada*.

Büffon, Vögel, XVI. p. 100. *der pomeranzenkehlige Feigenfresser*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 536. n. 107. *Sylvia (Auricollis) olivacea, subtus flava, collo subtus pectoreque flavo-aurantiis, crisso rectricibusque lateralibus intus albis*.

Martini, Naturlex. V. p. 104. *die große kanadensische Bachstelze*.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 138. *große kanadensische Bachstelze*.

Naturgesch. a. d. best. Schrift. p. 782. *Feigenvogel mit orangefarbener Kehle*.

151. MACULOSA. *Die Motacille mit gelbem Steiß. (6)*

Pennant, arct. Zool. II. p. 373. n. 205. *der Sänger mit dem gelben Rumpfe*.

Briffon,

(6) Ist nicht mit *Motacilla maculata*, p. 965. n. 92. zu verwechseln.

Briffon, ornith. I. p. 447. n. 56. Figuier tacheté de Pensilvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 102. *der grauköpfige Feigenfresser*; m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 182. Yellow-rumped Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 536. n. 108. Sylvia (Maculosa) nigro-maculata, supra viridi-olivacea, subtus uropygioque lutea, capite cinereo, fascia alarum duplici, rectricibusque lateralibus medio intus albis.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 45. *der Fliegenfänger mit gelbem Bürzel*.

Martini, Naturlex. V. p. 152. *pensylvanische bunte Bachstelze*.

Naturgesch. m. merian. Kupf. Vög. p. 783.

152. FUSCESCENS. *Die hellbraune Motacille.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 897. *die lichtbraune Mausfarbene Grasmücke*.

Klein, av. p. 75. n. 14. Luscinia, Muscicapa pallide fusca.

Klein, Vorbereit. p. 142. n. 14. *lichtbraune Grasmücke*.

Klein, verb. Vögelh. p. 76. n. 14. *lichtbraune Grasmücke*.

Briffon, ornith. I. p. 550. n. 61. Figuier de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XVI. p. 105. *der braune Feigenfresser*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 537. n. 109. Sylvia (Fuscescens) fuscescens, subtus rufo griseoque varia, per oculos iuguloque saturate fuscis.

Martini, Naturlex. V. p. 107. *Jamaixenische Bachstelze*.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 783.

153. TIGRINA. *Die getiegerte Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 379. n. 219. *der gefleckte Sänger.*

Onomat. hist. nat. III. p. 895. *die dunkle Bachstelze von Canada.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 168. n. 3. *gelbbunter Fliegenstecher.*

Briffon, ornith. I. p. 451. *Figuier brun de Canada.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 108. *der gelbflekkigte Feigenfresser*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 537. n. 110. *Sylvia (Tigrina) fusco et olivaceo-viridi varia, subtus flava, collo subtus pectoreque nigro-maculata, pone oculos macula rufa, fascia alarum alba.*

Seligmann, Vögel, VII. tab. 47. *der gelbgefleckte Fliegenfänger.*

Martini, Naturlex. V. p. 35. *die braune kanadensische Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. III. p. 803. *braune oder dunkle kanadensische Bachstelze.*

Naturgesch. a. d. best. Schr. m. Merian. K. p. 785. *der braun und gelbe Feigenvogel.*

β. *Briffon*, ornith. I. p. 450. n. 62. *Figuier brun de S. Domingue.* (7)

Büffon, Vögel, XVI. p. 110. *der braune Feigenfresser von St. Domingo.*

Onomat. hist. nat. III. p. 899. *die dunkle Bachstelze von der Insel Dominique.*

Martini, Naturl. V. p. 34. *die braune Bachstelze von St. Domingo.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 537. n. 110. β.

Neueste

(7) Nach *Büffon* das Weibchen. Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Neueste Mannigfalt. III. p. 802. *braune oder dunkle Bachstelze der Insel St. Domingo.*

154. VIRENS. *Die grünliche Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 377. n. 214. *der grüne Sänger.*

Onomat. hist. nat. III. p. 905. *die Bachstelze aus Pensylvanien mit einer schwarzen Kehle.*

Briffon, ornith. I. p. 458. n. 77. *Figuier à gorge jaune de Pensilvanie.*

Büffon, Vögel, XVI. *der schwarzkehlige Feigenfresser; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 537. n. 112. *Sylvia (Virens) viridi-olivacea, subtus alba, genis, lateribus colli pectoreque flavis, collo subtus nigro, fascia alarum duplici alba.*

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 90. *der grüne Fliegenschnäpper mit schwarzer Brust.*

Naturg. sch. a. d. best. Schr. p. 787. *der Feigenvogel mit der schwarzen Halskrause.*

31. DUMETORUM. *Der Hecken Springer.*

Müller, Natur Syst. II. p. 614. n. 31. *der Hecken Springer.*

Onomat. hist. nat. V. p. 264. *die Bachstelze so sich in Dornhecken aufhält.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 535. n. 4. *die graue Grasmücke; die weiße, blasse Grasmücke; der Dornreich. Motacilla dumetorum?*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604. *Motacilla dumetorum?*

Halle, Vögel, p. 343. n. 324. *der braune Hecken vogel?*

Halle, Vögel, p. 343. n. 325. *die Heckenwittwe; kleinste Heckenschmätzer; Wittwe?*

Zorn, Petinotheol. II. p. 377. *der kleinste Gattung Hecken-Schmätzer?*

Neueste Mannigfalt. III. p. 811. *Dorndreher?*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 522. n. 45. Sylvia (Dumetorum) cinereo-fusca, capite caeruleo-fescente, gula pectoreque albis.

Kramer, Austr. p. 377. n. 19. *blaue Grasmücke; Weißbartl; Dorngreul.*

32. CINNAMOMEA. *Der Zimmtvogel.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 614. n. 32. *der Zimmtvogel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 474. n. 23. β. Muscicapula cana subtus coccinea, gula nigra, remigibus quatuor primis basi rubris.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 464. *Zimmtvogel.*

155. NIGRIROSTRIS. *Die schwarz schnäblige Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 522. n. 46. Sylvia (Nigrirostris) fusco-olivacea subtus alba, pectore rufo nigro striato, loris gulaque rufo-flavis, striga maxillari nigricante, rectrice extima toto, sequente apice alba.

156. LUTESCENS. *Die schwarzgelbstirnige Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 523. n. 48. Sylvia (Lutescens) ferrugineo-fusca, subtus rufo-alba, fronte gulaque flavescentibus, macula aurium obscure rubra.

157. BOREALIS. *Die nördliche Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 522. n. 47. Sylvia (Borealis) viridi-olivacea, subtus flava, fronte
genis

(8) Nach Latham eine Varietät von *Muscicapa Flammea*, p. 942.
n. 60.

genis gulaque ferrugineis, rectricibus laterali-
bus apice albis.

158. CAMTSCHATKENSIS. *Die kamtschatkische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 162. *Sylvia* (Kamtschatkensis) fusco olivacea, abdomine medio albo, fronte genis gulaque pallide ferrugineis, rostro elongato.

Pennant, arct. Zool. II. p. 393. O. der Langschnabel.

159. AWATCHA. *Die Motacille von Awatcha.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 395. T. der Sänger von Awatcha.

Latham, Syst. ornith. II. p. 553. n. 167. *Sylvia* (Awatcha) fusca, subtus alba, pectore nigro. maculato, rectricibus lateralibus basi fulvis.

Latham, Syn. Suppl. p. 184. Awatcha Warbler.

33. CAPRATA. *Die luzonische Motacille.*

Müller, Naturyst. II. p. 614. n. 33. der Zaunhüpfer.

Onomat. hist. nat. VI. p. 847. das Luçonische Weißkehlchen.

Briffon, ornithol. I. p. 432. n. 30. Traquet de l'Isle de Luçon.

Büffon, Vögel, XV. p. 262. der Traquet von der Insel Lüßon, oder der Zaunhüpfer; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 524. n. 52. *Sylvia* (Caprata) nigra, uropygio crasso maculaque tectricum albis.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 454. der Zaunküpfen.

34. PHOENICURUS. *Der Hausröthling.* (9)

Müller, Naturfyst. II. p. 618. n. 34. *das Schwarzkehlchen.*

Leske, Naturgesch. p. 269. n. 4. *der Wistling.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 193. n. 14. *das Schwarzkehlchen; der Saulocker.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 192. n. 7. Motacilla (Phoenicurus) gula nigra, abdomine caudaque rufis, capite dorsoque cano; *das Schwarzkehlchen.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 539. n. 13. *das Rothschwänzchen; Mauernachtigall.*

Halle, Vögel, p. 331. n. 302. *das Schwarzkehlchen; Rothkehlchen mit schwarzem Kinne; Hausrothkehlchen; Rothschwanz.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 388. *der Wistling; das Schwarzkehlchen.*

Onomat. hist. nat. V. p. 269. *das Schwarzkehlchen.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 136. *Stadtrothschwänzlein; Hausrothschwänzlein; Röthling; Rothsterz; Schwarzkehlchen.*

Klein,

- (9) Einer der ersten Sänger des Frühlings, der sich gern in den Städten und Dörfern von den Spitzten der Dächer, von hohen Bäumen und Strangen herab, früh Morgens und Abends spät, auf eine helltönende angenehme und erfreuliche Weise hören läßt. Nährt sich zwar besonders von Insekten, frisst aber im Herbst auch Wacholder- und Hollunderbeeren, und wird um diese Jahreszeit mit letztern in Sprenkeln gefangen. Bey trübem Wetter kommt er zuweilen nach den Bienenstöcken, und fängt Bienen weg. Brütet jährlich zwey Mal, und nistet auch zwischen den Dachsparren unter den Ziegeln. Selten erfolgen nach seiner Ankunft noch starke Nachfröste. Gewöhnlich verläßt er uns um die Herbstnachtgleiche. Brütet auch Kukkukseyer aus, wenn dieser dazu kommen kann sein Ey in das Nest zu legen, verläßt aber auch seine eignen Eyer, wenn ein Mensch sie berührt hat, oder auch nur nahe dabey gewesen ist. Siehe nachher Anmerk. 4. bey *Motacilla Erithacus.*

- Klein*, av. p. 77. n. 2. *Sylvia thorace ex albo variegata*.
- Klein*, Vorbereit. p. 144. n. 2. *Schwarzkehllein*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 78. n. 2. *Schwarzkehllein*; *Hausrötele*, *Wüßling*, *Rottzägel*; *Saulocker*.
- Klein*, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. Fig. 8. a. b.
- Gesner*, Vögelb. p. 447. *Hausrötelein*; *Rothschwänzlein*; *Rotzägel*; *Rothstertz*; mit ein. fehl. Fig.
- Briffon*, ornith. I. p. 422. n. 15. *Rosignol de muraille*.
- Büffon*, Vögel, XV. p. 165. *die schwarzkehlige Mauernachtigall*, m. 2. Figg. M. u. W.
- Batsch*, Thiere, I. p. 561. *das Schwarzkehlchen*.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 511. n. 15. *Sylvia* (*Phoenicurus*) *gula nigra*, *abdomine caudaque rufis*, *capite dorsoque canis*, *fronte alba*.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 81. n. 185. *das Schwarzkehlchen*.
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 135. n. 8. *das Schwarzkehlchen*; *Hüting*; *Rothstiert*.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 440. *das Schwarzkehlchen*.
- Fischer*, Livl. p. 102. n. 170. *Erizchen*; *Rothbäuchlein*.
- White*, N. G. von Engl. p. 34. n. 17. p. 59. n. 11. p. 64. n. 2. *Hausröteln*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 174. n. 12. *Blodfugl*; *Blodstert*.
- Linné*, Abhandl. II. p. 305. n. 137. *das Schwarzkehlchen*.
- Scopoli*, Bem. aus der N. G. I. p. 192. n. 232. *das Wald-Rothschwänzlein*.
- Borkhausen*, Magazin, I. p. 185. n. 62. *Schwarzkehlchen*; *Gartenrothschwänzchen*.

Naturforsch. XVII. p. 104. n. 214. *das Schwarzkehlchen.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 64. *der Rothschwanz.*

Naumann, Vogelfteller, p. 148. *der gemine Rothschwanz.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 386. *der Haus - Röthling; das Haus - Rothschwänzlein.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 239. *das Schwarzkehlchen.*

Goeze, Natur, Menschl. u. Vorf. V. p. 195. *der Hausröthling.*

Neufelle Mannigfalt. IV. p. 403. *das Schwarzkehlchen.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. III. tab. 53. Fig. 6. 7.

Anweis. Vögel zu fang. p. 502. *der Röthling oder Rothschwänzlein.*

Martini, Naturlex. V. p. 179. *Schwarzkehlchen.*

Tänzer, notab. Venatoris, p. 98. n. 124. *Rothschwanz.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 502. *der Röthling, oder Rothschwänzlein.*

Meldinger, Vorles. I. p. 153. n. 4. *das Schwarzkehlchen.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. II. *Ruticilla.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 187. n. 21. *Motacilla (Phoenicurus) gula nigra, abdomine rufo, capite dorsoque cano.*

Kramer, Austr. p. 376. n. II. *Waldrothschweiffl.*

Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 10. *Ruticilla f. Phoenicurus.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 346. *Rubicilla; Ruticilla; Rubecula domestica aestiva; Luscinia murorum. Haus-Rötele; Wüßling; Rothschwanz; Rotzagal; Sommer Rötele.*

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. *Ruticilla.*

Rzaczyns.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 418. *Rubicilla*.
Barrere, ornithol. Cl. 3. gen. 18. sp. 6. *Ficedula*
 seu *Rubecula phoenicurus*.

Belon, observ. p. 17. *Ruticilla*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 347. *Rossignol de mur*
 ou de muraille.

Jonston, av. p. 122. *Ruticilla* seu *phoenicurus*.

Bomare, diction. X. p. 100. — Diction. des
 anim. III. p. 717.

Faun. Arragon. p. 89. — Hist. prov. I. p. 501.

Zinnar, Uov. p. 53. tab. 8. Fig. 41. *Culo-ranzo*,
Culo-rosso.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. *Phoenicurus*.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 49. *Φοινικουρος*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 385. n. 19.
 der *Hausröthling*.

β. *Der aschgraue Hausröthling*. (10)

Briffon, ornith. I. p. 423. A. *Rossignol de murail-*
le cendré.

Briffon, Vögel, XV. p. 179. *die aschgraue Mauer-*
nachtigall.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 512. n. 15. γ. *Ru-*
ticilla cinerea.

Borkhausen, Magaz. I. p. 186. n. 62. β.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 405. not. c.

γ. *Der Hausröthling mit gefleckter Brust*. (1)

Briffon, ornith. I. p. 423. B. *Rossignol de muraille*
à poitrine tachetée.

Xx 4

Briffon,

(10) Ist, nach *Briffon*, eine Varietät vom Männchen; nach *Bork-*
hausen ein junges Weibchen.

(1) Ist, nach *Briffon*, eine Spielart vom Weibchen; nach *Bechstein*
 ein junges im Herbst gleich nach der Mauser gefangenes Männ-
 chen. Mit letzterem stimmt *Borkhausen* in so weit überein, daß
 er es für das Männchen im Herbst hält, ehe es weggeht, zu
 welcher

Büffon, Vögel, XV. p. 179. *Mauernachtigall mit gelbroth gefleckter Brust.*

Klein, av. p. 78. n. 10. *Sylvia thorace argentata.*

Klein, Vorbereit. p. 147. n. 10. *Fleckkehlein mit silberstückenem Brustlatz.*

Klein, verb. Vögelh. p. 79. n. 13. *Fleckkehlein mit silberstückenem Brustlatz.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 512. n. 15. β . *Ruticilla pectore maculato.*

Frisch, Vögel, tab. 20. Fig. 2. b. *das Rothschwänzlein mit rothgesprengter Brust.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 603.

Borkhausen, Magaz. I. p. 186. n. 62. γ .

Neueste Mannigfalt. IV. p. 406. not. d.

δ. *Motacilla Titys.* (2)

Latham, Syst. ornith. II. p. 512. n. 16. *Sylvia (Tithys) remigibus nigricantibus, rectricibus rufis, intermedio pari nigro extrorsum rufescente.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 25. *Motacilla Titys.* Linn.

Halle, Vögel, p. 332. n. 303. *das Gartenschwarzkehlchen.*

Zorn,

welcher Zeit die sonst weisse Stirn grau wird, und die Kehle untenher weisse Flecken bekömmt.

- (2) Hier finde ich abermals eine grosse Verwechselung der Synonymen, und ganz verschiedene Meinungen der Naturforscher. In der X. Edit. nahm Linné die *Motacilla Titys* als eine eigne Gattung an. In der XIIten führt er sie als das Weibchen von *Motacilla Phoenicurus* auf. Unter den Neuern hat Latham l. c. sie wieder als eine eigne Gattung angenommen. Borkhausen ist eben der Meinung, zieht Scopoli's *Sylvia Tithys*, und Gmelins *Motacilla Gibraltariensis* als Synonymen zusammen; will aber doch Linné's *Motacilla Titys* davon getrennt wissen, ob sie gleich Scopoli mit der feinigen vereinigt. So viel hat seine Richtigkeit, daß die Beschreibungen bey dieser und den beyden folgenden Gattungen, dergestalt in einander laufen, daß es schwer hält, etwas mit Gewissheit darüber zu bestimmen.

Zorn, Petinotheol. II. p. 387. das Wald- oder Gartenrothschwänzlein; der Garten Röthling?
 Pontoppidan, Dannem. p. 174. n. 13. Titys; tab. 12.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 192. n. 233. das Haus-Rothschwänzlein.

Borkhausen, Magaz. I. p. 186. n. 64. Motacilla Tity. Hausrothschwänzchen; Mauernachtigall; Schwarzbrüstchen. p. 187. graues Rothschwänzchen.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 139. Hausrothschwänzchen.

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 14 Rubecula.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 187. n. 23. Motacilla (Titys) remigibus nigricantibus, rectricibus rufis: intermedio pari nigro extrorsum rufescente.

Kramer, Austr. p. 376. n. 12. Motacilla corpore nigro, cauda rufa? Hausrottschweiff.

160. GIBALTARIENSIS. Das Rothschwänzchen von Gibraltar. (3)

Klein, av. p. 80. n. 25. Sylvia f. Ruticilla corpore griseo, gutture nigro.

X x 5

Klein,

(3) Nach Borkhausen gehört diese Gattung, wie ich eben vorher bemerkt habe, zu *Motacilla Titys* Linn. — Brisson führt sie für sich allein auf; und Buffon sieht sie als eine Abart von *Motacilla Phoeniceus* an. Vergleicht man vollends die verschiedenen Synonymen bey den Ornithologen, so wird die Verwirrung noch grösser. In unserm System ist Edw. Grey Redstart, von Pennants Grey Redstart getrennt; ersterer zu *M. Gibraltariensis*, und letzterer zu *M. Erithacus* gerechnet. Aber Pennant führt Edwards selbst mit an; citirt auch Brissons und Buffons Ronge queue, die unser System zu *M. Erithacus* zählt; beruft sich auch auf Latham Syn. IV. p. 423 n. 12. dies ist wieder *M. Gibraltariensis*; und Latham vereinigt endlich Edw. und Penn. Grey Redstart, mit seinem Grey-Redstart, und rechnet sie mit Brisson zu *Mot. Gibraltariensis*.

Klein, Vorbereit. p. 150. n. 25. *schwarzkehliger grauer Rothschwanz*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 81. n. 28. *schwarzkehlig grauer Rothschwanz*.

Handb. der Naturgesch. II. 272. *das Blaukehlchen von Gibraltar*.

Briffon, ornith. I. p. 424. n. 16. *Rossignol de muraille de Gibraltar*.

Büffon, Vögel, XV. p. 180. *Edwards grauer Rothschwanz*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 513. n. 17. *Sylvia* (Gibraltariensis) cinerea, fronte abdomineque albis, genis colloque subtus nigris, uropygio rectricibusque lateralibus rufis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 57. *das graue Rothschwänzlein*.

35. ERITHACUS. Das gemeine Rothschwänzchen. (4)

Müller, Naturyst. II. p. 618. n. 35. *der Rothschwanz*.

Leske,

(4) Ich habe die hieher gehörigen Synonymen nach Anleitung unsres Systems geordnet, finde aber bey genauer Untersuchung derselben wiederum nicht wenige Zweydeutigkeiten, die die richtige Auseinanderetzung derselben, in Rücksicht auf die vorhergehenden Gattungen, erschweren. Was ich über die Naturgeschichte dieses Vogels bey den Ornithologen gesagt finde ist grossentheils auch auf die *M. Phoenicurus* so anwendbar, das auch der genaueste Kritiker, wenn er der Wahrheit die Ehre geben will, oft nicht wissen wird, wohin die Beschreibung eigentlich gehört; dies ist um so gewisser, da man selbst bey denen, die beyde umständlicher beschrieben haben, findet, wie sehr sie an Sitten und Lebensart einander gleichen. Merkwürdig bleibt es immer, das von der *M. Erithacus* sich weit weniger Synonymen, als von der *M. Phoenicurus* finden; das *Siemsen* des erstern unter den meklenburgischen Vögeln gar nicht gedenkt; das *Berkhausen* versichert, ihn nur einmal gesehen zu haben; das

Leske, Naturgeschichte. p. 270. n. 5. das *Rothschwänzchen*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 538. n. 12. der *Wistling*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 389 C. das *Rothschwänzchen*.

Oornat. hist. nat. III. p. 819. das *Rothschwänzlein*.
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 136 *Gartenrothschwänzlein*.

Klein, av. p. 78. n. 4. *Sylvia gula grisea, thorace longa, cauda tota rubra?*

Klein, Vorbereit. p. 146. n. 4. *Graukehlein, mit rothem Schwanz, und langem Brustlatz?*

Klein,

dass *Barrere*, *Salerne*, *Belon*, u. a. seiner gar nicht erwähnen, u. d. gl. daher denn auch *Beseke* auf den Gedanken gefallen, dass die *M. Phoenicurus* und *Eritacus* ein und eben derselbe Vogel seyn mögen, wie denn auch schon *Briffon* beyde *Linneische* Synonymen, unter seinem *Phoenicurus* mit einander verbindet. Es kommt hierzu noch ein Umstand, der die Sache erschwert. In unserm System ist *Frisch*, tab. 20. citirt, aber die Figur nicht bemerkt. Eben so citirt auch *Latham* den *Frisch*. *Briffon* führt ihn gleichfalls an, und beruft sich auf *Klein*. Wenn aber das richtig ist, was *Bechstein* (Naturgesch. Deutschl. III. p. 602. sq.) über die *Frischischen* Vögel gesagt hat, so kann keine von den *Figg. tab. 20* hieher gehören. Ihm nach ist a) das *Rothschwänzchen* mit ganz rothem Schwanz (*Phoenicurus, Rubicilla*) das Weibchen von *Motacilla Phoenicurus Linn.* und zwar eine Varietät, weil ihm die schwarzen mittlern Schwanzfedern fehlen b) Das *Rothschwänzlein* mit halb rothem, halb schwarzem Schwanz, *Phoenicurus inferiore parte caudae nigra*) das Weibchen von *Motacilla Suecica Linn.* womit auch *Zorn* (II. p. 431.) und *Büffon* (XV. p. 191.) übereinstimmen. c) Das *Rothschwänzlein* mit einer schwarzen Mittelfeder (*Phoenicurus media penna caudae subnigra*) das alte Weibchen von *Motacilla Suecica L* — Auf diese Art würde denn *Kleins* *Sylvia gula grisea thorace longa, cauda tota rubra*, zu *Motacilla Phoenicurus L.* — *Kleins* *Sylvia gula grisea fimbriata* aber zu *Motacilla Suecica L.* gehören.

Klein, verb. Vögelhist. p. 79. n. 7. *Graukehlein mit ganz rothem Schwanze, und langem Brustlatze.*

Klein, av. p. 78. n. 5. *Sylvia gula grisea fimbriata?*

Klein, Vorbereit. p. 146. n. 5. *Graukehlein schwarz verbräunt, mit halb roth, und halb schwarzem Schwanze?*

Klein, verb. Vögelhist. p. 79. Fig. 8. *Graukehlein, schwarz verbrehmt, mit halbrothem, und halb schwarzem Schwanze.*

Gesner, Vögelb. p. 448. *Rothschwänzlein.*

Briffon, ornith. I. p. 425. n. 18. *Rouge-queue à collier.*

Büffon, Vögel, XV. p. 184. *der Rothschwanz; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 513. n. 19. *Sylvia (Erithacus) dorso remigibusque cinereis, abdomine rectricibusque rufis, extimis duabus cineris.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 82. n. 186. *der Rothschwanz.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 440. *das Rothschwänzlein; Gartenröthling; Bienenschnappe.*

Fischer, Livl. p. 102. n. 169. *Rothschwanz.*

Martini, Naturlex. V. p. 172. *Rothschwänzchen.*

Naturforsch. XVII. p. 104. n. 215. *der Rothschwanz.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 186. n. 63. *das Waldrothschwänzchen.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 239. *der Rothschwanz.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 401. *Rothschwanz.*

Meidinger, Vorles. I. p. 153. n. 5. *Rothschwänzchen.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 12. *Phoenicurus.*

Linné,

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 187. n. 22. Motacilla (Erithacus) dorso remigibusque cinereis; abdomine rectricibusque rufis, extimis duabus cinereis.

Jonston, av. p. 122. Phoenicurus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 385. n. 20. das Rothschwänzchen.

β. *Briffon*, ornith. I. p. 424. n. 17. Rouge-queue. (5)

Büffon, Vögel, XV. p. 192. der graue Rothschwanz.

161. GUJANENSIS. Der guianische Rothschwanz.

Büffon, Vögel, XV. p. 195. der Guianische Rothschwanz; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 514. n. 20. Sylvia (Guianensis) grisea subtus alba, alis caudaque rufis.

Samml. zur Physf. und N. G. III. p. 240. der guianische Rothschwanz.

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 741.

162. ATRATA. Der schwarze Rothschwanz.

Latham, Syst. ornith. II. p. 514. n. 21. Sylvia (Atrata) nigra fusco-marginata, pileo cinereo, remigibus rectricibusque 2. intermediis fuscis, lateralibus rufis.

36. GUIRA. Der Guira. (6)

Müller, Naturfyst. II. p. 616. n. 36. die brasiliatische Bachstelze.

Halle,

(5) Nach *Briffon* eine eigne Gattung. Nach *Büffon* das Weibchen von *M. Erithacus*.

(6) Macht ein offenes, flaches, aus breitem welken Grafe und Fasern zuammen gefeztes Nest zwischen den kleinen Zweigen eines Baums, und legt weisse, verlohren schwarz gefleckte Eyer. Pennant.

- Halle*, Vögel, p. 342. n. 320. *der grüne Mönch, mit hellblauem Kopfe.*
- Pennant*, arch. Zool. II. p. 384. n. 233. *der Guira.*
Onomat. hist. nat. V. p. 266. der grüne Brustwenzel aus Brasilien.
- Brissou*, ornithol. I. p. 455. n. 71. Pipit verd du Brésil.
- Büffon*, Vögel, XVI. p. 198. *der Guiraberaba;*
 in. e. Fig.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 547. n. 147. Sylvia
 (Guira) viridis subtus uropygioque luteo, genis
 gulaque nigris, linea lutea cinctis.
- Seligmann*, Vögel, IX. tab. 41. *der Guira Guacu
 beraba.*
- Martini*, Naturlex. V. p. 33. *die brasilianische
 Bachstelze.*
- Salerne*, ornith. p. 249. Guiraguacu beraba.
- Fonston*, av. p. 205. Guiraguacu beraba.
- 37. SUECICA.** *Das Blaukehlchen.* (7)
- Müller*, Natursyst. II. p. 616. n. 37. *das Blaukehlchen.*
- Borowsky*, Thierreich, III. p. 194. n. 15. *das Blaukehlchen; die Wassernachtigall.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 538. n. II. *das Blaukehlchen.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 601. 602.
- Halle*, Vögel, p. 334. n. 307. *das Blaukehlchen.*
- Meyer*, Thiere, I. tab. 93 *Blaukehlchen?*
- Gatterer*, vom Nutz. und Schad. der Thiere II.
 p. 429. *das Blaukehlchen; Bleykehlchen; Spiegelvogelchen; Wegflecklein; Weidenguckerlein; Carlsvogel.*
- Pennant*, arch. Zool. II. p. 289. E. *das Blaukehlchen.*

Onomat.

Onomat. histor. natur. II. p. 52. *der Carlsvogel.*

Klein, av. p. 77. n. 2. *Sylvia gula caerulea, thorace ex albo variegata.*

Klein, Vorbereit. p. 145. n. 2. *Blaukehllein mit weißgeflecktem Brustlatze.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 78. n. 4. *Blaukehllein mit weißgeflecktem Brustlatze.*

Klein, av. p. 80. n. 24. *Sylvia, f. Rutililla guttore albo, zona caerulea fimbriato.*

Klein, Vorbereit. p. 150. n. 24. *Weißkehllein mit blauverbrämten Gürtel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 81. n. 27. *Rothschwanz mit weißer blau verbrämter Kehle.*

Gesner, Vögelb. p. 548. *Weidengückerlein; m. e. schl. Fig.*

Briffon, ornithol. I. p. 425. n. 19. *Gorge-bleue.*

Büffon, Vögel, XV. p. 225. *das Blaukehlchen; m. 2. Figg.*

Batsch, Thiere, I. p. 361. *das Blaukehlchen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 521. n. 43. *Sylvia (Suecica) cinereo-fusca, pectore ferrugineo, fascia caerulea, rectricibus fuscis versus basin ferrugineis.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 55. *das blaukehlige Rothschwänzlein.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 82. n. 187. *das Blaukehlchen.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 136. n. 9. *das Blaukehlchen.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 440. *das Blaukehlchen.*

Fischer, Zusätze zur N. G. von Livl. p. 49. n. 498. *das Blaukehlchen.*

Linné, Abhandl. II. p. 305. n. 138. *das Blaukehlchen.*

Naturforsch. XVII. p. 104. n. 216. *das Blaukehlchen.*

Naturforsch. XXII. p. 139. *Blaukehlchen*, XXV. p. 19. *Rothschwanz; Schildnachtigall.*

Günther, Nest. u. Ey. tab. 74. *Blaukehllein.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 430. *die Blau-Kehle.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 243. *das Blaukehlchen.*

André und Rechstein, Spazierg. III. p. 220. 225. *Blaukehlchen.*

Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 249.

Neueste Mannigfalt. III. p. 781. *Blaukehlchen.*

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. V. p. 746.

Naumann, Vogelfteller, p. 148. *der zweyte Rothschwanz, oder die Schildnachtigall.*

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Ruticilla.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 7. *Avis carolina.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 187. n. 24. *Motacilla* (Suecica) pectore ferrugineo fascia caerulea, rectricibus fuscis, versus basia ferrugineis.

Kramer, Austr. p. 375. n. 7. *Motacilla* pectore caeruleo macula flavelcente albedine cincta. *Blaukröpffl.*

Barrere, ornithol. Cl. 3. Gen. 19. sp. 6. *Motacilla pyrenaica*, cinerea, iugulo et pectore coeruleis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 385. n. 21. *das Blaukehlchen.*

β. *Briffon*, ornith. I. p. 426. n. 20. *Gorge bleue de Gibraltar.* (8)

Büffon, Vögel, XV. p. 232. *das Rothkehlchen von Gibraltar.*

γ. *Büffon*,

(8) Nach *Briffon* eine eigne Gattung. Er rechnet *Kleins* *Ruticilla gutture albo*, und *Edwards blue throated Redstaart* dazu, den *Büffon* für das Weibchen annimmt.

- γ. Buffon, Vögel, XV. p. 233. *der Spiegelvogel.*
 Latham, Syst. ornith. II. p. 522. n. 43. β. *Sylvia*
macula pectoris argentea.

38. SIALIS. *Der Blauvogel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 616. n. 38. *die amerika-*
nische Bachstelze.

Pennant, arch. Zool. II. p. 370. n. 198. *das blaue*
Rothkehlchen.

Onomat. hist. nat. VI. p. 844. *das blaue Rothkehl-*
chen aus Carolina.

Klein, av. p. 77. n. 3. *Rubecula americana cae-*
rulea.

Klein, Vorbereit. p. 145. n. 3. *Blaukehle mit ro-*
them Unterleibe, sonst blau.

Klein, verb. Vögelhist. p. 78. n. 5. *Brustwenzel*
mit rothem Unterleibe, sonst blau.

Klein, av. p. 80. n. 21. *Sylvia thorace rubro, su-*
premo corpore et cauda caeruleis.

Klein, Vorbereit. p. 150. n. 21. *Wenzel mit rothem*
Kamisol.

Klein, verb. Vögelhist. p. 80. n. 24. *Wenzel mit*
rothem Kamisol.

Briffon, ornithol. I. p. 428. n. 23. *Rouge-gorge*
bleue de la Caroline.

Buffon, Vögel, XV. p. 235. *das blauhälfige Roth-*
kehlchen; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 522. n. 44. *Sylvia*
(Sialis) supra caerulea, subtus rufo-rubra, ab-
domine albo.

Seligmann, Vögel, I. tab. 47. *das blaue Roth-*
kehlein.

Seligmann, Vögel, II. tab. 94. *der Blauvogel.*

Linne, Abhandl. II. p. 281. n. 18. *die Sialische Mo-*
tacille.

Martini, Naturlex. V. p. 12. *amerikanische Bachstelze*.

Samml. zur Physf. und N. G. III. p. 244. *der Blauvogel*.

Neueste Mannigfaltigk. III. p. 771. *die amerikanische Bachstelze*.

39. **FULICATA.** *Die philippinische Motacille.*

Müller, Natursystem, II. p. 617. n. 39. *die philippinische Bachstelze*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 848. *die philippinische Bachstelze*.

Briffon, ornith. I. p. 433. n. 31. Traquet des Philippines.

Büffon, Vögel, XV. p. 264. *der Philippinische Steinschmätzer*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 524. n. 53. *Sylvia* (Fulicata) nigro-violacea, crisso castaneo, macula tectricum alba.

Samml. zur Physf. u. Naturgesch. III. p. 246. *die philippinische Bachstelze*.

Martini, Naturlex. V. p. 153. *philippinische Bachstelze*.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 255. *philippinische Bachstelze*.

40. **CAYANA.** *Die blaue cayennische Motacille.*

Müller, Naturyst. II. p. 617. n. 40. *die mexicanische Bachstelze*.

Onomat. hist. nat. III. p. 769. *Elatototl*.

Briffon, ornithol. I. p. 455. n. 72. *Pipit bleu de Cayenne*.

Büffon, Vögel, XVI. p. 191. *der blaue Pitpit*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 445. n. 143. *Sylvia* (Cayana) caerulea, capistro humeris alis caudaque nigris.

Martini,

Martini, Naturlex. V. p. 125. *die mexikanische Bachstelze.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 201. *mexikanische Bachstelze.*

β. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 193. *der blaue Manaki.*

Latham, Syn. II. 2. p. 503. n. 138. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 546. n. 143. β.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 53. *der blaue Manakin.*

γ. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 193. *der blaue Pitpit von Cayenne*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 503. n. 138. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 546. n. 143. γ.

163. CYANOCEPHALA. *Die blauköpfige Motacille.*

Briffon, ornith. I. p. 455. n. 70. Pipit verd.

Büffon, Vögel, XVI. p. 139. *der grüne Pitpit.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 546. n. 144. Sylvia (Cyanocephala) viridis, capite tectricibusque alarum caeruleis, gula griseo-caerulescente, remigibus fuscis.

Martini, Naturlex. V. p. 104. *die grüne cayennische Bachstelze.*

164. LINEATA. *Die blaukappige Motacille.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 197. *der blaukappige Pitpit.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 546. n. 145. Sylvia (Lineata) corpore subtus maculaque verticis caeruleis, fronte vitta superciliari lateribusque colli caeruleo nitidis, fascia pectoris abdominisque alba.

165. CYANEA. *Die blaue neuholländische Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 545. n. 142. Sylvia (Cyanea) nigro-cyanea, subtus alba, capite ni-

gro-sericeo tumido, fincipite genis lunulaque
cervicis caeruleo-nitidis, fascia per oculos
nigra.

Phillips, Bot. Bay. tab. p. 157. (das Männch.)
p. 159. (das Weibch.) Superb Warbler.

White, voy. tab. p. 256.

Meyer, zool. Entdeck. p. 54. n. 2. Motacilla (Su-
perba) nigra, remigibus fuscis, abdomine albo,
fronte genisque caeruleis.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 545. n. 142. β. Sylvia
griseo-nigricans, capite gula cerviceque cya-
neis, tectricibus alarum fuscis, remigibus re-
ctricibusque nigris.

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 23. der blauköpf-
te Fliegenschnäpper von der Insel Luçon; m.
e. Fig.

41. VELIA. Der rothbäuchige Blauvogel. (9)

Müller, Naturfyst. II. p. 617. n. 41. die surinami-
sche Bachstelze.

*Onomat. hist. nat. IV. p. 895. purpurfarbige Gras-
mücke.*

Klein, av. p. 75. n. 15. Luscinia ex caeruleo et ru-
bro varia.

Klein, Vorbereit. p. 142. n. 15. blaurothe Gras-
mücke.

Klein, verb. Vögelhist. p. 76. n. 15. blau und ro-
the Grasmücke.

Brisson,

- (9) *Latham* unterscheidet hier folgende Varietäten. β) M. fronte
uropygioque aureis, corpore subtus caerulescente, ventre imo
castaneo. *Briss.* av. III. p. 536. n. 73. Sylvia Surinamensis cae-
rulea. — γ) M. Caerulea dorso imo abdomineque rufis. *Edw.*
tab. 22. Red-billed Blue-bird. *Bankr.* Guian. p. 182? —
δ) M. dorso fusco nigricante, pectore abdomineque coccineis
Fermin, Surin. II. p. 194. Rouge-gorge, — vid. Syst. ornith.
II. p. 547.

Briffon, ornith. I. p. 456. n. 73. Pipit bleu de Surinam.

Büffon, Vögel, XVI. p. 195. *der bunte Pitpit*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 546. n. 146. *Sylvia* (Velia) nigra, viridi-caeruleo-varia subtus rufa, collo subtus violaceo, uropygio viridi-aureo.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 43. *der Blauvogel mit dem rothen Bauch*.

Bankroft, N. G. von Guiana, p. 110. *der roth-bäuchige Blauvogel?*

Fermin, Surin. II. p. 176. *Rothkehlchen?*

Martini, Naturlex. V. p. 193. *die surinamische Bachstelze*.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 414. *surinamische Bachstelze*.

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 188. n. 26. *Motacilla* (Velia) caerulea, ventre elunibusque rufescentibus.

42. CANADENSIS, *Die canadische Motacille*.

Müller, Naturfyst. II. p. 617. n. 42. *die canadische Bachstelze*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 372. n. 202. *das canadische Schwarzkehlchen*.

Onomat. hist. nat. III. p. 894. *die aschgraue Bachstelze von Canada*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 167. *blauer Fliegenstecher*.

Briffon, ornithol. I. p. 453. n. 67. *Figuier cendré de Canada*.

Büffon, Vögel, XVI. p. 130. *der blaue Canadensische Feigenfresser*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 539. n. 117. *Sylvia* (Canadensis) supra caerulea subtus alba, iugulo remigibus rectricibusque nigris.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 42. *blauer Fliegenfänger.*

Martini, Naturlex. V. p. 108. *die kleine kanadensische graue Bachstelze.*

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 790. *der blaue Feigenvogel.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 140. *die kleine graue kanadensische Bachstelze.*

43. CAERULEA. *Die schieferfarbene Motacille.*

Müller, Naturfyst. II. p. 618. n. 43. *die blaue Bachstelze.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 378. n. 216. *der himmelblaue Sänger.*

Onomat. histor. natur. V. p. 261. *die blaue Bachstelze.*

Briffon, ornithol. I. p. 559. n. 79. *Figuier cendré de Pensilvanie.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 142. *der eifengraue Feigenfresser; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 540. n. 121. *Sylvia (Caerulea) supra caerulea subtus alba, alis caudaeque nigris.*

Seligmann, Vögel, VII. tab. 92. *kleiner eifengrauer Fliegenfänger.*

Martini, Naturlex. V. p. 23. *die blaue Bachstelze.*

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 793. *der eifengraue Feigenvogel.*

Neueste Mannigfaltigk. III. p. 780. *blaue Bachstelze.*

β. Büffon, Vögel, XVI. *der schwarzköpfige cayenische Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 540. n. 21. β.

166. CYANA. *Die weißbäuchige Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 541. n. 122. Sylvia (Cyane) saturate cyanea, subtus nivea, a rostro ad alas striga atra.

Pallas, Reif. Ausz. III. Anh. p. 7. n. 18. Motacilla Cyane.

167. ARUNDINACEA. *Die Rohrmotacille.* (10)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 510. n. 12. Sylvia (Arundinacea) supra olivaceo-fusca, subtus albidula, loris et orbitis fusco-albescentibus, angulo carpi subtus luteo-fulvo, cauda subcuneata fusca.

Lichtenberg u. Voigt, Magaz. für das Neueste, etc. IV. 1. p. 145. Motacilla arundinacea.

44. SIBILLA. *Der Fitert.*

Müller, Naturfystem, II. p. 618. n. 44. der Zischer.

Onomat. histor. natur. VI. p. 847. die Bachstelze aus Madagascar.

Brisson, ornithol. I. p. 431. n. 28. Traquet de Madagascar.

Büffon, Vögel, XV. p. 268. der Fitert, oder das Madagascarische Weißkehlchen.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 523. n. 50. Sylvia (Sybilla) nigricans, subtus alba, pectore rufo, rectricibus nigris, macula alarum alba.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 246. der Zischer.

Yy 4

Neueste

(10) *Latham* rechnet hieher noch folgende Synonymen: *Turdus arundinaceus minimus*, *Sepp. Vog. tab. p. 101. (Avis?) id. p. 97. (Nidus) Passer arundinaceus minor*, *Raji Syn. p. 47. A. 3? Will. p. 99? Rohrsperling*, *Günth. Nest. u. Ey. tab. 12? Boufcarle de Provence*, *Büff. V. p. 134? Pl. enl. 655. Fig. 2? Lesser Reed-Sparrow*, *Will. p. 144? Reed Wren*, *Lath. Syn. Suppl. p. 184. Gentl. Mag. LV. 462. t. p. 640.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 197. *die madagaskarische Bachstelze.*

45. RUBECULA. *Das Rothkehlchen.* (1)

Müller, Naturfyst. II. p. 618. n. 45. *das Rothkehlchen.*

Leske, Naturgesch. p. 270. n. 6. *das Rothkehlchen.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 194. n. 16. *das Rothkehlgen.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 192. n. 8. Motacilla (Rubecula) grisea, gula pectoreque ferrugineis; *das Rothkehlchen; Rothbrüstchen; Rothbart.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 537. n. 10. *das Rothkehlchen.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 601. *das Rothkehllein.*

Funke, Naturgesch. I. p. 256. *das Rothkehlchen.*

Halle, Vögel, p. 330. n. 301. *das Rothkehlchen.*

Meyer, Thiere, I. tab. 93. *das Rothkehlchen?*

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 429. n. 371. *das Rothkehlchen; Rothkröpfchen; Waldrothlein, etc.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 389. D. *das Rothkehlchen.*

Neuer Schanpl. der Nat. VII. p. 266. *Rothkehlchen.*

Onomat. hist. nat. V. p. 271. *das Rothkehlchen.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 273. *das Rothkehlchen.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 136. *das Rothkehlchen, etc.*

Klein, av. p. 77. n. 1. Sylvia sylvatica.

Klein, Vorbereit. p. 144. n. 1. *Rothkehlelein; Rothbrüstlein; Waldrothlein; Rothkröpflein.*

Klein,

(1) Die Jungen haben vor dem ersten Mausern das Orangeroth auf der Kehle und Brust nicht.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 78. n. 1. *Rothkehllein*;
Wald- oder Hausrötelein.

Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. fig. 13. a — c.

Klein, Vögeleyer, p. 26. tab. 10. fig. 16.?

Gesner, Vögelb. p. 445. *Waldrötelin*; *Rötelein*;
Winterrötelein; *Rotbrüflein*; *Rotkropff*. Fig.
 p. 446. mittelm.

Briffon, ornithol. I. p. 427. n. 21. Rouge-gorge.

Büffon, Vögel, XV. p. 212. *das Rothkehlchen*;
 m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 361. *das Rothkehlchen*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 42. Sylvia
 (Rubecula) grisea, gula pectoreque ferrugineis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 83. n. 188. *das Rothkehl-*
chen.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 137. n. 10. *das Roth-*
kehlchen.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 440. *das Roth-*
kehlchen.

Fischer, Zus. zur N. G. von Livl. p. 50. n. 503.
Rothkehlchen.

Cetti, Sardin. II. p. 217. *das Rothkehlchen*.

White, N. G. von Engl. p. 60. n. 1. *Roeteln*, p. 63.
 n. 4. *Rothkehlchen*.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 14. *Rödfinke*;
Rödkielke.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *das Rothkehlchen*.

Linne, Abhandl. II. p. 306. n. 139. *das Rothkehl-*
chen.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 191. n. 231. *das*
Rothkehlchen.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 242. *das Roth-*
kehlchen.

Naturforsch. XVII. p. 104. n. 217. *das Rothkehl-*
chen.

Pennant, britt. Thiergesch. III. tab. 55. fig. 2.

- Zorn, Petinotheol. II. p. 388. *das Rothkehllein.*
 Döbel, Jägerprakt. I. p. 64. *Roth-Kehle.*
 Naumann, Vogelfsteller, p. 149. *Rothkehlgen.*
 Anweis. Vögel zu fang. p. 497. *das Rothkehlgen.*
 Eberhard, Thiergesch. p. 84. *das Rothkehlgen.*
 Jablonsky, allgem. Lex. p. 942. *Rothkehle.*
 Goetze, Natur, Menschenl. und Vorf. V. p. 204.
das Rothkehlchen.
 André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 192. *das Rothkehlchen.*
 Meidinger, Vorles. I. p. 153. n. 6. *das Rothkehlchen.*
 Oekonom. Zool. II. p. 101. *das Rothkehlchen.*
 Dieskau, Naturgesch. der Nachtigall, p. 42.
 Martini, Naturlex. V. p. 164. *Rothkehlchen.*
 Wirsing, Vögel, tab. 25. *Rothkehllein.*
 Borkhausen, Magaz. I. p. 185. n. 61. *Rothkehlchen;*
Rothbrüstchen.
 Tänzer, notabil. Venator. p. 98. n. 123. *Roth-Kehle.*
 Neue Mannigfaltigk. III. p. 179. — Neueste
 Mannigfaltigk. IV. p. 328. *Rothkehlchen.*
 Loniceri, Kräuterb. p. 683. *Rothbrüstlein.*
 Elsholz, Tischb. p. 169. *Rothkehlchen.*
 Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Erithacus.*
 Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 13. *Erithacus.*
 Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 188. n. 28. *Motacilla* (*Rubecula*) *grisea gula pectoreque fulvis.*
 Kramer, Austr. p. 376. n. 12. *Rothkröpfl.*
 Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 8. *Rubecula,*
Erithacus.
 Schwenkfeld, av. Siles. p. 345. *Rubecula. Rottkählichen;*
Rottbrüstlin; Wald-Rötelin; Rottkröpfflin; Winter-Rötele.
 Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. *Rubecula.*

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 279. *Erithacus*
Phoenicurus Plinio; *Rubrica Gesnero*; *Rube-*
cula et *Ruticilla Gazae*; *Sylvia* aliis.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 418. *Rube-*
cula Schwenkfeldii, *Erithacus Ruticilla Gazae*;
Sylvia.

Barrere, ornithol. Cl. 2. Gen. 18. sp. 4. *Ficedula*
fulva, pectore rubro.

Belon, hist. nat. des ois. p. 348. — Obs. p. 16.
Gorge-rouge; Rubeline; Rouge-bourse; Ga-
drille; Roupie; Berée.

Bomare, diction. V. p. 165. — Diction. des anim.
III. p. 720.

Onomatol. forestal. III. p. 206.

Zinnan. Uov. p. 46. tab. 6. Fig. 32. *Pettiroffo*.

Hist. Prov. I. p. 508. Rouge-gorge.

Jonston, av. p. 121. *Rubecula*.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. *Erithacus*?

Aelian. de nat. animal. L. 7. c. 7. *Ἐριθακος*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 386. n. 22.
das Rothkehlchen.

β. *Briffon*, ornithol. I. p. 427. n. 22. Rouge-gorge
de Bologne. (2)

Latham, Syn. II. 2. p. 444. n. 38. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 521. n. 42. β. *Sylvia*
cinerea, gula alba, collo inferiore pectoreque
rufis, rectricibus alarum albo nigro rufoque va-
riis, remigibus rectricibusque nigris rufo-mar-
ginatis.

Zinnan. Uov. p. 50. tab. 7. fig. 36. *Spippola* mag-
giore.

Jonston, av. p. 121. *Spipola* prima.

γ. *RUBECULA TOTA ALBA*. *Das ganz weiße*
Rothkehlchen.

Ist mir wenigstens noch nie vorgekommen.

46. TRO-

(2) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

46. TROGLODYTES. *Der Zaunkönig.* (*)

Müller, Naturfyst. II. p. 619. n. 46. *der Zaunkönig.*

Leske, Naturgesch. p. 270. n. 7. *der Schneekönig.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 190. n. 9. *der Zaunkönig; Schneekönig; Winterkönig; Zaunschliefer.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 192. n. 9. *Motacilla (Troglodytes) grisea, alis nigro cinereoque undulatis. Zaunkönig; Zaunschlupfer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 545. n. 26. *der Zaunkönig.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 609. *der Schneekönig; Winterzaunkönig.*

Funke, Naturgesch. I. p. 259. *der Zaunkönig.*

Ebert, Naturl. II. p. 144. *Schneekönig.*

Haile, Vögel, p. 327. n. 298. *der Schneekönig.*

Meyer, Thiere, II. tab. 79. *der Schneekönig.*

Gatterer, vom Nutz. u. Schad. der Th. II. p. 430. n. 372. *der Zaunkönig; Schlupfkönig; Zaunschlupflein, etc.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 387. n. 239. *der Zaunkönig.*

Neuer Schaupl. der Nat. X. p. 159. *Zaunkönig.*

Onomat. histor. natur. V. p. 273. *der Winterkönig.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 275. *der Schneekönig.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 137. *Zaunkönig, etc.*

Klein, av. p. 76. n. 1. *Troglodytes simpliciter.*

Klein,

(*) Die deutschen u. a. Benennungen, *dieser*, der 48. und 49. Gattung werden häufig verwechselt; auch nicht selten ihre Naturgeschichte unter einander geworfen.

Klein, Vorbereit. p. 143. n. 1. *Winterkönig*, *Zaun-*
schlipflein, *Meisekönig*; *Nesselkönig*; *Dornkö-*
nig, *Schupkönig*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 77. n. 1. *Winterkönig*.

Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. Fig. 4. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 25. tab. 10. Fig. 13.

Gesner, Vögelb. p. 473. *Zaunschlipfflein*; m. e.
mittelm. Fig.

Briffon, ornith. I. p. 428. n. 24. Roitelet.

Büffon, Vögel, XVI. p. 215. *der Nesselkönig oder*
Troglodyt; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 547. n. 148. *Sylvia*
(*Troglodytes*) *grisea*, *superciliis albidis*, *alis*
nigro cinereoque undulatis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 83. n. 189. *der Zaunkönig*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 138. *der Zaunkönig*.

Nettelköning: *Tuunkonning*; *Groote Jochen*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 441. *der Zaunkönig*.

Fischer, Zus. zur N. G. von Livl. p. 51. n. 504.
der Zaunkönig.

Cetti, Sardin. II. p. 224. *der Schneekönig*.

White, N. G. von Engl. p. 60. n. 2. p. 66. n. 7.
p. 88. *der Zaunkönig*.

Pontoppidan, Dänneim. p. 174. n. 15. *Thomas im*
Zaune.

Pennant, Reif. d. Schottl. II. p. 280. *der Zaun-*
könig.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 114.

Naturforsch. XVII. p. 105. n. 218. *der Zaunkönig*.

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 51. *der Schneekö-*
nig; *Tomlingen*.

Zorn, Petinotheol. I. p. 324. II. p. 154. 393. 704.
der Zaunschlieffer; *Zaunschlupfer*.

Borkhausen, Magaz. I. p. 190. n. 69. *Zaunkönig*.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 196. 239. *der Zaun-*
könig.

Dübel.

- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 67 *Zaunkönig*.
Naumann, Vogellsteller, p. 149. *Zaunkönig*.
Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorf. VI. p. 109.
Zaunkönig.
André u. Bechstein, Spazierg. III. p. 56. *Zaunkönig*.
Anweil. Vögel zu fang. p. 575. *Zaunköniglein*.
Martini, Naturlex. V. p. 205. *Zaunschlipfer*, etc.
Hanöv. Merkwürdigk. der Natur, I. p. 290.
Geoffroy, mater. med. VII. p. 602. *der Zaunkönig*.
Tänzer, notab. Venator. p. 110. n. 139. *Zaunkönig*.
Eberhard, Thiergesch. p. 85. *der Zaunkönig?*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 1427. *Zaunkönig*.
Neueste Mannigfalt. IV. p. 454. *Zaunkönig*.
Loniceri, Kräuterb. p. 684. *Königlein*.
Elsholz, Tischb. p. 170.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. *Troglodytes*.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 20. *Troglodytes*.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 188. n. 29. *Motacilla*
(Troglodytes) grisea alis nigro cinereoque undulatis.
Kramer, Austr. p. 378 n. 20. *Schneekönig; Königskerl; Zaunschlupferl*.
Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 11. *Troglodytes*.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 324. *Passer Troglodytes*.
Regulus apricus; Schneekönig, Meuse-König, Nösselkönig, Zaunschlipflin.
Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. *Passer Troglodytes Aldrovandi, perperam Regulus*.
Rzaczymsky, hist. nat. Polon. p. 290. *Passer Troglodytes Ornithologis, Passer Sepium Turnero*.
Rzaczymsky, auch. hist. nat. Pol. p. 405. *Passer Troglodytes Gesneri, Passer sepiarius, Trochilus*.

Barrere, ornith. Cl. 3. Gen 23. sp. 1. *Trochilus fulvus*.

Belon, nat. des ois. p. 344. Obs. p. 17. Roitelet;
Boeuf de Dieu; Berichot; Roi bertaud.

Jonston, av. p. 115. Passer *Troglodytes*.

Bomare, dictionn. X. p. 63. — Diction des anim.
III. p. 607.

Onomat. forestal. III. p. 1048.

Faun. Arragon. p. 89. — *Hist. Prov.* I. p. 510.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 386. n. 23.
der Zaunkönig.

β. *Der Zaunkönig von Buenosayres.* (3)

Buffon, Vögel, XVI. p. 231. *der Zaunkönig von Buenosayres*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 548. n. 149. *Sylvia* (Platensis) supra rufo nigroque varia subtus alba, remigibus rectricibusque fasciatis.

γ. *Der louisianische Zaunkönig.* (4)

Buffon, Vögel, XVI. p. 232. *der Zaunkönig von Louisiana*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 548. n. 150. *Sylvia* (Ludoviciana) rufo fusca, superciliis, genis subtusque flavescens, remigibus caudaque fasciatis.

168. FURVA. *Der Surinamische Zaunkönig,*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 548. n. 151. *Sylvia* (Furva) fusca subtus pallidior, dorso alis caudaque nigricante fasciatis.

Fermin, Surin. II. p. 184. *der Zaunkönig.*

47. CALENDULA. *Die Rubinkrone.* (5)

Müller, Naturfyst. II. p. 611. n. 47. *der Ringelkönig.*

Onomat.

(3) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

(4) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

(5) Länge 4. Zoll; Gewicht 4. Drachmen. Penn.

Onomat. hist. nat. V. p. 262. *die Pensylvanische Calendula.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 386. n. 237. *die Rubinkrone.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 167. n. 2. *Zaunkönig mit der rubinfarbigen Krone.*

Briffon, ornithol. I. p. 473. n. 18. *Poul ou Souci de Pensilvanie.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 246. *das pensylvanische Königlein.* p. 249. *das rubingekrönte Königlein;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 549. n. 154. *Sylvia (Calendula) cinereo-virescens, linea verticali rubini colore, abdomine alisque subtus flavescens.*

Seligmann, Vögel, VII. tab. 44. *der rubingekrönte Zaunkönig.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 321. *der Ringelkönig.*

ß. Büffon, Vögel, XVI. p. 251. *ein Vogel der hinten am Kopfe mit einer Art von karminfarbenen Krone umgeben ist.*

48. REGULUS. *Das Goldhähnchen* (6)

Müller, Natur Syst. II. p. 620. n. 48. *der Haubenkönig.*

Laske, Naturgesch. p. 270. n. 8. *der Zaunkönig.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 189. n. 8. *das Goldhähnchen; der Haubenkönig, Sommerzaunkönig.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 193. n. 10. *Motacilla (Regulus) remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio albis, crista verticali crocea; das Goldhähnchen.*

Rech-

(6) Gewicht 96. bis 120. Gran, nach Büffon. Wird oft mit dem Zaunkönig und Weidenzeisig verwechselt, ob er sich gleich von beyden sehr unterscheidet.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 544. n. 26. *das Goldhähnchen*.

Funke, Naturgesch. I. p. 260. *das Goldhähnchen*.

Ebert, Naturl. II. p. 145. *gekrönter Zaunkönig; Goldhähnchen; deutscher Colibrit*.

Halle, Vögel, p. 328. n. 300. *der Sommerzaunkönig, mit goldner Krone; Fig. 19*.

Meyer, Thiere, I. tab. 34. *Goldhähnlein*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 431. n. 374. *der Haubenkönig*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 386. n. 238. *der Haubenzaunkönig*.

Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 478. *Goldhähnchen*.

Onomat. hist. nat. V. p. 270. der Sommerzaunkönig.

Handb. der Naturgesch. II. p. 274. das gekrönte Königchen; Goldhähnchen.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 137. Goldhähnchen.

Klein, av. p. 76. n. 3. *Trochilus. Regulus cristatus*.

Klein, Vorbereit. p. 143. n. 3. *Gekröntes Königchen; Sommerzaunkönig; Ochsenäuglein; Goldhähnlein; Streuslein*.

Klein, verb. Vögelh. p. 77. n. 3. *gekröntes Königchen. p. 167. Zaunkönig mit der goldnen Krone*.

Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. fig. 5. a—c. Id. tab. 28. fig. 2.

Gesner, Vögelb. p. 138. *Regulus vel Trochilus. Goldhendlein; König der Vögel; Parra*.

Briffon, ornith. I. p. 472. n. 17. *Poul ou Souci, appelé vulgairement Roitelet hupé*.

Büffon, Vögel, XVI. p. 234. *der Haubenkönig, das Goldhähnlein, oder das Königlein; mit e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 361. *das Goldhähnchen.*

Latnam, Syst. ornith. II. p. 548. n. 152. *Sylvia* (Regulus) virescens, remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio albis, vertice luteo.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 110. *der Zaunkönig.*

Seligmann, VII. tab. 44. *der goldgekrönte Zaunkönig.*

Beske, Vögel Kurl. p. 83. n. 190. *der Haubenkönig.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 140. n. 12. *das Goldhähnchen.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 442. *Goldhähnlein.*

Fischer, Livl. p. 102. n. 171. *gekrönter Zaunkönig.*

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 10. *Ochsenauge.*

Pallas, nord. Betr. III. p. 2. *der gekrönte Zaunkönig.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 16. *Fuglekonge.*

Olaffen, Isl. I. p. 311. f. *Rindill; Musarbroder?*

Linné, Abhandl. II. p. 306. n. 140. *der Sommerzaunkönig.*

Pennant, britt. Thiergeschichte. p. 114. tab. 53. Fig. 3.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 197. n. 240. *das Goldhähnlein.*

Naturforsch. XVII. p. 106. n. 219. *der Hauelkönig.*

Naturforsch. XXV. p. 19. *Goldämmerchen.*

Wirsing, Vögel, tab. 14. *Gold - Vögelein.* M. u. W.

Zorn, Petinotheol. I. p. 332. II. p. 94. 150. 395. *Gold - Hähnlein.*

- Martini*, Naturlex. V. p. 211. gekrönter Zaunkönig; Ochsenäuglein; Tannenmäuslein; Waldzeislein; Weidenmeise; Weidenzeislein, etc.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 68. Gold-Hähnchen.
- Naumann*, Vogelfsteller, p. 151. Goldämmerchen.
- Borkhausen*, Magaz. I. p. 191. n. 70. Goldhähnchen.
- Anweil.* Vögel zu fang. p. 575. Goldhähnlein.
- Goeze*, nützl. Allerl. II. p. 397. n. 18. Goldhähnchen.
- Goeze*, Natur, Menschenl. u. Vorf. V. p. 226. das Goldhähnchen.
- André u. Bechstein*, Spatzierg. II. p. 337. Goldhähnchen.
- Beckmann*, Naturhist. p. 55. c. der Zaunkönig.
- Neueste Mannigfalt. IV. p. 460. gekrönter Zaunkönig.
- Hanöv.* Seltenh. der Nat. I. p. 284.
- Tänzer*, notab. Venatoris, p. 111. Goldhähnchen.
- Linne'*, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. Regulus.
- Linne'*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 22. Regulus cristatus.
- Linne'*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 188. n. 30. Motacilla (Regulus) remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio albis.
- Kramer*, Austr. p. 378. n. 21. Motacilla remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio nigris. Goldhannel.
- Charleton*, onom. zoic. p. 89. n. 1. Regulus cristatus.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 344. Regulus. Gold-Hänlin; Ochsen-Euglin; Streuslin; Tan-Meishin; Wald-Zinslin.
- Sibbald*, Scot. illustr. III. 3. 4. p. 18. Parus sylvaticus.

- Rzaczynsky*, auct. hist. nat. Pol. p. 404. *Parus sylvaticus*; p. 417. *Regulus cristatus*; *Cladorinchus*, *Regaliolus*, *Regillus*, *Senator*, *Rex avium*, *Calendula*.
- Belon*, nat. des ois. p. 345. *Poul*; *Soulcie*, *Soucie*, *Sourcicle*.
- Borlase*, nat. hist. of Cornwall. p. 247. *Regulus cristatus*; *Wood-Titmouse* of *Gesner*.
- Barrere*, ornithol. Cl. 2. gen. 23. *Trochilus cristatus*. gen. 24. *Parus nigricans*, macula rubente in vertice.
- Salerne*, nat. des ois. p. 239. *Roitelet crete*; *Sucet*; *Suet*; *petit boeuf*; *Biffourdet*.
- Bomare*, diction. X. p. 65. — *Diction. des anim.* III. p. 707.
- Hist. Prov.* I. p. 509. *Roitelet*.
- Philos. Transact.* XXVIII. p. 170.
- Jonston*, av. pag. 120. *Parus sylvaticus*. p. 114. *Regulus*.
- Plin* hist. nat. L. 10. c. 74. *Trochilus*, *Rex avium*?
- Hermann*, tab. affin. anim. p. 224. ff. *Mot. Regulus*.
- Donndorff*, Handb. d. *Thiergeschich.* p. 387. n. 24. *das Goldkähnchen*.
- β. *Büffon*, *Vögel*, XVI. p. 255. *das Meisenköniglein*; m. e. Fig.
- Latham*, *Syst. ornith.* II. p. 549. n. 153. *Sylvia* (*Eleta*) *cristata virescens*, subtus cinereo-albida, occipite crissoque pallide flavo, rectricibus alarum margine, rectricibusque lateralibus apice albis.
- Hermann*, tab. affin. anim. p. 225. *Regulo-Parus*.

49. TROCHILUS. Der Weidenzeisig. (7)

Müller, Natursyft. II. p. 620. n. 49. der Läufer.

Leske, Naturgesch. p. 270. n. 9. der Weidenzeisig.

Borowsky, Thierreich, III. p. 191. n. 10. der Zaunkönig; grüner König; die kleinste Grasmücke.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 543. n. 24. der Weidenzeisig.

Ebert, Naturl. II. p. 144. der kleinste Zaunkönig; Winterkönig.

Halle, Vögel, p. 328. n. 299. der Zaunkönig.

Lz 3

Gatte.

(7) Fast unter allen Motacillen ist bey keiner die Verwirrung und Verwechselung der Synonymen grösser als hier. Man hat diesen Vogel oft mit der *Motacilla Salicaria*, oft mit der *M. Hippola's*, oft auch mit dem Weibchen der *M. Regulus* verwechselt. Eben so ist es auch mit den in unserm System hieher gerechneten Varietäten beschaffen, die ich hin und wieder theils bald als Spielarten von andern Gattungen, theils als ganz eigene Gattungen aufgeführt und wieder mit andern Synonymen verwechselt finde. Neuerlich hat *Bechstein* (Naturforsch. XXVII. p. 50. und 54.) die Sache auf eine ganz andere Art aus einander gesetzt. Er trennt den *Fellow Wren* des *Pennant*, von dem *Pouillot* des *Buffon*, nennt erstern den *Fitis* (*Motacilla Fitis*) und verbindet den letztern, den er *Weidenzeisig* nennt, mit der *Motacilla Trochilus* Linn. — Als deutsche Synonymen vom *Fitis* werden p. 54. angegeben: *Grosser Weidenzeisig*; *Sommerkönig*; *Wispertein*; *Afivogel*, in Thüringen: *Laubvögelchen*. — Vom *Weidenzeisig* finden sich p. 58. folgende Synonymen: *Kleiner Weidenzeisig*; *grüner König*; *kleinste Grasmücke*; *Tyrannen*; *Schmittel*; *Weidenzeislen*; *eigentliche Grasmücke*; *kleine gelbrothe Grasmücke*; *Läufer*; *Mitwaldlen*; in Thüringen: *kleinstes Laubvögelchen*. Das Gewicht des erstern beträgt 2. Quentchen, des letztern 1 1/2 Quentchen. — Der *Fitis* finde ich auch in *Naumanns* Vogelsteller p. 147. gedacht. — Es soll *Frischens* *Weidenzeisig*, tab. 24 Fig. 1. seyn. S. Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. it. N. G. des In- und Auslandes p. 543. n. 23. — *Latham* citirt hier noch *Frisch*, tab. 24. Fig. 2 so aber zu *Muscicapa atricapilla*, p. 934. n. 9. gehört. S. oben Anmerk. 2. bey *Muscicapa atricapilla*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 431. n. 373. *der Sommerkönig; das Seidenvögelchen; Tyrannchen; Smittl.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 385. n. 326. *der gelbe Sänger.*

Ouoniat. hist. nat. III. p. 891. *der Asilvogel.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 137. *Sommerkönig; Weidenzeisig.*

Klein, av. p. 76. n. 2. *Trochilus capite laevi.*

Klein, Vorbereit. p. 143. n. 2. *Sommer-Tyrannchen.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 77. n. 2. *Sommerkönig-Tyrannchen.*

Briffon, ornith. I. p. 441. n. 45. *Pouillot ou Chantre.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 201. *der Pouillot oder Sänger; m. e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 362. *der Zaunkönig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 550. n. 155. *Sylvia (Trochilus) cinereo-virens, alis subtus tectricibusque flavescens, superciliis luteis.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 141. n. 13. *die kleine Grasmücke.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 442. *der Läufer; gelber Sticherling.*

Cetti, Sardin. II. p. 222. *der Zaunkönig?*

White, N. G. von Engl. p. 32. 33. n. 1. p. 58. n. 2. p. 65. n. 4. *kleinster Zaunkönig?*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 17. *Spurrekonige; Fagerfis.*

Hasselquist, Palaeft. (Ed. germ.) p. 338. n. 52. *Motacilla hispanica.*

Bartram, Reis. d. Carolina, p. 300. *der gelbbirgige Sänger.*

Palas, nord. Beytr. IV. p. 14. *der Zaunkönig mit gelben Augenbraunen.*

Teng.

Tengmalm: neue Schwed. Abhandl. IV. p. 52.

M. *Trochilus*.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 195. n. 238. das
Weidenzeißein.

Naturforsch. XVII. p. 106. n. 220 der *Laufer*.

Naturforsch. XXVII. p. 54. n. 6. der *Weidenzei-*
fig. (Siehe unten Anmerk. n. 7.)

Borkhausen, Magazin, I. p. 191. n. 71. *Sommer-*
könig; *Bachkönig*; *Weidenzeischen*. p. 192.
Ba. köfchen.

Zorn, Petinotheol. II. p. 391. die eigentliche *Gras-*
mücke; *Weiden Zeißein*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 68. *Weiden Zeißig*.

Martini, Naturlex. V. p. 116. der *Läfer*.

Tänzer, notabil. Venator. p. 111. *Weiden Zeißig*.
Neueste Mannigfalt. IV. p. 104. der *Sänger*

Linne, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 23. *Regulus non*
cristatus.

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 188. n. 31. *Motacilla*
(*Trochilus*) cinereo-virens, remigibus sub-
tus flavescens, superciliis luteis.

Kramer, Austr. p. 378. n. 22. *Motacilla cinereo-*
virens, subtus flavescens, superciliis luteis.

Schmittl.

Charleton, onom. zoic. p. 89. n. 2. *Afilus*.

Möhring, av. gen. p. 44. n. 35 *Afilus*.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Pol. p. 417. *Regulus*
non cristatus.

Jonston, av. p. 114. *Regulus non cristatus*.

Barrere, ornithol. Cl. 3. gen. 23. sp. 2. *Trochi-*
lus ex flavo cinereus, capite nigro.

Belon, nat. des ois. p. 344. Chantre ou Chanteur.

Salerne, ornithol. p. 242 Chasty.

Faun. Arragon. p. 89. — Hist. prov. I. p. 510.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 388. n. 25.
der *Weidenzeißig*.

β. Der (sogenannte) gelbe Zaunkönig. (8)

Klein, av. p. 86. n. 11. *Parus luteus Carolinensis*.

Klein, Vorbereit. p. 161. n. 11. *gelbe Meise aus Karolina*.

Klein, verbeß. Vögelhistor. p. 89. n. 11. *gelbe Meise*.

Briffon, ornith. I. p. 443. n. 48. *Figuier de la Caroline*.

Büffon, Vögel, XVI. p. 111. *der braun und gelbe Feigenfresser*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 550. n. 155. β.

Seligmann, Vögel, III. tab. 26. *die carolinische gelbe Meise*.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 68. *der gelbe Zaunkönig*.

Schriften der berlin. Gesellsch. N. Fr. III. p. 195. *Motacilla Acredula*.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. m. Merian. Kupf. p. 785. *der braun und gelbe Feigenvogel*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 24. *Regulus cinereus*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 189. n. 22. *Motacilla (Acredula) supra cinereo virescens, remigibus fuscis, septimo octavo nono apice albis*.

γ. Der große Weidenzeisig.

Briffon, ornithol. I. p. 442. n. 45. *A. grand Pouillot*.

Büffon, Vögel, XVI. p. 213. *der große Sänger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 550. n. 155. δ.

δ. *Hasselquist*, Palaeß. (Ed. germ.) p. 337. n. 51. *Motacilla corpore ex fusco viridescente, pectore ferrugineo*.

Büffon, Vögel, XVI. p. 209. *die Bachstelze mit grünlichbraunem Leibe, und rostfarbiger Brust*.

Latham,

(8) Nach *Briffon*, u. a. eine eigene Gattung.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 551. n. 156. *Sylvia* (Mediterranea) fusco-virescens subtus ferruginea, collo subtus pectoreque fulvis. (9)

169. AESTIVA. *Die canadische Sommermotacille.* (10)

Pennant, arct. Zool. II. p. 374. n. 209. *der Gelbkopf.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 381. n. 224. *der olivenfarbige Sänger.*

Briffon, ornith. I. p. 444. n. 51. *Figuier de Canada.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 89. *der gefleckte Feigenfresser*; m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 183.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 551. n. 157. *Sylvia* (Aestiva) viridi-olivacea subtus flava, collo subtus pectoreque maculis rubescentibus, rectricibus lateralibus, intus luteis.

Zz 5

Latham,

(9) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

(10) In unserm System ist *Büffons Figuiet de Canada*, pl. enl. n. 58.

Fig. 2. als Varietät: *Motacilla corpore supra fusco*, aufgeführt.

Ich habe indeffen alle Synonymen unter der Hauptbenennung zusammen gefasst und bemerke nur noch, wie sehr die Ornithologen auch hier in deren Auseinandersetzung von einander abweichen. — *Büffon* hält den, in den Pl. enl. tab. 58. Fig. 1. abgebildeten Vogel (*Figuier de la Caroline*) für das Weibchen

von Fig. 2. (*Figuier de Canada*) — *Pennant* hält beyde für ganz verschiedene Gattungen: rechnet *Briffons Ficedula canadensis*, *Büffons Figuiet tacheté*, und Pl. enl. tab. 58. Fig. 2. *Figuier de Canada*, zu seinem *Yellow-poll Warbler*; — Pl. enl.

Fig. 1. aber *Figuier de la Caroline*, zu seinem *Olive Warbler*.

— *Latham* ist ihm hierin gefolgt, und führt den *Yellow-poll Warbler*, mit den dahin gezogenen Synonymen unter der Trivialbenennung *Sylvia Aestiva*; den *Olive Warbler* aber als *Sylvia Carolinensis* auf.

Von erstem sagt *Pennant*: Sein Nest sey sehr schön, und aus Daunen mit verwelktem Grase untermischt, gemacht; die inwendige Seite sey mit feinen Fasern gefüttert; die Eyer seyen an dem breiten Ende gefleckt. Der Vogel sey aus

Neu-York unter dem Namen *Swamp-Bird* (Sumpfvogel) gesandt.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 551. n. 158. *Sylvia* (Carolinensis) viridi-olivacea subtus flavescens, remigibus caudaque fuscis, rectricibus flavo-marginatis.

170. SUTORIA. *Der Schneidervogel* (1)

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 193. n. II. *Motacilla* (*Sartoria*) tota pallide lutea; *der Schneidervogel*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 551. n. 159. *Sylvia* (*Sutoria*) tota flava.

Naturforsch. I. p. 270. n. 8. *Motacilla Sutoria*; Oiseau Tailleux; Taylor Bird; *die Schneider-Bachstelze*; *Nätherin*.

Smellie, Philos. der Naturgesch. II. p. 63. *der Schneidervogel*.

Sander, Natur und Relig. p. 124. *der Schneidervogel*.

Berlinische Samml. IX. p. 192. *der Schneidervogel*.

Neueste Mannigfaltigk. I. p. 192. *der Schneidervogel*; m. e. Fig.

Göttingischer Taschenkalender 1781. *Schneidervogel*.

Donnlorff, Handb. der Thiergesch. p. 388. n. 26. *der Schneidervogel*.

50. CAFFRA. *Die cafferische Motacille*.

Müller, Naturyst. Suppl. p. 173. n. 51. *der Hottentot*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 514. n. 22. *Sylvia* (*Caffra*) olivacea, gula caudaque ferrugineis, superciliis albis.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 140. *Hottentotten-Bachstelze*.

171. GU.

(1) Gewicht, nach *Pennant*, 3/16. einer Unze.

171. GULARIS. *Die schwarzkehligte Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 160. *Sylvia* (Gularis) supra ferruginea, subtus alba, gula alis caudaque nigris.

172. FLAVICAUDA. *Die gelbschwänzige amerikanische Motacille.* (2)

Pennant, arct. Zool. II. p. 379. n. 218. *der Gelbschwanz.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 167. n. 2. *gelbschwänziger Fliegenstecher.*

Seligmann, Vögel, VII. tab. 47. *der Fliegenfänger mit gelbem Schwanz.*

173. TSCHEKANTSCHIA. *Die zwitschernde Motacille.* (3)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 161. *Sylvia* (Tschecantschia) supra nigricans, subtus ferruginea, capite atro, nucha albicante, torque et macula alarum oblonga albis, dorso nigro.

Lepechin, Tageb. der russ. Reif. II. p. 186. tab. 7. fig. 2. *Tschekantschik.* Motacilla superne nigricans torque albo interrupto, inferne ferruginea, capite atro, nucha albicante, macula alarum oblonga candida, dorso nigro, marginibus pennarum rufescentibus.

174. MELANOPE. *Die schwarzfüßige Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 503. n. 5. Motacilla (Melanopa) caerulefcenti-cinerea, subtus flava, loris et gutture nigris, superciliis et rectricibus utrinque 3. lateralibus albis, extima margine exteriori nigra.

Pallas, Reif. Ausz. III. Anh. p. 7. n. 16. Motacilla *Melanope.*

51. BOA-

(2) Nach *Latham* mit *Muscicapa Ruticilla*, p. 935. n. 10. einerley.

(3) Das russische Wort *Tschekanie* bedeutet *Zwitschern*.

51. BOARULA. *Die Kuhstelze.* (4)

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 173. n. 50. *die Rinderstelze.*

Halle, Vögel, p. 337. n. 311. *die gelbe Bachstelze?*

Klein, av. p. 78. n. 7. *Sylvia flava.*

Klein, Vorbereit. p. 146. n. 7. *Kuhstelze.*

Klein, Stemm. av. p. 16. tab. 7. fig. 7. a — c.

Klein, Vögeleyer, p. 26. tab. 20. fig. 18.

Klein, verb. Vögelhist. p. 79. n. 10. *Kühstelze; gelbbrüstige Bachstelze.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 540. n. 16. *die Kuhstelze.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 607. *gelbbrüstige Bachstelze.*

Brissou, ornithol. I. p. 439. n. 41. *Bergeronette jaune.*

Buffon, Vögel, XVI. p. 58. *der gelbe Sticherling; m. e. Fig. cf. p. 66.*

Latham, Syn. Suppl. p. 178.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 502. n. 4. *Motacilla (Boarula) cinerea, subtus flava, rectrice prima tota, secunda latere interiore alba.*

Seligmann, Vögel, VII. tab. 49. *die graue Bachstelze.*

Frisch, Vögel, tab. 23. fig. 2. a. *die gelbbrüstige Bachstelze.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 187. n. 226. *die Kuhstelze.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 253. die kleine gelbe Bachstelze.

Martini, Naturlex. V. p. 74. *die gelbe Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 136. graue oder gelbe Bachstelze.

André

(4) S. oben die Anmerk. 1. bey *Motacilla flava*, n. 12.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 177. *die gelbe Bachstelze.*

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 768. *gelbe Bachstelze.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 434. *die gelbe Bachstelze?*

Linne', Syft. Nat. Edit. XII. I. p. 331. ad n. 12. *Motacilla cinerea.*

Charleton, onomast. zoic. p. 90. n. 2. *Motacilla flava.*

Schwenkfeld, av. Silef. p. 307. *Motacilla flava. Kuhstelze; kleine Bachstelze; geele Bachstelze; Kufscheiße.*

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. *Motacilla flava.*

Rzaczymsky, auct. hist. nat. Pol. p. 396. *Motacilla flava; Motacilla minor; Florus.*

Jonston, av. p. 121. *Motacilla flava.*

Barrere, ornithol. Cl. 3. Gen. 19. Sp. 3. *Sylvia flava.*

Belon, hist. nat. des ois. p. 351. *Bergerette, ou Bergeronette jaune.*

Schaefer, element. ornithol. tab. 23. fig. 1.

Faun. Arragon. p. 85. n. 11.

Zinn, Uov. p. 51. tab. 7. Fig. 39. *Coda tremola gialla.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 388. n. 27. *die Kuhstelze.*

β. *Pallas*, Reis. Ausz. III. p. 6. n. 15. *Motacilla campestris.*

γ. *Briffon*, ornithol. I. p. 440. n. 42. *Bergeronette de Java. ()*

Büffon, Vögel, XVI. p. 64. *der Sticherling von Java.*

Latham, Syn. II. 2. p. 339. n. 4. A. *Javan Wag-tail.*

Latham,

(5) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 503. n. 4. β . *Motacilla fusco-olivacea subtus flava*, collo inferiore et pectore griseis, rectrice prima tota, secunda et tertia latere interiore, apiceque albis.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 125. Gattungen vermehrt. Bey der 1ten Gattung sind *drey*, bey der 9ten *drey*, bey der 11ten *zwey*, bay der 12ten *fünf*, bey der 14ten *zwey*, bey der 17ten *zwey*, bey der 18ten *vier*, bey der 35ten *zwey*, bey der 37ten *zwey* Varietäten aus einander gesetzt. Bey der 15ten sind die Varietäten γ und δ , bey der 34ten die Varietäten β und γ hinzugekommen.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Büffons Locustelle.*

Büffon, ois. V. p. 42. La Locustelle.

Büffon, Vögel, XIV. p. 214. *die Grillenlerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 515. n. 25. *Sylvia* (Locustella) fusco-viridis, maculis nigricantibus, subtus flavescens, pectore saturatiore, cauda cuneata, rectricibus apice mucronatis.

Halle, Vögel, p. 315. n. 277. *die Lerchenheuschrecke.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 694. *die Lerchenheuschrecke.*

Ich weis nicht, was ich aus diesem Vogel machen soll. *Latham* verwechselt — so scheint mirs wenigstens, — eine große Anzahl Synonymen, die zu *Alauda trivialis* p. 796. n. 5. gehören, mit dieser, mir ganz unbekannten Gattung, und zieht so gar seinen *Grashopper Warbler* II. 2. p. 429. n. 20. hieher. Man muß die vorher angeführte Stelle selbst nachlesen.

2. *Sylvia*

2. *Sylvia Zya*. Scopol. ann. I. n. 234.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 193. n. 234. *der braun und röthlicht bunte Fliegenvogel*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 188. n. 65. *Weißkehlchen; Braunnellchen*.

Etwa ein Weibchen von *Motacilla Rubecula*?

3. *Die graue Grasmücke*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 535. n. 4. *die graue Grasmücke; weiße blasse Grasmücke; der Dornreich*. *Motacilla dumetorum*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604.

4. *Die Südliche Motacille*.

White, Reise nach Neusüdwallis — in dem Magazin merkw. Reisebeschr. V. p. 128. *die Südliche Bachstelze*. (Ed. angl. tab. p. 239.)

Meyer, zool. Entdeck. p. 54. n. 1. *Motacilla (Australis) cinerea, subtus flava, gula fere albida*.

Götting. gelehrt. Anzeig. 1791. p. 50.

An *Motacilla* aut *Muscicapā*?

5. *Der Traquet vom Vorgebürge der guten Hoffnung*.

Büffon, ois. V. p. 233. *Traquet du Cap de bonne esperance*.

Büffon, Vögel, XV. p. 272. *das Capische Weißkehlchen*

Latham, Syn. II. 2. p. 450. n. 47. Var. A. *Sybil Watbler*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 523. n. 51. *Sylvia (Sperata) fusco-viridis, subtus uropygioque rufo-grisea, rectricibus duabus intermediis nigricantibus, lateralibus fusco-fulvo oblique dimidiatis*.

Martini, Naturlex. V. p. 201. *Kapisches Weißkehlchen*.

Etwa das Weibchen von *Motacilla Sybilla*?

6. *Motacilla* (Cucullata) virens, subtus flava, fronte genisque nigris, cauda cuneiformi.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 528. n. 72. *Sylvia cucullata*.

Vielleicht eine Varietät von *Motacilla Mitrata*.

7. *Motacilla* (Minima) pallide fusca, subtus albida, rostro caudaque brevissima flavescens.

Latham, Syst. ornith. II. p. 529. n. 78. *Sylvia Minima*.

Vielleicht eine Varietät von *Motacilla Longipes*; oder von der nachher anzuführenden *Motacilla Pusilla*.

C. Neuere Gattungen.

1. Der Spitzkopf.

Bechstein: Naturforsch. XXVII. p. 43. n. 2. *Motacilla* (Longirostra) fronte fusca, et in fine caudae fuscae lineola flavescens.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 543. n. 21. *der Spitzkopf*.

2. Das Laubvögelchen.

Bechstein: Naturforsch. XXVII. p. 47. n. 4. *Motacilla* (Sibillatrix) superciliis luteis, supra virens, subtus flavescens.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 544. n. 25. *das Laubvögelchen; der Zischer*.

3. Die gesperberte Grasmücke.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 537. n. 9. *Motacilla Nisoria*. *Die gesperberte Grasmücke; große Grasmücke; großer Feigenfresser*.

4. Die

4. Die kleinliche Bachstelze.

White, Voy. to new South - Wales, tab. p. 257.

White, Reif. nach Neufüdwallis; in dem Magaz. merkw. Reisebesch. V. p. 128. die kleinliche Bachstelze.

Meyer, zool. Entdeck. p. 56. n. 3. Motacilla (Puffilla) fusca subtus pallida, cauda prope apicem fascia fusca.

5. Die schöne Bachstelze.

White, Reif. nach Neufüdwall. I. c. Motacilla elegans.

6. Motacilla (Sylviella) cinereo - fusca, subtus fordide alba, rectricibus duabus intermediis brevioribus subalatis.

Latham, Syn. Suppl. p. 185. Lesser White-throat, tab. 113

Latham, Syst. ornithol. II. p. 515. n. 24. Sylvia Sylviella.

7. Motacilla (Canescens) fusco - canescens, subtus alba, capite nigro, fronte albo - striata, pectore crissoque striis nigris, macula alarum rectricum basi marginibusque fulvis.

Latham, Syn. Supplem. p. 187. Van Diemens Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 553. n. 168. Sylvia canescens.

Meyer, zool. Entdeck. p. 57. n. 5. Motacilla canescens.

8. Motacilla (Aequinoctialis) fusco - testacea, subtus alba, uropygio pallido, rectricibus fasciis obsoletis.

Latham, Syn. Suppl. p. 187. Equinoctial Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 553. n. 169. *Sylvia Aequinoctialis*.

Ist nicht mit *Motacilla Aequinoctialis* p. 972. n. 110. zu verwechseln.

9. *Motacilla* (*Nigricollis*) subcristata, supra pallide grisea, subtus incarnata, pileo cervice remigibus rectricibusque nigris.

Latham, Syn. Suppl. p. 187. Black-necked Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 553. n. 170. *Sylvia Nigricollis*.

10. *Motacilla* (*Plumbea*) plumbea, subtus cinerea, remigibus rectricibusque obscuris.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 553. n. 171. *Sylvia Plumbea*.

11. *Motacilla* (*Cambaiensis*) fusco-nigricans, subtus nigra nitida, abdomine imo crissoque rufo-ferugineis, rectricibus alarum albis.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 554. n. 172. *Sylvia Cambaiensis*.

12. *Motacilla* (*Guzurata*) virefcens subtus alba, vertice spadiceo, remigibus caudaque fuscis.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 554. n. 173. *Sylvia Guzurata*.

13. *Motacilla* (*Asiatica*) fusca, subtus flavicans, capite colloque nigris, loris gulaque albis, cauda elongata.

- β. *Motacilla* fusca, fronte superciliis corporeque subtus albis, rectricibus lateralibus dimidiato albis.

Latham, Syst. ornith. II. p. 554. n. 174. *Sylvia Asiatica*.

115. GESCHLECHT. PIPRA. *Der Manakin.*

Müller, Naturyst. II. p. 621. Gen. CV. *Zeisig*.

Leske, Naturgesch. p. 264. Gen. XLVI.

Borowsky, Thierreich, III. p. 161. Gen. LXVI.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 193. Gen. XXXVII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 550. Gen. LXXVI.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 190. Gen. LXXIX.

Onomat. hist. nat. VI. p. 521.

Briffon, ornithol. II. p. 166. Gen. LV. *Rupicola*,
p. 167. Gen. LVI. *Manacus*.

Büffon, Vögel, XIII. p. 63. sqq.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 554. Gen. XLIV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 222.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 389. Gen. LXXXIV.

1. RUPICOLA. *Der Felsenhahn.*

Müller, Naturyst. II. p. 621. n. 1. *der Steinzeisig*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 161. n. 1. *der Felsen-*
hahn, tab. 66.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 193. n. 1.
Pipra (*Rupicola*) *crista erecta margine purpurea*,
corpore croceo, *tectricibus rectricum trun-*
catis.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 550. *der Felsenhahn*;
Bergzeisig.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 190. *der*
Felsenhahn.

Onomat. histor. natur. VI. p. 859. *der gelbe Wie-*
dehopf.

Briffon, ornith. II. p. 166. n. 1. *Coq-de-roche*.

Büffon, Vögel, XIII. p. 109. *der Klippenhahn*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 554. n. 1. *Pipra* (*Ru-*
picola) *crista erecta margine purpureo*, *corpo-*
re croceo, *tectricibus rectricum truncatis*.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 54. *der Wiedehopf*.
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 748. *der Felsen-*
hahn.

Götz: Naturforsch. XIX. p. 78. *der Felsenhahn*.
Neueste Mannigfalt. II. p. 125. *der Felsenhahn*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 21. n. 2. *Upupa cro-*
cea.

Barrere, Franc. equinox. p. 132. *Gallus ferus sax-*
atilis, croceus, cristam e plumis constructam
gerens.

Barrere, ornithol. Cl. 3. Gen. 21. sp. 2. *Upupa*
americana, crocea saxatilis.

Gerin. ornith. II. p. 64. tab. 206. *Upupa america-*
na lutea.

Bomare, diction. II. p. 628. *Coq de roche*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 389. n. 1.
der Felsenhahn.

β. *Der peruanische Felsenhahn*. (6)

Büffon, Vögel, XIII. p. 115. *der peruanische Klip-*
penhahn; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 519. n. 1. A. *Peruvian Ma-*
nakin.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 555. n. 2. *Pipra* (Pe-
ruviana) corpore croceo rubro, tectricibus ala-
rum maioribus cinereis, remigibus caudaque
nigris, tectricibus rectricum non truncatis.

Naturforsch. XVII. p. 14.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 749. *der pe-*
ruvianische Felsenhahn.

α. *PAREOLA*. *Der blaurückige Manakin*.

Müller, Natursystem, II. p. 622. n. 2. *der Mei-*
senzeisig.

Borowsky, Thierreich, III. p. 162. n. 2. *der schwar-*
ze Manakin.

Brisson,

(6) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

Briffon, ornithol. II. p. 172. n. 10. Manakin noir hupé.

Büffon, Vögel, XIII. p. 70. *der Tije oder große Manaki*; m. 2. Figg.

Latham, Syst. ornith. II. p. 555. n. 3. Pipra (*Pa-reola*) crista sanguinea, corpore nigro, dorso caeruleo.

Onomat. histor. natur. V. p. 29. Manacus cristatus niger.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 58. *der Manakin mit blauem Rücken.*

Jonston, av. p. 206. Tijeguacu Brasiliensibus.

14. SUPERBA. *Der dreyfarbige Manakin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 556. n. 4. Pipra (*Superba*) aterrima, verticis mediis plumis longiusculis et flammeo - rubris, dorsi inter alas area lunata dilute caerulea, remigibus primoribus fuscescentibus.

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 11. *der dreyfarbige Manakin*, tab. 3. Fig. 1.

Onomat. hist. nat. V. p. 31. Manacus superbus *Pall.*

3. CRISTATA. *Der purpurfarbige Manakin.*

Müller, Naturyst. II. p. 622. n. 3. *Haubenzeisig.*

Halle, Vögel, p. 379. n. 374. *der purpurfarbene kleine Sperling mit dem güldnen Fließe.*

Onomat. histor. natur. V. p. 29. *gehaubter Rothschnabel.*

Klein, av. p. 90. n. 14. Passer cristatus, rostro rubro.

Klein, Vorbereit. p. 167. n. 14. *gehaupteter Rothschnabel.*

Klein, verbeß. Vögelhist. p. 91. n. 13. *gehaubter Rothschnabel.*

Briffon, ornith. II. p. 173. n. 12. Manakin rouge hupé.

Büffon, Vögel, XIII. p. 96. *Picicithi*, oder der ganz kleine und gekappte brasilianische Vogel.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 559. n. 15. Pipra (Cristata) crista lutea, corpore purpureo, cauda rubra.

Fermin, Surin. II. p. 176. das Surinamische Zeislein.

4. RUBETRA. *Der rothgelbe Manakin.*

Müller, Natursystem, II. p. 622. n. 4. der Gelbbusch.

Halle, Vögel, p. 504. n. 566. das gelbrothe Kolibrispechtchen, mit zerscheiteltm Federbusche.

Onomat. hist. nat. V. p. 30. der Gelbschups.

Klein, av. p. 108. n. 10. Falcinellus rubetra.

Klein, Vorbereit. p. 199. Gelbschups.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 110. n. 13. Gelbschopf.

Briffon, ornithol. II. p. 173. n. 11. Manakin roux hupé.

Büffon, Vögel, XIII. p. 94. Rubetra, oder der gekappte Amerikanische Vogel.

Latham, Syst. ornith. II. p. 559. n. 17. Pipra (Rubetra) crista lutea, corpore testaceo, remigibus rectricibusque testaceis (für caeruleis).

15. TORQUATA. *Der Manakin mit dem Halsbande.*

Briffon, ornithol. II. p. 172. n. 8. Manakin à collier.

Büffon, Vögel, XIII. p. 92. der Vogel, der bey den Brasilianern den Namen Maizi de Miaca-tototl führt.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 560. n. 18. *Pipra* (Torquata) nigra, capite rubro, collo torque aureo cincto, alis caeruleis, cauda nigra.

16. *GRISEA. Der graue Manakin.*

Halle, Vögel, p. 379. n. 376. *der buntflüglige Sperling mit liegendem Fiederbusche.*

Klein, av. p. 90. n. 16. Passer in occipite cristatus, crista plumacea dependente.

Klein, Vorbereit. p. 168. n. 16. *Straussperling.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 92. n. 15. *Straussperling.*

Briffon, ornithol. II. p. 174. n. 13. Manakin gris hupé.

Büffon, Vögel, XIII. p. 98 *Coquantototl, oder der kleine gehäubte Vogel in Sperlingsgestalt.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 560. n. 20. *Pipra* (Grisea) cristata grisea, subtus flavescens, sin-
cipite luteo, tectricibus alarum minoribus fla-
vescentibus, maioribus rubris.

5. *ALBIFRONS. Der weißbuschige Manakin.*

Müller, Naturyst. II. p. 622. n. 5. *Weißbusch.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 183. *der Zartschnabel mit weißem Gesichte; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 560. n. 21. *Pipra* (Albifrons) crista alba, corpore rubro testaceo, dorso nigro, gutture albo nigro marginato, femoribus caeruleiscentibus.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 34. *der Manakin mit weißem Gesichte.*

β. *Büffon*, Vögel, XIII. p. 100. *der weißstraußigte Manaki.*

Latham, Syn. II. 2. p. 531. n. 18. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 21. β.

6. ERYTHROCEPHALA. *Der goldköpfige Manakin.*

Müller, Naturfyst. II. p. 622. n. 6. *der Goldkopf.*
 Onomat. hist. nat. V. p. 28. *der rothköpfige Dornreich, mit schwarzem Körper, purpurnen Rücken, und kurzem Schwanze.*

Onomat. histor. natur. II. p. 827. *der Chichiltototlvogel.*

Klein, av. p. 94. n. 7. *Linaria Mexicana.*

Klein, Vorbereit. p. 175. n. 7. *gelber Dickkopf.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 100. *gelber Dickkopf.*

Klein, av. p. 86. n. 13. *Parus auro-capillus.*

Klein, Vorbereit. p. 161. n. 13. *rothköpfiger Dornreich.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 89. n. 13. *rothköpfiger Dornreich.*

Briffon, ornith. II. p. 169. n. 4. *Manakin à tête d'or.*

Buffon, Vögel, XIII. p. 82. *der goldköpfigte Manaki; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 556. n. 7. *Pipra (Erythrocephala) nigra, vertice armillisque fulvis.*

Halle, Vögel, p. 363. n. 354. *die schwarze goldköpfige Meise.*

Samml. zur Physf. und N. G. II. p. 747. *der weißkuppichte Manakin.*

Halle, Vögel, p. 395. n. 401. *der amerikanische schwarze Hänfling mit goldfarbenem Kopfe.*

Seligmann, Vögel, I. tab. 41. *die schwarze Meise mit dem goldfarbenem Kopf.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 203. n. 248. *die schwarze Meise mit rothgelbem Kopf.*

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 191. n. 10. *Parus (Erythrocephalus) niger capite femoribusque fulvis.*

Petiv.

Petiv. Gaz. tab. 46. Fig. 7. Avicula nigra, capite e luteo croceo.

Seba, mus. I. p. 96. tab. 60. Fig. 7. Avicula Mexicana de Chichiltototl.

β. *Der rothköpfige Manakin. (7)*

Halle, Vögel, p. 395. n. 401. der amerikanische schwarze Hänfling, mit rothem Kopfe.

Onomat. hist. nat. V. p. 31. Manacus rubro-capillus.

Klein, verb. Vögelhist. p. 100. n. 7. rother Dickkopf.

Briffon, ornithol. II. p. 170. n. 5. Manakin à tête rouge.

Büffon, Vögel, XIII. p. 82. der rothköpfige Manaki.

Latham, Syn. II. 2. p. 523. n. 5. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 557. n. 8. Pipra nigra, vertice armillisque rubris.

Salerne, ornith. p. 250. Tangara appellé Manakin.

Jonston, av. p. 209. Tangarae secunda species Brasiliensibus.

7. AUREOLA. *Der roth und schwarze Manakin.*

Müller, Naturfyst. II. p. 623. n. 7. der Rothkopf.

Briffon, ornith. II. p. 170. n. 6. Manakin rouge.

Büffon, Vögel, XIII. p. 76. der rothe Manaki; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 558. n. 11. Pipra (Aureola) nigra capite pectoreque coccineis, remigibus antrorsum macula alba.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 51. der rothe und schwarze Manakin.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 747. der rothe Manakin.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 191. n. 11. Parus (Aureola) niger, capite pectoreque coccineis, remigibus antrorsum macula alba.

β. *Der schwarz und gelbe Manakin.* (8)

Briffon, ornithol. II. p. 171. n. 7 *Manakin orangé.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 80. *der pomeranzenfarbigte Manaki*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 525. n. 9. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 558. n. II. β. P. nigra, capite collo inferiore pectore abdomine marginibusque alarum aurantiis, remigibus intus macula alba.

Samml. zur Physf und N. G. II. p. 747. *der orangefarbene Manakin.*

8. *LEUCOCEPHALA.* *Der weißköpfige Manakin.*

Müller, Natur Syst. II. p. 623. n. 8. *der Weißkopf.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 521. *der Weißkopf.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 107. *die weißköpfige Surinamische Pipra.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 557. n. 9. *Pipra* (*Leucocephala*) nigra, capite albo.

9. *LEUCOCAPILLA.* *Der weißkappige Manakin.*

Müller, Natur System, II. p. 623. n. 9. *der Rohrzeifig.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 162. n. 3. *der weißgehäubte Manakin.*

Halle, Vögel, p. 379. n. 377. *der schwarze Sperling, mit weißer Opferhaube; Schleiersperling.*

Onomat. hist. nat. V. p. 28. *Manacus albo-capillus.*

Klein, av. p. 90. n. 17. *Passer toto corpore niger, vitta alba.*

Klein, Vorbereit. p. 168. n. 17. *Weißkopf.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 92. n. 16. *Weißkopf*, p. 168. *weißköpfige Meise.*

Briffon, ornithol. II. p. 169. n. 3. *Manakin à tête blanche.*

Büffon,

(8) Nach *Briffon* und *Büffon* eine eigene Gattung.

Büffon, Vögel, XIII. p. 82. *der weißköpfigte Manaki*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 557. n. 8. Pipra (Leucocapilla) atra, pileo albo.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 5. *der weißgekappte Manakin*.

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 9. Parus (Pipra) ater, capite supra albo.

Seba, II. p. 102. tab. 96. Fig. 5. Avis de Cacatototl toto corpore nigra, cum vitta alba.

10. GUTTURALIS. *Der weißkehlige Manakin.*

Müller, Naturfyft. II. p. 623. n. 10. *Weißkehlchen*.

Onomat. hist. nat. V. p. 30. Manacus gutture albo.

Briffon, ornith. II. p. 168. n. 2. Manakin à gorge blanche.

Büffon, Vögel, XIII. p. 89. *der weißkehligte Manaki*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 557. n. 10. Pipra (Gutturalis) nigra, gutture albo.

11. SERENA. *Der weißstirnige Manakin.*

Müller, Naturfyft. II. p. 624. n. 11. *der Luftling*.

Onomat. hist. nat. V. p. 27. Manacus alba fronte.

Briffon, ornithol. II. p. 172. n. 9. Manakin à front blanc.

Büffon, Vögel, XIII. p. 91. *der weißstirnigte Manaki*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 556. n. 5. Pipra (Serena) nigra, fronte alba, uropygio cyaneo, ventre fulvo.

12. MANACUS. *Der schwarzkappige Manakin.*

Müller, Naturfyft. II. p. 624. n. 12. *der Weißnacken*.

Onomat. hist. nat. V. p. 27. *der Manakin.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 167. n. 5. *schwarzköpfige Grasmücke.*

Briffon, ornithol. II. p. 168. n. 1. *Manakin.*

Briffon, Vögel, XIII. p. 73. *der schwarzkappigte Manaki; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 556. n. 6. *Pipra* (Manacus) nigra subtus alba, macula cervicis alarumque alba.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 50. *der schwarzgekappte Manakin.*

Samml. zur Phys. u. Naturgesch. II. p. 747. *der schwarzgekappte Manakin, oder Nussknacker.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 389. n. 2. *der Nussknacker.*

β. Latham, Syst. ornithol. II. p. 556. n. 6. β.

13. MINUTA. *Der kleine Manakin.*

Müller, Naturfyst. II. p. 624. n. 13. *Zwergzeisig.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 108. *der kleinste Manakin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 558. n. 12. *Pipra* (Minuta) grisea, capite nigro albo punctato, pectore flavescens, lineis transversis nigris.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 189. n. 34. *Motacilla* (Minuta) grisea, capite nigro, punctis albis sparsis. (9)

17. STRIATA. *Der Manakin mit gestreiftem Kopfe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 558. n. 13. *Pipra* (Striata) cinereo-fusca, subtus flavescens, vertice nigro, striis albis, loris remigibusque secundariis apice flavis, alula rectriceque extima apice albis.

18. NAE-

(9) Pallas vermuthet, daß dies Synonym, so wie *Mus. Ad. Frid.* 2. p. 4. zu *Yunx Minutissima* p. 423. n. 2. gehöre. S. nord. Beitr. III. p. 5.

18. NAEVIA. *Der gefleckte Manakin.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 71. *der gefleckte Fliegen-
schnäpper von Cayenne.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 559. n. 14. Pipra
(*Naevia*) fusca, subtus fulva, gula iuguloque
nigris, pectore fascia alarum bifida rectricibus-
que apice albis.

19. LEUCOTIS. *Der weißhörige Manakin.*

Ist wohl mit *Turdus Auritus* p. 827. n. 94. einer-
ley. *S. Latham*, Syst. ornithol. I. p. 360.
n. 123.

20. ATRICAPILLA. *Der schwarzgekrönte Ma-
nakin.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 104. *der aschgraue Ma-
naki*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 22. Pipra
(*Atricapilla*) cinerea, subtus griseo-alba, rectri-
cibus alarum maioribus, remigibusque nigri-
cantibus, vertice nigro.

21. PAPUENSIS. *Der Orangen-Manakin.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 166. *der Orangen-Ma-
naki.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 23. Pipra
(*Papuenis*) nigro virescens, subtus albida, pe-
ctore macula ovata fulva, rectricibus 2. inter-
mediis brevioribus.

22. HAEMORRHOA. *Der Manakin mit rothem
After.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 24. Pipra
(*Haemorrhoea*) nigricans, subtus alba, crisso
macula coccinea.

23. NIGRICOLLIS. *Der schwarzkehlige Manakin.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 25. Pipra
 (Nigricollis) nigro-caerulescens subtus alba,
 gula crissoque nigris.
24. CAPENSIS. *Der capsche Manakin.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 26. Pipra
 (Capensis) obscura subtus fulvo-flavesens.
25. CINEREA. *Der aschgraue Manakin.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 562. n. 27. Pipra
 (Cinerea) cinerea, abdomine cinereo-albido.
26. MUSICA. *Der Organist.*
Büffon, Vögel, XII. p. 89. *der Organist*; m.
 e. Fig.
Latham, Syst. ornith. II. p. 562. n. 28. Pipra
 (Musica) nigricans, corpore subtus uropygio-
 que fulvis, gutture genisque nigris, vertice
 nuchaque caeruleis, fronte flava.
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 734. der Organist.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit dreyzehn Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind zwey, bey der 5ten zwey, und bey der 12ten gleichfalls zwey Varietäten auseinander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. Pipra (Picicitli) cinerea, capite colloque atris, macula candente, oculos ambiente, acumine in pectus usque procedente.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 559. n. 16.
Fernand, nov. Hisp. p. 53. c. CC. Avis Picicitli Tetzcoquensis.

Büffon,

Büffon, Vögel, XIII. p. 97. 98. *der Mexikanische Picicitti.*

An vere Pipra?

2. *Pipra* (*Miacatototl*) nigra, plumis candentibus interfertis, ventre pallente, alis caudaque inferne cinereis.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 560. n. 19.

Fernand, nov. Hisp. p. 30. *Miacatototl*, seu avis germinis Maizi.

Büffon, Vögel, XIII. p. 92. *der Vogel, der bey den Brasilianern den Namen Maizi de Miacatototl führt.*

An Pipra?

116. GESCHLECHT. PARUS. *Die Meise.* (Maife.)

Müller, Naturysst. II. p. 625. Gen. CXVI.

Leske, Naturgeschichte, p. 264. Gen. XLVI.

Borowsky, Thierreich, III. p. 177. Gen. LXXI.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 194. Gen. XXXVIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 546. Gen. LXXV.

Funke, Naturgesch. I. p. 272.

Ebert, Naturl. II. p. 146.

Halle, Vögel, p. 354. Gen. IX.

Pennant, a. ct. Zool. II. p. 395.

Neuer Schaupl. d. Nat. V. p. 584.

Onomat. hist. nat. V. p. 176.

Klein, av. p. 84 Gen. IX.

Briffon, ornithol. I p. 461. Gen. XLI.

Büffon, Vögel, XVII. p. 8. sqq.

Batsch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXIX.

Latham, Syst. ornith. II. p. 562. Gen. XLV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 224.

Donn-

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 390. Gen. LXXXV.

1. BICOLOR. *Die amerikanische Haubenmeise.*

Müller, Natursyst. II. p. 625. n. 1. *die zweyfarbige Meise.*

Halle, Vögel, p. 363. n. 352. *die graue Haubenmeise.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 395. n. 241. *die amerikanische Haubenmeise.*

Klein, av. p. 86. n. 12. *Parus cristatus pectore rubro.*

Klein, Vorbereit. p. 161. n. 12. *rothbrüstige Kobelmeise.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 89. n. 12. *rothbrüstige Kobelmeise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 179. *die zweyfarbige Meise.*

Briffon, ornith. I. p. 468. n. 9. *Mefange hupée de la Caroline.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 142. *die carolinische Schopfmeise; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 567. n. 13. *Parus (Bicolor) capite cristato, antice nigro, corpore cinereo, subtus ex albido rufescente.*

Seligmann, Vögel, III. tab. 14. *die gehaubte Meise.*
Naturgesch. a. d. best. Schriftst. Vögel, p. 848. *die carolinische Haubenmeise.*

Müller, zool. dan. prodr. p. IX. *Parus (Bicolor) capite cristato antice nigro, corpore cinereo, subtus ex albido rufescente.*

2. CRISTATUS. *Die (gemeine) Haubenmeise. (10)*

Müller, Natursyst. II. p. 626. n. 2. *die Haubenmeise.*

Leske,

(10) Brütet nicht selten auch in Eichhörnchen-Bauen (Kobeln) daher der Name *Kobelmeise*. Legt rundliche, weisse, am stumpfen

- Leske*, Naturgesch. p. 264. n. 1. *die Haubenmeiße.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 179. n. 2. *die Haubenmeiße.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 548. n. 4. *die Haubenmeiße.*
Funke, Naturgesch. I. p. 272. *die Haubenmeiße.*
Ebert, Naturl. II. p. 147. *die Haubenmeiße.*
Halle, Vögel, p. 358. n. 347. *die Haubenmeiße.*
Meyer, Thiere, II. tab. 26. *die Hauben-Meiße.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 433. n. 379. *die Haubenmeiße.*
Pennant, arch. Zool. II. p. 400. F. *die Haubenmeiße.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 183. *die Haubenmeiße.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 138. *Haubenmeiße; Kappmeiße.*
Klein, av. p. 85. n. 6. *Parus cristatus.*
Kein, Vorbereit. p. 159. n. 6. *Haubenmeiße; Kobel-Schopff-Straus-Haubel-Heidenmeiße.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 88. n. 6. *Haubenmeiße.*
Klein, Vogeleyer, p. 29. tab. 4. Fig. II.
Gesner, Vögelb. p. 378. *Kobelmeißlein; Straußmeißlein; Heydenmeißlein; m. e. schl. Fig.*
Briffon, ornith. I. p. 466. n. 8. *Mefange lupée.*
Büffon, Vögel, XVII. p. 134 *die Schopfmeiße; m. e. Fig.*
Batsch, Thiere, I. p. 359. *die Haubenmeiße.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 567. n. 14. *Parus (Cristatus) griseo-rufescens cristatus, collari nigro, ventre albo.*
Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 191. *die Haubenmeiße.*

Siemßen,

pfen Ende röthlich punctirte Eyer. — Die Haube besteht aus schwarz und weißen Schuppen, die nach dem Wirbel zu immer länger werden, und daselbst einen Schopf bilden.

- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 142. n. 1. *Haubenmeise*; *Töppelmeesken*.
- Bork*, N. G. von Preuss. IV. p. 443. *die Haubenmeise*.
- Fischer*, Livl. p. 104. n. 174. *Haubenmeise*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 175. n. 1. *Topmeise*.
- Scopoli*, Bem. a. d. N. G. I. p. 199. n. 243. *die Schopfmeise*.
- Storr*, Alpenreis. I. p. 80. *Parus cristatus*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 365. *die Schopf-Meisse*.
- Angenehme Landluft*, p. 223. *die Schopfmeise*.
- Naturforsch. XVII.* p. 107. n. 221. *die Haubenmeise*.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 66. *die Kupp-Meise*.
- Borkhausen*, Magaz. I. p. 197. n. 77. *Haubenmeise*; *Meisenkönig*.
- André u. Bechstein*, Spazierg. II. p. 409. *die Haubenmeise*.
- Onomat. forestal.* II. p. 808. *die Kuppmeise*; *Kupfmeise*; *Haubelmeise*.
- Börner*, schles. ökon. Nachr. 781. p. 107. *Parus cristatus*.
- Tänzer*, notab. Venator. p. 107. *Kupp-Meisse*.
- Anweiss*, Vögel zu fang. p. 373. *Schopfmeise*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Parus cristatus*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 32. n. 2. *Parus cristatus*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 189. n. 1. *Parus (Cristatus) capite cristato*.
- Charleton*, onom. zoic. p. 90. n. 5. *Parus cristatus*.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 321. *Parus cristatus*. *Straus-Meislín*; *Kobelmeise*; *Heubel-Meise*.
- Rzaczynsky*, auct. hist. nat. Pol. p. 404. *Parus cristatus*.
- Jonston*, av. p. 120. *Parus cristatus*.

Barrere, Sp. nov. Cl. 3. Gen 24. p. 49. *Parus cristatus*.

Salerne, ornith. p. 156. *Mésange coiffeté à bouquet, à perruche; Méfange crêlée, hupée, chaperonnée.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 390. n. 1. *die Haubenmeise.*

3. MAIOR. *Die Kohlmeise.* (1)

Müller, Naturfyst. II. p. 626. n. 3. *die Kohlmeise.*

Leske, Naturgesch. p. 265. n. 2. *die Kolmeise.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 180. n. 3. *die Kohl-, Brand-, Spiegel-, Finkmeise.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 194. n. 1. *Parus* (Maior) capite nigro, temporibus albis, nucha lutea; *die Kohlmeise, Pickmeise; Finkmeise.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 547. n. 1. *die Kohlmeise.*

Funke, Naturgesch. I. p. 272. *die Kohlmeise.*

Ebert, Naturl. II. p. 146. *die Kohlmaise.*

Halle, Vögel, p. 354. n. 343. *die große schwarze Meise, mit weißen Schläfen und gelbem Nacken.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 343. n. 380. *die Kohlmeise.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 398. A. *die Kohlmeise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 185. die große schwarze Meise.

Bbb 2

Handb.

- (1) *Kohlmeise, Kohlenmeise*, wegen ihrer kohlen schwarzen Kopfplatte, oder weil sie in den Mauern einzelner Häuser nahe an den Wäldern, z. E. der Kohlenbrenner nistet. — *Spiegelmeise* von der glänzend schwarzen Kopfplatte. — *Finkmeise* von ihrem, dem Finkenschlage nicht ganz unähnlichen Gesange; — *Speckmeise, Schinkenmeise*, weil sie des Winters oft in die Häuser kommen, und Löcher in den Speck fressen. — Tödtet Vögel, z. E. Goldammer, graue Ammer, so gar Finken, und frisst ihnen das Gehirn aus. Ja man weiß Beyspiele, daß diese Meisen schlafenden kleinen Kindern die Augen ausgehackt haben. Daß sie den Bienenstöcken nachtheilig sind, hat schon *Aelian* bemerkt. Das Fleisch ist essbar, hat aber einen etwas bitteren Geschmack. — Wird etwa 5, bis 6. Jahr alt.

- Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 138. *Kohlmaise*.
Klein, av. p. 94. n. 1. *Parus maior*.
Klein, Vorbereit. p. 158. n. 1. *Kohlmaise*; *Spiegel-*
Brand -, *große Meise*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 87. n. 1. *Kohlmaise*.
Klein, Stemmat. av. p. 16. tab. 17. Fig. 8. a. b.
Gesner, Vögelb. p. 376. *große oder Spiegelmaise*;
 m. e. zieml. gut. Fig.
Brissson, ornith. I. p. 461. n. 1. *grosse Mésange ou*
Charbonniere.
Biffon, Vögel, XVII. p. 29. *die große oder*
Kohlmaise; m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 359. *die Kohlmaise*.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 562. n. 1. *Parus*
 (Maior) viridi-olivaceus subtus flavescens, ca-
 pite nigro, temporibus albis, gula lutea.
Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 192. *die Kohlmaise*.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 143. n. 3. *die große*
Kohlmaise.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 443. *die Kohlmaise*.
Fischer, Livl. p. 103. n. 172. *große Meise*.
Cetti, Sardin. II. p. 225. *die große Art*.
White, N. G. von Engl. p. 65. n. 2. *Spiegel-*
maise.
Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 2. *Musvit*.
Pontoppidan, Norweg. II. p. 155. *Kiød-Meise*;
Musvit; *Talg-Oxe*.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die große Meise*.
Linné, Abhandl. II. p. 306. n. 141. *die Kohlmaise*.
 Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 298. *Kohlmaise*.
 Naturforsch. XVII. p. 107. n. 122. *die Kohlmaise*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 66. *die Pick- oder Groß-*
maise.
Naumann, Vogelfteller, p. 139. *die Kohlmaise*.
Scopoli, Bem. 2. d. N. G. I. p. 199. n. 242. *die*
Kohlmaise.

- Zorn, Petinotheol. II. p. 358. *die Kohl-Meisse.*
 Angenehme Landluft, p. 219. *die Kohlmeise.*
 Anweis. Vögel zu fang. p. 369. *die Kohlmeise.*
 Onomat. forestal. II. p. 803. *Pickmeise; Großmeise.*
 Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 107.
 Goffroy, mat. med. VII. p. 59. *die große- oder Kohlmeise.*
 Tänzer, notabil. Venator. p. 107. *die Schwartz-Meisse.*
 Eberhard, Thiergesch. p. 85. *die große Meise.*
 Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorst. VI. p. 86. *Kohlmeise.*
 An ré u. Bechstein, Spatzierg. I. p. 282. *die Kohlmeise.*
 Naturgesch. a. d. best. Schriftst. Vögel, p. 825. *die Kohlmeise.*
 Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. Parus maior.
 Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 1. Parus maior.
 Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 189. n. 2. Parus (Maior) capite nigro, temporibus albis, nucha lutea.
 Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 1. Parus maior.
 Möhring, av. gen. p. 45. n. 36. Parus.
 Schwenkfeld, av. Siles. p. 318. Parus Carbonarius, Fringillago. *Kol-Meise; Spiegel-Meise; Brand-Meise, große Meise.*
 Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Parus maior.
 Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 403. Parus Carbonarius.
 Jonston, av. p. 120. Parus maior.
 Journal de physique Aout. 1776. p. 127. Serre fine; Bargne, etc.
 Belon, nat. des ois. p. 376. Premiere espece de Mésange, Mésange, Nonnette.

Schaefer, element. ornithol. tab. 52.

Faun. Arragon. p. 90. n. 1.

Aristot. hist. anim. L. 8. c. 3. Αἰγυθαλος.

Alcian. de nat. anim. L. 1. c. 58. Αἰγυθαλοι.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 391. n. 2.
die Kohlmeise.

β. P. fusco-olivaceus, subtus fordide flavicans, capite nigro, temporibus cinereis, rostro forficato. *

Latham, Syst. ornith. II. p. 563. n. 1. β.

Levin, britt. Birds. I. t. tit. praef. Cross-billed Titmouse.

γ. Die kleinere Kohlmeise. *

Büffon, Vögel, XVII. p. 43. die kleine Kohlmeise, kleine Speckmeise.

16. CYANEUS. Die lasurblaue Meise.

Briffon, ornith. I. p. 463. n. 3. grosse Mélange bleue.

Büffon, Vögel, XVII. p. 153. die große blaue Meise; m. e. Fig.

Pennant, arct. Zool. II. p. 399. C. die lasurblaue Meise.

Latham, Syn. Suppl. p. 189. Azure Titmouse.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 563. n. 3. Parus (Cyanus) dilute caeruleus, subtus albus, uropygio et vertice cano-albidis, cervicis albae fascia lata, humeris tectricibusque caudae caeruleis.

Lepechin, Nov. comment. Petrop. XIV. p. 498. tab. 13. Fig. 1. Parus dorso caeruleo, etc.

Jonston, av. pag. 120. Parus indicus.

15. IGNOTUS. Die Strömsche Meise.

Pennant, arct. Zool. II. p. 398. B. die Strömsche Meise.

Büffon,

Buffon, Vögel, XVII. p. 162. *die unbekannte Meise des Ström.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 563. n. 2. Parus (Stroemei) viridi-flavescent, pectore rufo-maculato, abdomine caeruleo, cauda forficata, rectricibus duabus exterioribus extus albis.

4. AMERICANUS. *Die Kriechmeise. (2)*

Müller, Naturfyst. II. p. 626. n. 4. *die amerikanische Meise.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 396. n. 243. *die Kriechmeise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 177. *die amerikanische Finkennaife.*

Briffon, ornithol. I. p. 452. n. 66. *Figuier cendré de la Caroline.*

Buffon, Vögel, XVI. p. 124. *der aschgrau Feigenfresser mit dem Halskragen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 571. n. 28. Parus (Americanus) caeruleus, temporibus pectore dorsoque flavescentibus, hypochondriis purpurascentibus.

Seligmann, Vögel, III. tab. 28. *Finkmeise.*

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 4. Parus (Americanus) caeruleus, temporibus pectore dorsoque flavescentibus, hypochondriis purpurascentibus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 225. Parus americanus.

Bbb 4

5. CAE-

(2) *Buffon* *Figuier de la Caroline*, und *Figuier cendré à collier*, rechnet *Latham* zu *Motacilla Americana*, p. 960. Ueberhaupt werden die Synonymen hier sehr verwechselt. Ob dies auch eine Meise seyn mag?

5. CAERULEUS. *Die Blaumeise.* (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 627. n. 5. *die Blaumeise.*

Leske, Naturgesch. p. 265. n. 3. *die Blaumeise.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 180. n. 4. *die Blau-, Pimpel-, Käsemeise.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 194. n. 2. Parus (Caeruleus) remigibus caerulescentibus; primoribus margine exteriori albis, fronte alba, vertice caeruleo. *Blaumeise, Jungfermeise; Blau-müller.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 548. n. 5. *die Blaumeise.*

Funke, Naturgesch. I. p. 273. *Blaumeise.*

Ebert, Naturl. II. p. 147. *Blaumaise.*

Halle, Vögel, p. 356. n. 345. *die blaue Maise; Fig. 21.*

Meyer, Thiere, I. tab. 33. *Blau-Meise.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 434. n. 381. *Blaumeise, Mehlmeise; Meelmeise, etc.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 399 D. *die Blaumeise.*

Ouomat. hist. nat. VI. p. 180 *die blaue Maise.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 138. *Blaumaise; Braubling, etc.*

Klein, av. p. 85. n. 3. Parus caeruleus.

Klein, Vorbereit. p. 158. n. 3. *Blaumeislein, Käsemeischen.*

Klein, verb. Vögelh. p. 87. n. 3. *Blaumeise.*

Klein, Stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. 10. a. b.

Klein, Vögelzeyer, p. 29. tab. 4. Fig. 10.

Gesner, Vögelb. p. 376. *Blaumeise; Mehlmeißlein.*

Briffon, ornith. I. p. 462. n. 2. *Méfarge bleue.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 75. *die blaue Meise; m. e. Fig.*

Batsch,

(3) Gewicht, nach Büffon, drey Drachmen.

- Batsch*, Thiere, I. p. 359. *die Blaumaise*.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 566. n. 12. Parus
 (Caeruleus) olivaceo-virefcens, subtus luteus,
 remigibus caerulescentibus, primoribus mar-
 gine exteriore albis, fronte alba, vertice cae-
 ruleo.
Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 193. *die Blaumaise*.
Siemssen, meklenb. Vög. p. 144. n. 3. *die Blau-
 maise*.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 444. *die specht-
 artige Blaumaise*.
Fischer, Liv. p. 103. n. 173. *Blaumaise*.
Cetti, Sardin. II. p. 225. Parus caeruleus.
Pallas, Reif. Ausz. III. p. 475. *Blaumaise*.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die blaue Maise*.
Pontoppidan, Dännem. p. 175. *Blaumaise*.
Storr, Alpenreise, I. p. 80. Parus caeruleus.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 200. n. 244. *die
 Blaumaise*.
Naturforsch. XVII. p. 107. n. 223. *die Blaumaise*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 66. n. 3. *Blau-oder Mehl-
 Maise*.
Naumann, Vogelsteller, p. 139. *Pümpelmaise
 oder Blaumaise*.
Borkhausen, Magaz. I. p. 199. n. 79. *Blaumaise*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 361. *die Blau-Meisse*.
Angenehme Landluft, p. 221. *Blaumaise*.
Onomat. forestal. II. p. 806. *Blaumaise; Pimpel-
 maise*.
Börner, schles. ökonom. Nachr. 1781. p. 107. Pa-
 rus caeruleus.
Anweis. Vögel zu fang. p. 371. *Blaumaise*.
Wirsing, Vögel, tab. 32. — *Günther*, Nest.
 u. Ey. tab. 66. *Blaumaise*.
Goeze, Allerl. II. p. 396. n. 16. *Blaumaise*.

- Goetze, Natur, Menschenl. u. Vorf. VI. p. 101. *Blaumeiße*.
- André und Bechstein, Spazierg. II. p. 370. *Blaumeiße*.
- Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 3. Parus caeruleus.
- Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 4. Parus (Caeruleus) remigibus caerulefcentibus: primoribus margine exteriori albis, fronte alba, vertice caeruleo.
- Charleton, onomast. zoic. p. 90. n. 2. Parus minor.
- Kramer, Austr. p. 379. n. 3. Parus remigibus caerulefcentibus: prima margine exteriori alba; vertice caeruleo; *Blaumeiße*.
- Schwenkfeld, av. Siles. p. 320. Parus caeruleus. Parus montanus. *Blaw-Meißlin; Meel-Meiße; Bin-Meiße; Pimpel-Meiße*.
- Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Parus caeruleus.
- Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 403. Parus caeruleus.
- Johnston, av. p. 120. Parus caeruleus.
- Belon, hist. nat. des ois. p. 369. Mefange bleue; Marengé.
- Salerne, ornith. p. 212. petite Ardelle.
- Zinnan. Uov. p. 76. tab. 11. Fig. 68. Parozolino o Fratino.
- Faun. Arragon. p. 90.
- Hermann, tab. affin. anim. p. 225. Parus caeruleus.
- Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 391. n. 3. *die Blaumeiße*.
- β. P. capite remigibus rectricibusque fordide albis, dorso pallide viridi, abdomine pallide flavo. *
- Günther: Naturforsch. I. p. 63. n. 14. *weiße Blaumeiße*.

γ. *P. cinereus*, dorso flavescente, rostro pedibusque pallidioribus. *

Götz: Naturforsch. XVI. p. 48. n. 2.

17. *SAEBYENSIS. Die Säbysche Meise.* (5)

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 597. not. * 1.

Büffon, Vögel, XVII. p. 84. *die Säbysche Meise*; m. e. Fig.

6. *ATRICAPILLUS. Die schwarzköpfige canadische Meise.*

Müller, Naturfyst. II. p. 627. n. 6. *das Schwarzköpfchen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 397. n. 245. *die canadische Meise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 178. *die Meise aus Canada.*

Briffon, ornithol. I. p. 464. n. 6. *Mefange à tête noire de Canada.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 67. *die schwarzköpfige kanadensische Meise.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 566. n. 10. *Parus (Atricapillus) pileo gulaque nigris, corpore cinereo subtus albo.*

Philos. Transact. LXII. p. 407.

7. *ATER. Die Tannenmeise.* (6)

Müller, Naturfyst. II. p. 627. n. 7. *die Tannenmeise.*

Leske, Naturgeschichte, p. 265. n. 4. *die Tannenmeise.*

Borows.

(5) Nach Latham mit *Parus Cyanus* p. 1007. einerley. Auch Bechstein ist der Meinung.

(6) Ich begreife noch nicht, wie Latham Cetti's *Cingallegra* hier anführen kann. Nach Cetti's Beschreibung muß dies *Parus Caerulens* seyn.

Borowsky, Thierreich, III. p. 181. n. 5. die *Tannenmeise*; *kleine Kohlmeise*; *Holzmeise*; *Waldmeise*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 547. n. 2. die *Tannenmeise*.

Funke, Naturgesch. I. p. 273. die *Tannenmeise*.

Ebert, Naturl. II. p. 146. die *Tannenmeise*.

Halle, Vögel, p. 356. n. 344. die *Tannenmeise*.

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere II. p. 434. n. 382. die *Tannenmeise*; *Hundsmeise*; *Sperrmeise*; *Kreuzmeise*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 396. n. 244. die *Tannenmeise*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 177. die *Tannenmeise*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 138. *Tannenmeise*.

Klein, av. p. 85. n. 2. *Parus sylvaticus*.

Klein, Vorbereit. p. 158. n. 2. *Tannenmeise*; *Wald-, klein Kohlmeise*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 87. n. 2. *Tannenmeise*; *Hundsmeise*.

Klein, stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. 9. a. b. *Parus carbonarius*.

Gesner, Vögelb. p. 377. *Kohlmeiß*; m. e. schl. Figur.

Briffon, ornithol. I. p. 464. n. 5. *Mésange à tête noire*.

Briffon, Vögel, XVII. p. 44. die *kleine Kohlmeise*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 359. die *Tannenmeise*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 564. n. 8. *Parus* (Ater) dorso cinereo, capite nigro, occipite pectoreque albo.

Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 194. die *Tannenmeise*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 145. n. 4. *die kleine Kohlmeise*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 444. *die graue Waldmeise*.

Fischer, Liv. p. 104. n. 175. *Tannenmeise*.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die schwarze Meise*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 362. *die Tann-Meiß*.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 201. n. 245. *die Schwarzmeise; Sperrmeise*.

Naturforsch. XVII. p. 108. n. 224. *die Tannenmeise*.

Naumann, Vogelfteller, p. 139. *die Tannenmeise*.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 276. *Tannenmeise*.

Angenehme Landluft, p. 222. *die Holzmeise*.

Onomatol. forestal. II. p. 307. *Waldmeise; Holzmeise*.

Anweis. Vögel zu fang. p. 372. *Holzmeise*.

Wirsing, Vögel, tab. 59. *Tannenmeise*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 4. Parus ater.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 5. Parus (Ater) capite nigro, dorso cinereo, occipite pectoreque albo.

Charlton, onom. zoic. p. 90. n. 1. Parus maior, Carbonarius.

Kramer, Austr. p. 379. n. 4. Parus capite nigro, vertice albo, dorso cinereo pectore albo; *Speermoise; Creuzmeise*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 320. Parus ater; Parus caninus; *Hunds-Moise; kleine Kol-Moise*.

Jonston, av. p. 120. Parus ater.

Barrere, ornith. Cl. 3. Gen. 24. sp. 1. Parus ater, Carbonarius.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Polon. p. 404. Parus Carbonarius minor.

Salerne, ornith. p. 212. petit Charbonnier.

Histoire. Prov. I. p. 516.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 391. n. 4.
die Tannenmeise.

8. PALUSTRIS. *Die Sumpfmeise*. (7)

Müller, Naturyst. II. p. 627. n. 8. *die Sumpfmeise*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 181. n. 6. *die Sumpf-By-Plattenmeise*; *Ash-Nonnenmeise*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 548. n. 5. *die Sumpfmeise*; *Mönchmeise*; *Speckmeise*.

Halle, Vögel, p. 357. n. 346. *die Nonnenmeise*.

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 435. n. 388. *die Sumpfmeise*; *Plattenmeise*, etc.

Pennant, arch. Zool. II. p. 400. E. *die Sumpfmeise*.

Onomat. histor. natur. VI. p. 188. *die Hundsmoise*; *Sumpfmeise*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 139. *Holzmeise*; *Waldmeise*; *Plattenmeise*, etc.

Klein, av. p. 85. n. 4. *Parus fuscus*, cinereus, palustris, atricapillus.

Klein, Vorbereit. p. 159. n. 4. *Münchmeise*; *Mönchmeise*; *Meisenkönig*; *schwarzköpfiger Dornreich*; *Graumeise*; *Ashmeise*; *Murmeise*; *Kottmeise*; *Rindmeislein*.

Klein,

- (7) Hält sich mehr in Wäldern als in Gärten auf, lebt von kleinen Samenkörnern, greift Bienen, Wespen und Raupen an; sammelt einen Vorrath von Hanffamen, wenn sie dazu Gelegenheit hat. Lebt gern auf Erlen und Weiden an sumpfigen Orten. Legt 5. bis 7. weisse mit hellbraun, besonders am stumpfen Ende punctirte Eyer. Lässt sich schwer im Bauer halten, und wird oft vor ihrem Tode, wenn man sie ein Jahr gehabt hat, blind.

- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 88. n. 4. *Münchmeise*.
Klein, Stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. II. a — c.
Gesner, Vögelb. p. 377. *Murmeise*; *Murmeiß*;
Rietmeiß; *Reitmeiß*; *Kolmeiß*; m. e. Fig.
Briffon, ornith. I. p. 465. n. 7. Mefange de ma-
rais, ou Nonnette cendrée.
Büffon, Vögel, XVII. p. 57. die aschgraue Non-
nenmeise; m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 359. die Plattenmaise.
Latham, Syn. Suppl. p. 189. Marsh Titmouse.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 565. n. 9. Parus
(Palustris) capite nigro, dorso cinereo, tempo-
ribus albis.
Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 195. die Sumpf-
meise.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 145. n. 5. die Sumpf-
meise.
Fischer, Zus. zur N. G. von Livl. p. 51. n. 505.
Sumpfsmeise; Hundemeise.
White, N. G. von Engl. p. 65. n. 2. Sumpfsmeise.
Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 4. Graameise.
Storr, Alpenreise, I. p. 80. Parus palustris.
Naturforsch. XXV. p. 19. Plattmeise.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. die Mauermoise.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 201. n. 246. die
Hundsmoise.
Zorn, Petinotheol. II. p. 363. die Platten- Meisse;
Nonn- Meisse; Hanf- Meisse.
Borkhausen, Magazin, I. p. 200. n. 81. Sumpf-
meise.
Naumann, Vogelsteller, p. 139. die Plattmeise.
Angenehme Landluft, p. 222. Hanfmeise.
Anweis. Vögel zu fang. p. 372. Hanfmeise.
Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 107. Parus
palustris.

Onomat. forestal. II. p. 807. *Hanfmeise*; *Schwarzmeise*.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 829.

Linne, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Parus palustris*.

Linne, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 5. *Parus palustris*.

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 6. *Parus* (Palustris) capite nigro, temporibus albis, dorso cinereo.

Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 3. *Parus palustris*.

Brünniche, ornith. bor. p. 73. *Parus palustris*.

Kramer, Austr. p. 379. n. 5. *Hundsmeise*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 320. *Parus fuscus*, cinereus, palustris, atricapillus. *Graw-Meißlin*; *Mur-Meise*; *Asch-Meise*; *Kott-Meise*; *Ried-Meißlein*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 404. *Parus fuscus*.

Jonston, av. p. 120. *Parus palustris*.

Zinnan. Uov. p. 77. tab. 12. fig. 68. 1. *Parolozino palustre*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 392. n. 5. *die Sumpfsmeise*.

β. *Büffon*, Vögel, XVII. p. 64. *Meise von Louisiana*.

Latham, Syn. II. 2. p. 541. n. 8. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 565. n. 9. β.

Borkhausen, Magazin, I. p. 200. 201. (8)

γ. *Latham*,

- (8) Die zwey weissen Binden auf den Flügeln, deren bey der Hauptgattung in unfrem System gedacht wird, habe ich so wenig, als die weissen Flecken bey dem Anfange eines jeden Flügels, deren *Scopoli* erwähnt, an den Exemplaren, die ich gesehen habe, gefunden. *Borkhausen* macht dieselbe Bemerkung, und glaubt, das hier vielleicht mehrere Arten verwechselt würden, und das *Gmelin* *Parus palustris* β, die *Linneische* *Parus palustris*; — hingegen *Gmel.* *Parus palustris* α, so wie die *Scopoli-*sche *Meise* dieses Namens eine andere Art seyn mögen.

γ. *Latham*, Syn. II. 2. p. 542. n. 8. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 566. n. 9 β.

9. VIRGINIANUS. *Die virginische Meise.*

Müller, Naturfyst. II. p. 627. n. 9 die virginische Meise.

Pennant, arch. Zool. II. p. 396. n. 242. die virginische Meise.

Klein, av. p. 74. n. 8. *Luscinia uropygio luteo.*

Klein, Vorbereit. p. 140. n. 8. *Gelbsteiß.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 75. n. 8. *Gelbsteis.*

Briffon, ornithol. I. p. 470. n. 14 *Mefange de Virginie.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 148. die Meise mit gelben Bürzel; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 567. n. 15. *Parus* (Virginianus) fusco-olivaceus, subtus griseus, uropygio luteo.

Seligmann, Vögel, III. tab. 16. die Meise mit gelbem Bürzel.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 849. *Meise mit dem gelben Steiß.*

10. PEREGRINUS. *Die Meise mit rothem Steiß.* (9)

Müller, Naturfyst. II. p. 618. n. 10. die ausländische Meise.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 564. n. 4. *Parus* (Peregrinus) uropygio coccineo, corpore cinereo, subtus albo.

18. GRISEUS. *Die graue, rothgekrönte Meise.* (10)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 597. not. * 2.

Büffon,

(9) Ist, nach *Latham*, mit *Parus coccineus* p. 1015. n. 31. einerley.

(10) Ist, nach *Bechstein*, mit *Motacilla Regulus*, p. 995. n. 48. einerley. *Latham* l. c. sch. int. sie mit *Fringilla Flammea* p. 915. n. 20. für verwandt zu halten.

Büffon, Vögel, XVII. p. 167. *die graue, roth-schneitlichte Meise.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 564. n. 6. Parus (Griseus) griseus vertice coccineo.

Olaassen, Isl. I. p. 312. c. *Audua Tytlingr?*

Hermann, tab. affin. anim. p. 225. Parus griseus.

19. AFER. *Die schwarzbrüstige afrikanische Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 168. *die afrikanische Meise.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 564. n. 7. Parus (Afer) nigricans, genis nucha abdomineque albis, collo subtus, pectoreque nigris.

II. CAUDATUS. *Die Schwanzmeise. (1)*

Müller, Naturyst. II. p. 628. n. II. *die Schwanzmeise.*

Leske, Naturgesch. p. 265. n. 5. *die langeschwänzte Meise.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 182. n. 7. *die Schwanz-Schnee-Zagelmeise; Pfannenstiel; Weinzapfer.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 194. n. 3. Parus (Caudatus) vertice albo, cauda corpore longiore; *die Schwanzmeise; Moormeise; Backofendrescher.*

Beckstein, Naturgesch. I. p. 549. n. 6. *die Schwanzmeise.*

Funke, Naturgesch. I. p. 372. *die Schwanzmeise.*

Ebert, Naturl. II. p. 147. *Schwanzmaise; Weinzapfer.*

Halle,

(1) Länge bis zum After $2\frac{1}{2}$, bis an das Ende des Schwanzes 6. Zoll. Flügelweite $6\frac{1}{2}$ Zoll. Gewicht $2\frac{1}{3}$ Drachmen. Aldrovand kannte den Unterschied zwischen *Parus Caudatus* und *Pendulinus* nicht. S. *Ludwigii* delect. opusc. ad scient. nat. spect. Lips. 1790. I. p. 148.

Halle, Vögel, p. 358. n. 348. *die Schwanzmaise.*

Meyer, Thiere, II. tab. 27. *die Schwanzmaise.*

Gatterer, vom Nutz. u. Schad. der Th. II. p. 435.

n. 384. *die Schwanzmaise; Belzmaise; Bergmaise; Pfannenstieglitz, etc.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 400. I. *die langgeschwänzte Maise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 181. *die Schwanzmaise.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 139. *Schwanzmaise, etc.*

Klein, av. p. 85. n. 7. *Parus caudatus.*

Klein, Vorbereit. p. 160. n. 7. *langgeschwänzte Maise; Zahlmaise; Pfannenstieglitz.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 88. n. 7. *langgeschwänzte Maise.*

Klein, Stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. 12. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 28. tab. 4. fig. 7.

Gesner, Vögelb. p. 378. *Schwanzmeißlein; Pfannenstieglein; Zigelmeiß, Pfannenstieglitz; m. e. schl. Fig.*

Briffon, ornithol. I. p. 469. n. 13. *Mefange à longue queue.*

Buffon, Vögel, XVII. p. 114. *die langgeschwänzte Maise; m. e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 358. *die Schwanzmaise.*

Latham, Syn. Suppl. p. 190. *Long-tailed Titmouse.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 569. n. 20. *Parus (Caudatus) albo roseo nigroque longitudinaliter varius, vertice albo, cauda longiore.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 196. *die Schwanzmaise.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 146. n. 6. *die Schwanzmaise.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 445. *die Schwanzmaise.*

- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 14. *die Schwanzmeise*.
Storr, Alpenreise, I. p. 80. *Parus caudatus*.
Naturforsch. XVII. p. 108. n. 225. *Schwanzmeise*.
Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 52. *die langgeschwänzte Meise*.
Scopoli, Bem. aus der N. G. p. 202. n. 247. *die Schwanzmeise*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 324. 366. *die Schwanzmeise*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 66. *die Schwanz-Meise*.
Naumann, Vogelsteller, p. 139. *Spiegelmeise*; *Teufelsbolzen*; *Pfannenstiel*. (ganz falsch beschrieben.)
Angenehme Landluft, p. 223. *die Schneemeise*.
Anweif. Vögel zu fang. p. 373. *Schneemeise*.
Börner, schles. ökonom. Nachr. 1781. p. 107. *Parus caudatus*.
Onomat. forestal. II. p. 809. *die Schneemeise*; *Mehlmeise*.
Naturgesch. aus den besten Schriftst. Vögel, p. 842. *Schwanzmeise*.
Borkhausen, Magazin, I. p. 201. n. 82. *Schwanzmeise*; *Pfannenstielchen*.
André und Bechstein, Spazierg. II. p. 394. 399. *Schwanzmeise*.
Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorseh. VI. p. 106. *Schwanzmeise*.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Parus caudatus*.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 6. *Parus caudatus*.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 7. *Parus* (Caudatus) vertice albo, cauda corpore longiore.
Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 4. *Parus caudatus*.
Moehring, av. gen. p. 45. n. 37. *Orites*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 319. *Parus caudatus*; *Parus monticola*. *Schwanz - Meise*; *Zahlmeise*; *Berg - Meißlin*; *Pfannenstieglitz*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 404. *Parus caudatus*.

Kramer, Austr. p. 379. n. 6. *Belzmeise*; *Pfannenstiel*.

Jonston, av. p. 121. *Parus caudatus*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 368. Perd sa queue; *Mélange à longue queue*.

Salerne, ornith. p. 216. *Boulard*, etc.

Journal de physique. Aout. 1776. p. 129. *Meunier*, *Materat*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 224. *Parus caudatus*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 392. n. 6. *die Schwanzmeise*.

20. CAPENSIS. *Die capische Meise*.

Büffon, Vögel, XVII. p. 130. *die Halbtrauer*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 570. n. 22. *Parus (Capensis) cinereo-griseus, remigibus nigris albo-marginatis, cauda nigra, subtus alba*.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 160. tab. 115. *die kleine Meise vom Vorgeb. d. g. Hoffnung*.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 845.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 392. n. 8. *die Capmeise*.

12. BIARMICUS. *Die Bartmeise*. (2)

Müller, Natur Syst. II. p. 628. n. 12. *das Bartmännchen*.

Ccc 3

Borowsky,

(2) Es scheint mir noch nicht so ganz ausgemacht, ob *Kramer's Pendulus* hierher gehöre. *Kramer* führt weiter kein Synonym an, als *Mont. At. bonon.* und dies ist *Parus Pendulinus* Lian.

- Borowsky*, Thierreich, III. p. 183. n. 8. *das Bartmännchen; Bartmeise.*
- Blumenbach*, Handb. der Naturgesch. p. 195. n. 4. *Parus* (*Biarmicus*) *vertice cano, cauda corpore longiore, capite barbato; das Bartmännchen; der Indianische Sperling.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 549. n. 7. *die Bartmeise; Schilfmeise.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 592. *indianische Sperling.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 148. *das Bartmännchen.*
- Halle*, Vögel, p. 360. n. 349. *die Bartmaise.*
- Onomat. histor. natur.* VI. p. 178. *die Bartmaise.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 401. H. *die Bartmeise.*
- Klein*, av. p. 86. n. 8. *Parus barba nigra utrinque ab oculis dependente.*
- Klein*, Vorbereit. p. 160. n. 8. *spitzbärtiger Langschwanz.*
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 88. n. 8. *spitzbärtiger Langschwanz.*
- Briffon*, ornith. I. p. 468. n. 12. *Mefange barbue ou Moustache.*
- Büffon*, Vögel, XVII. p. 86. *die Bartmeise; mit 2 Figg. M. u. W.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 190. *Bearded Titmouse.*
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 570. n. 23. *Parus* (*Biarmicus*) *rufus, vertice cano, cauda corpore longiore, capite barbato, crisso nigro.*
- Seligmann*, Vögel, III. tab. 5. *der kleinste Neuntöter.*
- Pallas*, Reis. Ausz. I. p. 370. *Rietmeise, III. p. 475. Bartmeise.*
- Tengmalm*: neue schwed. Abhandl. IV. p. 55. *Parus biarmicus.*
- Scopoli*, B. m. a. d. N. G. I. p. 198. n. 241. *die Barthmeise.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 203. n. 83. *Bartmeise*;
Rohrmeise.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 8. Parus
(*Biarmicus*) vertice cano, cauda corpore lon-
giore.

Kramer, Austr. p. 373. n. 1. *Rohrspatz*; *persia-
nischer Spatz*; *türkischer Spatz*?

Salerne, ornith. p. 217. Parus barbatus, seu pas-
serculus arundinaceus?

Hermann, tab. affin. anim. p. 224. Parus biar-
micus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 392. n. 7.
das *Bartmännchen*.

21. ALPINUS. *Die Alpenmeise*. (3)

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 597.
not. * 3.

Büffon, Vögel, XVII. p. 169. *die Alpenmeise*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 569. n. 21. Parus
(*Alpinus*) niger, subtus rufescens, nigro ma-
culatus, linea alba a basi rostri ad cervicem de-
currente, ungue postico longissimo.

22. SINENSIS. *Die chinesische Meise*.

Büffon, Vögel, XVII. p. 171. *die chinesische
Meise*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 570. n. 24. Parus
(*Sinensis*) ferrugineo-fuscus, capite colloque
dilutioribus, remigibus caudaque elongata fu-
scis, nigro marginatis.

23. MALABARICUS. *Die malabarische Meise*.

Büffon, Vögel, XVII. p. 172. *die malabarische
Meise*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 564. n. 5. Parus
(*Malabaricus*) griseus, gula alis rectricibusque

Ccc 4

duabus

(3) Nach *Bechstein* vielleicht ein junger *Parus Caudatus*.

duabus intermediis nigris, corpore subtus, uropygio macula alarum basique tectricum laterali-
um fulvis.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. u. Chin. II. p. 159. *die Meise von der Küste Malabar.*

24. SIBIRICUS. *Die sibirische Meise.*

Biffon, Vögel, XVII. p. 132. *die sibirische Meise mit dem weißen Gürtel*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 371. n. 25. Parus (Sibiricus) griseo-fuscus, subtus albidus, abdomine rufo-griseo. collo inferiore medio nigro, hypochondriis rufescentibus.

β. *Latham*, Syn. II. 2. p. 556. n. 23. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 371. n. 25. β. P. cinereo-fuscus, subtus fronteque albus, collo subtus pectoreque medio nigris, cauda longiore obscura.

25. KNJAESZIOK. *Der Knjasziok. (*)*

Biffon, Vögel, XVII. p. 174. *der Knjäscok.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 572. n. 30. Parus (*Knjaszik*) albus, subtus macula continua, lineae oculari et collari lividis.

26. HUDSONIUS. *Die Meise von der Hudsonsbay. (*)*

Pennant, arch. Zool. II. p. 397. n. 246. *die Meise von der Hudsonsbay.*

Biffon, Vögel, XVII. p. 176. *die Hudsonsmeise.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 566. n. II Parus (Hudsonius) fusco-rubescens, dorso cinereo, iugulo

(*) Das russische Wort bedeutet einen kleinen Fürsten; ein Prinzen.

(4) Länge 5 ½ Zoll. Flügelweite 7. Zoll. Gewicht 1½ Unze. Penn.

jugulo atro, fascia suboculari pectoreque albis, hypochondriis rufis.

27. MACROCEPHALUS. *Die großköpfige Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 178. *die großköpfige Meise.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 571. n. 26. Parus (Macrocephalus) niger, abdomine albidus, pectore subfulvo, fronte maculaque alarum albis.

28. NOVAE SEELANDIAE. *Die neu-seeländische Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 179. *die Neu-seeländische Meise.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 571. n. 27. Parus (Novae Zealandiae) cinereo-ruber, subtus rufogriseus, superciliis albis, rectricibus duabus intermediis nigris, lateralibus medio macula quadrata alba.

13. PENDULINUS. *Die Beutelmeise (°)*

Müller, Naturfyst. II. p. 629. n. 13. *die Beutelmeise.* tab. 21. Fig. 5.

Leske, Naturgesch. p. 265. n. 6. *der Pendulin.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 178. n. 1. *die Beutelmeise; Pendulino, Remitz, Cottonvogel.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 195 n. 5. Parus (Pendulinus) capite subferrugineo, fascia oculari nigra, remigibus rectricibusque fuscis, margine utroque ferrugineo. *Pendulinmeise; Remitz.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 550. n. 8. *die Beutelmeise.*

Funke, Naturgesch. I. p. 273. *die Beutelmeise.*

Ebert, Naturl. II. p. 148. *die Beutelmaise.*

Ccc 5

Halle,

(5) Legt 4. oder 5. schneeweiße, fast durchsichtige Eyer. Brüter gewöhnlich zweymal.

Halle, Vögel, p. 361. n. 351. *die Pendulinmeise, Sumpfmaise, litthauische Remitzvogel mit dem Hängeneste; Rohrmaise; Vollhynische Beutelmaise mit dem Schnabel des Fliegenspießer; Grasmücke an Sümpfen*; Fig. 22.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 436. n. 385. *die Beutelmeise; Florentinermaise*, etc.

Onomat. hist. nat. VI. p. 189. *polnische Beutelmaise*.

Klein, av. p. 86. n. 10. *Parus lithuanicus nidum suspendens*.

Klein, Vorbereit. p. 161. n. 10. *vollhynische Beutelmeise*.

Klein, verb. Vögelh. p. 88. n. 10. *vollhynische Beutelmeise*.

Klein, Stemm. av. p. 17. tab. 17. fig. 13. a. b.

Briffon, ornith. I. p. 467. n. 11. *Mésange de Pologne ou Remiz*.

Büffon, Vögel, XVII. p. 95. *der Remiz*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, p. 358. *der Pendulin*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 568. n. 18. *Parus (Pendulinus) capite subferrugineo, fascia oculari nigra, remigibus rectricibusque fuscis, margine utroque ferrugineo*.

Fischer, Livl. p. 104. n. 176. *Beutelmeise*.

Rutshkov, orenb. Topogr. p. 244. *Remes*.

Strahlenberg, Asien, p. 416. *Remes*.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 2. IV. p. 14. *Remesvogel*.

Naturforsch. XVII. p. 109. *vollhynische Beutelmeise*.

Allgem. Magaz. II. p. 238. 249. *Remitz*; mit Abbild. des Vogels und Nests.

Hamburg. Magaz. XVIII. p. 228 *litthauische Remitzvogel*; mit Abbildung des Vogels und des Nests. (Titius Abhandl.)

Smellie, Philos. der Naturgesch. II. p. 63. *Pendulin*.

Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 108. *Parus pendulinus*.

Meidinger, Vorles. I. p. 150. n. 6. *der Pendulin*.

Christ. Friedr. Ludwigii, delect. opusculor. ad scient. nat. spectant. Lips. 1790. p. 147. c. Fig. (Abhandl. von Titius.)

Journal de physique. Aout. 1776. Mefange de marais.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 189. n. 33. *Motacilla* (*Pendulinus*) capite ferrugineo, macula nigra oculari, remigibus rectricibusque fuscis, margine utroque ferrugineis.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Pol. p. 402. *Parus nidum suspendens*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 393. n. 9. *die Beutelmeise*.

29. *NARBONENSIS. Die Meise von Languedoc.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 110. *der Pendulin*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 568. n. 19. *Parus* (*Narboniensis*) rufo-griseus, vertice cano, alis caudaque nigricantibus rufo-marginatis, remigibus primoribus margine albis.

Hist. Prov. I. p. 517. Pendulino ou Canari sauvage.

14. *CELA. Die guianische Meise.*

Müller, Natur Syst. II. p. 629. n. 14. *die gefleckte Meise*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 183. die gefleckte Meise.

Büffon, Vögel, XVII. p. 160. *die schwarze Meise oder Cela des Linné*.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 568. n. 16. *Parus* (Cela) niger, rostro albo, macula alarum basique caudae flavis.

Bankroft, N. G. von Guian. p. 110. *die schwarze Meise*.

Linneé, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 191. n. 12. *Parus* (Cela) niger, rostro albo, macula alarum basique caudae flavis.

30. AMATORIUS. *Die verliebte Meise*.

Büffon, Vögel, XVII. p. 156. *die verliebte Meise*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 568. n. 17. *Parus* (Amorosus) caeruleo - nigricans, macula alarum longitudinali rufo flavoque dimidiata.

31. COCCINEUS. *Die scharlachrothe Meise*. (6)

Büffon, Vögel, XVII. p. 164. *die ausländische Meise*.

32. INDICUS. *Die indianische Meise*.

Büffon, Vögel, XVII. p. 180. *die indianische Meise*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 572. n. 29. *Parus* (Indicus) cinereus, subtus albidus, pectore abdomine crisloque ferrugineis, rostro pedibus alis caudaque nigro fuscis.

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit acht Gattungen vermehrt. Bey der 8ten Gattung sind drey Varietäten auseinander gesetzt.

117. GESCHLECHT. HIRUNDO. Die Schwalbe.

Müller, Natursyft. II. p. 630. Gen. CXVII.

Leske, Naturgeschichte, p. 266. Gen. XLVII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 154. Gen. LXV.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 196. Gen. XXXIX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 552. Gen. LXXVIII.

Funke, Naturgesch. I. p. 274.

Ebert, Naturl. II. p. 149.

Halle, Vögel, p. 345. Gen. VIII.

Pennant, arct. Zool. II. p. 401.

Neuer Schaupl. d. Nat. VII. p. 792.

Onomat. hist. nat. IV. p. 216.

Klein, av. p. 82. trib. 2.

Briffon, ornithol. I. p. 293. Gen. XXX.

Batfch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXXI.

Latham, Syst. ornith. II. p. 572. Gen. XLVI.

Hermann, tab. affin. anim. p. 229.

Donndorff, Handb. d. Thiergeschichte, p. 394. LXXXVI.

1. RUSTICA. Die Rauchschwalbe. (7)

Müller, Natursyft. II. p. 630. n. 1. die Rauchschwalbe.

Leske,

- (7) Die Benennungen dieser und der dritten Gattung (*Hirundo urbica*) werden häufig verwechselt. Diese Schwalbe ist es eigentlich nicht, von der behauptet wird, daß sie sich im Herbst in Sümpfe und Teiche verstecke, sondern die *Uferschwalbe*; doch versichern es auch mehrere von der *Rauch-* und *Haus-**Schwalbe*. Die ganze Sache ist überhaupt noch nicht aufs Reine. Für die Wanderungen der Schwalben giebt es Zeugnisse, die schlechterdings unverwerflich sind. Aber eben so unwidersprechliche Thatfache ist es auch, daß man Schwalben, — nicht einzeln, nicht etwa im Herbst, sondern mitten im Winter bey 6, 10, und mehreren aus dem Schlamm in den Teichen und andern

Leske, Naturgesch. p. 266. n. 1. *die Rauchschwalbe*.
Borowsky, Thierreich, III. p. 155. n. 2. *die Rauch-*
schwalbe, *Stachelschwalbe*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 196. n. 1. *Hirun-*
do (*Domestica*) *rectricibus*, exceptis duabus
intermediis, *macula alba notatis*; *die Rauch-*
schwalbe, *Feuerschwalbe*, *Stadtschwalbe*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 553. n. 1. *die Rauch-*
schwalbe; *Feuerschwalbe*.

Funke, Naturgesch. I. p. 274. *die Rauchschwalbe*.

Ebert, Naturl. II. p. 150. *die Rauchschwalbe*;
Bauernschwalbe; *Küchenschwalbe*.

Halle, Vögel, p. 349. n. 336. *die Rauchschwalbe*.

Meyer, Thiere, II. tab. 86. *Hausfischwalbe*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 477.
 n. 387. *die Rauchschwalbe*; *Feuerschwalbe*, *Kü-*
chenschwalbe, *Stadtschwalbe*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 401. n. 247. *die Rauch-*
schwalbe.

Onomat. hist. nat. IV. p. 249. *Fensterfischwalbe*,
Leinschwalbe, *Giebelschwalbe*, *Hausfischwalbe*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 139. *Rauch-*
fischwalbe, etc.

Klein, av. p. 82. n. 2. *Hirundo domestica*.

Klein, Vorbereit. p. 154. n. 2. *Rauch - Küchen-*
fischwalbe.

Klein, verb. Vögelh. p. 84. n. 2. *Rauchfischwalbe*,
Bauern, *Küchen*-, *Brüchenschwalbe*.

Klein, Stemm. av. p. 15. tab. 17. Fig. 2. a—c.

Klein, Vögeleyer, p. 27. tab. 10. Fig. 2.

Gesner, Vögelb. p. 453. *Hausfischwalb*; *Schwalbe*;
Schwalb; *Schwalm*; m. e. zieml. gut. Fig.

Brisson,

der in Gewässern gefunden hat, die in der Stubenwärme auf-
 lebt und herumgeflattert sind. Am Ende dieses Geschlechts wird
 man ein untändliches Verzeichniß mehrerer hier gehörigen
 Schriften finden.

Briffon, ornith. I. p. 294. n. 1. Hirondelle de Cheminée.

Batsch, Thiere, I. p. 363. die Rauchschwalbe.

Latham, Syn. Suppl. p. 192. Common Swallow.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 572. n. 1. Hirundo (Rustica) nigro caerulescens, subtus albida, fronte gulaque castaneis, rectricibus lateralibus macula alba notatis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 197. die Rauchschwalbe.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 148. n. 1. die Rauchschwalbe, Rookschwälnen.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 446. Rauchschwalbe; Bauernschwalbe.

Fischer, Lvl. p. 105. n. 177. gemeine, oder Bauernschwalbe.

Cetti, Sardin. II. p. 227. die Rauchschwalbe.

Wolf, Reif. n. Zeilon, p. 136. die Schwalbe.

Forster, Reif. Ed. in 8. I. p. 48. die gewöhnliche Hauschwalbe.

White, N. G. von Engl. p. 7. 17. 21. p. 33. n. 3. p. 54. p. 56. p. 58. n. 3. p. 63. n. 8. p. 66. n. 6. p. 101. p. 128. Rauchschwalbe.

Fabric. Reif. n. Norw. p. 181. Hirundo rustica.

Pallas, Reise Ausz. II. p. 8. III. p. 185. Rauchschwalbe; Hauschwalbe.

Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 1. Marksvale; Forstuesvale; Feldschwalbe.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 186. Svalè.

Adanson, Senegall. p. 97. 131. Schwalben.

Linné, Abhandl. II. p. 306. n. 142. die Rauchschwalbe.

Bartram, Reif. d. Karolina, p. 288. Hirundo cerdo. Rauchschwalbe.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 204. n. 249. Hauschwalbe; Stachelchwalbe.

- Naturforsch. XVII. p. 109. n. 1. *die Rauchschwalbe*.
 Stralfund. Magaz. I. p. 22. *Rauchschwalbe*.
 Allgem. Reif. IV. p. 267. *Schwalben*.
 Zorn, Petinotheol. II. p. 399. *die Hauß Schwalbe*.
 Meidinger, Vorles. I. p. 150. n. 1. *die Rauchschwalbe*.
 Goeze, nützl. Allerl. II. p. 400. *Rauchschwalbe; Stadtschwalbe*.
 André u. Bechstein, Spatzierg. I. p. 303. *die Rauchschwalbe*.
 Beckmann, Naturhist. p. 56. a. *die Hauschwalbe*.
 Eberhard, Thiergesch. p. 78. *gemeine Schwalbe*.
 Borkhausen, Magazin, I. p. 192. n. 72. *Rauchschwalbe; Stachelschwalbe; innere Hauschwalbe*.
 Geoffroy, mat. med. VII. p. 525. *Hauschwalbe*.
 Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. *Hirundo domestica*.
 Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 1. *Hirundo domestica*.
 Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 191. n. 1. *Hirundo (Rustica) rectricibus, duabus intermediis exceptis, macula alba notatis*.
 Charleton, onom. zoic. p. 89. *Hirundo*.
 Kramer, Austr. p. 380 n. 1. *Hirundo rectricibus, excepto pari intimo, alba macula notatis. Hauschwalbe*.
 Schwenkfeld, av. Siles. p. 286. *Hirundo I. Hauschwalbe; Giebel Schwalbe*.
 Möhring, av. gen. p. 46. n. 38. *Hirundo*.
 Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 21. *Hirundo domestica*.
 Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 283. *Hirundo domestica*.
 Schaeffer, element. ornithol. tab. 40.
 Zinnar, Uov. p. 48. tab. 7. Fig. 35. *Rondine minore*.

Philos. Transact. LI. p. 459. LIII. p. 101. LXV.
p. 528. 343.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 24. c. 53. L. 18. c. 26. c. 35.
Hirundines.

Aelian. de nat. anim. L. 1. c. 52. L. 3. c. 24. 25.
Χελιδων.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 394. n. 1.
die Rauchschwalbe.

β. Die weiße Schwalbe.

Briffon, ornith. I. p. 294. n. 1. A. Hirondelle
blanche.

Latham, Syn. II. 2. p. 563. White Swallow.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 573. n. 1. β.

Will. ornith. p. 155. Hirundo prorsus candida.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 450. weiße Schwal-
ben.

Naturforsch. I. p. 63. n. 10. et 11. ganz weiße Sta-
chelschwalbe.

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 116. n. 4.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 149. n. 1. β. weiße
Rauchschwalbe.

Ledel: hirundo alba. Eph. nat. cur. Dec. III. an. 1.
obl. 54. p. 84.

Wallin, d. fl. de hirundine alba. Ups. 1733. 4.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Pol. p. 285. Hirun-
do candida.

Aelian. de nat. anim. L. 10. c. 34. Χελιδones
λευκαί.

33. TAHITICA. Die tahitische Schwalbe.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 573. n. 2. Hirun-
do (Tahitica) fusco-nigricans, corpore supra
caeruleo-nitente, fronte colloque subtus pur-
pureo-fulvis, cauda subforficata nigra.

2. ESCULENTA. *Die Salangane.* (°)

Müller, Naturfyst. II. p. 631. n. 2. *die chinesische Schwalbe.*

Leske, Naturgesch. p. 266. n. 2. *die chinesische Schwalbe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 156. n. 3. *die chinesische Schwalbe.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 198. n. 4. *Hirundo (Esculenta) rectricibus omnibus macula alba notatis; die Salangane.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 555. n. 6. *die Indianische Schwalbe.*

Ebert,

- (8) Zehen solche Vögel wiegen zusammen etwa 2 1/2 Unze, und 1/2 Drachme. Nisten auf unterschiedenen Höhen von 50. bis 300. Fufs. Der Stoff dieser so berufenen *Tunkinsnefter* ähnelt der Hausenblase, ist aber noch nicht weiter bekannt genug. Zur Verfertigung des Nests braucht der Vogel 2 Monathe, dann legt er 2. Eyer, die in 15. bis 16 Tagen ausgebrütet werden. So bald die Jungen flück sind, fängt man an die Nestchen einzusammeln, welches mit grofser Gefahr verbunden ist, und vielen Menschen das Leben kostet. Die Nester werden getrocknet, gereinigt und in Körbe gelegt, an die Chineser verkauft. Der Preifs hängt von ihrer Weisse und Feine ab. Die von der besten Sorte sind sehr rar. 125 Pfund werden von 300. bis zu 1400. Thalern bezahlt. Auf der Insel Java werden ohngefähr etwas über 2500. Pfund solcher Nestchen eingesammelt. Die Insel zieht also, wenn man 125. Pfund nur zu 1000. Thaler rechnet, 20,000. Thaler. Die Nester werden zu einem schleimigen Brei gekocht, des Nachts in Thau gesetzt, und mit Zucker vermengt. Sie werden auch zu Suppen und andern Speisen genommen. Sie müssen aber, wie es heifst, 24. Stunden kochen. — Dieser Vogel bewohnt die Sundaischen und andere Inseln des Indischen Archipelagus bis Neu-Guinea; Java, Sumatra, Coromandel, Tunkin; soll aber in China selbst nicht angetroffen, und nur deswegen die *chinesische Schwalbe* genannt werden, weil die meisten Nester nach China kommen, und daselbst verbraucht oder weiter verkauft werden. Auch die Vögel werden gegessen, sind aber schwer zu bekommen, und werden für sehr erhirzend gehalten.

- Ebert**, Naturl. II. p. 152. *die chinesische Felsenschwalbe.*
- Halle**, Vögel, p. 353. n. 341. *Hirundo sinensis nido eduli.*
- Gatterer**, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 438. n. 388. *die Indianische Schwalbe.*
- Onomat. hist. nat.** IV. p. 238. *die chinesische Felsenschwalbe mit dem eßbaren Neste.*
- Klein**, av. p. 84. n. 7. *Hirundo sinensis nido eduli.*
- Klein**, Vorbereit. p. 157. n. 7. *Sinesische Felsenschwalbe.*
- Klein**, verb. Vögelhist. p. 86. n. 10. *Sinesische Felsenschwalbe.*
- Briffon**, ornith. I. p. 300. n. 14. *Hirondelle de rivage de la Cochinchine.*
- Latham**, Syst. ornithol. II. p. 580. n. 26. *Hirundo (Esculenta) nigricans, subtus albida, rectricibus omnibus apice albis.*
- Valentini**, mus. museor. I. p. 468. c. 23.
- Museum Wormian.** p. 311.
- Allgem. Reif.** VIII. p. 120. *Saroy Boura (Nester.)*
- Allgem. Reif.** XI. p. 407. (Nester.)
- Mannigfaltigk.** II. p. 510. *von indianischen Vogelnestern.*
- Bohns** Waarenlager, p. 598. (das Nest.)
- Halle**, Magie, III. p. 570. *die eßbaren Vogelnestern.*
- Fabri**, geographisches Lesebuch, I. p. 70. *von den eßbaren Vogelnestern im Orient.*
- Lichtenberg**, Magaz. für das Neueste, etc. II. 3. p. 3. *Beschreibung des eßbaren Vogelnestes.*
- Verhandlingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Weetenschappen**, Th. 3.
- Houttyn**, Natuurlyke Historie I. Deels. V. Stuk. 607.
- Christ. Wang**, Schwed. Koch- u. Haushalt. Buch, a. d. schwed. überf. Greifsw. 1772. p. 540.

Berkmann, phys. ökon. Bibl. IV. p. 590.

Philos. Transact. XXIII. p. 1396. 36. *Hirundo maritima*.

Smellie, *Philosoph. der Naturgesch.* II. p. 68.

Meidinger, *Vorles.* I. p. 151. n. 5. *die chinesische Schwalbe*.

Goeze, *Natur, Menschl. u. Vorf.* IV. p. 82.

Hemmings *Geschichte des Carnatiks*, in Beziehung auf das Tanjournsche Gebiet, etc. Th. 2. 1785.

Marsden, *Sumatr.* p. 141. Layong-Layong.

Voy. de Siam. I. p. 278 f. — *Forrest.* voy. p. 28.

Linné, *Syst. Nat.* Edit. X. I. p. 191. n. 2. *Hirundo* (Efulenta) rectricibus omnibus macula alba notatis.

Donndorff, *Handb. d. Thiergesch.* p. 395. n. 2. *die Salangane*.

14. BORBONICA. *Die bourbonische Schwalbe.*

Latham, *Syst. ornithol.* II. p. 580. n. 27. *Hirundo* (Borbonica) fusco-nigricans, subtus grisea fusco-maculata, cauda integra.

β. *Latham*, *Syn.* II. 2. p. 581.

Latham, *Syst. ornith.* II. p. 580. n. 27. β. *Hirundo* fusco nigricans, subtus grisea, maculis longitudinalibus fuscis, rectricibus 3. exterioribus apice albidis.

Pl. enl. n. 544. f. 2. *Hirondelle de Bourbon?*

15. FRANCICA. *Die Schwalbe von der Insel Frankreich.*

Latham, *Syst. ornithol.* II. p. 580. n. 28. *Hirundo* (Francica) nigricans, subtus uropygioque albido.

16. AMERICANA. *Die amerikanische Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 581. n. 29. *Hirundo* (Americana) fusco - nigricans, viridi. nitens, subtus albida, uropygio crissoque rufis.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 581. n. 29. β. *Hirundo* fusco nigricans subtus albida, gula, uropygio crissoque rufis.

3. URBICA. *Die Hauschwalbe.* (9)

Müller, Naturfyst. II. p. 632. n. 3. *die Hauschwalbe.*

Leske, Naturgesch. p. 267. n. 3. *die Hauschwalbe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 154. n. 1. *die Haus-, Giebel-, Fenster-, Leinschwalbe*; tab. 65.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 197. n. 2. *Hirundo* (Agrestis) pedibus hirsutis, rectricibus immaculatis, dorso nigro caerulecente, tota subtus alba. *Die Hauschwalbe; Fensterschwalbe; Mehlschwalbe; Spyrtschwalbe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 553. n. 2. *die Hauschwalbe.*

Funke, Naturgesch. I. p. 275. *die Hauschwalbe.*

Ebert, Naturl. II. p. 150. *die Hauschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 350. n. 337. *die Fensterschwalbe; Landschwalbe.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 439. n. 389. *die Hauschwalbe; Dorfschwalbe, Spirk-schwalbe, Speyerl, etc.*

Ddd 3

Pennant,

(9) Die Anekdote, daß mehrere Schwalben dieser Art, wenn sie einen Sperling nicht aus ihrem Neste loswerden können, sich versammeln und ihn einmauern, finde ich schon bey *Conrad. Gesner*, l. c. und in dem Buche vom *P. Bougeant*: Sur le langage des Bêtes, à la Haye, 8. 1739. p. 79. aber ich bezweifle ihre Richtigkeit.

Pennant, arch. Zool. II. p. 402. n. 248. *die Haus-*
schwalbe.

Onomat. hist. nat. IV. p. 249. *die Fenster*
schwalbe; Lainschwalbe.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 140. *Dorf-*
schwalbe, etc.

Klein, av. p. 82. n. 1. *Hirundo domestica.*

Klein, Vorbereit. p. 154. n. 1. *Haus*
schwalbe.

Klein, verb. Vögelhist. p. 84. n. 1. *Haus*
schwalbe.

Klein, Stemmat. av. p. 15. tab. 17. Fig. 3. a—c.

Gesner, Vögelb. p. 460. *Mur*
spyr, Münster
spyr; Kirch
schwalb, Weiß
spyr.

Briffon, ornith. I. p. 295. n. 2. *petite Hirondelle,*
ou Martinet à cul blanc.

Batsch, Thiere, I. p. 363. *die Haus*
schwalbe.

Latham, Syn Suppl. p. 192.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 573. n. 3. *Hirundo*
(Urbica) nigro-caerulea
scens, sub
tus alba, re-
atricibus immaculatis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 198. *die Haus-*
schwalbe.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 149. n. 2. *die Kir-*
chenschwalbe.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 450. *die Haus-*
schwalbe.

Cetti, Sardin. II. p. 229. *die Haus*
schwalbe.

Fischer, Livl. p. 105. n. 178. *die Haus*
schwalbe.

White, N. G. von Engl. p. 8. *Rauch*
schwalben.
p. 33. n. 4. p. 58. n. 4. p. 66. n. 6. p. 94. p. 128.
n. 4. *Haus*
schwalbe.

Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 2. *Byes*
vale; Skor
ste
nsvale.

Pallas, Reif. Ausz. II. p. 8. *Haus*
schwalbe.

Linne, Abhandl. II. p. 306. n. 143. *die Haus-*
schwalbe.

- Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 205. n. 250. *die Spyrſchwalbe, Mehlschwalbe.*
- Naturforsch. XVII. p. 110. n. 227. *die Hausſchwalbe.*
- Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 294. *Hausſchwalbe.*
- Zorn, Petinotheol. II. p. 400. *die zweyte Hausſchwalbe.*
- Döbel, Jägerprakt. I. p. 67. *Haus-Schwalbe.*
- Erxleben, phyſik. Bibl. II. p. 198.
- Goeze, nützl. Allerl. I. p. 21. II. p. 401. *Mehlſchwalbe.*
- Borkhaufen, Magaz. I. p. 194. n. 73. *Mehlſchwalbe; äußere Hausſchwalbe; Spyrſchwalbe.*
- Linné, Syſt. Nat. Edit. II. p. 57. *Hirundo ruſtica.*
- Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 32. n. 2. *Hirundo ruſtica.*
- Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 192. n. 3. *Hirundo (Urbica) rectricibus immaculatis, dorſo nigro-caeruleſcente.*
- Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 1. *Hirundo agreſtis, ruſtica n. 4. Hirundo Apos minor.*
- Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 288. *Hirundo II. Hirundo domeſtica altera. Hirundo apus minor. Leimſchwalbe; Laubensſchwalben; Dachſchwalben, Fenſterſchwalben; Kirchſchwalben.*
- Kramer, Austr. p. 380. n. 2. *Speyerl.*
- Rzaczynsky, hiſt. nat. Polon. p. 283. *Hirundo agreſtis.*
- Jonſton, av. p. 117. *Hirundo agreſtis.*
- Faun. Arragon. p. 90.
- Zinnan, Uov. p. 48. tab. 7. Fig. 34. *Rondone minore.*
- Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 295. n. 3. *die Hausſchwalbe.*

β. *Pennant*, arch. Zool. II. p. 403. ein Exemplar mit einem schwarzen Rumpfe.

Latham, Syn. II. 2. p. 565.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 574. n. 3. β. *Hirundo nigricans*, subtus alba, remigibus rectricibusque apice albis.

γ. *Die weiße Hausfchwalbe*. *

Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 198.

Naturforsch. I. p. 63. n. 12.

Zorn, Petinotheol. II. p. 52.

Borkhausen, Magazin, I. p. 194. ad n. 73.

17. *PANAYANA*. *Die Schwalbe von Panay*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 574. n. 4. *Hirundo* (*Panayana*) nigro-fericea, subtus alba, fronte gulaque ferrugineo-flavis, gula lunula nigro-marginata.

Sommerat, Reif. n. Neuguin. p. 43. *die Schwalbe von Antigua*.

18. *Rufa*. *Die Schwalbe mit braunrothem Bauche*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 574. n. 5. *Hirundo* (*Rufa*) nigro-splendens, subtus rufa, fronte albida.

19. *CAPENSIS*. *Die Capfchwalbe*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 574. n. 6. *Hirundo* (*Capensis*) nigro-caerulescens subtus flavescens nigricante striata, pileo rufo, rectricibus lateralibus macula alba.

4. *RIPARIA*. *Die Uferschwalbe*. (10)

Müller, Naturyst. II. p. 632. n. 4. *die Uferschwalbe*.

Leske,

(10) Nach *Zorn* brütet sie gewöhnlich zwey Mal. Sie legt unter allen inländischen Schwalbenarten die kleinsten Eyer.

- Leske*, Naturgeschichte, p. 267. n. 4. *die Uferschwalbe*.
- Borowsky*, Thierreich, III. p. 156. n. 4. *die Ufer-, Sand-, Strand-, Wasser- und Erdschwalbe*.
- Blumenbach*, Handb. der Naturgesch. p. 197. n. 3. *Hirundo (Riparia) cinerea, gula abdomineque albis. Uferschwalbe; Erdschwalbe*.
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 554. n. 3. *die Uferschwalbe*.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 60. *Ufer- oder Erdschwalbe*.
- Funke*, Naturgesch. p. 275. *die Uferschwalbe*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 151. *die Uferschwalbe*.
- Halle*, Vögel, p. 251. n. 338. *die Uferschwalbe*.
- Gatterer*, vom Nutz. und Schad. der Thiere II. p. 440. n. 390. *die Uferschwalbe; Wasser- und Erdschwalbe, etc.*
- Pennant*, arch. Zool. II. p. 403. n. 249. *die Uferschwalbe*.
- Onomat. hist. nat.* IV. p. 244. *die Erdschwalbe*.
- Handb. der deutschen Thiergesch.* p. 140. *Uferschwalbe*.
- Klein*, av. p. 83. n. 3. *Hirundo riparia*.
- Klein*, Vorbereit. p. 155. n. 3. *Erdschwalbe; Ufer-, Sand-, Rhein-, Wasser- und Erdschwalbe*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 84. n. 3. *Uferschwalbe*.
- Klein*, Stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. 5. a — c.
- Klein*, Vögeleyer, p. 27. tab. 10. fig. 4.
- Gesner*, Vögelb. p. 460. *Rheinvogel oder Rheinschwalbe; m. e. Fig.*
- Briffon*, ornithol. I. p. 299. n. 12. *Hirondelle de rivage*.
- Batsch*, Thiere, I. p. 364. *die Uferschwalbe*.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 575. n. 10. *Hirundo (Riparia) cinerea, gula abdomineque albis*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 450. *Rein-, Strand-, Uferschwalbe.*

Fischer, Liv. p. 105. n. 179. *StrandSchwalbe.*

Cetti, Sardin. II. p. 237. *die Uferschwalbe.*

White, N. G. von Engl. p. 33. n. 5. p. 50. n. 5. p. 108. p. 109. p. 128 *die Uferschwalbe.*

Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 3. *Digsvale; Jordsvale, Salbakke.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 401. *die Wasserschwalbe.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 67. *die Uferschwalbe.*

Naturforsch. XVII. p. 112. n. 228. *die Uferschwalbe, Bergschwalbe.*

Stralfund. Magaz. I p. 22. *StrandSchwalbe.*

Hannöv. Magaz. 1766. n. 97. p. 1546.

Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. II. 1. p. 201. *eine Art Schwalbe mit weißem Streiße?*

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 401. *Uferschwalbe.*

Beckmann, Naturhist. p. 56. c. *die Erdschwalbe.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 194. n. 74. *Uferschwalbe.*

Meidinger, Vorles. I. p. 151. n. 3. *die Uferschwalbe.*

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Hirundo riparia.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 4. *Hirundo riparia.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 4. *Hirundo (Riparia) cinerea gula abdomineque albis.*

Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 2. *Hirundo riparia; Drepanis; Falcula.*

Kramer, Austr. p. 381. n. 4. *Gestetten-Schwalbe.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 288. *Hirundo riparia; Ripariola. Ufer-Schwalbe; Rein-Schwalbe; Wasser-Schwalme.*

Sibbald, Scot. illustr. p. 27. *Hirundo riparia.*

Rzaczyński, hist. nat. Polon. p. 283. *Hirundo riparia*.

Jonston, av. p. 117. *Hirundo riparia*.

Zinn, Uov. p. 49. tab. 12. fig. 35. *Rondine riparia*.

Philos. Transact. LIII. art. 24. p. 101.

History of Scilly by *Heath*. p. 300?

Hermann, tab. affin. anim. p. 194. *Hirundo riparia*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 396. n. 4. *die Uferschwalbe*.

20. RUPESTRIS. *Die Felsenschwalbe*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 576. n. 11. *Hirundo* (*Rupestres*) *murina*, subtus albida, remigibus caudaque nigricantibus, rectricibus latere interiore macula ovali alba.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 207. n. 253. *die Felsenschwalbe*.

21. MONTANA. *Die Bergschwalbe*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 576 n. 12. *Hirundo* (*Montana*) *cinerea* subtus rufescens, rectricibus, duabus intermediis extimisque exceptis, latere interiore macula ovata alba.

5. PURPUREA. *Die Purpurschwalbe*. (1)

Müller, Naturyst. II. p. 630. n. 5. *die Purpurschwalbe*.

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 440 n. 391. *die Purpurschwalbe*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 403. n. 250. *die Purpurschwalbe*.

Onomat.

(1) *Pennant* und *Latham* rechnen auch die *Hirundo Violacea* p. 1026. n. 36. hieher; und letzterer nimmt die *Hirundo Subis* n. 7. als das Weibchen an.

Onomat. histor. natur. IV. p. 243. *die Purpur-
schwalbe.*

Briffon, ornithol. I. p. 302. n. 17. Martinet de la
Caroline.

Latham, Syst. ornith. II. p. 578. n. 22. Hirundo
(Purpurea) violacea, caeruleo-nitens, cauda
forficata.

Seligmann, Vögel, III. tab. 2. *die purpurfarbene
Schwalbe.*

Schöpf, Reis. durch Nordamer. II. p. 308. *die Mar-
tinschwalbe.*

Linné, Abhandl. II. p. 281. n. 23. *die Purpur-
Schwalbe.*

Goeze, Natur, Menschenl. und Vorf. IV. p. 95.
Purpur-Schwalbe.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 396. n. 5.
die Purpurschwalbe.

6. *Apus. Die Mauerschwalbe.* (2) (eigentliche Spyr-
schwalbe.)

Müller, Naturyst. II. p. 633. n. 6. *die Mauer-
schwalbe.*

Leske, Naturgesch. p. 267. n. 5. *die Mauerschwal-
be,* tab. 5. Fig. 9.

Borows.

(2) Scopoli und Borkhausen machen Linné den Vorwurf, daß er die Beschreibung dieses Vogels von todtten Exemplaren genommen, wo es vielleicht geschienen habe, als ob alle vier Zehen vorwärts stünden, welches sich aber nicht so verhalte, vielmehr stünde die vierte Zehe nur mehr seitwärts, so daß sie, wenn die übrigen ausgebreitet wären, mit denselben gleiche Richtung zu haben schiene. — Latham ist der Meinung, daß aus den vier Gattungen *Hirundo Apus, Melba, Cayennensis,* und *Sinensis,* wegen der mancherley besondern Abweichungen wohl ein eigenes Geschlecht gemacht werden könne. *Ex digitis omnibus anticis, naribus ellipticis cum duplicatura in latere interno, mandibula quoque inferiore deflexa posset haec avis cum sequentibus* (die ich eben genannt habe,) *proprium genus constituere.* — Scopoli hat dies schon geäußert, l. c. p. 207.

Borowsky, Thierreich, III. p. 157. n. 5. *die Mauer-, Steinschwalbe.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 198. n. 5. *Hirundo* (Apus) nigricans, gula alba, digitis omnibus quatuor anticis. *Mauerschwalbe; Steinschwalbe; Thurmshwalbe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 554. n. 4. *die Mauerschwalbe.*

Funke, Naturgesch. I. p. 275. *die Mauerschwalbe.*

Ebert, Naturl. II. p. 151. *die Mauerschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 351. n. 339. *die Mauerschwalbe*, Fig. 20.

Meyer, Thiere, II. tab. 85. *Mauerschwalbe.*

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 140. n. 392. *die Mauerschwalbe; Spirschwalbe; Spyrshwalbe, Spürschwalbe; Geyerschwalbe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 404. n. 251. *die Mauerschwalbe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 236. *die Spirschwalbe.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 140. *Mauerschwalbe.*

Klein, av. p. 83. n. 4. *Hirundo muraria, saxatilis f. speluncaris.*

Klein, Vorbereit. p. 155. n. 4. *Mauerschwalbe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 85. n. 4. *Mauerschwalbe; Spirschwalbe.*

Gesner, Vögelb. p. 461. *Spyr; Spyrshwalb; Gerschwalb; Geyerschwalb; m. e. zieml. gut. Fig.*

Briffon, ornith. I. p. 301. n. 15. *Martinet.*

Batsen, Thiere, I. p. 363. *die Mauerschwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 582. n. 32. *Hirundo* (Apus) nigricans, gula alba, digitis omnibus quatuor anticis.

Beseke, Vögel Karl. p. 85. n. 199. *die Mauerschwalbe.*

Siemssen,

- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 151. n. 4. *die Mauer-
schwalbe*; *Peerdschwälken*; *Spierschwälken*.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 451. *die Mauer-
schwalbe*.
Fischer, Liv. p. 105. n. 180. *Mauerschwalbe*.
Cetti, Sardin. II. p. 232. *die Mauerschwalbe*.
White, N. G. von Engl. p. 34. n. 11. p. 43. p. 54.
 p. 59. n. 15. p. 115. p. 128. *die Thurmshwalbe*.
Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 4. *Steenfvalde*;
Kirkefvalde.
Linné, Abhandl. II. p. 307. n. 144. *die Mauer-
schwalbe*.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 205. n. 251. *die
Thurmshwalbe*.
Naturforsch. XVII. p. 113. n. 229. *die Mauer-
schwalbe*, n. 230. *die Kirchenschwalbe*?
Zorn, Petinotheol. II. p. 396. *Stein- oder Mauer-
schwalbe*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 67. *Thurm- oder Mauer-
schwalbe*.
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 401. *Thurmshwalbe*;
 p. 402 *Pier- oder Spyrshwalbe*.
Borkhausen, Magazin, I. p. 195. n. 75. *Mauer-
schwalbe*.
Stralfund. Magaz. I. p. 22. *die Thurmshwalbe*.
Meidinger, Vorles. I. p. 131. n. 4. *die Mauer-
schwalbe*.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Hirundo apus*.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 3. *Hirundo
apus*.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 5. *Hirundo
(Apus) nigricans*, gula alba, digitis omnibus
 quatuor anticis.
Charlton, onom. zoic. p. 90. n. 3. *Hirundo apos
maior*.

Kramer, Austr. p. 380. n. 3. *Hirundo tota nigra*, gula albicante. *Speyer*; große Thurmshwalbe.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 289. *Hirundo* IV. *Hirundo muraria*; *Apes*; *Depes*. *Mauerschwalbe*; *Geyer Schwalbe*; *Spyr Schwalbe*.

Sibbald, Scot. illustr. II. p. 31. *Hirundo apus*.

Raczynsky, hist. nat. Pol. p. 283. *Hirundo muraria seu saxatilis*.

Faun. Arragon. p. 90.

Zinnan. Uov. p. 47. tab. 7. Fig. 33 *Rondone*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 396. n. 6. *Mauerschwalbe*.

32. SINENSIS. Die chinesische Schwalbe.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 583. n. 35. *Hirundo* (Sinensis) fusca, subtus griseo-rufescens, pileo rufo, gula orbitisque albis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 155. die große chinesische Schwalbe.

7. SUBIS. Die canadische Schwalbe. (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 633. n. 7. die canadische Schwalbe.

Onomat. hist. nat. IV. p. 247. die Schwalbe von der Hudsonsbay.

Klein, verb. Vögelhist. p. 86. n. 7. *Hudsons Mauerschwalbe*.

Briffon, ornith. I. p. 302. n. 18. *Hirondelle de la Baye de Hudson*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 578. n. 22. *H. nigro-caerulescens*, ore subtusque cinereo-exalbida.

Seligmann, Vögel, V. tab. 15. die große amerikanische Schwalbe.

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 6. *Hirundo* (Subis) nigro-caerulescens, ore subtusque cinereo-exalbida.

8. SENE-

(3) Nach *Latham* das Weibchen von *Hirundo Purpurea*, n. 5.

8. SENEGALENSIS. *Die senegalische Schwalbe.*

Müller, Naturfyst. II. p. 634. n. 8. *die senegalische Schwalbe.*

Briffon, ornithol. I. p. 296. n. 5. Hironnelle du Sénégal.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 574. n. 7. Hirundo (Senegalensis) nigra, caeruleo-nitens, sub-tus uropygioque rufa, remigibus rectricibusque nigris.

23. AMBROSIACA. *Die Ambraschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 348. n. 334. *die Ambraschwalbe; holländische Seeschwalbe.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 239. *Ambraschwalbe.*

Klein, av. p. 82. n. 4. Hirundo ambram griseam redolens.

Klein, Vorbereit. p. 153. n. 4. *Amberschwalbe.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 84. n. 5. *Ambra-schwalbe.*

Briffon, ornithol. I. p. 300. n. 13. Hironnelle de Rivage de Senegal.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 575. n. 9. Hirundo (Ambrosiaca) griseo-fusca, subtus dilutior, cauda maxime forficata.

Seba mus. I. p. 102. tab. 66. Fig. 4. Hirundo marina indigena.

β. H. cinerascens, subtus cinereo-alba, cauda elongata maxime forficata. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 575. n. 9. β. — Syn. Suppl. p. 193.

24. FASCIATA. *Die weißbäuchige Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 575. n. 8. Hirundo (Fasciata) nigra, fascia abdominis, maculaque femorum albis.

9. TAPERA. *Die brasilianische Schwalbe.*

Müller, Natursystem, II. p. 634. n. 9. *die amerikanische Schwalbe.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 248. *die Amerikanische Tapera.*

Klein, av. p. 83. n. 1. *Hirundo americana, Tapera dicta.*

Klein, Vorbereit. p. 155. n. 1. *die amerikanische Tapera.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 85. n. 5. *Tapera.*

Brisson, ornith. I. p. 298. n. 10. *Hirondelle d'Amerique.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 579. n. 23. *Hirundo (Tapera) rectricibus subaequalibus, corpore fusco subtus griseo-fusco, abdomine albo.*

Jonston, av. p. 198. *Tapera.*

25. TORQUATA. *Die Schwalbe mit der braunen Brustbinde.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 579. n. 24. *Hirundo (Torquata) fusca, subtus alba, fascia pectorali femoribusque fuscis.*

26. LEUCOPTERA. *Die weißflügelige Schwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 579. n. 25. *Hirundo (Leucoptera) cinerea caeruleo-nitens, subtus uropygio alisque nebuloso albis.*

β. Latham, Syn. II. 2. p. 517. n. 27. *Var. A.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 579. n. 25. β. H. *supra fusca subtus alba, fusco-maculata.*

10. PELASGIA. *Der Stachelschwanz. (4)*

Müller, Natursystem, II. p. 634. n. 10. *die carolinische Schwalbe.*

Halle,

(4) Bewohnt viele Theile von Nordamerika. Kömmt in Neuyork, und Pensylvanien bisweilen früh, bisweilen spät im May an.

Halle, Vögel, p. 353. n. 341. *die Amerikanische Schwalbe mit gestachelt m Schwanze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 405. n. 252. *der Stachelschwanz*, tab. 18.

Onomat. hist. nat. IV. p. 241. *die amerikanische Schwalbe mit dem spitzen Schwanze.*

Klein, av. p. 84. n. 6. *Hirundo cauda vel sexies divisa.*

Klein, Vorbereit. p. 156. n. 6. *Schwalbe mit wohl sechsmal getheiltem Schwanze.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 86. n. 9. *Schwalbe mit vielmal getheiltem Schwanze.*

Briffon, ornith. I. p. 298. n. 9. *Hirondelle de la Caroline.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 581. n. 30. *Hirundo (Pelasgia) fusca gula albida, rectricibus aequalibus apice nudo subulatis.*

Seligmann, Vögel, IV. tab. 107. *die amerikanische Schwalbe mit dem stachlichten Schwanze.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 7. *Hirundo (Pelagica) rectricibus aequalibus, apice subulatis nudis.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 397. n. 7. *der Stachelschwanz.*

β. Pennant, arct. Zool. II. p. 405. ad n. 252. unten.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 581. n. 30. β.

γ. Latham, Syst. ornithol. II. p. 581. n. 30. γ.

27. ACUTA.

Bauet in Schornsteinen, und macht aus kleinen kurzen Reisern, die sie mit dem Gummi des Pechbaums zusammen klebt, ein merkwürdiges Nest, das an der Spitze offen ist, und die Form des dritten Theils von einem Cirkel hat. Sie legt im Junius 4. bis 5. Eyer, und verläßt das Land im August. Sie hängen oft mit den Füßen fest an der Schornsteinwand, und halten sich mit ihrem scharfen Schwanze.

27. **ACUTA.** *Die martinikische spitzschwänzige Schwalbe.* (5)

Briffon, ornithol. I. p. 297. n. 8. Hirondelle de la Martinique.

Latham, Syst. ornith. II. p. 581. n. 31. Hirundo (Acuta) nigra subtus fusca, gula grisea, rectricibus apice nudo subulatis.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 581. ad n. 31. H. corpore subtus rubro-fusco.

II. **MELBA.** *Die Alpenschwalbe.*

Müller, Naturyst. II. p. 634. n. II. die spanische Schwalbe.

Halle, Vögel, p. 352. n. 340. die größte Gibraltarschwalbe.

Onomat. histor. natur. IV. p. 240. die große Gibraltarschwalbe.

Klein, av. p. 83. n. 2. Hirundo maxima freti Hudsonis.

Klein, Vorbereit. p. 155. n. 2. große Gibraltar-schwalbe.

Klein, verbeff. Vögelhist. p. 85. n. 6. Gibraltar-schwalbe; barbarische Schwalbe.

Briffon, ornithol. I. p. 299. n. II. grande Hirondelle d'Espagne.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 582. n. 33. Hirundo (Melba) griseo-fusca, gula abdomineque albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 53. die größte Schwalbe.

Cetti, Sardin. II. p. 232. die Gibraltarschwalbe.

White, N. G. von Engl. p. 125. große weißbäuchigte Gibraltarishe Schwalbe.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 207. n. 252. die Alpenschwalbe.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 8. Hirundo (Melba) fusca, gula abdomineque albis.

28. CAYENNENSIS. *Die cayennische Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 583. n. 34. Hirundo (Cayanensis) violaceo-nigricans, capite nigro, gutture fascia oculari bifida, femoribusque albis.

12. DAURICA. *Die sibirische Schwalbe.*

Müller, Naturyst. Suppl. p. 179. n. 13. die russische Schwalbe.

Müller, Naturyst. Suppl. p. 179. n. 14. die sibirische Bergschwalbe.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 576. n. 13. Hirundo (Daurica) caerulea, subtus alba, temporibus uropygioque ferrugineis, rectrice extima, longissima, macula alba intus notata.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 10. n. 19. Hirundo *alpestris*.

Berlin. Samml. IV. p. 565. *daurische Steinschwalbe*; m. e. Fig.

29. ERYTHROCEPHALA. *Die rothköpfige Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 14. Hirundo (Erythrocephala) nigricans, supra alba marginata, subtus alba, capite rubro, alis caudaque fuscis.

30. UNALASCHKENSIS. *Die Schwalbe von Unalaska.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 15. Hirundo (Aoonatschkensis) nigricans, subtus cinerascens, uropygio albid.

31. INDICA. *Die indische Schwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 577. n. 16. Hirundo (Indica) fusca, pileo rufo, corpore subtus albid.

32. NIGRA.

32. NIGRA. *Die schwarze Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 17. Hirundo (Nigra) tota nigra, alis longissimis, cauda forficata.

β. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 577. ad n. 17. H. fascia frontali alba.

33. DOMINICENSIS. *Die Schwalbe von St. Domingo.*

Halle, Vögel, p. 353. n. 342 die Gesangschwalbe.

Onomat. hist. nat. IV. p. 237. die Gesangschwalbe.

Klein, av. p. 83. n. 5. Hirundo cantu alaudam referens.

Klein, Vorbereit. p. 156. n. 5. Sangschwalbe.

Klein, verb. Vögelhist. p. 86. n. 8. Sangschwalbe.

Briffon, ornith. I. p. 295. n. 3. Hirondelle de St. Domingue.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 18. Hirundo (Dominicensis) nigro-chalybea, abdomine albo rectricibus nigricantibus.

Feuillée observat. III. p. 267. Hirundo cantu alaudam referens.

34. PERUVIANA. *Die Schwalbe von Peru.*

Briffon, ornithol. I. p. 297. n. 7. grande Hirondelle de Peru.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 19. Hirundo (Peruviana) nigra subtus alba, fascia abdominali cinerascens, alis caudaque pallide griseis.

Feuillée, obs. III. p. 269. Autre Hirondelle ou Hirundo maxima Peruviana. Avis praedatoris calcaribus instructa?

35. CINEREA. *Die graubäuchige Schwalbe.*

Briffon, ornith. II. p. 297. n. 6. Hirondelle du Peru.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 578. n. 20. *Hirundo* (*Cinerea*) *nigra nitens*, *subtus cinerea*, *rectricibus margine griseo-flavescentibus*.

Feuillée, obs. III. p. 269. *Hirondelle*, ou *Hirundo minima Peruviana cauda bicorni*?

36. VIOLACEA. *Die violette Schwalbe.*

Ist nach *Pennant*, und *Latham* mit *Hirundo Purpurea*, p. 1020. n. 5. einerley.

37. CHALYBEA. *Die stahlglänzende Schwalbe.*

Briffon, ornithol. II. p. 296. n. 4. *Hirondelle de Cayenne*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 578. n. 21. *Hirundo* (*Chalybea*) *nigro-chalybea*, *subtus fusco grisea*, *rectricibus nigris*.



Thomasi diss. de hibernaculis hirundinum. Lips. 1658. 1671. 1702.

Bresl. Nat. u. Kunstgesch. VII. Vers. p. 321. VIII. p. 457. XIX. p. 283. XXVIII. p. 409. Von der Wiederkunft der Störche und Schwalben.

Neu hamburg. Magaz. XVIII. St. p. 195. Von dem Winteraufenthalt der Schwalben.

Hamburg. Magaz. IV. p. 406. desgl.

Koburg. Magaz. I. p. 45. desgl.

Neues brem. Magaz. I. p. 412. desgl. V. p. 151.

Oekonom. phys. Ausz. VI. p. 116. IX. p. 140. desgl.

Hannöv. Magaz. 1766 p. 1201. — 1767. p. 79. 315. 1021. 1437 — 1769. p. 167. desgl.

Comment. Lips. Vol. XIII. p. 667. desgl.

Titius: Wittenb. Wochenbl. 1771. p. 78. desgl. XXIII. p. 453.

Leche: diss. de commoratione hybernali et peregrinationibus Hirundinum. Aboae 1764.

Vogel,

- Vogel*, neue medicin. Bibl. VI. B. 4. St. p. 296.
Büffon, Naturgeschichte der Vögel, I. Einleitung, p. XXII. fqq.
Stralfund. Magaz I. p. 20. desgl. p. 145.
Sperling, diss. de Hirundine. Wittenb. 1635. 4.
Heurnius de hirundinum usu et efficacia in medicina Gryphisw. 1652.
Praetorius, von des Storches und der Schwalben Winterquartier. Fref. 1678. 8.
White de hirundine domestica. Phil. Transact. LXIV. p. 196.
White de hirundine rustica, Apo et riparia. ib. LXV. p. 258.
Ledel de hirundine alba. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. 1. obs. 54. p. 84.
Wallin, diss. de hirundine alba. Upf. 1733. 4.
Oeuvres de Regnard, Tom. I. p. 121. (von erstarrten Schwalben.)
Barrington, miscellan. p. 225. (vom Winterschlaf der Schwalben in Sümpfen.)
Praetorius Winterflucht der nordischen Sommervögel. Lpzg 1678 8.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 446. vom Winteraufenthalt der Schwalben.
Klein, Abhandl. der Danziger Gesellsch. I. p. 474.
Klein, av. p. 195. — Vorbereit. p. 357. — Verb. Vögelhist p. 208.
Olaus M. de gent. septentr. XIX. p. 20.
Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 284.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 87.
Borkhausen, Magaz. I. p. 193.
Smellie, Philos. der Naturgesch. II. p. 235.
Beckmann, phys. Bibl. I. p. 187. V. p. 203.
Pallas, Reif. Ausz. II. p. 8.
Fischer, N. G. von Livl. p. 106.
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 613.

Deutsche Zeit. 1784. p. 24. — Goeze, nützl. Allerl. II. p. 244. List einer Schwalbe.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 57. ob die Rauchschnalben die Kühe stechen? — I. p. 452. verspätete Schnalben.

Onomat. hist. nat. IV. p. 218.

Zorn, Petinotheol. I. p. 432. 435. 442. 451. II. p. 159.

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 345. n. 12. Hirundo Praetincta. p. 695. n. 1. Glareola Austriaca.

Das Geschlecht ist mit 25. Gattungen vermehrt. Da aber die 12te Gattung der XII. Edit. anderswohin versetzt, und deren Stelle durch eine neue ersetzt worden; so beträgt die Anzahl der neu hinzugekommenen Gattungen überhaupt 26 — Bey der 1sten Gattung sind zwey, bey der 3ten zwey, bey der 10ten drey Varietäten aus einander gesetzt.

118. GESCHLECHT. CAPRIMULGUS. Die Nachtschnalbe. (Tageschläfer; Ziegenmelker.)

Müller, Naturfyst. II. p. 636. Gen. CXVIII.

Leske, Naturgeschichte, p. 267. Gen. XLVIII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 151. Gen. LXIV.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 198. Gen. XL.

Becstein, Naturgesch. I. p. 551. Gen. LXXVII.

Pennant, aet. Zool. II. p. 406.

Onomat. hist. nat. II. p. 607.

Klein,

Klein, av. p. 81. trib. I.

Brissón, ornithol. I. p. 289. Gen. XXIX.

Batsch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXXII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 583. Gen. XLVII.

Hermann, tab. affin. anim. p. 229.

Donndorff, Handb. d. Thiergeichichte, p. 397.
Gen. LXXXVII.

I. EUROPAEUS. *Die europäische Nachtschwalbe.* (6)

Müller, Naturyst. II. p. 636. n. I. *die europäische Nachtschwalbe*; tab. 21. Fig. 7.

Leske, Naturgesch. p. 268. n. I. *die europäische Nachtschwalbe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 152. n. I. *der Nachtrabe*; *Tageschläfer*; tab. 64.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 198. n. I. *Caprimulgus (Europaeus) narium tubulis obsoletis. Nachtschwalbe, Ziegenmelker; Ziegenfanger; Hexe; Nachtrabe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 571. *die europäische Nachtschwalbe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 665. *Nachtrabe.*

Funke, Naturgesch. I. p. 330. *die Nachtschwalbe.*

Ebert, Naturl. II. p. 153. *Ziegenmelker; bärtige Schwalbe.*

Halle, Vögel, p. 345. n. 330. *die große Nachtschwalbe.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 441. n. 394. *die Nachtschwalbe.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 408. A. *der europäische Ziegenmelker.*

Neuer Schaupl. d. Nat. X. p. 216. Ziegenmelker.

Eee 5

Onomat.

(6) Die Sage, daß der Vogel die Ziegen ausmelke, hat sich von Aristoteles Zeiten bis hieher fortgepflanzt. Auch *Aelian* giebt sie, nach seiner gewöhnlichen Art, für Wahrheit aus.

- Onomat. hist. nat. II. p. 607. *Tagschläfer*.
 Handb. der Naturgesch. II. p. 148. *Hexe*.
 Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 141. *Nachtschwalbe*, etc.
 Klein, av. p. 81. n. 1. *Hirundo caprimulgus*.
 Klein, Vorbereit. p. 152. n. 1. *großbärtige Schwalbe*; *Hexe*; *Milchsauger*, *Ziegenauger*; *Kindermelker*; *Tagschläfer*; *Nachtschade*; *Nachtvogel*; *Pfaffe*.
 Klein, verb. Vögelh. p. 83. n. 1. *Hexe*.
 Klein, Stemmat. av. p. 15. tab. 17. Fig. 1. $\alpha - \gamma$.
 Gesner, Vögelb. p. 49. *Caprimulgus*.
 Brisson, ornithol. I. p. 289. n. 1. *Tette-chevre*; *Crapaud-volant*.
 Biffon, pl. enl. p. 193. *Crapaud-volant*.
 Batsch, Thiere, I. p. 365. *Geismelker*.
 Latham, Syn. Suppl. p. 194. *European Goat-sucker*.
 Latham, Syst. ornithol. II. p. 584. n. 5. *Caprimulgus* (Europaeus) *niger*, cinereo fusco ferrugineo et albo varius, subtus albo-rufescens, fasciis fuscis.
 Beseke, Vögel Kurl. p. 85. n. 200. *die europäische Nachtschwalbe*.
 Simeßen, meklenb. Vögel, p. 153. n. 1. *die europäische Nachtschwalbe*; *Dagschlap*.
 Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 452. *Nachtschwalbe*, *Nachtschatten*.
 Fischer, Livl. p. 108. n. 181. *Nachtschwalbe*.
 Cetti, Sardin. II. p. 238. *die Nachtschwalbe*; *Ziegenmelker*.
 White, N. G. von Engl. p. 84. n. 18. p. 38. p. 60. n. 19. *Ziegenmelker*.
 Pallas, Reise Ausz. I. p. 370. *Nachtschwalbe*.
 Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *Nachtschwalbe*.

Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 1. *Natravn*;
Natskade; *Aftenbakke*.

Linné, Abhandl. II. p. 283. n. 37. p. 307. n. 145.
europäische Nachtschwalbe.

Linné, Reis. durch Westgothland, p. 34. (das
Nest.)

Naturforsch. XVII. p. 114. n. 231. XXI. p. 199.
Nachtschatten; *Ziegenmelker*.

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 297. *Nacht-
schwalbe*.

Lange, Briefe zur Naturgesch. p. 40. *Tageschläfer*.

Scopoli, Bem. aus der N. G. p. 209. n. 254. *gemei-
ne Geismelker*.

Lichtenberg, Magaz. I. 3. p. 59. *Nachtschwalbe*;
tab. 3. Fig. 4. (der Fuß.)

Lichtenberg u. Voigt, Magaz. V. 2. p. 17. *Zie-
genmelker*.

Schneider, zool. Abhandl. p. 144. *die Nacht-
schwalbe*.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 402. III. p. 295. *Zie-
genmelker*.

Naumann, Vogelsteller, p. 154. *der Tageschläfer*.

André u. Bechstein, Spatzierg. I. p. 342. *der Tag-
schläfer*.

Mannigfaltigk. III. p. 11. *Ziegenfanger*.

Eberhard, Thiergesch. p. 78. *Ziegenfanger*.

Beckmann, Naturhist. p. 56. *Nachtschwalbe*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 715. *Nachtrabe*.

Meidinger, Vorles. I. p. 151. *Nachtschwalbe*.

Borkhausen, Magaz. p. 196. n. 76. *Nachtschwalbe*.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. *Caprimulgus*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 5. *Capri-
mulgus*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 193. n. 1. *Capri-
mulgus (Europaeus) narium tubulis obsoletis*.

Linné,

- Linné*, Syst. Nat. Ed. XII. I. p. 346. n. 1. Caprimulgus (Europaeus) narium tubulis obsoletis.
Charleton, onom. zoic. p. 71. n. 8. Caprimulgus.
Möhring, av. gen. p. 46. n. 38. Hirundo.
Kramer, Austr. p. 381. n. 5. Hirundo cauda integra, ore setis ciliato. *Mückenstecher*; *Nachtrabl*.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 232. Caprimulgus. Fur nocturnus. Connilus nocturnus. *Nachtschade*; *Tageshläffer*; *Nacht-Räblin*; *Nachtvogel*; *Pfaff*.
Rzaczyński, auct. hist. nat. Pol. p. 369. Caprimulgus.
Schaeffer, element. ornithol. tab. 23.
Gerin, ornithol. I. p. 91. tab. 99.
Faun. Arragon. p. 91. — Hist. Selb. p. 62. 94.
Hist. Prov. I. p. 338. Chathuant.
Zinnar, Uov. p. 94. tab. 15. Fig. 84. Covaterra.
Hermann, tab. affin. anim. p. 176. 229.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 40. Caprimulgi.
Aristot. hist. anim. L. 9. c. 39. n. 213. Αίγροθηλας.
Aelian. de nat. anim. L. 3. c. 39. L. 16. c. 22. Αίγροθηλας.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 398. n. 1. die europäische Nachtschwalbe.

3. VIRGINIANUS. Die langfittige Nachtschwalbe.

- Klein*, av. p. 81. ad n. 1. Whip Poor Will.
Klein, Vorbereit. p. 152. Whip Poor Will.
Klein, verbeß. Vögelhistor. p. 83. Whippoorwill.
Briffon, ornith. I. p. 291. Tette chevre de Virginie.
Pennant, arct. Zool. II. p. 407. n. 254. der langfittige Ziegenmelker; tab. 18. ob. Fig.
Latham, Syn. Suppl. p. 194. Virginia Goatsucker.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 585. n. 6. Caprimulgus (Virginianus) fusco-nigricante rufescence cine-

cinereoque varius, subtus albidus fasciis nigricantibus, gula lunula alba.

Seligmann, Vögel, III. tab. 21. *der Whip-Poor-Will, oder kleine Geismelker.*

Seligmann, Vögel, IV. tab. 112. *der Whip-Poor-Will, oder der kleine amerikansche Geismelker.*

Carver, Reis. d. Nordamer. p. 385. *die Nachtschwalbe.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 193. n. 1. β. *Caprimulgus minor americanus.*

Gerin. ornithol. I. p. 92. tab. 100.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 398. *der langfittige Ziegenmelker.*

4. CAROLINENSIS. *Die kurzfittige Nachtschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 347. n. 331. *die karolinische Nachtschwalbe.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 406. n. 253. *der kurzfittige Ziegenmelker.*

Onomat. hist. nat. II. p. 608. *der Tageschläfer von Carolina.*

Klein, av. p. 81. ad n. 1. *Caprimulgus Carolinensis Catesbeji.*

Klein, Vorbereit. p. 152. *der karolinische Ziegenfänger.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 83. *die carolinische Nachtschwalbe.*

Briffon, ornithol. I. p. 290. n. 2. *Tette-chèvre de la Caroline.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 584. n. 4. *Caprimulgus (Carolinensis) griseo nigricanteque undulatus, subtus griseo-rufescens, lineolis nigricantibus, rectricibus tribus exterioribus latere interiore albis.*

Seligmann, Vögel, I. tab. 16. *der carolinische Nachtrab oder Geismelker.*

5. GRISEUS. *Die graue Nachtschwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 584. n. 3. Caprimulgus (Griseus) griseus alis nigricantibus griseofasciatis, rectricibus fasciis fuscis.

6. JAMAICENSIS. *Die Nachtschwalbe von Jamaica.*

Halle, Vögel, p. 347. n. 333. die flachköpfige Nachtschwalbe.

Klein, av. p. 82. n. 3. Hirundo caprimulgi species, *Guiraoquerell*.

Klein, Vorbereit. p. 153. n. 3. eine Abart von unserm Ziegenmelker aus Jamaica.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 84. n. 4. zweyter Brasilianer.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 584. n. 2. Caprimulgus (Jamaicensis) ferrugineus, nigro-striatus, alis albo variegatis, remigibus fuscis maculis albis, rectricibus fasciis nigris.

7. GRANDIS. *Die große Nachtschwalbe.*

Briffon, ornith. I. p. 293. n. 7. Grand-Tette-chèvre tacheté du Bresil.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 583. n. 1. Caprimulgus (Grandis) nigricante albo flavescenteque variegatus, subtus albo nigroque varius, area oculorum flavescente, pedibus albis.

Jonston, av. p. 191. Ibijau species magnitudine Noctuae.

8. ALBICOLLIS. *Die weißkehlige Nachtschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 585. n. 7. Caprimulgus (Albicollis) rufo fuscus, albo nigricanteque varius, subtus fuscus nigricanteque transversim lineatus, gula macula triangulari alba.

9. RUFUS. *Die rothbraune Nachtschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 586. n. 9. Caprimulgus (Rufus) rufus nigro-varius, rectricibus alarum corporeque subtus fasciis nigricantibus, remigibus rufo-nigroque, rectricibus nigro fasciatis.

10. GUJANENSIS. *Die guianische Nachtschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 586. n. 8. Caprimulgus (Guianensis) fulvus, maculis difformibus, striisque rufis notatus, sub gula lunula alba.

11. BRASILIANUS. *Die brasilianische Nachtschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 348. n. 335. die Amerikanische Nachtschwalbe.

Onomat. hist. nat. II. p. 609. der Ibijau; brasili-sche Tageschläffer.

Klein, Vorbereit. p. 84. n. 3. Brasilianer; Ibijau.

Briffon, ornithol. I. p. 292. n. 6. Tette-chèvre tacheté du Brésil.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 586. n. 10. Caprimulgus (Brasilianus) nigricans, flavescens varius, punctulis albis, subtus albo nigroque varius, area oculorum flavescens-alba.

Möhring, av. gen. p. 83. n. 110. Nycticorax.

Jonston, av. p. 191. Ibijau Brasilienfibus, Noitibo Lusitanis.

12. SEMITORQUATUS. *Die Nachtschwalbe mit weißem Halsbande.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 586. n. 11. Caprimulgus (Semitorquatus) nigricans, rufo griseoque maculatus, collo inferiore lunula alba.

13. CAYENNENSIS. *Die cayennische Nachtschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 587. n. 12. Caprimulgus (Cayanus) rufo griseoque varius, nigro undulato-lineatus, gula fasciaque alarum alba, temporibus rufis, striis 5. nigris.

14. ACUTUS. *Die spitzschwänzige Nachtschwalbe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 195. Sharp-tailed Goatsucker.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 587. n. 13. Caprimulgus (Acutus) nigricante fasciatus, supra griseus subtus rufus, capite colloque rufo-fuscis, rectricibus apice subulatis.

2. AMERICANUS. *Die amerikanische Nachtschwalbe.*

Müller, Naturfyst. II. p. 638. n. 2. der Geismelker; tab. 26. Fig. 4.

Borowsky, Thierreich, III. p. 153. n. 2. der amerikanische Tageschläfer.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 442. n. 395. die amerikanische Nachtschwalbe.

Halle, Vögel, p. 347. n. 332. die Nachtschwalbe mit 2. Röhren auf der Nase.

Klein, av. p. 81. n. 2. Hirundo Jamaicensis, naribus conspicilia mentientibus.

Klein, Vorbereit. p. 153. n. 2. Brillennase.

Klein, verb. Vögelh. p. 83. n. 2. Brillennase.

Briffon, ornith. I. p. 291. n. 4. Tette-chèvre de la Jamaïque.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 587. n. 14. Caprimulgus (Americanus) toto corpore griseo nigro et xerampelino variegatus, naribus cylindraceis.

Linneé, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 193. n. 2. Caprimulgus (Americanus) narium tubulis eminentibus.

Möhring, av. gen. p. 47. n. 40. Caprimulgus.

Barrere,

Barrere, Franc. equinox. p. 147. *Strix sylvatica* maior, pulla. *Noctua* minor, ex pallido et fusco varia.

15. **TORQUATUS.** *Die Nachtschwalbe mit goldenem Halsbände.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 587. n. 15. *Caprimulgus* (*Torquatus*) cinereo-fuscus, maculis obscure flavis et albicantibus varius, torque aureo, rectricibus binis intermediis longioribus.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 346. n. 1. β. *Capr. min.* p. 1028. n. 3. *Caprimulgus*
americ. Virginianus.

Das Geschlecht ist mit dreyzehnen Gattungen vermehrt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Die asiatische Nachtschwalbe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 195. n. 16. *Bombay Goatsucker.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 588. n. 16. *Caprimulgus* (*Asiaticus*) cinerascens, nigro ferrugineoque nebulosus, pectore fasciis cinereis, striga verticali nigricante, maxillari maculaque gulae pallidis.

2. *Die indianische Nachtschwalbe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 196. n. 17. *Indian Goatsucker.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 588. n. 17. *Caprimulgus* (*Indicus*) cinerascens, nigro transversim

lineatus, genis pectore alisque ferrugineo-maculatis, rectricibus caerulefcentibus nigro-fasciatis, extima ferrugineo nigroque varia.

3. *Die gehäubte Neuholländische Nachtschwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 588. n. 18. *Caprimulgus* (Novae Hollandiae) fusco nigro albidoque nebulosus, subtus albidus, collo pectoreque fasciis obscuris, crista frontali erecta setacea.

Phillips, bot. Bay, tab. p. 270. Crested Goat-sucker.

White, Reif. nach Neu-Süd-Wallis, p. 129. *der gehäubte Ziegenmelker.*

Meyer, zool. Entdeck. p. 58. n. 1. *Caprimulgus* (Cristatus) cinereo fuscus, subtus pallidus, remigibus caudaque fasciis pallidis numerosis, vibrissis utrinque erecto-cristatis.



Wiederholung der neu hinzugekommenen Gattungen.

In dem Geschlecht			Vultur.	8. Gattungen.
—	—	—	Falco.	84.
—	—	—	Strix.	32.
—	—	—	Lanius.	28.
—	—	—	Pfittacus.	94.
—	—	—	Ramphastos.	8.
—	—	—	Buceros.	8.
—	—	—	Buphaga.	—
—	—	—	Crotophaga.	1.
—	—	—	Glaucopis.	1.
—	—	—	Corvus.	26.
—	—	—	Coracias.	11.
—	—	—	Oriolus.	32.
—	—	—	Gracula.	4.
—	—	—	Paradisea.	6.
—	—	—	Trogon.	4.
—	—	—	Bucco.	16.
—	—	—	Cuculus.	26.
—	—	—	Yunx.	1.
—	—	—	Picus.	32.
—	—	—	Sitta.	5.
—	—	—	Todus.	14.
—	—	—	Alcedo.	26.
—	—	—	Merops.	14.
—	—	—	Upupa.	5.
—	—	—	Certhia.	29.
—	—	—	Trochilus.	33.
—	—	—	Anas.	79.

627. Gattungen.

Von umstehender Seite			627. Gattungen.	
In dem	Geschlecht	Mergus.	2.	—
—	—	Alca.	7.	—
—	—	Aptenodytes.	9.	—
—	—	Procellaria.	17.	—
—	—	Diomedea.	3.	—
—	—	Pelecanus.	24.	—
—	—	Plotus.	2.	—
—	—	Phaëton.	2.	—
—	—	Colymbus.	17.	—
—	—	Larus.	9.	—
—	—	Sterna.	19.	—
—	—	Rynchops	—	—
—	—	Phoenicopterus.	1.	—
—	—	Platalea.	—	—
—	—	Palamedea.	—	—
—	—	Mycteria.	—	—
—	—	Cancroma.	—	—
—	—	Scopus.	1.	—
—	—	Ardea.	59.	—
—	—	Tantalus.	14.	—
—	—	Corrira.	1.	—
—	—	Scolopax.	29.	—
—	—	Tringa.	18.	—
—	—	Charadrius.	20.	—
—	—	Recurvirostra.	1.	—
—	—	Haematopus.	—	—
—	—	Glareola.	1.	—
—	—	Fulica.	18.	—
—	—	Vaginalis.	1.	—
—	—	Parra.	10.	—
—	—	Kallus.	21.	—
—	—	Pfophia.	1.	—
—	—	Otis.	5.	—

939. Gattungen.

Von

Von umstehender Seite.

939. Gattungen.

In dem Geschlecht	Struthio.	5.	—
— — —	Didus.	2.	—
— — —	Pavo.	1.	—
— — —	Meleagris.	—	—
— — —	Penelope.	4.	—
— — —	Crax.	—	—
— — —	Phasianus.	4.	—
— — —	Numida.	2.	—
— — —	Tetrao.	46.	—
— — —	Columba.	42.	—
— — —	Alauda.	23.	—
— — —	Sturnus.	12.	—
— — —	Turdus.	98.	—
— — —	Ampelis.	4.	—
— — —	Colius.	3.	—
— — —	Loxia.	46.	—
— — —	Emberiza.	50.	—
— — —	Tanagra.	25.	—
— — —	Fringilla.	71.	—
— — —	Phytotoma.	1.	—
— — —	Muscicapa.	72.	—
— — —	Motacilla.	125.	—
— — —	Pipra.	13.	—
— — —	Parus.	8.	—
— — —	Hirundo.	26.	—
— — —	Caprimulgus.	13.	—

1630. Gattungen.



VERZEICHNISS

AUSLÄNDISCHER SYNONYMEN.

41. *Geschlecht. Vultur.* 7. *Pernopterus.*
Râchaene, arab.
Safran-bacha, bey den
Türken in Syrien.
Chapon de Pharaon, oder
de Mahomet, bey den
Franzosen in Aegypten.
Boleta, in Spanien?
1. *Gryphus.* 12. *Cinereus.*
Harecatching Vulture,
engl.
Sep Popielaty, poln.
- Condor*, spanisch,
Cuntur, in Peru,
Gryp, holländ.
Ouyrard-Ovasson, bey
den Maragnonen.
Roc; *Ruch*, bey den
oriental. Völkern.
3. *Papa.* 42. *Geschlecht. Falco.*
Moine, französ.
Monk, holländ.
Cosquauthli; *Cozaquau-*
thli, in Mexico.
5. *Aura.* 1. *Serpentarius.*
Slanga - Vreeter, am
Cap.
- Menschen-eeter*, holländ.
Kreng-Raue, bey den
Engländern in Jamaica.
Gallinache, *Marchand*,
bey den französ. Reise-
beschreibern.
Turkey Buzard, bey d.
europ. Engländern.
Zamuro, auf d. Küsten
des südl. Amerika.
Suguntu, in Peru.
Tzopilottl, in Mexico.
Kiankia, *Oyroua*, in
Guiana.
Uruba, in Brasilien.
34. *Harpyia.*
Itzquauthli, in Mexico.
Urutaurana, in Brasilien.
Orenoko-Eagle, engl.
Calquin, in Chili.
38. *Barbatus.*
Jlloo, bey den Mongo-
len.
- β. *Sach*, an den samami-
fischen Alpen.
39. *Albicilla.*
Fiske-Orn, norweg.
Pistoina,

- Pistoina*, krainisch.
Hafs - Orn; *Fisk Ijusen*,
 schwedisch.
Elo, bey den Tungusen?
Maitaslisja, lettisch.
Bislogwoft, russisch.
Nektoralik; *Terterssoak*;
Efaruktorsoak; *Ting-*
miarlurksoak, grönland.
2. *Melanaetos*.
Ehrglis, lettisch.
Kokkas, ehstnisch.
Orzel mnieyszy, poln.
3. *Leucocephalus*.
Wapow - Estequan - Mi-
ckesue, an d. Hudsons b.
4. *Ossifragus*.
Offifraga, lat.
Orfraye, *Bris - os*, franz.
Aquilastro, italien.
Sea-Eagle; *Osprey*, engl.
Gaase - Orn, dänisch.
Skast, schles.
Quetranabueffos, *Cheba-*
los, span.
Orzel - tomignat; *Orzel-*
morski, poln.
Tepnys, russisch.
Soudagua, bey den Hu-
 ron.
5. *Chrysaetos*.
Grand - aigle; *Aigle*
royal; *Aigle noble*; *Ai-*
gle doré, französ.
- Golden Eagle*, engl.
Arent, holländ.
Landörn, dänisch.
Örn, schwed.
Karagush, russ.
Przedny, poln.
12. *Milvus*.
Milan, französ.
Ecouffe; *Ecouffle*; *Huan*,
 alt französ.
Milvio; *Nibbio*; *Poya-*
na, ital.
Mulano, span.
Wowe; *Wou*, holländ.
Kite; *Glead*, engl.
Kania, poln.
Glada, schwed.
Wannags, lettisch.
Kannakul, ehstn.
Glente, dänisch.
Aturulia, sardin.
62. *Ater*.
Mäuseahr, deutsch.
Küken - Dieff, holländ.
Black Gled, engl.
25. *Furcatus*.
Snake Hawre, in Caro-
 lina.
26. *Haliaetus*.
Fisktius, schwed.
Skopnia, polnisch.
71. *Pondicerianus*.
Ois - au brame, französ.
Bramary - Kite, engl.

- Tehil*, in Hindostan.
Kueronden, tamulisch.
15. *Buteo*,
Poana, ital.
Buzzard, engl.
Goiran, in Frankr.
Quidvogel, schwed.
Kaine, krainisch.
Skiör-Vänge, norweg.
Oerne-Falk, dänisch.
Alferraz, in Arragonien.
Astoreddu, in Sardin.
28. *Apivorus*.
Slaghök, schwedisch.
Muse-Höeg; *Muse-Vaage*, dänisch.
Spend-Hoeg; *Morads-Höeg*, norweg.
29. *Aeruginosus*.
Bozzagro, italien.
Moor-Buzzard, engl.
Tapaju; *Falcu-tapaju*, in Sardin.
Höense-Höeg; *Dverg Glente*, dänisch.
Hoense-Tyv, norweg.
80. *Javanicus*.
Lang, in Java.
7. *Rusticolus*.
Millekulartok, in Grönland?
30. *Palumbarius*.
Accipiter, latein.
- Autour*, franzöf.
Goose-hawk, engl.
Astore, italien.
Sletfalk; *Graa-Falk*; *Huid-Falk*; *Bla-Fugl*.
Gnulbeck, dänisch.
Due-Falk; *Stor-Höeg*, norweg.
Gastrzabwielki; *Jastrzab-golebiow*, poln.
Komishark - *papanasew*, an d. Hudsons b.
Bauge, das }
Männchen; } in China.
Jurra, das }
Weibchen; }
13. *Gentilis*.
Falcone, ital.
Faucon, franzöf.
Örn, schwed.
Höense-Höeg, dänisch.
Slaetfalk, bey den dänischen Falkonierern.
Blaaefugl, mit }
bläulicher }
Wachshaut. } nach
Gnulbek, mit } Brunn.
gelbgrüner }
Wachshaut. }
Halkon, spanisch.
Sokol, poln.
- §. *Ater*.
Tlotli, in Mexico.
Nebbi, in Brasil.

98. Melanoleucos.

Kaloe Koeroelgoya, ceylonisch.

27. Gyrfalco.

Bialozor, poln.

Kretzel, moskow.

Gyrfalkon, *Gerfalcon*, engl.

Wannags, lettisch.

Kul, ehstn.

Habicht, in Livland.

16. Tinnunculus.

Cercerelle, *Quercerelle*,

Ecrecelle, alt französ.

Mezy, zu Sologne.

Rabaillet, zu Chalons.

Ratier, in Provence.

Pitrion, in Touraine.

Pitri, zu Saumur.

Preneur des Mulots, in Beauce.

Canibello, *Tittinculo*, *Tintarello*, *Garinello*, italienisch,

Cernicalo, *Fernicalo*, spanisch.

Kestrel, *Kestril*, engl.

Pustotka, poln.

Stanchel, *Stannet*, *Stonigall*, in Schottl.

Postoka, *Splinza*, *Skoltisch*, krainisch.

Kirke-Falk; *Spurv-Hoeg*, dänisch.

Kyrko-Falk, schwed.

Tilibriecu, *Tilibriu*, in Sardin.

Acertello, *Fottivento*, (nach Zinnan.)

Gheppia, (nach Cetti.)

31. Nifus.

Mouchet, *Emouchet*, französisch.

Spar-hawk; *Sparrowhawk*, engl.

Croguler, poln.

Spacshoek, schwed.

Sparviero, das }
Weibchen.

Moscardo, *Ter- } italien.
zuolo*, das }
Männchen.

Spadderi, in Sardin.

Spurre-Hog, dänisch.

Wehja wannags, lettisch.

Wihna-kul. ehstn.

Σπιζίας, griech.

21. Columbarius.

Smal Bird Hawk; } an der
Becassich } Hudf.

23. Vespertinus.

Kobez, in Ingrien.

Kober, um Astrachan.

Derbnitschok, russisch.

14. Subbuteo.

Hobreau, französ.

Hobby, engl.

Laerke-Falk, *Blaafalk*, dänisch.

Masshu, schwed.

Krogulek, poln.

118. Aelalon.

Loyette, alt franzöf.

Palletier; *Preneur des*

Passes, ou de *Passerets*,

in einigen franzöf. Provinzen.

Smerlo, *Smeriglio*, ital.

Merlin, engl.

Jack, schottl.

Orzemlik, poln.

Αιταλον, griech.

43. Geschlecht. *Strix*.

1. *Bubo*.

Bubo, latein.

Grand-Duc, franzöf.

Barbaian, an einig. Ort. in Frankr.

Great-horn-owl; *Eagle owl*, engl.

Duc, *Dugo*, ital.

Buho, span.

Mochó portugies.

Chassetou, Savoyard.

Pétive, in Provence.

Puhacz, *Sowalezna*, poln.

Uf, schwed.

Schuijsuit, holländ.

Sternugle, dänisch.

Bergugle; *Roper*, Kat.

Ugl-Hane, norweg.

Sova, krainisch.

Uspis, lettisch.

Jänneschüüp, ehstn.

Buæs, griech.

Janschuph, hebr.

Lün; *Ulin*, russisch.

Ackia, *Acky*, tatarisch.

Zagan Schubo; *Zagan*

Gorochun, kalmückisch.

13. *Virginiana*.

Natowokey Omiffew, an der Hudsonsbay.

Looloo, auf den Freundschaftsinseln.

14. *Zeylonensis*.

Raia Allia, in Zeylon.

3. *Asio*.

Siutitok, *Tunnudliorbik*, in Grönland?

4. *Otus*.

Asio, *Otus*, latein.

Hibou; *moyen Duc*, französisch.

Chat huant cornu, an einigen Orten Frankr.

Choue; *Cornerote*, in Bourgogne.

Ducquet, in Gascogne.

Chat huant de Bruyeres, in Sologne.

Chouant, in Anjou und Bretagne.

Cloudet, an einigen andern Orten.

Horn-Owl, engl.

Guso; *Barbagianni*, ital.

Mocliuelo, spanisch.

Horn-Ugla, schwed.

Horn-Ugle, dänisch.

Puszczyk,

- Puszczyk*, poln.
Cluk-nocny; *Sowa ur-sata*, polnisch?
Mala-Sowa, krainisch.
Amisk-oho, an der Hud-fonsbay.
17. *Brachyotos*.
Moufe-Hawk, bey den Engl. an d. Hudfonsb.
Thotose causew, bey den Eingebornen daselbst.
Woodcock-Owl, an einigen Orten in Engl.
20. *Indica*,
Bakkamaena, auf Zeylan.
22. *Carniolica*.
Wald-Außfl, im Oesterreichischen.
Giu, in Bologna.
Tshuk, krainisch.
5. *Scops*.
Houette, *Chouette*, französisch.
Little-Horn Owl, engl.
Alocharello, *Zivetta*, *Chivino*, italien.
Boom-Wiltge, holländ.
Sowka, poln.
6. *Nyctaea*.
Harfäng, schwed.
Gysfugl; *Lemäns-Grils*;
Gys-ugt, norwegisch.
Jäggelosko, lappisch.
Opik; *Opirksoak*, grönl.
26. *Cinerea*.
Omissew-Athineton, an der Hudfonsbay.
7. *Aluco*.
Hulotte, französ.
Choue, in Burgund.
Trembleur, in Champagne. (nach Salerne)
Alocho, ital.
Corusa, portugies.
Xura; *Kura*, katalon.
Howlet, engl.
Lelok; *Sowka*; *Puszzik*, poln.
Nachtugle, dänisch.
Har-Ugglan, schwed.
Putwista; *Puhze*, lettisch.
Surisprakul, ehstn.
8. *Flammea*.
Chouette des Eglises, voilée, blanche, Effraye, Frésaye, französ.
Fresaye, in Orleans.
Presaye, in Poitou.
Bresague, in Gascogne.
White-Owl, engl.
Kerkugle; *Ransugle*, holländisch.
Krakugle, dänisch.
Tuidara, in Brasilien.
Sirea, *Istria*, in Sardinien.
Ulu, auf Hindostan.
Bum, persisch.
9. *Stridula*.

9. Stridula.

Chat-huant, franzöf.*Leech-Owl*; *Fog-Owl*;*Schreech-Owl*, engl.*Har-Uggla*, schwed.*Nat-Ugle*, dänisch.*Cabeca*, in Katalonien.*Massusu*, arabisch?*Bane*, syrisch?*Velch*; *Skrakoper*, krainisch.*d Zierzba*; *Strokos*;*Wickfzy*, poln.*Wapau Whisky**John*,*White Whisky**John*,an der
Hudf.

11. Funerea.

Cabeticuch; *Cabaducutch*,
an der Hudlonsbay.

12. Passerina.

Katugle, dänisch.*Cucumiau*, in Sardinien.*Shipomas-pish*, an der
Hudlonsbay.

31. Leverianus.

Vale Savane, in Cayenne.

7. Nengeta.

Guiraru Nhengeta, in
Brasilien.

8. Curvirostris.

Vanga, in Madagascar.

12. Collurio.

Pie-escrayere; *Pie-an-*
crouelle, franzöf.44. Geschlecht. *Lanius*.

12. Excubitor.

Montagasse; *Arneat*, in
Savoyen.*Pouchari*; *Bouchari*, in
Bourgogne.*Butcher-bird*; *Adder-*
bird, engl.*Gaza*; *Sperviera*; *Fal-*
conello; *Oresto*; *Castri-*
ca; *Verla*; *Stragazzina*;
Ragazzvia, ital.*Bufertlotio*, in Bologna.*Tornskade*, *Harpax*, dä-

nisch,

Klavert, norwegisch.*Wafogel*, schwedisch.

15. Pitangua.

Cuiriri, in Brasilien.*Bemtere*, portugies.

17. Rufus.

Schet-Be, in Madagascar.

18. Barbarus.

Gonolek, bey den Negeren
am Senegal.

22. Madagascariensis.

Calic-Calic, das
Männchen,*Bruia*, das
Weibchen,in Ma-
dagaf-
car.

28. Leucorhynchus.

L'angraien, in Madagasc.

38. Viri-

38. Viridis.

Tcha - chert, in Madagascar.

39. Leucocephalus.

Tcha - chert - be, in Madagascar.

25. Infaustus.

Loppskata; *Olyksfogel*, schwed.

Röd - tiuxa, jemt.

45. Geschlecht. *Pfittacus*.

Pfittacus, latein.

Ψιττακη, griechisch.

Παπαγας, neugriech.

Ara, s.

deutsch,

Ara, lat.

Maccav,

engl.

die großen,
mit sehr
langem
Schwanz.

Kakadu,

deutsch,

Cacatua,

latein.

Cockatoo,

engl.

die großen,
mit kurzem
Schwanz
und weißem
Leibe.

Lor y,

deutsch.

Lorius,

latein.

Lori,

engl.

dergleichen
mit rother
Farbe.

Sittich, *Sittig*,

deutsch.

Perroquet,

franzöf.

Poppinjay,

Poppingay,

engl.

Parrot, engl.

Papagalo, ital.

Papagio, span.

Parakit,

deutsch,

Perruche,

franzöf.

Perroquet,

engl.

Pfittacula,

latein.

Petite

perruche

franzöf.

Parrakeet

engl.

Pappaufek, illyrisch.

Papuga, poln.

Dadi, türkisch.

Tuzzenu, alt mexican.

(nach de Laet.)

Papagaut, alt französ.

die bunt-
farbigen
Papa-
geyen.

die klei-
nen mit
langem
Schwan-
ze.

die kleinen
mit kurzem
Schwanz.

1. Macao.

Ara, in Brasil.

2. Aracanga.

Aratanga, in Brasilien.

3. Ararauna.

Ararauna, in Brasil.

6. Severus.

6. Severus.
Maracana, in Brasil.
15. Pertinax.
Tui-aputejuba, in Brasil.
32. Aestivus.
Ajuru-curau, in Brasil.
42. Collarius.
Xaxabes, in Jamaica.
46. Geschlecht. *Ramphastos*.
9. Pavonius.
Xochitenacatl, in Mexico.
2. Piperivorus.
Koulik, in Cayenne.
10. Torquatus.
Cochitenacatl, in Mexico.
7. Malabaricus.
Cherry deanisch, in Bengalen.
3. Rhinoceros.
Engang, in Sumatra.
4. Nasutus.
Tock, in Senegall.
Tullaek, *Dymludy*, in Arabien.
50. Geschlecht. *Corvus*.
1. Corax.
Corvus, latein.
Koçax, griechisch.
Cuorvo, spanisch.
- Corvo*, italien.
Raven, engl.
Corbeau, französ.
Corbin, alt französ.
Escorbeau, in Guienne.
Corbillats, } die Jun-
Corbillards, } gen.
Korp, schwed.
Krak, poln.
Ravn, dänisch.
Korp, norweg.
Rauf, holländisch.
Oreb, hebr.
Gerabib, arab.
Calak, pers.
Woron, russisch.
Pullugak; *Kernektok*, grönländ.
Velch-Oru, krainisch.
Krauklis, ehstnisch.
Kaar, lettisch.
Hawram, illyrisch.
Kakekew, auf Hudsons b.
Eatoas, auf den Sandwich-Inseln.
Koenai, am Natkasund.
3. Corone.
Corneille, französ.
Greille; *Greillat*, alt französ.
Grolle, in Touraine.
Agrolle, in Bourbon.
Canale, in Sologne.
Crouas, in Auvergne.
Croace, in Piemont.
Cornice;

- Cornice*; *Cornacchia*;
Cornacchio; *Gracchio*;
Corvo ordinario, ital.
Corneia, spanisch.
Crow, engl.
Wraka, illyrisch.
Gracula; *Busaroca*; *Cucula*, catalon.
Κορῶν, griech.
Κουγαρα, *Κομβρα*, neu-
griech.
Kurka, chald.
Oru, krainisch.
Turlak, burät.
Blaa-Rage, dänisch.
Maldivian Crow, in Loui-
siana?
Hahafeu, an d. Hudsons b.
Kaenne, am Natkasund.
4. *Frugilegus*.
Frayonne, um Paris.
Graye, alt franzöf.
Grolle, nach Belon.
Rook, engl.
Roka, schwed. oeland.
Koore Krey; *Roek*, hol-
ländisch.
Gawron, poln.
Σπερμολογος, griech.
Karok, in Pommern.
5. *Cornix*.
Corneille mantelée, fran-
zösisch.
Malacchia, *munacchio*,
italien.
- Roufton - Crow*; *Sea-
Crow*; *Hooded - Crow*,
engl.
Kroka, schwed.
Krag, dänisch.
Kraaka, norweg.
Urona, polnisch.
Worona, russisch.
Wahrna; *Dserves*, let-
tisch.
Warres, *Non*, ehstn.
Krai; *Aniskrai*, nieder-
sächsisch.
Uzana, krainisch.
Bonte Kraey, holländ.
Κορῶν σποδοειδης, neu-
griech.
Corroga-barza, in Sar-
diniën.
22. *Dauricus*.
Corneille du Senegal,
französisch.
White - breasted Crow,
engl.
Alaktu, bey den Mon-
golen.
24. *Jamaicensis*.
Chattering Crow; *Ca-
can Walk*, engl.
Gabbeling Crow, bey den
Engl. in Jamaica.
6. *Monedula*.
Monedula, latein.
Chouette; *Chouchette*,
franzöf.
- Chicas*;

Chicas; Chocas; Choucas; Chacotte; Cornillon, in einigen franzöf. Provinzen.

Jack-Daw, engl.

Ciagula; Tattula; Pola; Monacchia, ital.

Graio; Graia, spanisch.

Beena, im Graubündtschen.

Choue, Caue, Cauette, Cauvette, in Savoyen.

Tschauka, türkisch.

Graake, in der Schweiz.

Ka, Kaw, holländisch.

Kawka; Kawa, illyrisch.

Zegzolka, poln.

Gaeg; Hannekin, im Niederländischen.

Kaja, schwed.

Allicke, dänisch.

Kaa; Kaie; Ravn-Kaate, norweg.

Galka, russisch.

Tun, burät.

Kohsa; Kowahrna, lett.

Ack, ehstnisch.

Anapha, hebr.

7. Glandarius.

Jeay, franzöf.

Geai; Gai; Jayon;

Gayon; Jaques; Jacuta;

Geta; Gautereau;

Vautrot, in verschied.

franzöf. Provinzen.

Jay; Ja Ja, engl.

Ghiandaja; Gaza verla;

Berta; Bertina; Barettino, italien.

Gayo, Cayo, spanisch.

Gaity, Gralla, in Cataloni.

Girau; Richau, in Brabant.

Soyka, poln.

Skow-Skade, dänisch.

Kornskrika; Noëtskrika;

Aellonskrika, schwed.

Sillawahrns, Wahrna, lettisch.

Paskrat, ehstn.

Schoia, krainisch.

Ronscha, russisch.

Μαλακογρανως, griech. nach Belon.

Καρακαζα, neugriech.

Piga, in Sardin.

10. Caryocatactes.

Casse-noix, franzöf.

Nut-cracker, engl.

Merle Alpadie, ital.

Nodde-krige, dänisch.

Not-kraake; Noddeskriger, norweg.

Nottckraka; Notweka, schwedisch.

Garga, türkisch.

Klesk; Grabulusk, poln.

Kostobryz; Kedrowka, russisch.

Ongolo, tungusisch.

Pähkla-

- Bähklatraat*, ehstnisch.
Nootekraaker, holländ.
13. *Pica*.
Pica, latein.
Pie, französ.
Jaquette; *Dame*; *Agasse*; *Agace*; *Ajace*;
Ouasse, an verschied.
 französ. Orten, und zu
 verschied. Zeiten.
Gazza; *Ragazza*; *Are-*
gazza; *Gazzuola*; *Ga-*
za dominicana; *Gaz-*
zara; *Pica*; *Putta*,
 italien.
Grassa, in Catalonien.
Pega; *Picata*; *Pigaz-*
za, spanisch.
Pye; *Piot*; *Magpye*.
Piapet, engl.
Skata, schwed.
Skade; *Huus-Skade*, dä-
 nisch.
Skior; *Skiaere*; *Skate*;
Tunfugl, norweg.
Skiurra, upländ.
Skära, gothländ.
Häster, in Livl.
Aexter, in Flandern.
Schaggata, lettisch.
Harrakas, ehstn.
Ketsakas, in der livl.
 Wiek.
Strakavel; *Krizstela*,
 illyrisch.
- II. Band II. Th.
- Stroka*, poln.
Praka, krainisch.
Soroka, russisch.
Sascharei, burät.
Saschinga, tungus.
Oue-ta-kee-afke, an d.
 Hudsonsbay.
She-pecum-memewuck,
 in einigen Gegenden der
 Hudsons b.
Kisa; *Kitta*; *Ποκίλις*,
 griech.
Αργασσα, neugriech.
15. *Brachyurus*.
γ. Bengalensis.
Breve, französ.
Madras-Jay, engl.
Ponmunky-pitta; *Pon-*
nandutty, in Indien.
16. *Canadensis*.
Whiskijohn, } an d. Hud-
Whiskijack, } sonsbay.
19. *Eremita*.
Sonneur, französ.
Wood-Crow from Swit-
zerland, engl.
Corvo Spilato, italien.
Kruk-lesney; *Nocay*,
 polnisch.
51. *Geschlecht. Coracias*.
 1. *Garrula*.
Rollier; *Rollier d'Euro-*
pe, französ.
Roller, engl.
- Ggg *Ellekra.*

Ellekrage, dänisch.

Blaa - kraake, norweg.

Allekräka, schonisch.

Spansk - kräka, schwed.

Bläkräka, smoländ.

Kraska, poln.

Shagarag, in der Barba-
rey?

52. Geschlecht. *Oriolus*.

1. *Galbula*.

Avis iſterus, *Galgulus*,
latein.

Loriot, franzöſ.

Lorion; *Lourion*; *Lou-
riou*; *Aurion*; *Lau-
riol*; *Oriol*; *Orio*, alt
franzöſ.

Oriot; *Piloriot*; *Bilo-
rot*; *compere Loriot*;
Laufot; *Merle - jaune*;
Merle doré; *Cortpandu*,
in verschied. franzöſ.
Provinz.

Lutronne, bey Abeville?

Oriolo; *Regalbulo*; *Gual-
bedro*; *Galbero*; *Rei-
galbero*; *Garbella*; *Re-
geyo*, *Melziozallo*, *Bru-
sola*; *Rigogalo*, ital.

Oropendola; *Oroyendo-
la*, ſpaniſch.

Witwal; *Gulden Truſh*;
Oriole, engl.

Wilga, *Wywielga*, pola.

Jwolga, ruſſiſch.

Wahlod, lettifch.

Canarin Salvatico, in
Sardin.

Papagaletto, zu Saffari.

4. *Iſterus*.

Troupiale, franzöſ.

Yellow and black Pie;
*Bonana bird from Ja-
maica*, engl.

Guira - Tangeima, in
Brafilien.

Yapou, in Guiana.

52. Geschlecht. *Gracula*.

2. *Calva*.

Gouling, franzöſ.

Iting, *Tabaduru*, auf
den Philipp. Inſeln.

6. *Sularis*.

Dial; *Dyal*, in Benga-
len.

7. *Quiscula*.

Pie de la Jamaïque,
franzöſ.

Purple Jackdaw, engl.

Tordo, ſpan.

Tequiquiacatzanatl, in
Mexico.

54. Geschlecht. *Paradisæa*.

Manucodiata, in verſch.
Sprachen.

Oiseau de Paradis, fran-
zöſiſch.

Bird of Paradise, engl.

Passarof

Passaros de Sol, portu-
giesisch.

Bourong-aru, in Neu-
guinea.

Boeres, in Indien.

55. Geschlecht. *Trogon*.

2. *Curucui*.

Couroucou à ventre jaune
franzöf.

Red-bellied Curucui,
engl.

Curucui, in Brasilien.

Tzinitzcan, in Mexico.

7. *Fasciatus*.

Pilliehorra, in Zeilan.

Rantvan-kondea, cin-
galesisch.

57. Geschlecht. *Cuculus*.

1. *Canorus*.

Cuculus, latein.

Coucou, franzöf.

Cocou; *Coquu*, *Cocu*;

Coux, an verschied. Or-
ten Frankr.

Coudiou, in der Provence.

Coucouat, die Jungen in
Sologne.

Dinde sauvage, in einige
Gegenden von Bour-
gogne.

Cuculo; *Cucco*, *Cuco*,

Cucho, ital.

Cuelillo, span.

Cuckow, engl.

Kukulka; *Kukaika*; *Gzeg-*
zolka, poln.

Zezula, russisch.

Korkkoek, holländ.

Giög, *Kukert*, *Kuk*, dän.

Kuk-Manelen, cimbr.

Gouk, norweg.

Dsegguse, lettisch.

Käggi, ehstn.

Cucu, in Sardin.

Kukauza, krainisch.

Giök, schwed.

Geeka, lappisch.

Kockok; *Kockunt*, fla-
mand.

Ziez gale, illyrisch.

Κοκκυζ, griech.

Κακολιζ, *Κακακοζ*, ver-
dorb. Griech.

Kaath; *Schalac*; *Scha-*
schaph; *Banchem*; *Ea-*
chem, hebr.

27. *Tahitius*.

Ara Wereroa, auf den
Freundsch. Inseln.

31. *Ridibundus*.

Quapactototl, in Mexico.

32. *Guira*.

Guira Acangatara, in
Brasil.

40. *Pyrrhocephalus*.

Malkoha, cingalesisch.

21. *Cornutus*.

Atingacu-camacu, in
Brasilien.

58. Geschlecht. *Tunx.*
1. *Torquilla.*
Torcal, französ.
Wryneck, engl.
Torcallo, *Torcicollo*, *Col-
 lotorto*; *Verticella*, ital.
Draaihals, holländ.
Giökttyta, schwed.
Vendehals, *Dreyhals*,
 dänisch.
Saougouk, norweg.
Säd-Gjök, Småland.
Wäänkal, ehstnisch.
Tshudesch, krainisch.
Kretogtow, poln.
λυγξ, griech.
59. Geschlecht. *Picus.*
1. *Martius.*
Pic-noir, französ.
Great-black Woodpecker,
 engl.
Pigoccio-nero, italien.
Kraaispecht, holländ.
Hackespett, dänisch.
Sort-Spaet; *Sort-Hak-
 ke-Spaet*; *Sort-Trae-
 Kloppe*; *Trae-Pikke*;
Lie-Hast, norweg.
Trillkräka; *Spillkräka*,
 schwed.
Toile, gotländ.
Tscherna, *Schouma*, krain.
Kärrik; *Pu-Kornstaga*,
 ehstn.
Dzieciol, poln.
2. *Principalis.*
Grand pic-noir à bec blanc,
 französ.
White-billed Woodpecker,
 engl.
Carpenteros, spanisch.
Corta-pao, portugies.
Quatotomomi, in Mexico.
4. *Lineatus.*
Ipecu, in Brasil.
9. *Auratus.*
Pic aux ailes dorées,
 französ.
Gold-winged Woodpecker,
 engl.
Ou-thee-quan-nor-ow,
 an der Hudsonsbay.
Hittot; *Pint*, bey den
 Schwed. in Amerik.
40. *Miniatus.*
Toekan, malaiisch.
12. *Viridis.*
Pic-verd, französ.
Woodspite; *Rainfowl*;
Highoe; *Hewhole*; *Green
 Woodpecker*, engl.
Pigoccio verde, ital.
Wedknarr; *Grönsplit*;
Gröngjoling, schwed.
Grönspekt, dänisch.
Zhiaina, lappisch.
Deten; *Detela*, krain.
Meltsas, ehstn.
Zolna, poln.

13. Bengalensis. β
Kerella, auf Zeilan.

17. Maior.
Epeiche ou pic varié,
 franzöf.

Great spotted Wood-
pecker, engl.

Cul-rosso, ital.

Grillenrenna, schwed.

Hakke - Spaet; *Trae-*

Spaet; *Trae-Klak*, dän.

Cobilar, krainisch.

Dfennis, lettisch.

Rähn, ehstn.

Toccadorza, in Sardin.

18. Medius.

Pic-varié, franzöf.

Middle spotted Wood-
pecker, engl.

Flag-Spaet, *Flack-Spär-*
re, dänisch.

Kraakspinte, norweg.

Zuhku, lettisch.

Räudrösa, ehstn.

19. Minor.

Petit Epeiche, franzöf.

Piannet, in Engl.

Pipra, in Ital.

Lille Trae-Pikke, nor-
 wegisch.

59. Geschlecht. *Sitta*.

1. Europaea.

Sitterelle; *Torchepot*,
 franzöf.

Percepot; *Chaussepot*, in
 der Normandie.

Grimpard; *Grimpant*, in
 der Picardie.

Macon; *Pic-macon*, in
 Lothringen.

Cendrille; *Dos-bleu*;

Pic-bleu; *Tape-bois*;

Beque-bois cendré; *Car-*

se-noix, in Iffoudun.

Planot, in Dauphiné.

Nuthatch; *Nutjobber*,
 engl.

Pico; *Picchio*, ital.

Nätväcka; *Natpacka*,
 schwed.

Spaet-Meyffe, dänisch.

Nat-Vakke; *Egde*; *Ere-*
mit, norweg.

Chlaen, in der Schweiz.

Picotella, in Catalon.

Agascakan, in der Tür-
 key.

Dzieciot modrawy, poln.

Barleß, krainisch.

Klener, in Oesterreich.

Raporino, in Ravenne.

Maloidjetet; *Sliepuschka*;

Butschock; *Polfyk*, in

Rußl. (nach Gmelin.)

Kököbyka, jakutisch.

Okudong, bey den arin-
 zischen Tataren.

Oetjülged, bey den Ostia-
 ken am Käs.

Schondokon, tunguf.

7. Carolinensis.
Unmisku = *Apethayhish*,
 an der Hudsonsbay?
8. Sinenfis.
Kou-kay-konn, in China.
60. Geschlecht. *Todus*.
- I. Viridis.
Perroquet de terre, auf
 St. Domingo.
- II. Paradiseus.
Wallubora, zeylanisch.
Waygehoë, *Wardioë*, auf
 den Papus-Inseln.
61. Geschlecht. *Alcedo*.
- I. Cristata.
Tohorkey; *Hito*, in Am-
 boina.
Vintsi, auf den Philip-
 pinen.
3. Ispida.
Martin-pecheur, französ.
Kingsfisher, engl.
Piombino, ital.
Tsvogel, holländ.
Puzzone di santu Marti-
nu, in Bosä.
Zimorodek, poln.
Ju-loang, in China.
7. Alcyon.
Kiskeman; *Kiskemarafus*,
 in Indien.
26. Cayennensis.
Taparara, in Guiana.
28. Tuta.
Erooro, in Otaheite.
9. Capensis.
Tye-tzoy, in China.
15. Galbula.
Venetore, bey den Ein-
 gebohrnen in Guiana.
Colibri des grands bois,
 bey den Creolen.
Jacamaciri, in Brasil.
63. Geschlecht. *Merops*.
- I. Apiaſter.
Guépier, französ.
Bee-eater, engl.
Graulo; *Ghiouaro*; *Lu-*
go dell' Api, ital.
Byeneeter, holländ.
Varuar, arab.
Schtschura; *Schtschurka*,
 an der Wolga.
Shaeghagho, um Yemen.
Maragan, bey den Cam-
 pidanesen.
Pardal de san jura, zu
 Algher.
Piana, *Apiolo*, an ver-
 schied. Orten in Sardin.
3. Aegyptius.
Chaddaejr, arab.
2. Congener.
Formique, in Spanien.
3. Superciliosus.
Putirich Tirich, in Ma-
 dagascar.

18. *Novae Seelandiae.*
Kogo; Poe - Vogel, in
Neu-Seeland.
64. *Geschlecht. Upupa.*
1. *Epops.*
Hupe; Puput, französ.
Upupa, latein.
Hoop; Hoopoe, engl.
Upuba, italien.
Harfugl, schwed.
Herfugl, dänisch.
Aerfugl, norweg.
Smerda Kaura; Smer-
duch, krainisch.
Badda Dsegguse; Pup-
pukis, lettisch.
Sittane räästas; Pähkla
öhk, ehstn.
Pupusa, in Sardin.
Dudek, poln.
Duchiphath, hebr.
65. *Geschlecht. Certhia.*
1. *Familiaris.*
Grimpereau, französ.
Creepër, engl.
Picchio, Piccolo, ital.
Krypare, schwed.
Trae-Pikker; Lichesten,
dänisch.
Bartniczëk, polnisch.
27. *Pacifica.*
Huhu, auf O-Waihi.
28. *Obscura.*
Akaiearua, auf O-Waihi?
29. *Coccinea.*
Eee-eve, auf den Sand-
wich-Inseln.
Hevro-taire, auf Atui.
34. *Sannio.*
Neghobarra, auf Köni-
gin Charlotten Sund.
38. *Cardinalis.*
Kuyameta, auf der Insel
Tanna.
39. *Carunculata.*
Fulehajuh, auf den
Freundsck. Inseln?
2. *Muraria.*
Grimpereau de muraille,
französ.
Echelette, zu Clairmont.
Ternier, zu Auvergne.
Pitschal, in Savoyen.
Pitschard, das. und bey
Neuchatel, in der
Schweitz.
Wallcreeper; Spider cat-
cher, engl.
Pico, Pichio, ital.
Dzieńtät murowy, poln.
Paxaco araneco, in Ar-
ragon.
25. *Latenia.*
Angala-Dian, auf Ma-
dagaskar.
66. *Geschlecht. Trochilus.*
Oiseau-mouche, französ.
Humming-bird, engl.

- Guianumbi*, in Brasil.
Aratica; Arataratagua-
cu, das.
Pegafrol, portugies.
Tomineios, in Spanien.
Quinti; Quinde, in Peru.
Huitzitzil; Hoitzitzil,
 in Mexico.
Ouiriffia, das. nach Nie-
 remb.
Vicicilin, in Gomara.
Guachichil, in Neuspa-
 nien.
 25. *Cyanurus*.
Tayanquitototl, in Neu-
 spanien.
 12. *Colubris*.
Ouiriffia; Guaracyaba;
Guaraeygaba; Huitzit-
zil; Vicililin, bey ver-
 schiedenen americ. Na-
 tionen.
 67. *Geflecht. Anas*.
 1. *Cygnus*.
Cygne, französ.
Swan; Elk, engl.
Cino; Cigno, ital.
Cisne, span.
Svane, dänisch.
Svane, norweg.
Oelbs; Elbs, in der
 Schweiz.
Gulbis, lettisch.
Lük, ehstn.
Labec, poln.
Labod, krainisch.
Kukvos, griech.
 54. *Hyperborea*.
Oie de neige, französ.
Snow Goose, engl.
Bjeloi gus, russisch.
Trung-Chaß, jakutisch.
Ungula-Choteng, bey
 den obdonischen Ostia-
 ken.
 4. *Tadorna*.
Tadorne, französ.
Sheldrake; Bourrough
Duck, engl.
Jugås, schwed.
Grav-Gaas; Brand-
Gaas; Grav-Drage,
 dänisch.
Ring-Gaas; Urgaas;
Fager-Gaas, Röd-
Baelle, norweg.
Avekong, in Island.
Hav-Simmer, auf den
 Feroë-Inseln.
It-alla-kasß, bey den
 Baschkiren.
 5. *Spectabilis*.
Canard à tête grise, fran-
 zösisch.
Grey-headed Duck; King-
Duck, engl.
Soë-Orre; Hav-Orre,
 norweg.
Siorakitsok, grönländ.
 Kinga-

- Kingalik*, das Männchen. }
Kaiortok, } das } grön-
Arnau- } Weib- } länd,
iertuk, } chen. }
6. *Fufca*.
Double Macreuse; *grande Macreuse*, franzöf.
Great black Duck, engl.
Svart-Orre; *Svart-And*; *Sorte*, norweg.
Suaerta, schwed.
Glowienka, poln.
62. *Nilotica*.
Bah, arabisch.
8. *Marila*.
Polsk - Edelmand, dä-
nisch.
9. *Anser*.
Jars, das Männch. }
Oie, das Weibch. } fran-
Oison, die Jungen, } zöf.
Goose, engl.
Grey-lag-goose, engl.
Ocha, das Männch. } ita-
Papera, die Jungen, } lien.
Ganso, span.
Gaas, dänisch.
Gaas, norweg.
Klinger - Gaas; *Graa-*
Gaas, die wilde. *ibid*.
Guneniki, in Kamt-
schatka.
Vilgiäs, in Island.
Meschafokß, lettisch.
- Laggel*, ehstn.
Laggias, ehstn. die klei-
nere Art.
Ges, die zahme }
Gans, } pol-
Dzika Ges, die } nisch.
wilde, }
Tlalacotl, in Mexico.
67. *Ruficollis*.
Tschagwoi, bey den
Ostiaken.
Tschagu, famojedisch.
Morskaja Kasarka, russ.
Tschakwoi Aßjuch, lap-
pisch.
Sunksur, bey den Kal-
mücken.
46. *Casarca*.
Krasnye Utki; *Karagat-*
ki, an der Wolga.
15. *Mollissima*.
Oie à duvet, franzöf.
Eiderduck; *Cuthbert-*
Duck, engl.
Eddergaas; *Ederfugl*,
dänisch.
Aerfugl, norweg.
Eider, *Ad*; *Ada*; *Gu-*
dunge, schwed.
St. Cuthberts - Ente, auf
einig. Schott. Inseln.
Aedar - Fugl; *Aedur.*
Fugl, in Island.
Edder - Aedder - Aeder.
Aer - Aee - Fugl, in ver-
schie-

- schiedenen nördlichen Gegenden.
Aes - Aesteig, im Dront-heimisch.
Aera, in Bohuslehn.
Colca, schottisch?
Aaeboer, auf Bornholm.
Mittek, grönk.
Arnaulik, das }
 Männchen, }
Arnauiak; *Sio-* }
rartok, das } grönl.
 Weibchen. }
Arnaulifak, ein }
 Junges. }
Eiderblicke; *Aerblick*,
 auf Feröe.
16. *Moschata*.
Muscovi - Duck; *Cairo-Duck*; *Guinea - Duck*;
Indian - Duck, engl.
Canard Franc, bey den Franzosen in Guiana.
Tureka Kaczka, poln.
Apeca Apoa; *Ipeca-guacu*, in Brasilien.
19. *Clypeata*.
Souchet, französ.
Shoveler, engl.
Krop - And; *Stock - And*;
Leffel - And, dänisch.
Taschenmaul, in der Schweiz.
Schaußl - Ente, im Oesterreichischen.
20. *Strepera*.
Chipeau, französ.
Godwall; *Gray*, engl.
Roep - Eend, holländ.
Knarand, dänisch.
23. *Clangula*.
Garrot, französ.
Golden - Eye, engl.
Quattr' Ochi, ital.
Hwin - And; *Blanke-Kniv*, dänisch.
Bruuns - Kop, dänisch.
Ring - Oie, norweg.
Knipa, Dopping, schwed.
Kertlutokpiarsuk, grönländisch.
26. *Glaucion*.
Morillon, französ.
Spoon bill'd Duck, engl.
Krekkop; *Dykker*, dänisch.
Brunnacke, schwed.
Capo-rosso, bey den Venetianern.
Ulluagolik, grönländ.
96. *Glocitans*.
Moklok; *Moklofchka*,
Klektunja, an der Lena.
27. *Penelope*.
Canard siffleur, französ.
Wheber; *Whiffling*;
Widgeon, engl.
Brunn-Nakke; *Blas - And*;
Graes - And; *Stiert - And*,
 dänisch.

Wriand,

- Wriand*, schwed.
Piula, in Catalonien.
28. *Acuta*.
Canard à longue queue,
 französ.
Cracker; *Sea-Pheasant*;
Pin-tail, engl.
Vinter-And, dänisch.
Ala, schwed.
Schilochwostka, russisch.
Tzitzihua, in Mexico.
29. *Hyemalis*.
30. *Glacialis*.
Canard à longue queue
d'Islande, französ.
Canard à longue queue
de terre neuve, französ.
Canard de Mitlon, franz.
Long-tailed Duck, engl.
Swallow-tailed Sheldrake,
 engl.
Gadisse; *Klaeshan*; *Un-*
gle; *Dykene*; *Angle-*
taske; *Troeforer*, dä-
 nisch.
Hav-Old; *Hav-Aeller*,
Ha-Alla; *Ha-Old*;
Havelda, norweg.
Haavella, isländ.
Aglek, grönländ.
31. *Ferina*.
Millouin, französ.
Pochard; *Poker*; *Great*
red-headed Wigeon, engl.
Brun-Nakke, dänisch.

- Röd-Nakke*; *Kiärnds-*
And, norweg.
Raudawa; *Raudewith*,
 lettisch.
32. *Querquedula*.
Sarcelle, französ.
Garganey, engl.
Kernell, bey Straßburg.
Krek-And; *Saur-And*,
 norweg.
Cercelle; *Cercerelle*; *Ale-*
brande; *Garfotte*; *Ha-*
lebran, in verschied.
 Provinzen Frankr.
Oert, isländ.
Prischke, lettisch.
Cyranka, poln.
33. *Crecca*.
Petite Sarcelle, französ.
Teal, engl.
Schyf Taling, holländ.
Krik-And, dänisch.
Atteling-And, cimbr.
Heste-Lort-And; *Krek-*
Aender; *Saur-Aender*,
 norweg.
Arta, schwed.
Kraecka, westbothn.
Cyranta, poln.
Pepatzka, in Mexico?
Aradone, in Sardin.
Crabedu, bey den Alghe-
 resen.
Kothantl; *Pfeiffantl*, im
 Oesterreichschen.

34. *Circia*.
Sarcelle d'Été, französ.
Summer-Teal, engl.
Prihkschke, lettisch.
35. *Histrionica*.
Canard à collier de terre
neuve, französisch.
Stone-Duck; *Harlequin-*
Duck; *Dusky and spot-*
ted Duck, engl.
Jan Pottagie Eend, hol-
ländisch.
Grav-And; *Straun-And*,
isländ.
Tornauiarsuk, grönländ.
113. *Domestica*.
40. *Boschas*.
Anas, latein.
Canard, französ.
Duck, engl.
Anatre, *Anitra*, ital.
Anade, span.
Aden, portugies.
Blaa-Hals; *Blaa-Nak-*
ke; *Blaakoll*; *Graes-And*;
Stock-And, norweg.
Anka, schwed.
Kaczka, poln.
Ratza, krainisch.
Stock-Ente, im Oester-
reichischen.
Bebe, indian.
Kaertlutok; *Kongmuta-*
jok, grönländ.
43. *Sponsa*.
Canard d'Été, französ.
Summer Duck, engl.
Tzatzonyayauhqui, in
Mexico.
118. *Rufina*.
Schmakowaja Utka, russ.
120. *Arabica*.
Scar-chir, arab.
121. *Alexandrina*.
Sau-Sarai, arab.
45. *Fuligula*.
Petit morillon, französ.
Tufted-Duck, engl.
Capo-negro, in Venedig.
Toppertje, holländ.
Trold-And, norweg.
Wigga, schwed.
68. *Geschlecht. Mergus*.
1. *Merganser*.
Harle, französ.
Goosander; *Dun Diver*;
Sparling-Fowl, engl.
Garganey; *Ganner*, ita-
lienisch.
Skalle-flugger, dä-
nisch.
Fisk-And; *Mort-And*;
norweg.

Skrake,

Skrake, das }
Männch. } schwed.
Skräkan, das }
Weibch. }
Wrakfogel, smoländ.
Gaura; *Gaigula*, lettisch.
Skiör; *And*; *Gul Önd*;
Geir-Fugl, isländ.
Krukmorski, poln.
Paikpiarsuk; *Pararsuk*,
grönländ.

3. *Serrator*.
Top-And; *Shraekke*, dän.
Vatus-Önd, isländ.
Pajk; *Nyaliksfak*, grönl.

5. *Albellus*.
Piette, französ.
Smew, engl.
Hvid-Side, dänisch.
Topp-Önd, isländ.
Monachetto, in Toscana.

69. Geschlecht. *Alca*.

4. *Arctica*.
Macareux, französ.
Puffin; *Pope*; *Coulter-*
neh; *Mullet*; *Gulden-*
head; *Bottlenose*; *Hele-*
gug, engl.
Pappegaaiduken, hol-
ländisch.
Lunde; *Soë-Papegöy*,
norweg.
Lund-Taeller, norweg.
die Jungen.

Praest, isländ.
Killengak, grönländ.

3. *Impennis*.
Grand Pingouin, franz.
Great-Auk, engl.
Angle-Mager; *Penquin*;
Brillefugl; *Flärt*, nor-
wegisch.
Geirfugl; *Goifugl*, is-
ländisch.
Isarokitfok, grönländ.

2. *Pica*.
Petit Pingouin, französ.
Black-billed Auk, engl.
Spidsnaebbet Alk, nor-
wegisch.
Akpa, grönländ.
Vuthamaria Calicatczu,
an den Küsten von Can-
dia.

1. *Torda*.
Pingouin, französ.
Auk, *Murre*; *Razor-bill*,
engl.
Klub-Alk; *Klympe*; nor-
wegisch.
Tord; *Tordmule*; schwe-
disch.
Klumbenefia, isländ.
Scout, schott.

9. *Psittacula*.
Inypilahelap, bey den
Koräten.
Chuichanetschkun, bey den
Itälmenen.

Heäa.

- Hekatschitschir*, bey den Kurilen.
10. *Cirrhata*.
Mytschagatka, am Bolschajareka.
Igilma, in Ochozk, und am penf hinischen Meerbusen.
Kytschuguigalli, bey den Koräten.
Tschelaata, am Kamtschatkaflusse.
Etubirga, bey den Kurilen.
5. *Alle*.
Petit guillemot, französ.
Little Auk, engl.
Soe-Konge; *Jacob*; *Soren-Jacob*; *Peer-Driker*; *Perdykker*; *Perjsper*; *Boesjaer*; *Borresjaer*; *Hys-Thomas*, norweg.
Rotteke, holländ.
Halkion; *Havdirdell*, isländisch.
Fulkop, auf den Feröe-Inseln.
Akpalliarfuk; *Akpalliarfungoak*; *Kaerrak*; *Ijarsoakale*, grönländ.
70. Geschlecht. *Procellaria*.
1. *Pelagica*.
Petrel, französ.
Storm-finch, engl.
- Soren-Peder*; *St. Peders-Fugl*; *Vestervinds-Are*; *Sondenvinds-Fugl*, *Uveyrs-Fugl*; norweg. *Stormvaders - Fogel*, schwed.
Strunkvit, auf den Feröe Inseln.
3. *Glacialis*.
Fulmar; *Petrel Puffin gris blanc*, französ.
Haffhert; *Seahorse*, engl.
Skraap; *Liere*; *Skrabe*, norweg.
Kakordlungnak, grönl.
72. Geschlecht. *Pelecanus*.
1. *Onocrotalus*.
Pelican, französ.
Pelecan, engl.
Grotto, *Agrotto*, ital.
Wattadragaren, schwed.
Livane; *Libane*, in Brabant.
Kruk-wodny, poln.
Baba, russisch.
Kik; *Hakik*, hebr.
Chatta, chald.
Ahdjirbu, arab.
2. *Aquilus*.
Tailleur, französ.
Man of war bird, engl.
Rabihorcado, span.
Raboforcado, portugiesisch.
3. *Carbo*.

3. Carbo.

Cormoran, franzöf.

Cormoran, engl.

Crot Pefcherot, in Burgund.

Skarv; *Strand - Ravn*, norweg.

Skrie - Skarv, norweg. (Müll.)

Bettlaar; *Hviidlaaring*; *Blik - Skarv*, norw. isl. (Brünn.)

Hopling; *Student*, auf Feroe. (Brünn.)

Hafs - Tjader, schwed.

Okaitfok, grönländ.

Okaitfoak, *Kidlingaejouk*, grönl. ein Junges.

4. Graculus.

Shag, engl.

Aalekrage, dänisch.

Skarv, *Fiskeren*, norweg.

Sma; *Skarfur*, isländ.

Chracholec, poln.

5. Bassanus.

Fou de Bassan, franzöf.

Soland Goose, engl.

Hav - Sule; *Tosse - fugl*;

Jan van Gent, norweg.

Sula, isländ.

Kuksuk, grönländ.?

75. Geschlecht. Colymbus.

1. Grylle.

Petit guillemot noir, franzöf.

Kajaver; *Cajor*; *Groenland - Dove*; *Sea - turtle*; *Black - guillemot*, engl.

Teiste, norweg.

Silde - Perris, norweg. ein Junges.

Triska, schwed.

Zhiaelkes, lappisch.

Serbak; *Sarpak*; grönl.

2. Troile.

Guillemot, franzöf.

Guillemot, *Toolish Guillemot*; *Sea - Hen*, engl.

Aalge; dänisch.

Lomvie; *Lomgivie*, *Langvine*; *Lumbe*, norweg.

Doppan, lappisch.

Tuglok, grönländ.

3. Septentrionalis.

Plongeon à gorge rouge, franzöf.

Red-throated Loon, engl.

Loom, dänisch.

Loom, *Lumme*, norweg.

Gakkor; *Gakatte*, lappisch.

Liomen, auf Feroe.

4. Arcticus.

Plongeon à gorge noire, franzöf.

Speckled Loon; *Black throated Diver*, engl.

Hymber, *Imber*; *Ember*, norweg.

Kakkar.

- Kakkardaja*, ehstn.
Lom, schwed.
5. *Glacialis*.
Grand plongeon tacheté;
Imbrim; franzöf.
Greatest speckled Diver;
Northern Diver, engl.
Hav - Hymber; norweg.
Vas Hymber, Halsbaan-
det *Lom*; *Brusen*; *Hym-*
brine? isländ.
Tudlik; grönländ.
6. *Immer*.
Grand-plongeon, franzöf.
Embergoose; *Imber*, engl.
Hav - Immer; *Lom Im-*
ber; *Ember - Gaas*; *Om-*
mer; *Morte ferie*, nor-
wegisch.
Efarokitsok, grönländ.
7. *Cristatus*.
Grebe, *Grebe huppé*,
franzöf.
Crested Grebe; *Nasse*,
engl.
Jurar, ital.
Sperga, venet.
Foet, *Füüt*, holländ.
Topped - Havskiaerre;
Halskraved Dykker;
Top Skero, norweg.
Sef - Ond, isländ.
8. *Auritus*.
Petit Grebe huppé, fran-
zöfisch.
- Eared Dobchick*; *Eared*
Grebe, engl.
Söe - Höne, dänisch.
Söe - Horre; *Sav - Orre*,
norweg.
Flaue - Flit, isländ.
19. *Cornutus*.
Skeep, an der Hudsons b.
Water - Witch, in Neu-
york.
76. *Geschlecht. Larus*.
1. *Rissa*.
Lille - Soloet, dänisch.
Ritsa, norweg.
Skegla, *Ritar*, isländ.
Tattarak, grönländ.
2. *Tridactylus*.
Krykie, norweg.
Skierro, isländ.?
Tattarok, grönländ.?
Kihris, lettisch.
Kowit; *Kallakul*, ehstn.
Ribitw; *Trzonek*; poln.
14. *Eburneus*.
Mouette blanche, franzöf.
Ivory Gull, engl.
Nayauarsuk, grönländ.
3. *Canus*.
Graa - Nakke, dänisch.
Hvidmaase, norweg.
Mäse; *Fiskmäse*, schwe-
disch.
Straule, lappisch.
Gaßke, finnm.

- Trzonek mniefry*, poln.
Karfaak, grönland.
6. *Marinus*.
Goeland noir, franzöf.
Black-backed Gull, engl.
Svart Bag; *Blaamaage*, dänisch.
Hav-Maase, norweg.
Hafstrut; *Svarttrut*, schwed.
Gairo, lappisch.
Nayardluk; *Nayardlurk-soak*, grönland.
7. *Fuscus*.
Goeland à manteau gris-brun, franzöf.
Herring Gull, engl.
Sild-Maage, dänisch.
Gullfötting; *Egmor*, norweg.
Mäs, schwed.
Veyda-Bialla, isländ.
Soe-Unge; *Skurre*; *Granafur*, isl. ein Junges.
8. *Glaucus*.
Goeland tendré, franzöf.
Glaucous Gull, engl.
Perlemaage, dänisch.
Dalvek, lappisch.
Naya; *Nayavek*; *Nayainak*; *Pukteralik*, grönländisch.
9. *Ridibundus*.
Mouette rieufe à pattes rouges, franzöf.
- II. Band II. Th.
- Black-headed Gull*;
Brown-headed Gull; *Petit black Cap*, or *Sea Crow*, engl.
Kurlik, ehstn.
10. *Parasiticus*.
Labbe à longue queue, franzöf.
Arctic Bird; *arctic Gull*, engl.
Struuntjager; *Tya-jo*;
Jo-Tyv; *Kive*; *Maase-fat*; *Maase-Skid*;
Truen; *Levar-Jo*;
Spotte-Jo; *Jo-Bonde*;
Tusva; *Kiusva*, norwegisch.
Kioe, isländ.
Skajite; *Hasket*, lappisch.
Efungak; *Ilingak*; *Merriarsairfok*, grönland.
77. *Geschlecht. Sterna*.
2. *Hirundo*.
Grande hironde de mer, franzöf.
Sea-Swallow; *Great Tern*, common *Tern*; *Spurre*;
Skrage, engl.
Zeezwallow, holländ.
Taerne; *Krop-Kirre*, dänisch.
Haetting-Taerne; *Sand-Taerne*; *Tende-Löber*;
Tenne; *Tende*; *Sandtal*, norweg.
- Hhh Tarna.

- Tarna*, schwed.
Zhierrek, lappisch.
Therne; *Kriia*, isländ.
Makauka, krainisch.
Mackerell Gull, in Neu-
 engl.
Imerkoteilak, grönländ.
 3. *Nigra*.
Gachet, franzöf.
Glitter; *Sort - Kirre*, dä-
 nisch.
Söe - Svale; *Sort - Tärne*,
 norweg.
 78. *Geschlecht. Rynchops*.
 1. *Nigra*.
Bec - en - ciseau, franzöf.
Sea - Crow; *Cutwater*,
 engl.
Taya, indian.
Coddel Kauka; *Suenmoo-
 dra Cavky*, malabar.
 79. *Geschlecht. Phoeni-
 copterus*.
 1. *Ruber*.
Becharu, *Flamant*, fran-
 zöfisch.
Fenicottero, ital.
Feamenoo, span.
Mangone, in Sardin.
Gentarubia, zu Oristano.
 80. *Geschlecht. Platalea*.
 1. *Leucordia*.
Spatule, franzöf.
Pale; *Palette*; *Poche*;
Cueiller; *Truble*, an
 verschied. Ort. Frankr.
Spoon - bill, engl.
Beccaroveglia, ital.
Lepelgans; *Schoffelaar*,
 holländ.
Schuffel, dänisch.
Skoul, *Neb*; *Bred - Neb*,
 norweg.
Calpetra; *Kolpiza*, russ.
 81. *Geschlecht. Palamedea*.
 1. *Cornuta*.
Camouole, in Cayenne.
Anhima, in Brasil.
Horned Screamer, engl.
 2. *Cristata*.
Crested Screamer, engl.
Cariama, in Brasil.
 82. *Geschlecht. Mycteria*.
 1. *Americana*.
Touyouyou, in Cayenne.
Jabiru - guacu, in Brasil.
 84. *Geschlecht. Ardea*.
 4. *Grus*.
Grue, franzöf.
Crane, engl.
Gru, *Grua*, ital.
Grulla, *Gruz*, span.
Erua, portugies.
Kraanvogel, holländ.
Krye, in der Schweiz.
Trane, dänisch.
 Zoraw,

- Zoraw, poln.
 Trana, schwed.
 Gerzah, illyrisch.
 Gabilan, catalon.
 Dserwe, lettisch.
 Kung, ehstn.
 Scheriau, krainisch.
 Tseavos, griech.
 Hagur, hebr.
11. Gigantea.
 Ak-Turna, bey den
 Baschkiren.
 Keugolok, bey den sibir.
 Tataren.
 Sterchy, russisch.
7. Ciconia.
 Cicogne blanche, französ.
 White Stork, engl.
 Ovevaar, holländ.
 Stork, dänisch.
 Starks; Dsefe; Swehte-
 lis; Swehtsputus; Schi-
 guris, lettisch.
 Tonekung, ehstn.
 Bocian, poln.
 Sterchi, russ.
 Legled, türkisch.
 Bel-arje, in der Barba-
 rey.
 Chasidah, hebr.
 Zakid, arab.
8. Nigra.
 Cicogne noire; Cicogne
 brune, französ.
 Black-Stork, engl.
- Den Sorte Stork, dä-
 nisch.
 Sziaft, poln.
9. Nycticorax.
 Bihoreau, französ.
 Night-Heron, engl.
 Stepowron, poln.
12. b Cinerea.
 Heron, französ.
 Common Heron, engl.
 Airone; Aerone, ital.
 Fiske-Heyer; Skid-Hey-
 re; Skred-Heyre, dän.
 Heine, norweg.
 Haeger, schwed.
 Guorga, lappisch.
 Garnis; Gahrnis, let-
 tisch.
 Czapla, poln.
 Balakel, türkisch.
 Schalach, hebr.
 Bargach, arab.
21. Stellaris.
 Butor, französ.
 Bittern, engl.
 Trombatto; Tarabuso,
 italien.
 Galerand, in Bretagne.
 Butoor; Roerdomp, hol-
 ländisch.
 Hortyhel, in Bayern.
 Gazola, portugies.
 Rorardum, dänisch.
 Dumpis, lettisch.
 Merrehülp, ehstn.

- Bak; Bunk*, poln.
Gelve, türkisch.
Corvu ambidastri, in Sardinien.
Gangia, bey den Alghe-
 resen.
Buik, russisch.
85. Geschlecht. *Tantalus*.
1. Loculator.
*Grand Courlis d'Ameri-
 que*, französ.
Wood-Pelikan, engl.
Masfarino, portugies.
Nimmersatt, holländ.
Tacab Mife, persisch.
Curicaca, in Brasil.
2. Falcinellus.
Courlis verd, französ.
Scythe bill'd Heron, engl.
Ror-Drum, dänisch.
86. Geschlecht. *Scolopax*.
3. Arquata.
Corlis, Courlis, fran-
 zösisch.
Common Curlew, engl.
*Torquato; Arcase; Char-
 lot*, ital.
Hanikens, holländ.
Gruy, in der Schweiz.
Schrye, in Friesl.
Wallop, in Ostfriesl.
Caroli, milanesisch.
Heel-Spove; Regn-Spaar,
 dänisch.
- Lang-Neeh; Spue*, nor-
 wegisch.
Gusgastak, lappisch.
Grytan, poln.
4. Phaeopus.
Corlieu; petit Courlis,
 französ.
Whimbrel; Blaffer, engl.
Tarangalo, ital.
Girardello, milanef.
Mellem-Spoue, dänisch.
Gaasspon; Smaa-Spue;
Spoue, norweg.
Spoe, isländ.
Grytan maly, poln.
6. Rusticola.
Becasse, französ.
Wood-Cock, engl.
Accegia; Beccagia, ital.
Holz-Sneppe, dänisch.
Rutte; Blom-Rokke, nor-
 wegisch.
Schneffa, krainisch.
Pardwa; Stomka, poln.
Kikkuts, lettisch.
Poello-Tilder, ehln.
Pudda di matta, in Sar-
 dinien.
Cabone de murdego, im
 Campidanefischen.
Pudda de nudeja, außer-
 halb Campidano.
7. Gallinago.
Becassine, französ.
Snipe, engl.

- Pizzardella*, italien.
Steen-Sneppe; *Dobbelt-Sneppe*; *Hoffe-Giög*, dänisch.
Trolldrukke, *Mackergouk*; *Myre-Hest*; *Myre-Bock*; *Myr-Sneppe*; *Myr-Snippe*, norweg.
Mall-Snaeppe, schwed.
Perkohnkasse; *Perkohnuasis*; *Kikkukahsa*, lettisch.
Metskits; ehstn.
Kositz, krainisch.
Bekas, *Baranek*, poln.
Koza Baranek, poln.
Beccarin Reale, im Toscanischen.
Beccacino, in Sardin.
Myr-Skitt, isländ.
Mekastak, lappisch.
Siguktok, grönländ.
Felue, türkisch.
8. *Gallinula*.
Petite becassine, französ.
Gid; *Jacksnipe*; *Judcock*, engl.
Half-Schnepf, holländ.
Ror-Sneppe, dänisch.
Pokerl, krainisch.
Kulyk, poln.
10. *Glottis*.
Barge variée, französ.
Greenshank, engl.
Hoft-Fugl, norweg.
- Tschoket*, krainisch.
Leverfina, neapolit.
Pluiero, bolognes.
Girardel, milanef.
11. *Calidris*.
Chevalier aux pieds rouges, französ.
Redshank; *Poolsnipe*, engl.
Laxe Tite; *Lax Titing*, norweg.
Kurlyk ezerwonemi nogami, poln.
12. *Totanus*.
Corlieu, französ.
Spotted Snipe; *spotted Redshank*, engl.
Rodbeen, dänisch.
Quikketiöld; *Squaptiöld*; *Strand-Kiöld*; *Stilk*; *Skrig-Kiöld*; *Soelskin-Stöd*, norweg.
Stelkur, isländ.
Buvadak, lappisch.
87. *Geschlecht. Tringa*.
1. *Pugnax*.
Combattant; *Paon de mer*, französ.
Ruff, *Reeve*, engl.
Kemperken, holländ.
Staal-Sneppe; *Bruuskop-Sneppe*, dänisch.
Brus-Kop; *Bruus-Hane*, norweg.

- Brushane*, schwed.
Kolmnierzyk; Ptak-bitny,
 poln.
2. *Vanellus*.
Vanneau, franzöf.
Lapwing; Bastard Plover, engl.
Pavoncella, ital.
Dix-huit; Papechieu, an
 verschied. Ort. Frankr.
Vibe, dänisch.
Kybits, norweg.
Kehwahla, lettisch.
Kiwit; Sehmalis; Semale
Kiwitis, ehln.
Tschibes, russ.
Czayka, poln.
Lepera d'arzola, in Cam-
 pidano.
Gavi - Gavi, bey den
 Saffarefen.
4. *Interpres*.
Coulon - chaud, franzöf.
Turnstone; Sea Dotterel,
 engl.
Veydetite, dänisch.
Kutte Rutte, norweg.
5. *Striata*.
Chevalier rayé, franzöf.
Striated Sandpiper, engl.
Flöre; Strand - Elg; Flär
Plister, norwegisch?
Sarburfuk; Sarguarsuk,
Sirkfariarfungoak, grön-
 ländisch.
8. *Lobata*.
Smaellebot; Nordvest-
Fugl; Lita, Fisk-Lita,
 norweg.
Bieggush, lappisch.
Nelloumirfortok; Nellou-
mirfortungoak, grönl.
13. *Ocropus*.
Becaßeau; Cul - blanc,
 franzöf.
Green Sandpiper, engl.
Horse - Giög, dänisch.
Skodde-Fugl; Jord-Geed;
Mækker-Goux; Ros-
Gouge, norweg.
Culbianco, Gombettola;
Giarola, Pivinello;
 italien.
Pstry Kulyk, poln.
- ß. *Littorea*.
Chevalier varié, franzöf.
Shore Sandpiper, engl.
Strand-Bekkasin; Skode-
fole; Plougeller; Klov-
Mand; Taage - Hest,
 dänisch.
Laekiadudra, isländisch?
Knibgas, ehln.
14. *Hypoleucos*.
Guignette, franzöf.
Common Sandpiper, engl.
Lille - Myrstikkel; Lille
Becassin; Myr - eller;
Strand - Sneppe, nor-
 wegisch.

Virlen, bornholm.
Jäntilder; *Sopatil*, ehst-
 nisch.

88. Geschlecht. *Chara-*
drius.

I. *Hiaticula*.

Pluvier à collier, franz.
Sea-lark, engl.

Jaticula, ital.

Praeste - Krave; *Sand-*
Vrister, dänisch.

Strand - Piper; *Strand-*
Elg; *Sand - Rönne*;

Sand - Muling; *Sand-*
Sneppe, norweg.

Strand - Pipare, schwed.
Trulls, holländ.

Grylle, scan.

Sandloe, isländ.

Pago, lappisch.

Urineglia de riu, bey
 den Algheresen.

Ziriolu, bey den Orista-
 nesen.

Tukaguajok, grönländ.

Matuitui, in Brasil.

5. *Morinellus*.

Guignard, franzöf.

Dotterel, engl.

Pomerants-Fugl; *Citron-*
fugl, dänisch.

Pehrloe; *Bold Tiäd*;
mindre Akerloe, nor-

wegisch.

Lauhol; *Laf-Uhl*, lap-
 pisch.

6. *Apricarius*.

Pluvier doré à gorge
noire, franzöf.

Spotted Plover, *Alwar-*
grim Plover, engl.

Hieilo, dänisch.

Heyloe; *Brokfugl*; *My-*
reløe; *Akerla*, norwe-

gisch.

Ackerhoen, schwed.

Hjeile, cimbr.

Altwargrim, oeländ.

Myrpitta, smoländ.

Lo, isländ.

Bizhiutzh; *Huet*; *Huit*;

Hutti; *Huttich*, lap-
 pisch.

Kajorrovek; *Kajordlek*,
 grönländ.

Hawks - Eya, bey den
 Engl. an der Hudsons-
 bay.

89. Geschlecht. *Recurvi-*
rostra.

I. *Avocetta*.

Avocette, franzöf.

Scooping Avocetta, engl.

Beccastorta, ital.

Klyde; *Lau-Fugl*; *For-*
keert Regn Spove, dä-

nisch.

Filippa, im Oristanesi-
 schen.

90. Geschlecht. *Haematopus*.

1. Ostralegus.

Huitrier, franzöf.

Seapie, engl.

Oistercatcher, engl.

Strand-Skade, dänisch.

Kield; *Strand-Skur*; *Ronekalv*; *Sagan*; *Tiadur*; *Glib*; *Tield*, norweg.

Strand-Skjura, öländ.

Marspitt, gothländ.

Tiälderew, isländ.

Sagan, lappisch.

91. Geschlecht. *Fulica*.

4. Chloropus.

Poule d'eau, franzöf.

Common Water-Hen;

More-Hen, engl.

Porzanone, ital.

Vandhöne, dänisch.

Pudda da'ba, in Sardin.

Giaddina d'eva, in Saffari.

Puglietta, zu Algher.

2. Atr.

Foulque, *Morelle*, franzöfisch.

Coot, engl.

Fulaga, Polon, ital.

Blis-Höne; *Fas-And*;

Vard-Höne; *Rör-Höne*;

Bondelöber, dänisch.

Bläs-klacka, schwed.

Meer-Coot, holländ.

Lyska, poln.

Puliga, in Sardin.

Flusteres, in Carolina.

(Lawf.)

92. Geschlecht. *Parra*.

3. Jacana.

Tohualquachitti, in Mexico.

11. Brasilienfis.

Aguapecata, in Brasil.

93. Geschlecht. *Rallus*.

1. Crex.

Rale de genet; *Roi des cailles*, franzöf.

Rail; *Daker-hen*, engl.

Re di quaglia, ital.

Kwartel Koning, holländ.

Skov-Snarre, dänisch.

Akerrixe; *Ager-Hone*, norweg.

Kornknarren, schwed.

Corn-Crek, schottl.

Rostz, krainisch.

Keczan-Derkacz, poln.

2. Aquaticus.

Rale d'eau, franzöf.

Water-rail; *Bilcock*;

Brook-ouzel, engl.

Galla Mareza, span.

Water-Rall, holländ.

Vagtet Konge, dänisch.

Strand-

Strand-Snarre; Strand-Rixe; Vand-Rixe; Vand-Höne; Vand-Vachtel, norweg.

Jord-Koene, feroens.
Puddighina de Malta, in Sardin.

3. Porzana.

Marouette; petit rale d'eau, französ.

Girardin; spotted Gallinule, engl.

12. Crepitans.

Meadow Clapper, in Neuyork.

95. Geschlecht. Otis.

1. Tarda.

Outarde, französ.

Bustard, engl.

Ostarde; Houtarde; Bistarde, alt französ.

Starda, ital.

Trapp, schwed.

Sigha, lettisch.

Tuzok, ungarisch.

Gustarde, schottisch.

Drop; Trop, poln.

Drofa, illyr.

Отис; Отиs; Оутиs, griech.

Alhabari, hebr.

3. Tetrax.

Petite Outarde; Canapetiero, französ.

Field-Duck; little Bustard, engl.

Gallina pratajuola, Fasarella, ital.

Pudda campina, in Sardinien.

Giaddinu di campu, zu Sassari.

Pittara; Pidroschia, zu Oristano.

96. Geschlecht. Struthio.

1. Camelus.

Autruche, französ.

Ostrich; Ostridge, engl.

Struzza, ital.

Vagel-Struis, holländ.

Avestruß, span.

Ema; Ema di Gei, portugiesisch.

Jacuah, hebr.

Namitha, chald.

Neahma; Thär ed Sjam-mel, arab.

2. Casuarius.

Casoar, französ.

Casuel, Gasuel, alt französisch.

Cassawar; Cassowary, engl.

Kasuavis, holländ.

Eme; Emeu, in Indien.

3. Rhea.

Nhanda-Guacu, in Brasilien.

Thouyouyou, in Guiana.
Yardu; *Yandu*; *Andu*,
 in Indien.

Sallian, auf d. Inf. Ma-
 ragnan.

Suri, in Chili.

97. Geschlecht. *Didus*.

I. Ineptus.

Dronte, französ.

Hooded Dodo, engl.

Dod-aars; *Walghvogel*,
 holländ.

98. Geschlecht. *Pavo*.

I. Cristatus.

Paon, französ.

Peacock, engl.

Pavone, ital.

Pavon, span.

Päfogel, schwed.

Paaue, holländ.

Pau, krainisch.

Paw, poln.

Tuchim, hebr.

Cavaz, chald.

Tauza, fyrisch.

99. Geschlecht. *Meleagris*.

I. Gallopavo.

Dindon; *Coq d'Inde*,
 französ.

Turkey, engl.

Gallo d'India, ital.

Pavon de las Indias,
 span.

Indiot; *Gall d'Indi*, in
 Catalonien.

Indiyk, poln.

Ondettutaques, bey den
 Wilden in Canada.

Arynamussu, am Missi-
 sippi, und in Brasilien.

Huexototl, das }
 Männch. } in Me-
Cihuatotolin, das } xico.
 Weibch. }

100. Geschlecht. *Crax*.

I. Alektor.

Hocco de la Guiane, fran-
 zösisch.

Crested Curassow; *Pea-
 cock Pheasant of Guiana*,
 engl.

Ano, in Afrika.

Mitu-poranga, in West-
 indien.

Tepetototl, in Mexico.

Quirizai, in Jamaica.

101. Geschlecht. *Phasianus*.

I. Gallus.

Coq; *Poule*, französ.

Cock, engl.

Gallo, ital.

Gallo, span.

Gol, *Gog*, alt französ.

Gau; *Geau*, savoyard.

Haan, *Hoen*, holländ.

Hane, dänisch.

Hoens; *Tupt*, schwed.

Petel;

- Petel*; Kokusch, krain.
Kokosz, poln.
Achau, in Chili.
Sikvi; *Sakvia*, hebr.
3. Colchicus.
Faisan, *Faisante*; *Faisanne*; *Faise*; *Faisanteaux*; *Faisanneaux*; *Faiseau*, franzöf.
Phasianus, latein.
Pheasant, engl.
Fagiano, ital.
Faisan, span.
Fazant, holländ.
Fazyan; *Bazant*, poln.
Surglum; *Suglum*, türkisch.
Thi-Khi, chines.
Thifionis, rabbin.
Madsharskoy; *Petuschok*, am Kumassus.
102. Geschlecht. *Numida*.
1. Meleagris.
Peintade, franzöf.
Guinea-Hen; *Pintado*, engl.
Gallina di Numidia, ital.
Quetele, in Congo.
Acangues, in Madagascar.
103. Geschlecht. *Tetrao*.
1. Urogallus.
Coq de bruyere, französisch.
- Coq de Limoges*; *Coq de bois*; *Faisan bruyant*, in einigen französischen Provinzen.
Cock of the Wood; *Mountain*, engl.
Gallo cedrone, ital.
Norsk-Kalkan, dänisch.
Tiur; *Tödder*; *Teer*, norweg.
Kjäder, schwed.
Devi Pitele, krainisch.
Meddens, *Medmis*, lettisch.
Metsis, ehstn.
Möttus, im Pernauischen.
Tetrez, slawon.
Stolzo, bey den Graubündern.
Ziufzhia, lappisch.
Dukiphat, hebr.
7. Phasianellus.
Long-tailed Grouse; *Sharp-tailed Grouse*, engl.
Au-Kuskow, an der Hudsonsabay.
2. Tetrix.
Petit Tétrás, *Coq de bruyere à queue fourchue*, franzöf.
Black Cock; *Black Game*; *Black Grouse*, engl.
Sforzello, ital.
Urhane, dänisch.
Aarfugl;

- Aarfugl; Aerefugl; Orhane; Orhöne*, norweg.
Orne, schwed.
Birkhaan, holländ.
Orrar, lappisch.
Rubbens; Tetteris; Tettera mahte, lettisch.
Tedder, ehstn.
Dziki Kur; Czietzew, poln.
 4. *Lagopus*.
Gelinote blanche; Lagopede, franzöf.
Francoline blanche; Arbenne; Poule de neige, an verschiedenen Orten Frankr.
White Game; Ptarmigan, engl.
Daina; Gallina bianca, ital.
Rype; Field-Skov-Lie-Snee-Rype; Hareford, norweg.
Snöripa, schwed.
Cheruna, Riensak; Giron, lappisch.
Riupa, isländ.
Rebalino, bey den Graubünd.
So; Tuddokanna, ehstn.
Akeiksek; Kawio, grönl.
 9. *Bonasia*.
Gelinote, franzöf.
Hazel Grouse, engl.
- Hierpe; Hiärpe*, schwedisch.
Podlesk, krainisch.
Laukuirbe; Kurrata, lettisch.
Pöldpii, ehstn.
Jarzabek, poln.
Jabantan, türk.
 11. *Alchata*.
Ganga, fränzöf.
Perdrix de Damas, ou de Syrie, franzöf.
Partridge of Damascus; little pin-tailed Grouse, engl.
Ganga, span.
Cata, Kata, türk.
Kitaviah, in der Barbarey.
 12. *Rufus*.
Bartavelle, Perdrix de Grèce, franzöf.
Greek Partridge; Great red Partridge, engl.
Sterna montana, ital.
Acker-hoena, schwed.
Cottorna, krainisch.
Cabugi, Cubugi, arab.
 13. *Perdix*.
Perdrix grise, franzöf.
Common Partridge, engl.
Perdice, ital.
Perdez, span.
Agerhöne, dänisch.
Raphöne, norweg.

- Rapp-hoena*, schwed.
Laukuirbe, Kurrata, lettisch.
Pöldpii, ehstn.
Jerehitza, krainisch.
Kuro-patwa, poln.
Kore, hebr.
36. *Perlatus*.
Tche-con, in China.
20. *Coturnix*.
Caille, französ.
Quail, engl.
Quaglia, ital.
Cuaderviz; *Quaderviz*, span.
Vagtel, dänisch.
Wachtel, schwed.
Kwakkel; *Kwartel*, holländisch.
Perpelitza, krainisch.
Greesa; *Paipola*, lettisch.
Putspassarat, ehstn.
Przepiorka, poln.
Quakkel, flandr.
Circuri, im Campidane-fischen.
Trespodres, im Capo di Sopra.
’Ogruž, griech.
Shelav, hebr.
Katta, arab.
Moregzag, pers.
104. Geschlecht. *Columba*.
1. *Oenas*.
2. *Domestica*.
Pigeon, französ.
Dove, engl.
Colombo, ital.
Paloma, span.
Doffer, holländ.
Dufica, schwed.
Golob, krainisch.
Mescha Balloschi, lettisch.
Metstuike, ehstn.
Gahlah, poln.
Jon, *Jonah*, hebr.
Kaphtar, pers.
Aetakeha, arab.
Jugargen, türk.
8. *Hispanica*.
Pigeon-romain, französ.
Runt-Pigeon, engl.
Tronfo, *Asturnellato*, italien.
8. *Dasytus*.
Pigeon-pattu, französ.
Rough footed Dove, engl.
Colombo co’ piedi pennati, italien.
Ruigpooten, holländ.
19. *Palumbus*.
Pigeon-ramier, französ.
Ring-Pigeon; *Ring-Dove*, engl.
Columbo torquato; *Columbo favoro*; *Colombaccio*, ital.
Paloma torcatz, span.
Mauséan,

- Manseau*, brabant.
Ring-duif, holländ.
Krieff-Dove, flandr.
Ringel-Due, dänisch.
Ring-Dufwa, schwed.
Siutut, oeländ.
Skude, bornholm.
Cushat, im nördl. Theil
 von Engl.
Palombe, zu Perigord.
Mausard, in der Picar-
 die.
Grzywacz, poln.
Griunik, krainisch.
32. *Turtur*.
Tourterelle, französ.
Turtle, *Turtle Dove*,
 engl.
Tortora, *Tortorella*, ital.
Tortola, span.
Tortel-duif, holländ.
Turtur-Dufwa, schwed.
Trakawke, poln.
Τούρτιος, griech.
Tor, hebr.
Tetaru, pers.
34. *Passerina*.
Petite tourterelle de S.
Domingue, ou de Mar-
tinique, französ.
Ground Dove; *Ground*
Pigeon, engl.
Least Barbados Turtle,
 engl.
Mosch-Duijge, holländ.
- Cocotli*; *Cocotzin*, in Me-
 xico.
Picuipinima, in Brasil.
35. *Minuta*.
Tlapalcocotli, in Mexico.
105. *Geschlecht. Alauda*.
1. *Arvensis*.
Alouette, französ.
Louette, *Alavette*; *Layet-*
te, in Guienne.
Mauviette, zu Paris.
Field-lark; *Sky-lark*,
 engl.
Lodola, *Lodola campe-*
stre non capellata, ital.
Lurlen, bey Bale.
Sang-larke, dänisch.
Lärka, schwed.
Cugniada, span.
Ziluhri, lettisch.
Lerke, ehstn.
Lauditza, krainisch.
Skowronek, poln.
Skrzwan, illyr.
Uanseta, in Catalon.
Shaworonek, russisch.
Butschumur, tungus.
Alaud, celtisch.
Calandra, zu Sassari.
Pispanti, bey den Cam-
 pidanesen.
Kunbar; *Kombara*, arab.
2. *Pratensis*.
Farlouse, französ.
Titlark, engl.
- Spipola*,

- Spipola*, *Calandrino*;
Scorzetta, ital.
Rulifar, *Zekkuli*, lettisch.
3. *Arborea*.
Cujelier; *Alouette de bois*,
 französ.
Cochelivier; *Cochelirieu*;
Pienu; *Fluteux*; *Alouette*
fluteuse; *Lutheux*;
Turlut; *Turlitoir*; *Mu-*
ssette; *Trelus cotrelus*,
 an verschiedenen Orten
 Frankreichs.
Pirouat, in einigen Ge-
 genden von Bourgogne.
Coutrieux, in Saintonge.
Alouette calandre, in
 Nantes.
Tottovilla, ital.
Skow-larke; *Heede-larke*;
Lyng-larke, dänisch.
Zippa, krainisch.
Dzierlatka, poln.
Accucadita, in Sardin.
Mattolina, toskanisch?
4. *Campestris*.
Spipolette, französ.
Meadow Lark, engl.
Mark lerke, dänisch.
Zdzoto, poln.
Kurbukon, tungus.
- β. *Spinoletta*.
Pisipoletta, in Sardin.
Piuli, hin und wieder
 in Sardinien.
- Quina*, italien.
Mala zippa, krainisch.
6. *Cristata*.
Cochevis, französ.
Crested-Lark, engl.
Lodola capellata, ital.
Toplarke; *Veylaerke*,
 dänisch.
Alouette duppée, in So-
 logne.
Verdange, in Perigord.
Zihrulis ar Zekkuli, lett.
Dzierlatka czubata, poln.
9. *Calandra*.
Grosse alouette; *Calan-*
dre, französ.
Calandre Lark, engl.
Calandra; *Chalandria*,
 ital. span.
Coulassade, in der Pro-
 vence.
Alouette de Bruyere, um
 Orleans.
Corydalos, in Venedig.
10. *Alpestris*.
Hauffe col-noir; *Alouette*
de Virginie, französ.
Shore Lark, engl.
Bisnoi-Shavronek, russ.
Chi-chup-pi-sue, an d.
 Hudsonsbay.
106. *Geschlecht. Sturnus*.
1. *Vulgaris*.
Etourneau, französ.
Eslour-

- Estournal*, perigord.
Tournel, in Guienne.
Stare, Sterling, engl.
Storno, ital.
Estorino, span.
Sturino, portugies.
Stornell, catalon.
Spreuve, in Flandern.
Staer, dänisch.
Star, norweg.
Stare, schwed.
Starl, krainisch.
Szpak; *Spatzek*; *Sspac-*
ziek; *Sharzek*, poln.
Skworez, russisch.
Buchoschir, burät.
Φαε, *Φαεος*, griech.
Sarsir, *Zezir*, hebr.
Alzarazir, arabisch.
5. *Cinclus*.
Merle d'eau, franzöf.
Water - Ouzel, engl.
Merla acquajuola, ital.
Fosse - Fald; *Fosse - Kald*; 2. *Pilaris*.
Quärn - Kald; *Strom-*
Stär; *Bakke - Fugl*; *El-*
ve - Konge, norweg.
Watnstare, schwed.
Povodni Kofß, krain.
Mirlu de riu, in Sardin.
107. *Geschlecht. Turdus*.
 1. *Viscivorus*.
Draine, franzöf.
Ciserre; *Jocasse*; *Joca-*
de; *Grive de brou*; *Gri-*
ve provençale; *Gillonie-*
re; *Trie*; *Trage*; *Truie*;
Treiche; *Traine*; *Tric-*
trac, in verschied. Pro-
 vinzen Frankreichs.
Missel-bird, *Shrite*; *Mis-*
sel Thrush, engl.
Tordo; *Tordo viscado*;
Tordella, ital.
Penyelheyn, alt britt.
Hautgrive, in Lothrin-
 gen.
Verquette, in Bugey.
Dobbelt Kramsfugl, dä-
 nisch.
Biörk - Trast, schwed.
Mattschinsch; *Matsnings*,
 lettisch.
Rääst; *Zobbose - Rääst*,
 ehstn.
Turdu suerinu, in Sar-
 dinien.
Geratauk, türkisch.
- Litorne*, *Tourdelle*, fran-
 zösisch.
Fieldfare, *Feldefare*,
 engl.
Cha - Cha; *Cla - Cla*;
Fia - Fia; *Tia - Tia*;
Cancoine; *Serre - mon-*
tagnarde, in verschied.
 franzöf. Provinzen.
Gardena; *Tordo mezza-*
no, ital.
Tordo; *Zorzol*, span.
Graae.

Graae . Trost; *Field-Trost*; *Norden-Vinds-Pipe*, norweg.

Kramsfogel, schwed.

Simmeren, auf Bornholm.

Snöskata, uppländ.

Reckholter; *Wechholter*, in der Schweiz.

Mellsstrads, lettisch.

Halvräif, ehstn.

Cased y ddryccia, alt brittisch.

Brinauka, krainisch.

Gluch - *jemiolucha*; *Drozd-Srzedni*; *Kwiczot*, poln.

Kwiczuela, illyr.

Drozd, russ.

Smortitu, in Sardin.

3. *Iliacus*.

Mauvis, französ.

Grive-montagnarde; *Gri-vette*; *Roselle*; *Grive-champenoise*; *Grive des Ardennoises*; *Grive de vendage*; *Tris*; *Siffleur*, an verschied. Ort. Frankreichs.

Boute-quelon, *Calandrote*, um Montbard.

Redwing; *Swinepipe*; *Wind-Thrush*, engl.

Tordo sassello, ital.

Malvis, span.

Tort-alaroity, catalon.

Can; *Quan*, in Brie.

Klera, finoländ.

Kladra, ostrogoth.

Tall-Trast, westmann.

Nat-Vaxe, norweg.

Veigezizatsh, lappisch.

Drozd-mniysy, poln.

Giraweckz, illyr.

4. *Musicus*.

Grive, französ.

Toudre; *petit Touard*;

Oiseau Dunetto; *Siselle*;

Vendangette; *Gri-vette*;

Mauviette, in verschied. französ. Provinzen.

Tordo mezzano, ital.

Zorzal, span.

Throstle; *Song-thrush*, engl.

Droßig; *Drosch*, krainisch.

Lauloräästas, ehstn.

Drozd, poln.

Ceilio brou fraith, in Wallis.

22. *Merula*.

Merle, französ.

Black-bird, *Amzell*, engl.

Merla, ital.

Mierla, span.

Melroa, portugies.

Lyster, holländ.

Sälsort, dänisch.

Sort - Trost; *Sol - Sort*,
norweg.

Traft; *Kohl - Traft*,
schwed.

Tr aderyndu; *Ceiliog*
mwyatch, alt brittisch.

Koß, krainisch.

Kos, poln.

Mußträäst, ehstn.

Tscheravi - Drost, russ.

Felveck; *Eelveck*, tür-
kisch.

23. *Torquatus*.

Merle à collier, }
Merle à plas- } *franzöf.*
tron blanc, }

Merle terrier; *Buiffon-*
nier, in einigen Gegen-
den Frankreichs.

Merle gris, }
Merle d'Es- } *um Or-*
pagne, } *leans.*
Merle de Sa- }
voye, }

Torcal noir, }

Ring - Ouzel, engl.

Ring - Drossel, dänisch.

Ring - Trost, norweg.

Gielavaelgo, lappisch.

108. *Geschlecht. Ampelis.*

1. *Garrulus*.

Jaseur de Boheme, franz.

Bohemian Chatterer; *Prib-*
chotterer; *Waxen chat-*
terer, engl.

Beccofrisone; *Galletto del*
bosco; *Vcello del mon-*
do novo, ital.

Siden - Svands, norweg.

Sidenfwanz, schwed.

Snetuppa, uppländ.

Skitteren, auf *Christia-*
naoe.

Brkostaw, böhmisch.

Sihdeast, lettisch.

Jedwabnicka, poln.

3. *Carnifex*.

Coyoltototl, in Mexico.

Arara; *Apira*, in der
goriponnischen Sprache
in Guiana.

Ouette, bey den Creolen.

109. *Geschlecht. Loxia.*

1. *Curvirostra*.

Bec - croisé, französ.

Crossbill; *Sheld - apple*,
engl.

Korsfugl, norweg.

Korsnaef; *Kiaegelvifare*,
schwed.

Gryllfingroes, alt britt.

Krzywonos, poln.

Selenoi - Klest, russ.

12. *Leucoptera*.

Afitchu Achaschich, an
der Hudsonsby.

2. *Coccothraustes*.

Gros - bec, französ.

Pinçon royal, in Maine.

Grosse.

Grosse-tête, in der Picardie.

Malouffe; *Amalouffe gate*; *Pinçon maillé*; *Ebourgeonneux*, in Sologne.

Casseragnon; *Casse-noix*; *Cassenoyaux*, in Champagne.

Gros-pinçon; *Pinçon d'Espagne*, in Saintonge.

Durbec, in Perigord.

Geai de bataille; *Coche-pierre*, in einigen Ort. Frankreichs.

Grosbeak; *Haefinch*, engl. *Frosone*; *Frisone*; *Grisone*; *Franquet del né*;

Franquet montano, ital.

Pinça mec; *Pinça rogné*, in Catalon.

Stenkneck, schwed.

Swirpis, lettisch.

Gylfinbratf, alt britt.

Dleschk, krainisch.

Picu-grossu, in Sardin.

Re d'alipinti, bey den Saffarefen.

3. Enucleator.

Dur-bec, französ.

Pine-Grosbeak; *Greatest Bulfinch*, engl.

Kirsebaer-Fugl, dän.

Norsk-Papegoy; *Nödde*.

Knekker; *Kierne-Bider*;

den guulhaerdede Dom-Oxe, norweg.

Tallbit; *Swänsk-Papaja*, schwed.

Natt-waka, westboth.

Ptakrayski, poln.

Wustanithow, an der Hudsonsabay.

4. Pyrrhula.

Bouvreuil, französ.

Bouvreux, *Bourgeonnier*; *Bouvrer*; *Bouvrier*, in Unter-Normandie.

Boeuf; *Pinçon maille*, in Sologne.

Choppard; *Grosse tête noir*, in Picardie.

Pive, in Provence.

Pivane, in Berry.

Pion; *Pione*, in Lothringen.

Pivoine, in Paris.

Pinçon d'Auvergne, in Saintogne.

Pinçon rouge; *Siffleur*;

Fluteur; *Groulard*;

Prêtre; *Perroquet de*

France; *Ecoffonneux*;

Ebourgeonneux; *Ros-*

signol moner; *Civiene*;

Tapon, in verschied.

französ. Provinzen.

Gimpl, krainisch.

Dompape, dänisch.

- Domherre; Blod-Finke*, 110. Geschlecht. *Emberiza.*
 norweg.
Domherre, schwed.
Rulfinch, engl.
Cifolotto; Monachino,
 italien.
Pilart, in Brabant.
Franquille - invernengk,
 in den Alpen.
Smilges; Shwapulis, let-
 tisch.
Popek, poln.
Blask, illyr.
16. *Malacca.*
Mungul, in Indien.
27. *Chloris.*
Verdier, französ.
Bruyan; Bruant; Verdun; Verdier; Verdereule; Verdere, in verschied. französ. Provinzen.
Greenfinch, engl.
Verdone, ital.
Verdelham, portugies.
Svenske, dänisch.
Swenska, schwed.
Verderol, catalon.
Schwonez, böhm.
Grindling, krainisch.
Dzwoniek; Konopka, polnisch.
Zeglolka, illyr.
77. *Asiatica.*
Lap-tzoy, in China.
1. *Nivalis.*
Ortolan de neige, französisch.
Snow Bunting, engl.
Sneekok; Vinter-Fugl,
 dänisch.
Snee-Fugl; Fiälster; Sneespurre; Snee-Titting; Soelskrigger, norwegisch.
Snösparf, schwed.
Alaipy, lappl.
Illwärsfogel, in Dalekarlien.
Hardvärsfogel, uppländisch.
Sino-Tyellingur; Soelskrikia; Tytlings-Blike, isländ.
Pulma; Pulmuinen; Lumipulmonen; Lumispulmonen, finnisch.
Sioelaerka, in Schonen.
Lumenpoinia, bey Abo.
Kopanaursak; Kopamungarsuk; Amauligakau-dit, grönland.
Sniegula; Sniczniczka, poln.
Podoroshink, russisch.
Mapathecusisch, an der Hudsonbay.
2. *Hyemalis.*
Ortolan Jacobin, französ.
Snow

Snow Bird; Black Bunting, engl.

Chuck-bird, bey den Amerikanern.

Snovogel, schwed.

3. *Miliaria*.

Proyer, französ.

Chic-perdrix, in Provence.

Tchi-pardrix, zu Montelimar.

Tettei, in Brie.

Tride-Prele, zu Lyon.

Verdiere des Prés, zu Lothringen.

Bunting, engl.

Strilozzo, ital.

Korn-Laerke, dänisch.

Knötter, norweg.

Predicatore, in Piemont.

Macottu; Orgiale, in Sardin.

4. *Hortulana*.

Ortolan, französ.

Hortolan; Jardinier, an verschied. Orten Frankr.

Benaris; Benarrie, in Languedoc.

Ortolan, engl.

Ortolano, ital.

Tordino, ital. (nach Salern.)

Ogrodniczek, poln.

5. *Citrinella*.

Bruant, französ.

Verdelat, in der Provence.

Verdat, in Sologne.

Verdale, in Languedoc.

Verdoie, in Poitou.

Verdange, in Perigord.

Binery, um Orleans.

Bardeant, in Guienne.

Verdier; Chic-jaune;

Vertmontant; Verdier

buissonnier; Verdin;

Verdon; Rousette, in

verschied. französ. Provinzen.

Yellow-hammer; Yellow

Bunting, engl.

Zivolo; Zigolo, ital.

Jasine, in Brabant.

Serrant, in Maine.

Gulspurv; Gulvesting, dänisch.

Skur, norweg.

Sternardt, krainisch.

Stehrsts, lettisch.

Trznadel, poln.

Sirnad, illyr.

Offänka, russ.

Altachan, burät.

II. *Cia*.

Bruant fou; Bruant des prés, französ.

Foolish Bunting, engl.

Cirlo matto, ital.

Chic-farnous, in Prov.

Pieux des Rochers, in Mantua.

Geel-Göfchen, in Pom-
mern.

Gluszek, poln.

III. Geschlecht. *Tanagra*.

1. *Jacapa*.

Bec d'argent, franzöf.

Red-breasted Blackbird,
engl.

Jacapu, in Brasil.

2. *Brasilia*.

Tye-piranga, in Brasil.

Chiltototl, in Mexico.

4. *Jacarina*.

Jacarini, in Brasil.

5. *Violacea*.

Teitei, *Guiranhemgeta*;

Guraundi; *Gurauthe*
engera, in Brasil.

15. *Brasiliensis*.

Turquin, franzöf.

Guira-genoia, in Brasil.

33. *Leucocephala*.

Quatotztli, in Brasil.

35. *Amboinensis*.

Calatti, in Amboina.

36. *Canora*.

Xihtototl, in Mexico.

III. Geschlecht. *Fringilla*.

I. *Lapponica*.

Grand montain; *Pinçon*
de montagne, franzöf.

Lapland Finch, engl.

Rouffolan, in Dauphiné?

Tecurmasishish, an der
Hudsonsbay.

Narksarmiutak, grönl.

3. *Caelebs*.

Pinçon, franzöf.

Pinçon commun; *Pin-*
gard; *Pinchard*; *Pin-*
chon; *Glaumet*; *Huit*;
Pichot; *Guignot*; *Ri-*
che-prieur, in verschied.
franzöf. Provinzen.

Chaffinch, engl.

Fringuello, ital.

Bog-Finke; *Bo-Finke*,
dänisch.

Finke; *Bofink*, schwed.

Penkewa, böhm.

Snow-fleck; *Shoul-fall*,
schott.

Pinça, catalon.

Schinkowitz, krainisch.

Schubbe, lettisch.

Metskask, ehstn.

Zieba, poln.

Pinkawa; *Pienkawa*, il-
lyrisch.

4. *Montifringilla*.

Pinçon d'Ardenne, fran-
zösisch.

Tioguat, in einigen Ge-
genden von Burgund.

Quinçon de montagne, in
Savoyen.

Ardennet, in Sologne.

Pichot

- Pichot montain; Pichot de mer; Ebourgeonneau; Pinson d'Artois*, in Orleans.
Rufes innocentes, nach Fontin.
Bramble; Brambling; Bramblefinch; Bierfinch; Mountainfinch, engl.
Fringuello montanino, italien.
Quaker; Bogfinkens Hoer- Unge; Akerlan, dän.
Norrquint, schwed.
Pinosch, krainisch.
7. *Carduelis*.
Chardonneret, franzöf.
Cardaline, in der Provence.
Cardelino, in Perigord.
Cardina; Chardonneret; Chardonneau; Chardrier, in Guienne.
Cadoreu, in der Picardie.
Golfinch; Thistlefinch, engl.
Cardello; Cardellino; Calderugio, ital.
Sirguerito; Siele colore; Forte pintacilgo, span.
Cardina, catalon.
Distelvink; Putter, holländisch.
Ziglis; Kammulis, lettisch.
- Tiglits*, ehstn.
Guas a Sierri Pancuryn, wall.
Sczygiel, poln.
Steglik, illyr.
16. *Citrinella*.
Citril Finch, engl.
Verzellino, um Rom.
Luguarinera, Beagana; Raverin, an einig. Ort. Italiens.
Gassarü, catalon.
Vidarino, im Bolognesischen.
Lequilla, zu Neapel.
Scarino, in Genua.
Citrinella, im Tridentinischen.
Citril, in Wien.
Sare, türkisch.
17. *Serinus*.
Serin, franzöf.
Serin; Scarzerin, in Ital.
Canari de Montanya, catalonisch.
Schwederle, in der Schweiz.
Grilitsch, krainisch.
23. *Canaria*.
Serin des Canaries, französisch.
Canary - Bird; Canary - Finch, engl.
Passera di Canaria, ital.
Kanarek; Kanary, poln.
25. *Spi-*

25. *Spinus*.*Tarin*, französ.*Lucre*, in der Provence.*Terin*; *Tirin*, an verschied. Orten Frankr.*Siskin*; *Aberdivine*, engl.*Lucarino*, ital.*Sifchen*, friesl.*Sisgen*; *Sisiken*, dänisch.*Siska*; *Gronfska*, schwed.*Zieschen*, livländ.*Zitskens*; *Kiwulis*, lettisch.*Paolind*, ehstn.*Saisl*, krainisch.*y Ddreiniog*, wall.*Cyz*, poln.*Czisz*, illyr.*Tschischk*, russisch.*Uthugan*, türkisch.28. *Canabina*.*Grande linotte de vignes*, französ.*Greater red-headed Linnet*; *Greater Redpoll*, engl.*Passerell vermell*, catalon.*Torrn - Irrisk*; *Sidse*.*Rönnicke*, dänisch.*Hämpling*, schwed.*Himpulinda*, *Hacotiden*, finnisch.*Sommerhämpling*, finnisch.*Kanepu - Putrini*, lettisch.*Wästrik*; *Linna Wästrik*, ehstn.*Makolagwa*, poln.*Konoplänka*, russ.29. *Linaria*.*Sixerin*, französ.*Lesser Redpole*; *Lesser red headed Linnet*, engl.*Stone Redpole*, um London.*Moirisk*; *Graa - Sifken*, dänisch.*Graefiska*, schwed.*Sisserönnike*, lappisch.*Dadsi*, lettisch.*Wastrick*, ehstn.*Tschetschotka*, russisch.*Urachon Trogoi*, burätisch.*Orpingmiutak*; *Anarak*; v. diminutive *Anarangoak*; *Nennamak*, grönländisch.70. *Angolensis*.*Tobaque, Negral*, das Männch. } nach
Benguelinha, das Weibch. } Edw.30. *Petronia*.*Sulcie*, französ.*Ring - Sparrow*, engl.*Passera alpestre*, ital.*Passerell dorat*, catalon.36. *Domestica*.*Moineau franc*, französ.
Passeron,

- Passeron*, in der Provence.
Passiere, in Saintonge.
Passerat, in Guienne.
Parat, in Languedoc.
Pierrot; *Moinet*, in der Picardie.
Pierrot, zu Paris.
Paisse; *Paissorelle*, in Nantes.
Grospillery; *Guillieri*, in der Normandie.
Houfe Sparrow, engl.
Passera domestica, ital.
Pardat, span.
Mosch, holländ.
Graa-Spuru, dänisch.
Huus-Spuru; *Huus-Kald*, norweg.
Grabetz, krainisch.
Swirlulis; *Swihpuris*, lettisch.
Warblane, ehstn.
Alderyng to, alt britt.
Curculeus, zu Campidano.
Furfuragiu, am obern Cap.
Biddiso, zu Saffari.
Wrobel domowey, poln.
Worabin, russisch.
Ziphur, hebr.
Azbar, arab.
37. *Montana*.
Friquet; *Moineau de montagne*, franzöf.
Tchouet, in Guienne.
- Passeron de muraille*, in Provence.
Paersfiere folle, in Saintonge.
Paisse de Saule, in Anjou.
Saulet, in Nantes.
Petrat, *Petra*, in Orleans.
Pardal royner, catalon.
Mountain Sparrow, engl.
Passera montanino, ital.
Skov-Spurre, dänisch.
Orkiaer, norweg.
Tolfän y mynydd, alt britt.
Wrobel gorny, poln.
39. *Crispa*.
Pinson frisé, franzöf.
Frizzled Finch, engl.
Beco de prata, portugies.
106. *Indica*.
Coltheirinho, portugies.
113. *Geschlecht. Muscicapa*.
14. *Olivacea*.
Whip-Torn-Kelly, in Jamaica.
80. *Atra*.
Phoeby bird; *Bee-eater*, in Neuyork.
81. *Noveboracensis*.
Small green hanging Bird, in Neuyork.

114. Geschlecht. *Motacilla*.1. *Luscinia*.*Rossignol*, französ.*Nightingale*, engl.*Russignuolo*, *Ussignuolo*,
italien.*Ruiffenot*, span.*Nachtegael*, holländ.*Nattergal*, dänisch.*Naecktergahl*, schwed.*Slaufz*, krainisch.*Lagsdigalla*, lettisch.*Oepitk*, ehstn.*Slowik-Wiekzy*, poln.*Slawick*, illyr.*Passarilante*, bey den
Iglefienfern.*Tachmas*, hebr.*Ranun*, arab.3. *Modularis*.*Traine-buisson*; *Mouchet*;*Fauvette d'hiver*, franz.*Passeron*, zu Marseille.*Gratte-paille*, in Brie.*Burette*, in Berry.*Burette*, *Brunette*, in
der Normandie.*Passe-Paisse buissonniere*,
in Anjou.*Passe-sourde*, in Perigord.*Tifit*, in Lorraine.*Grasset*; *Chic d'auvassé*,
in der Provence.*Passere matto*, in Bou-
logne.*Fauvette des haies*; *Pas-
se-buse*; *Rossignol d'hi-
ver*, in den nördlichen
französ. Provinzen.*Hedge-Sparrow*; *Hedge-
Warbler*, engl.*Passera Salvatica*, ital.*Graa-Irrisk*, dänisch.*Järnsparf*, schwed.6. *Curruca*.*Fauvette*, französ.*Fauvette babillarde*, fran-
zösisch.*Rabbing Warbler*, engl.*Beccafico canapino*, ital.*Graes-Smutte*, dänisch.*Kruka*, schwed.*Lagsdigallakalpas*, let-
tisch.*Potamida*, auf der Insel
Creta.*Cannevarola*, im Bo-
lognesischen.*Piegzia*, poln.*Pienige*, illyr.8. *Salicaria*.*Fauvette des roseaux*;
französ.*Sedge-Bird*, engl.*Wyderle*; *Zepste*, in der
Schweitz.*Wierzbowiozka*, poln.10. *Ficedula*.*Beccafique*, französ.*Beccafico*, ital.*Cyprias*;

Cyprias; *Uccelli di Cypro*, ital.

Vinette, in Bourgogne.

Beccafigua; *Papafigo*, catalon.

Figogadka, poln.

II. Alba.

Lavandiere, französ.

Walcerono, in der Provence.

Enguane-pastre; bey Montpellier.

Peringleo, in Guienne.

Batajasse, in Saintonge.

Battiquouë, in Gascogne.

Semeur, in der Picardie.

Bergeronette; *Vachette*, in Nantes.

Hoche-queue, in Lothringen.

Crosse-queue; *Branle-queue*, in Bourgogne.

Damette, in Bougey.

White Wagtail, engl.

Cutrettola del petto nero, ital.

Coda tremola; *Entretola*, ital.

Codinzingola; *Bouarina*, zu Rom.

Cutrettola, in Toscana.

Bellarina, in der Lombardey.

Aveloa, portugies.

Quick Stertz, flandr.

Vipstiert; *Havre-Fugl*; *Steen-Pikker*; *Rendesteens-Snager*, dänisch.

Erle; *Lin-Erle*; *Elle-Kongens-Datter*, norwegisch.

Mari-Erle, isländ.

Aerla; *Suedes-aerla*, schwed.

Woestraeckia, ostbothnisch.

Zeemala; *Zeelawa*, lettisch.

Hännelinne, ehstn.

Pliska Pastariza, krai-nisch.

Pliszka; *Trzefogonek biaty*, poln.

15. Oenanthe.

Cul-blanc; *Vitree*; *Motteux*, französ.

Trainee-charrue; *Garde-charrue*; *Tournematte*, in Sologne.

Trotte chemin, bey Romorentin.

Artile; *Arquille*; *Moterelle*, in Beauce.

Wheat-ear; *Fallow-Smith*; *White Tail*, engl.

Culo-bianco, ital.

Steen-dolp; *Steen-squette*; *Steen-Gylp*, dänisch.

Steens-

- Steensquetta*; *Steens-gwaetta*, schwed.
Steinde-Pill, isländ.
Bella, krainisch.
Fornarola; *Petragnola*, in den apenninischen Gebirg.
Kyssektak; *Kussektak*, grönländ.
 17. *Rubicola*.
Traquet, französ.
Piglia-moche, um Bo-logne.
Tracas, in Bourgogne.
Tourtrae, zu Semur.
Martelot, um Langue-doc.
Semetro, um Metz.
Stone-Smith; *Stone-chat-ter*; *Moor-Titling*, engl. (Raj. u. Will.)
Mortetter; *Black-berry-eater*; *Blac-cap*, engl. (Charleton.)
Barada, ital.
 18. *Atricapilla*.
Fauvette à tête noire, französ.
Testo-russo, das Weibch. in der Provence.
Black cap, engl.
Capinero; *Capinera*, *Caponegro*, ital.
Blask, in Böhmen,
Hav Skade; *Spikke*, *Brun-Skalle*, das Weibch. } dänisch.
Filomela, in Sardin.
Figoiadka, poln.
 33. *Caprata*.
Maria capra, auf der Insel Luçon,
 34. *Phoenicurus*.
Rosignol de muraille, französ.
Redstuart, engl.
Codirosso; *Corossolo*; *Re-verzal*, ital.
Culrosso, boulogn.
Wüßling, in Schlesien.
Blod-Fugl; *Blod-stiert*; *Röd-stiert*, dänisch.
Roedstjert, schwed.
Erizkins, lettisch.
Czerwony-agonok, pol-nisch.
 35. *Erithacus*.
Rouge-queue; *Rouge-queue à collier*, französ.
Red-tail; *Grey Red start*, engl.
Ohrmannisch, lettisch.
Czerwonorzytek, poln.
 45. *Rubecula*.
Rouge-gorge, französ.
Bosote,

Bosote, in Bourgogne.
Rubiette, in Anjou.
Rubienne, in Maine.
Beree, in der Normandie.
Ruche, in Sologne und Poitou.
Frilleuse; *Roupie*, in der Picardie.
Red-breast; *Robin Red-breast*; *Ruddok*, engl.
Peti-rosso, ital.
Pettusso; *Pechietto*, italienisch.
Thomas Gierdel, in Engl. (Penn.)
Petiroxo, portugies.
Pita-rotti, catalon.
Rothorftje, holländ.
Smarnza; *Taschitza*; *Taschtza*, krainisch.
Rod-Hals; *Röd-Kielke*; *Röd-Fuuke*; *Tommi-Liden*, dänisch.
Peter-Ronfmad, norwegisch.
Rotgel, schwed.
Gil, polnisch.
Czir-wenka; *Zer-wenka*, illyrisch.
Configliere, bey den Algheresen.
Occhio di bue, zu Oristano.
Frater Gavino, zu Sassari.

46. Troglodytes.

Roitelet, *Troglodyte*, französ.
Roi bedelet, in der Provence.
Roi bouti, in Saintonge.
Roi bery, in Sologne.
Quion - Quion, in Poitou.
Arrepit, in Guienne.
Rebetre, in der Normandie.
Berichon; *Roi bertaud*, in Anjou.
Ratillon; *Ratereau*; *Petit rat*, um Orleans.
Tourre-buiffon; *Roi de froidure*, in Bourgogne.
Wren, engl.
Reattino, ital.
Scricciolo, zu Toscana?
Re di Siepe; *Re di Macchia*, zu Rom?
Perchia chagria, in Sicilien?
Thomas i Giaerdet; *Nelle-Konge*; *Tomme-Liden*; *Gierd-Smutte*; dänisch.
Petermannsmad; *Muse-Broder*, norweg.
Stresch; *Stoerschek*, krainisch.

Strzyzyk;

- Strzyzyk; Watowe-oczko; Krol Myszy; Pokrzywka*, poln.
Bilbil, türkisch.
48. *Regulus*.
Roitelet; Roitelet hupé, franzöf.
Golden - crested - Wren; Capped - Wren, engl.
Fior - Rancio; Occhio-bovino, ital.
Capo d'ore, zu Verona.
Boarino della Stella, zu Geneve.
Papazzino, zu Bologne.
Koniinsken, flandr.
Sivigio, alt breton.
Fugle - Konge, dänisch.
Zeplihts, lettisch.
Tühahne, ehstn.
Kralitsch, krainisch.
Krolik - czubaty, polnisch.
Seroé, in der Turkey.
49. *Trochilus*.
Pouillot; Chantre; Chanteur, franzöf.
Reatin, boulon.
Fiß, in der Provence.
Fenerotet, in Bourgogne.
Tuit, in Lorraine.
Frelot; Frelotte; Fouillet; Toute - vive, in Sologne.
- Vetti - vetto; Totitolo*, in Orleans.
Fretillet, in Champagne.
Yellow Wren; green Wren, engl.
Xiuxerra, catalon.
Krolik nieczubati, polnisch.
116. Geschlecht. *Parus*.
 1. *Cristatus*.
Mésange huppée, franzöfisch.
Crested Titmouse, engl.
Top - Meise, dänisch.
Tofs - Myssa, schwed.
Meshatt, in Uppland.
Sikora czubata, polnisch.
3. *Maior*.
Grosse - mésange; Charbonniere, franzöf.
Bezenge; Serrurier, in Provence.
Mesfingle; Mersfingle, in Picardie.
Anderelle; Anderolle; Anderzelle, in Sologne.
Patron des Marechaux, das.
Cendrille, in Poitou.
Croque - abeille, in Bourbonne.
Serre - fine; Bargne; Crevechassis; Larderiche; Moineau

- Moineau de bois*; *Me-
sange brulée*, an ver-
schiedenen Orten Frank-
reichs.
Great Titmouse; *Ox-eye*,
engl.
Spernuzzola, ital.
Parifola domestica, ita-
lienisch.
Paruffola, in der Lom-
bardey.
Cincinpotola, in Tos-
cana.
Testa - nera, in Pie-
mont.
Majenze, in Savoyen.
Tschirnabo, in der Ge-
gend der Alpen.
Tintilaum, portugies.
Poligola, in Bologna.
Mese, in Brabant.
Een - Maes; *Coelmaes*,
holländ.
Musvit, dänisch.
Talg-Oxe; *Kiöd-Meise*,
norweg.
Snitza, krainisch.
Sihle, lettisch.
Sikorna, *Czarna wietka*,
poln.
Ala, in der Turkey.
- Petite cendrille bleue*, in
Berry.
Petite ardelle; *Arderolle
bleue*, in Sologne.
Serre fine à tête blanche,
in Provence.
Blue Titmouse, engl.
Parozolina, ital.
Milchemo, span.
Chamoris; *Alionire*; *Mil-
heiro*, in Spanien und
Portug.
Blaameise, dänisch.
Blamees, schwed.
Sihle; *Sneedse*, lettisch.
Blava Snitza; *Blauman-
ditz*, krainisch.
Sikora modra; *Bargiel*,
poln.
6. *Atricapillus*.
Kiß-Kiß-Keschisch, an
der Hudsonsb.
7. *Ater*.
Petite charbonniere, fran-
zösisch.
Colemoufe, engl.
Sikora czarna; *Mnieyssa*,
poln.
8. *Palustris*.
Mesange de marais; *Non-
nette cendrée*, franzö-
sisch.
Marsh Titmouse, engl.
Paron.
5. *Caeruleus*.
Mesange bleue, französ.
Paruffolin; *Rospedino*;
Fratino, in Bologne.

- Paronzino*, ital.
Craa-Meise; *Lille-Musvit*,
 dänisch.
Tete; *Hamp-Meis*, nor-
 wegisch.
Entita; *Tomlinge*, schwe-
 disch.
Aeschmeißle; *Kaatmeißle*,
 in der Schweiz.
Sikora - popielata, pol-
 nisch.
- II. *Caudatus*.
Mefange à longue queue,
 französ.
Perd sa queue, in Or-
 leans.
Queue de poilon, in Sain-
 togne.
Demoiselle, in Verdun.
Fourreau; *Gueule de four*,
 in Sologne.
Moiniet, *Moignet*, zu
 Montbard.
Dame; *Meuniere*; *Ma-
 terat*; *Monstre*, hin
 und wieder in Frank-
 reich.
Long - tailed Titmouse,
 engl.
Pulzonzino, ital.
Wintepthker, in Cöln.
Lappmesen, schwed.
Gaugarza, krainisch.
Sikora zdtugim ogonem,
 poln.
12. *Biarmicus*.
Monstacle, französ.
Bearded Titmouse, engl.
*Parosolino barbato delle
 paludi*, span.
Ußatsch, in Astrachan.
26. *Hudsonius*.
Peche - ke - ke - schisch, an
 der Hudsons b.
13. *Pendulinus*.
Mefange de Pologne,
 französ.
Penduline Titmouse, eng-
 lisch.
Pendulino, in Bologne.
Remez; *Remis*; *Remiz*;
Remezawpytak; *Re-
 micz*; *Remitsch*; *Re-
 misch*; *Romisch*, in Po-
 len.
29. *Narbonensis*.
Dabussaire, in Langue-
 doc.
117. *Geschlecht. Hirundo*.
 I. *Rustica*.
Hirondelle de cheminée,
 französ.
House - Swallow; *Chim-
 ney - Swallow*, engl.
Rondine; *Rondine mino-
 re*; *Rondinella*, *Rondo-
 la*, ital.

Forstu - Svale; *Mark-Svale*, dänisch.

Lade - Svale, norwegisch.

Ladu - Swala, schwedisch.

Laustaza, krainisch.

Besdeliga, lettisch.

Päfokenne, ehstn.

Rzecholka, poln.

2. Esculenta.

Salangane, französ.

Esculent Swallow, englisch.

Chim, im Orient.

Lawid, in Java.

Berondaya; *Waled*, bey den Bergjavanern.

Layong - Layong, in Sumatra.

Die Nester heißen

Nidi esculenti,
Nidi halcyonum,
Nidi edules, } latein.

Nids des Alcyons, französisch.

Vogelneftjes, holländ.

Saroi - būra, chinef.

Jenwa - Joniku, japan.

Suffu, javan.

Saron - baerong, malayisch.

3. Urbica.

Hirondelle de muraille;

Martinet à cul blanc;

II. Band II. Th.

Petit martinet, französisch.

Martin; *Martlet*; *Martinet*, engl.

Conca de moru, in Sardinien.

Balestruccio, in Toscana?

Bye - Svale; *Tag-Skiägs-Svale*; *Hvid - Svale*; *Rive*; *Skornsteens-svale*, dänisch.

Huus - Svale, norweg.

Hus - Swala, schwed.

Turts, ehstn.

Huda - urnik, krainisch.

Jaskotzka, poln.

4. Riparia.

Hirondelle de Rivage, französ.

Sand-martin; *Shore-bird*, engl.

Rondine riparia; *Drepone*, ital.

Dig - Svale; *Jord-Svale*; *Blint-Svale*; *Sol-Bakke*, dänisch.

Sand - Rönne; *Strand-Svale*; *Dig-Sulu*; *Sand-Sulu*, norweg.

Strand - Swala; *Back-Swala*, schwed.

Grzebielucha, poln.

6. Apus.

Martinet, französ.

Kkk

Black

Black Martin; *Swift*, 118. Geschlecht. *Caprimulgus*.
engl.

Rondone, ital.

Barbarottu, *Vargia*, in 1. *Europaeus*.
Sardin.

Martinet-grand; *Hiron-*
delle-grande; *Marte-*

let; *Moutardier*, an
verschied. Orten Frank-

reichs.
Steen - Swalm, hollän-

disch.
Steen - Kirke - Söe - Muur-
Swale, dänisch.

Ring-Svale; *Svart-Sulu*;

Field - Sulu, norwe-

gisch.
Ring - Swala, schwe-

disch.
Tschurkste, lettisch.

Jurz, poln.

Jerzyk, polnisch?

Engoulevert; *Tette-che-*
ure; *Crapaud-volant*,
französ.

Dorr - Hawk; *Night-*
Jarr; *Night - Hawk*;
Fern Owl; *Churn-Owl*;
Goatsucker, engl.

Cavaterra; *Tetta vache*;
Calcabotto; *Caprimul-*
go, ital.

Passa-litorta, in Sardin.

Aftenbakke; *Natravn*;
Nat Skade, dänisch.

Gedemalker, norweg.
Nattskräfva; *Nattskär-*
ra, schwed.

Quältnarren, smoländ.
Kozodoy, poln.

R e g i s t e r

nach den Seitenzahlen.

II. bedeutet den zweyten Theil. Die mit *Cursivschrift* gedruckten Wörter beziehen sich auf das Verzeichniß der ausländischen Synonymen, und die dabey stehende *erste* Zahl zeigt das *Geschlecht*, die *zweyte* die *Gattung* an.

A.

Aneboer 67. 15
 Aalekrage 72. 4
 Aalge 75. 1
 Aalscholwer 880
 Aarfugl. 103. 2
 Aasgeyer 6. 9. 11. 13
 Aaskrähe 350
 Aaskrac 50. 5
 Aasrabe 327
 ABC Kybitz 1091
 Abendfalk 122
 Aberdevine 112. 25
 Ablicke 50. 6
 Abou Douch'n 21
 Abou Hannes 1008
 Abuffaej. II. 618
 Acalchitli 410
 Acamacu 561
 Acangues 102. 1
 Acanthus II. 519
 Acatechili II. 521
 Acatechichitli II. 521
 Accegia 86. 6
 Achalalaetli 519
 Accipitres I. 109
 Accucadira 105. 3
 Acertello 42. 16
 Achau 101. 1
 Acitli 885
 Ack 50. 6
 Ackerdrossel II. 283

Ackerboen 88. 6
 Acker - Hoena 103. 12
 Ackerkrähe 348
 Ackerlerche II. 207
 Ackerloe 88. 5
 Ackermännchen II. 636
 Ackertrappe II. 2
 Ackervogel 1093
 Acoho II. 57
 Acototloquichitl II. 315
 Acredula II. 220
 Ad 67. 15
 Ada 67. 15
 Adder - bird 44. 12
 Adebar 958
 Aden 67. 40
 Adjum 907
 Adler 18 ff. 25 ff.
 Adlereule 119. 144
 Adlergeyer 12. 24
 Adventsvogel 882
 Aederfugle 738
 Ae - Aesteing 67. 15
 Aedon II. 596
 Aηδων II. 610
 Aegerle 374
 Aegerster - Specht 532
 Aegerst - Specht 534
 Aegithus II. 528
 Aehbähr 958
 Aehrenträger II. 28
 Aecrone 84. 12
 K k k 2

Aelke

- Aelke 355
 Aellonskrika 50. 7
 Aelster 374. 381. 538
 Aelsterspecht 533
 Aemmerling II. 413
 Aentrich 783
 Aera 67. 15
 Aerblick 67. 15
 Aeresfugl 103. 2
 Aerfugl 738
 Aerla 114. 11
 Aerone 84. 12
 Aesalo 86. 126
 Aeschmeisle 116. 8
 Aethiops II. 501
 Aethyia 880
 Aexter 50. 13
 Aftenbakke II. 811
 Afterfalke 189
 Aftergoldflügel 518
 Afternachtigall II. 663
 Agace 50. 13
 Agami 974. 1154
 Agasse 50. 13
 Agelaster 374
 Ager-Hön 1140
 Ager-Höne 103. 13
 Agerluster 374
 Aghiron 963
 Agrolle 50. 3
 Agrotto 72. 1
 Ahdjirbu 847
 Ahr 77
 Ajace 50. 13
 Ajaja 940
 Ajascakan 59. 1
 Αιγιάλας II. 758
 Aigle 19 ff.
 Αιγοθήλας II. 812
 Aigrette 973
 Aist 959. 964
 Ajuru - catinga 248
 Ajuru - curau 282
 Akaiearua 65. 28
 Akeiksek 103. 4
 Akerla 88. 6
 Akerlan 112. 4
 Aker-Rixe 1140
 Akkaviak 949
 Akoko II. 57
 Akpa 69. 2
 Akpalliarfuk 69. 5
 Akpalliarjungoak 69. 5
 Ak-Turna 84. 11
 Ala 67. 28—116. 3
 Alactu 354
 Alaipy 110. 1
 Alap 48
 Alapi II. 294
 Alario II. 494
 Alaster 374
 Alaud 105. 1
 Alauda II. 206 ff.
 Alaudae congener II. 407
 Alavette 105. 1
 Albatros 836. 840 ff.
 Albatrus 840
 Albicilla 22. II. 538
 Alca 814 ff.
 Alcatraz 860
 Alcedo 563 ff.
 Alchata II. 106
 Alcyon II. 315
 Alderyng 10 112. 36
 Alebrande 67. 32
 Alektor II. 37. 40. 46. 78
 Alelster 374
 Alester 374
 Alexanderspapagey 241
 Alferraz 42. 15
 Algarte 374
 Alhabari 95. 1
 Alionire 116. 5
 Alk 814. 819
 Alk 69. 4 ff.
 Alle 823

- Allekräke* 51. I
Allicke 356
Alocharello 43. 5
Alocho 43. 7
Alouette-de-mer 1067. 1076 ff.
Alouette II. 208 ff.
Alpengrasmücke II. 632
Alpenkrähe 384
Alpenlerche II. 232
Alpenmeise II. 775
Alpenschwabe II. 803
Alpenstrandläufer 1066
Alpkachel 384
Altachan 110. 5
Altekeba 104. I
Aluco 160
Alwargrim 1093
Alzarazir 106. I
Amaduvad II. 495
Amalouffe 109. 2
Amauligakaudil 110. I
Amaxl II. 304
Amazon 282
Amazonen II. 433
Amazonenammer II. 433
Amazonenpapagey 280. 285. 289
Ambraſchwalbe II. 800
Ameiſendroſſel II. 297
Ameiſenfreſſer II. 294 f.
Ameiſen-Nachtigall II. 293 f.
Ameiſenvogel II. 294 ff.
Amerikaner II. 123. 369
Amethyſtkolibri 685
Amethyſtſinaragd 680
Amisk-obo 43. 4
Ammer 407. 426. II. 390. ff. 405. 413
Ammering II. 415
Ammerling II. 408
Ampelis II. 323
Amsel 413. 423. 437. 1093. II. 233. 242. 257. 274. 281. ff. 291. 301. 451
Amselmerle II. 302
Amselmeve 930
Amzell 107. 22
Anaca 303
Anapba 50. 6
Anarak 112. 29
Anarangoak 112. 29
Anas 694. 784. II. 7
And 67. 19 ff. — 68. 1. ff.
Anderelle 116. 3
Anderolle 116. 3
Andezelle 116. 3
Andu 96. 3
Angala-Dian 651
Angeltaſche 765
Angeltaſke 765
Angle-Mager 69. 3
Anhima 942
Anhinga 864
Ani 333. 613
Ano 100. 1
Anſer 718. 828
Anſeres 694
Anter 783
Anthos II. 223
Antigore 956
Antrach 783
Apeca-Apoa 67. 16
Apiafter 594 ff.
Apiolo 63. 1
Apira 108. 3
Aptenodytes 825
Apus II. 798
Apute-Juba 245
Aquila 31 ff.
Aquilaſtro 42. 4
Aquilus 850
Araber II. 5
Arenz 42. 5
Aracanga 225
Aracari 315
Arada II. 293
Aradone 67. 33
Arapa-

- Arapapa 946
 Arara 108. 3
 Aras 222
 Aratarataguacu 66
 Aratica 66
 Ar. - Wereroa 57. 27
 Arbenne 103. 4
 Arcase 86. 3
 Ardea 948 ff.
 Ardeae affinis 603
 Ardelle II. 702
 Ardennel 112. 4
 Ardeola 978
 Aregazza 50. 13
 Arguille 115. 15
 Argusfasan II. 72
 Arimanon 258
 Arnauiak 67. 15
 Arnauartak 67. 5
 Arnaulik 67. 15
 Arnear 44. 12
 Arpschnarp 1139
 Arquata 1019
 Arrepi 114. 46
 Arrian 16
 Arschfufs 883
 Arza 67. 33
 Arrile 114. 15
 Artzche II. 525
 Arynaruffu 99. I
 Aschenente 717
 Aschlerche II. 228
 Aschmeife II. 766
 Asilus II. 727
 Asilvogel II. 725
 Asio 146
 Aster 374
 Astkrähe 351
 Astore 42. 30
 Astoreddu 42. 15
 Astralaginas II. 490
 Astrild II. 366
 Asturnellaz 104. I d.
 Atinchou Achaschich 109. 12
 Atototl 639
 Atricapilla II. 661
 Attagen 851. II. 99
 Attelingant 773
 Atthis 440
 Attinguacu camacu 493
 Aturulia 42. 12
 Atzel 374. 435. ff. II. 468
 Atzeldohle 436 ff.
 Audna. Tytlingr II. 530
 Auen. Nachtigall II. 110
 Auerbirkhuhn II. 93
 Auercalze II. 90
 Auerhahn II. 84. 88. 102. 107
 Auk 69. I
 Au. Kuskow 103. 7
 Aura 6
 Aureola II. 15
 Aurfugl II. 90
 Auricoma 674
 Auriol 405
 Aurion 52. I
 Aurivittis II. 490
 Aurorapapagey 289
 Auroraparkit 268
 Austerfresser 1109
 Austermann 1109
 Austerndieb 1109
 Austernfischer 1108
 Austersammler 1109
 Austerschnepfe 1110
 Autour 42. 30
 Autruche II. 12
 Au. Vogel II. 610
 Avarou 945
 Avekong 67. 4
 Aveloa 114. 11
 Averano II. 332
 Avestruß 96. I
 Avicula II. 745
 Avicula nivalis II. 402
 Avocette 1105

Avosette 1023. 1105
 Avosettschnepfe 1106
 Avozette 1106
 Awerhan II. 85
 Ayaya 941
 Ayoquantotl 423
 Azbar 112. 36
 Azeldohle 435 ff.
 Azulam II. 368
 Azulinha II. 539
 B.
 Baarkhohn II. 90
 Baba 846
 Bachamsfel II. 244
 Bachkönig II. 727
 Bachsprehe II. 244
 Bachstelze II. 268. 575. 605.
 ff. 634 ff. 636. 732
 Bachvogel II. 244
 Backöfchen II. 727
 Backofendrescher II. 770
 Back-Swala 117. 4
 Badda Dfegguse 63. I
 Bagiafecht II. 384
 Bab 67. 62
 Bahamaflink II. 499. 558
 Bak 84. 21
 Bakkamaena 43. 20
 Bäkke-Fugl 106. 5
 Balaban 103
 Balbul 795
 Balbusard 56
 Balbuzard 56
 Balestruccio 117. 3
 Balicaffio 370
 Ballarina 114. II
 Baltimore 419
 Banbea II. 295
 Banana II. 540
 Bananist II. 613
 Banchem 57. I
 Banjahbu II. 268
 Bantanhühner II. 53

Barada 114. 17
 Baranek 86. 6
 Barbaien 43. I
 Barbaganni 43. 4
 Barbareztaube II. 150
 Barbarottu 117. 6
 Barbates 735
 Barbu 459
 Bardeane 110. 5
 Baretino 50. 7
 Bargach 84. 12
 Barge 1023. ff. 1036. ff. 1042.
 1108
 Bargiel 116. 5
 Bargne II. 757
 Barker 1040
 Barlakzel 84. 12
 Barlefs 54. 5
 Barliata 735
 Bartadler 20
 Bartavelle II. 111
 Bartdohle 337
 Bartemmerling II. 431
 Bartfalk 20
 Bartgeyer 15. 20
 Bartinännchen II. 773
 Bartmeise II. 773
 Bartniczek 65. I
 Bartparkit 251
 Bartvogel 335. 458 ff.
 Bassaner 860
 Bassanus 860
 Bastardadler 12
 Bastardauerhahn II. 92
 Bastardbaltimore 420
 Bastardberghuhn II. 108
 Bastardbirkhuhn II. 92
 Bastardbuffard 68
 Bastardeisvogel 555 ff.
 Bastardentenhuhn II. 59
 Bastardsasan II. 70
 Bastardhänfling II. 528
 Bastardkranich 943
 K k k 4 Bastard-

- Bastardlachtaube II. 196
 Bastardlerche II. 213
 Bastardnachrigall II. 623. 625
 Bastardsperling II. 553
 Bastardstieglitz II. 493
 Bastardwaldhuhn II. 92
 Bastardwasserhuhn 163 ff.
 Bastardzeisig II. 520
Baragasse 114. 11
 Baet 768
B. triq. oile 114. 11
 Bauernammer II. 417
 Bauergans 723
 Bauernschwalbe II. 782
 Bauertaube II. 143
Bauge 42. 38
 Baumente 792
 Baum-Endtle 734
 Baumeule 154. 161
 Baumfalk 123
 Baumfink II. 509
 Baumigans 733
 Baumigans 733
 Baumhäckel 617. 652
 Baumhackl 535
 Baumhackerl 537
 Baumhacker 452. 502. ff. 510.
 527. ff. 533. 536. 541. 549.
 ff. 592. II. 677
 Baumhatzel 361
 Baumhecker 548
 Baumheckel 618
 Baumkleber 617
 Baumklette 617. 631. 646.
 660. 663
 Baumkletterer 548. 642
 Baumkletterlein 618
 Baumläufer 616. ff. II. 370
 Baumläuferlein 617. 628
 Baumlerche II. 215. 226. 233
 Baumnachtigall II. 614
 Baumpelikan 1002
 Baumpicker 546
 Baumreiter 617
 Baumrutscher 617
 Baumschnepfe 609
 Baumschwalbe II. 577
 Baumspecht 536
 Baumsperling II. 370. 536. 553
 Baumsteiger 617
Bazant 101. 3
Beagana 112. 7
Bebe 67. 40
 Bebeschwanz II. 638
Beccagia 86. 6
Beccaroveylia 80. 1
Becas 86. 6
Becasse 1027
Becasseau 1069
Becassine 1031. 1036. 1041
Beccacino 86. 7
Beccafico 114. 10
Beccafico canapino 114. 6
 Beccafige II. 630
Beccafigua 114. 10
Beccarin reale 86. 7
Beccastorta 89. 1
Beccofrisone 108. 1
Bec-croisé II. 339
Bec-en-oiseau 933
 Bechigue II. 630
 Becharu 347
Beco de prata 112. 39
 Becquefigue II. 631
Bee-eater 596 ff.
Bee-eater 113. 80
 Beemerziemer II. 259
Beena 50. 60
 Beerold 405
 Beginen 1050
 Behemle II. 259. 324
 Beinbrecher 30
 Beinbrecheradler 31
 Bekassine 1032
 Bekkassine 1074
Bel-arje 84. 4

- Belch 1126
 Belchinen 1126
 Bella 115. 15
 Belzmeise II. 773
 Bemtere 44. 15
 Benaris 110. 4
 Bengali II. 496. 539
 Benguelinba 112. 70
 Bennarie 110. 4
 Bentaveo 205
Beque noir cendré 59. 1
 Beren 136. II. 715
 Bergadler 10
 Bergamner II. 404. 439
 Bergamfel 217. II. 308. 320
 Bergdohle 383
 Bergdol 384
 Bergelster 189
 Bergeinsiedler 387
 Bergente 709. 717. 770
 Bergeremit 387
 Bergerette II. 733
 Bergeronette II. 641. ff. 677.
 732
 Bergeule 182
 Bergfalke 12. 96. 109. 110
 Bergfasan II. 54
 Bergfink II. 475. 482. 509
 Berggans 727
 Berghänfling II. 532
 Berghu 139
 Berghuhn 1036. II. 83. 107.
 110
 Bergkrähe 385
 Berglerche II. 231
 Bergmeise II. 771
 Bergnachtigall II. 483
 Bergrebhuhn II. 118
 Bergreiher 968
 Bergschneppé 1026
 Bergschwalbe II. 794. ff. 804
 Bergspatz II. 556
 Bergsperling II. 509. 553
 Bergstaar II. 246
 Bergtaube II. 139. 146. 165
 Bergtrostel II. 259
 Bergtul 384
 Bergugle 43. 1
 Berguhu 141
 Bergzeißig II. 529. 739
 Berichon 114. 46
 Berichot II. 719
 Beringsgans 715
 Berkuti 38
 Bernakelgans 730. 733
 Berniela 730
 Bernikel 734
 Berolst 403
Berongdayä 117. 2
 Berta 50. 7
 Bertina 50. 7
Besdeliga 117. 1
 Bettlaar 72. 3
 Beutelgans 845
 Beutelmeise II. 777
Bezenge 116. 3
 Bhu 139
Bialozor 42. 37
 Biberente 805
 Bibertaucher 804
Biddiso 112. 36
 Biekelchen 772
 Biekilchen 774
Bielogwoß 42. 39
Bjeloc gus 67. 45
 Bienenfalk 68
 Bienenfänger 595
 Bienenfraß 595
 Bienenfresser 593
 Bienenschnappe II. 700
 Bienenschwalbe 597
 BienenSpecht 596
 Bienenverrätherkukuk 588
 Bienenvogel 595
 Bienenwolf 595
 Bierefel 503
 K k k 5
 Bier.

Bierhold 503
 Bierholf 403
 Bierole 403
 Bierkelchen 774
 Bihoreau 966
 Bilbil 114. 46
 Bilcock 93. 2
 Bilorot 52. 1
 Bimbele II. 613
 Binery 110. 5
 Binneise II. 762
 Binsennachtigall II. 618
 Biörk. Traß 107. 1
 Birkilgen 774
 Birgamsel II. 320
 Birkfalke 109
 Birkheher 390
 Birkhuhn II. 88. 95. 100
 Bifamente 739
 Bischoff II. 468
 Biset II. 146
 Bisnoi - sbavronek 105. 10
 Bissourdet II. 724
 Bistarda II. 4
 Bitter II. 259
 Bittern 984
 Bizbiutzb 88. 6
 Blakolls-Oend 787
 Blaefugl 42. 13
 Blaa Hals 67. 40
 Blaakoll 67. 40
 Blaakraake 51. 1
 Blaamage 906
 Blaamager 910
 Blaameise 116. 5
 Blaa-Nakke 67. 40
 Blaa-Rage 50. 2
 Blabrach 991
 Blaffer 86. 4
 Black-Cock 103. 2
 Black-Game 103. 2
 Black Grous 103. 2
 Black-bird II. 302

Blakberry-eater 114. 17
 Black-cap 114. 17
 Bläkräka 51. 1
 Blamees 116. 5
 Blankeknie 755
 Blas-And 91. 2
 Bläsenörk 1128
 Blaser 101
 Blask 109. 4
 Bläschchen 1125
 Blässenente 777
 Blässengans 715
 Blasgsieker 1125
 Blafsente 786. 1125
 Bläfsen 1127
 Blafshuhn 1125
 Bläsklaka 91. 2
 Bläsl 1127
 Bläsling 1125
 Blauamsel II. 312
 Blauammer II. 448
 Blauauge 336. 357
 Blaubäckchen 116
 Blaubeeerschnepfe 1021
 Blaudrossel II. 313
 Blauente 787
 Blauflügel 640
 Blaufufs 57. 59. 60. 73. 96.
 1021
 Blaugürtel II. 330
 Blauhals 296
 Blauhänfling II. 427
 Blaukehlchen II. 698. 702
 Blaukehle II. 313. 702. 705
 Blau Kehle II. 704
 Blaukopf 225. 232. 243. 271.
 275. 635. 778. II. 177
 Blaukrähe 390
 Blauling II. 297
 Blaumandirz 116. 5
 Blaumeise II. 760
 Blaumerle II. 313
 Blaumüller II. 760

Blaurack 391
 Blaurock 391
 Blauschnabel II. 361
 Blauschwanz 663. II. 672
 Blauspecht 544
 Blautaupe II. 140
 Blauziemer II. 253
 Blauvogel II. 705. 708 f.
 Blaw-Meißlin II. 762
 Blawvogel II. 313
 Blawzimmer II. 313
 Bleikehlchen II. 615
 Blets II. 126
 Blessing II. 127
 Bleyfalke 104. f. 136
 Bleykehlchen II. 702
 Bleykehllein II. 615
Blik-Skarv 72. 3
Blind-Svale II. 117. 4
 Blinzer II. 659
 Blishöne II. 126
 Blochtaube II. 140. 172
 Blocktaube II. 140
Blod-Finke 109. 4
 Blodfugl II. 693
Blodstiert II. 114. 34
 Blodstert II. 693
 Blomrokke 1027
 Blongior 998
 Blumenkönig 644
 Blumenprinz 645
 Blumenschwänzel 561
 Blumenspecht 660 ff.
 Blömente 786
 Blutfink II. 350
 Bluthänfling II. 524. 529
 Blutkopf 460
 Blutpapagey 232
 Blutrothkehlchen II. 665
 Blutschnabel II. 366
 Blutschwanz 416
 Boarina II. 632
Boarino della stella II. 114. 48

Boarula II. 732
 Boat-bill 947
 Bob-Lincoln II. 435
Bocian 84. 4
Boesjaer 69. 5
 Boemerlein II. 259
 Boeres 54
Boeuf 109. 4
 Boenf de Dieu II. 719
Bo-Finke II. 112. 3
 Bogendroffel II. 298
Bog-Finke II. 112. 3
Bog-Finkens Hoer-Unge II. 112. 4
 Böhmer II. 324
 Böhmlein II. 325
 Bohnengans 729
 Bölchinen II. 126
Bold-Tiär 88. 1
Boleta 45. 7
 Bollenbeißer II. 346
 Bollenpick II. 344
 Bollihes II. 52
 Bombycilla II. 326
 Bonana 423
 Bonasia II. 102
Bondelöber 91. 2
 Bonjour-Commendeur II. 429
 Bondrée 69
 Boom-Spaarling II. 554
Baom-Uiltze 43. 5
 Bootfink II. 478
Boro Nagossun 751
 Boschas 773. 785
Bosore II. 114. 45
 Bottervogel 803
Bottlerose 69. 4
Bouarina II. 114. 11
Bouchari 44. 12
 Boulard II. 773
 Boulboul 221
Bourgeonnier 109. 4
Bourou-aru 54
Bourrough-Duck 67. 4
 Bouze.

- Boute - quelon* 107. I
Bouveret II. 369. 370
Bouveron II. 393
Bouvier 109. 4
Bouvrer 109. 4
Bouvreuil II. 351. 362. 383.
 387. 389. 391. 544
Bouvreux 109. 4
Bozzagro 42. 29
Braakvogel 1093
Brachamsel 1078
Bracher 595. 1003
Brachhenné 1094
Brachhuhn 1017. 1085
Brachlerche II. 207. 212. 214.
 215. 219
Brachschnepfe 1017
Brachvogel 1001. ff. 1015.
 1017. 1056. 1084. 1090.
 II. 249
Brakvogel II. 251
Bramanendrossel II. 278
Bramanen Eisevogel II. 278
Bramary - Kite 42. 71
Bramble 112. 4
Brambling 112. 4
Bramblefinch 112. 4
Brandente 760. 768. 794
Brandeule 167
Brandfalk 67
Brandfink II. 522
Brandgans 67. 4
Brandgans 708
Brandgeyer 67. 71
Brandmeise II. 756
Branta 730
Brantangel 925. 929
Brasilianer II. 37
Brassler II. 407
Braubling II. 760
Braule - queue 114. 11
Braunelchen II. 615. 630
Braunelle II. 615
Braunellein II. 615. 631
Braunellerl II. 617
Braunflügel 680
Braunhänlein 1077
Braunhänfling II. 525
Braunkehlchen II. 655. 658
Braunkopf 295. 407. 549. 912
Braushahn 1050
Braut 791
Bred - Neb 80. I
Breggush 87. 8
Brein vogl II. 235
Breitfuß 864
Breitschnabel 746. 757
Breitschnabler 746
Breitschnabelkopf 746
Breitschwanz II. 153
Brennhahn II. 89
Brenta 733
Brentgans 732
Brenthus 732
Bresague 43. 8
Breve 381
Brieftaube II. 158
Briefträger II. 158
Brillefugl 69. 3
Brillendrossel II. 301
Brillenente 755. 756
Brilleneule 181
Brillenmotacille II. 659
Brillennase II. 816
Brilltaube II. 163
Brinauka 107. 2
Bris - os 42. 4
Brkostaw 108. I
Brokfugle 1095
Bromhan II. 89
Brook - Ouzel 93. 2
Bröfexter 361
Bruant II. 413 ff.
Bruchdrossel II. 314
Brücheschwalbe II. 782
Bruchschnepfe 1031

- Bruchweidendrossel II. 283
 Bruder Berholft 403
 Bruia 44. 22
 Brummvogel 693
 Brunette 114. 3
 Brunnakke 67. 27. 31. — 761.
 768
 Brunn-Skalle 114. 18
 Brusen 85. 5
 Bruskop 87. 1
 Brusula 52. 1
 Brustling II. 525
 Brustwenzel II. 702. 705
 Bruuns Kopper 1052
 Bruus-Hane 1052
 Bruyant II. 735
 Bubil II. 299
 Bubo 139
 Bucco 457
 Buceros 323
 Buchfink II. 477
 Buchfinkens Hurkind II. 484
 Buchschir 106. 1
 Büffelkopfsente 752
 Buferlotto 44. 12
 Bubo 43. 1
 Buhu 139
 Buik 985
 Buisonnier 107. 22
 Bülau 403
 Bulfinch II. 351
 Büloh 403
 Bülow 403
 Bum 438
 Bunk 84. 21
 Bunkkopf 710
 Bunt droffel II. 259
 Buntflügel 882
 Bunting 403 ff.
 Buntschwänzel 121
 Buntspecht 508. 530. 533. 535.
 538 ff.
 Buntwenzel 632
 Bu-onk 998
 Buphaga 331
 Burette 114. 3
 Burgemeister 908. 909
 Busard 54
 Busaroca 50. 3
 Buschadler 18
 Buschelster 189
 Buscheule 161. 165. 170
 Buschbahn II. 50
 Buschhuhn II. 39 f.
 Buschlerche II. 213. 215. 223
 Buschfänger II. 617
 Buschschneepfe 1026
 Buse 64
 Busaar 2
 Busard 63
 Bushart 7. 63. f. 66. f. 123
 Bushardfalk 64
 Bustard II. 7
 Busthart 65
 Butcher-bird 44. 12
 Buteo 63. 70
 Butoor 84. 12
 Butor 984 ff.
 Butschock 59. 1
 Butschumur 105. 1
 Buttelnase 166
 Futtervogel II. 375
 Buwadak 86. 12
 Buzard 7
 Buzzard 42. 15
 Buzac 42. 1
 Byeneeter 63. 1
 Byesvale II. 790
 Bymeise II. 766
 Byrold 403
 C.
 Caapwachtel 384
 Cabaducutch 43. 11
 Cabeca 43. 9
 Cabericuch 43. 11
 Cabizoni 770
 Cabone

- Cabone de murdego* 86. 6
Cabugi 103. 12
Cabure 151
Cacadu 260
Cacalotl 341
Cacao - Walke 50. 24
Cacatolotl II. 521. 744
Cadoreu 112. 7
Caelebs II. 477
Caeruleo II. 313
Cage 702
Cahuitalü 705
Caica 297
Caille II. 125 ff.
Calak 50. 2
Calandra II. 230. 407
Calandrino 105. 2
Calandrote 107. 3
Calao 324. 326 f.
Calatti II. 462
Calcabotto 118. 1
Calderugio 112. 7
Calecutisch Huhn II. 33
Calendula II. 719
Calfat Ammer II. 447
Calicatocu 69. 2
Calic - Calce 208
Calidris 1039. 1071. 1075.
 1077
Callaeus 335
Calliope II. 674
Calpeira 80. 1
Calquin 42. 34
Camelus II. 11
Can 107. 3
Canace II. 95
Canale 50. 3
Canard 711. ff. 783. ff. II. 8
Canard 67. 16 ff.
Canaria II. 514
Canarienfink II. 513
Canarienfattard II. 540
Canariensperling II. 511
Canarienvogel II. 511
Canarien - Zeisle II. 515
Canarin - Salvatico 52. 1
Cancoine 107. 2
Cancroma 914
Canibello 42. 16
Canishühnchen II. 53
Canne - petiere II. 8
Cannevarola II. 622
Cantor II. 318
Canutsvogel 1074
Caparoch 174
Capella coelestis 1031
Capercally II. 90
Capercalze II. 90
Capinero II. 664
Capmeise II. 773
Capo d'ore 114. 48
Capo negro 67. 45. — 114. 18
Capo - rosso 67. 26
Capricalca II. 87
Caprimulgus II. 808 ff.
Caprotherus 914
Capfa - Fink II. 509
Capfa - Sperling II. 509
Capschwalbe II. 792
Capsperling II. 494
Capsturmvoegel 838
Caracara 54
Carbo 713. 852
Carbonarius II. 765
Cardeline 112. 7
Cardellino II. 490
Cardello 112. 7
Cardina 112. 7
Cardinal II. 354. f. 360. 390.
 450 ff. 463. 465. 662
Cardinalbaumläufer 624
Cardinalchen II. 444. 662
Cardinalente 540
Cardinalspecht 540
Cardinalvogel II. 354 f.
Carduelis II. 476. 487. 519
 Car.

Carfunkel 688
 Cariama 942 ff.
 Caripira 851
 Carlsvogel II. 702
 Carminhänfling II. 529
 Carnifex II. 329
 Caroli 86. 3
 Caroliner 917
 Carolinerlerche II. 232
 Carouge 422
 Carpenteros 59. 3
 Carririni 18
 Caryocatactes 18
 Casarka 778
 Cased-γ-ddryccin 107. 2
 Casoar 96. 2
 Casparus 1144
 Casper 1140
 Casswar 96. 2
 Casse-noix 767. — 109. 2
 Cassenoiaux 109. 2
 Casseraignon 109. 2
 Casslike 414 ff.
 Cassique 416 ff.
 Cassowary 96. 2
 Castagneux 890
 Castor 804
 Castrica 44. 12
 Casuar II. 15
 Casuarius II. 15
 Casuaris II. 15
 Casuel II. 16
 Cata 103. 12
 Catarraetes 828. 875. 915
 Catharina 294
 Catotol II. 521
 Caudec II. 573
 Caue 50. 6
 Cauette 50. 6
 Cavaz 98. 1
 Caxcaxtototl II. 246
 Cayo 50. 6
 Cedrin II. 503

Cehoilotl II. 176
 Ceiliog brou fraith 107. 4
 Ceiliog mwyateb 107. 22
 Cela II. 16. 779
 Cenchramus 1123. II. 31
 Cendrille 59. 1. — 116. 3
 Centcontlatolli II. 271. 272
 Cepphus 881. 915
 Cercelle 67. 32
 Cercerelle 42. 16. — 67. 32
 Cerisin II. 503
 Cernicalo 42. 16
 Certhia 617. ff. 620
 Chacamel II. 39
 Cha. cha 1107. 2
 Chachalacametl II. 39
 Chacotte 50. 6
 Chadara 733
 Chaddaejir 63. 1
 Chaffinch II. 478
 Chafty II. 727
 Chalandra 105. 9
 Chalandria 105. 9
 Chalois 140
 Chamoris 116. 5
 Chantre II. 726
 Chapon de Pharaon 45. 5
 Charadrius 1067. 1083 ff. 1096
 Charah 184
 Charbonniere II. 756. 766
 Chardonneret II. 487
 Chardonneau 112. 7
 Chardrier 112. 7
 Charlot 86. 3
 Charniergans 861
 Chartologoi-Nagoffsum 751
 Chasidah 84. 7
 Chassarka 728
 Chasserou 43. 1
 Chata 72. 1
 Chatering 50. 24
 Chat-huant 137. 165. 168.
 172. 812
 Chatre-

- Chatterer* 108. 1
Chaumi II. 300
Chausse-pot 59. 1
Cebalos 42. 4
Cecla 155
Χελιδων II. 785
Chelanopex 710
Χελανοπηξ 710
Cherik II. 680
Cheriway 26
Cherry-deanisch 46. 7
Cbruna 103. 4
Chevalier 1056
Chic II. 439
Chic d'auvassé 114. 3
Chicus 50. 6
Chichiçtli 177
Chichiltototl Tepuzcullulae
 II. 450
Chichiltototl - Vogel II. 744
Cbi - cbup - pi - sue 105. 10
Cbic - jaune 110. 5
Chic - perdrix 110. 3
Cchim 116. 2
Chineserente 791
Chineserschwalbe f. *Salangane*
Chin - Tchien - Khi II. 28
Chipeau 750
Chirino 43. 5
Chirurgien 1134
Chlän 546
Chlorion II. 375
Chloris II. 371. 446. 666
Chocas 50. 6
Chongorgalu 704
Choppard 109. 4
Choroi 772
Chouant 43. 4
Choucari 371
Choucas 356
Choudet 43. 4
Chouchette 50. 6
Choue 43. 4. 7
Chouette 170. 176. ff. 43. 8 f.
Chougt 359
Chout 359
Cbracholec 72. 4
Christöffelchen II. 660
Chrysaetos 33
Chrysomitris II. 490
Chuatotolin 99. 1
Chuck - bird 110. 2
Chuc - nocny 43. 4
Chue 50. 6
Chuichanitschkun 69. 9
Churge II. 8
Churn - Owl 118. 1
Cia II. 430
Ciagula 50. 6
Cicogne 345. 959
Ciconia 950. 958
Cifoletta 109. 4
Cigni II. 503
Cigno 67. 1
Cincinpotala 116. 3
Cinclus 1058. 169. II. 243.
 640
Cineraria II. 629
Cini II. 503
Cinit II. 503
Cino 67. 1
Circia 774
Circuri 103. 20
Ciris II. 431
Cisferre 107. 1
Cisne 409
Citril 112. 16
Citrinella II. 412. 501
Citrincha II. 519
Citrinlein II. 501
Citronenfink II. 501
Citronvogel 415. 1090
Civiere 109. 4
Cla - cla 107. 2
Cladorinchus II. 724
Clanga 42

- Clericus 340
 Clignot II. 659
 Cnipologus II. 640
 Cnupio 107. 1
 Cobilar 59. 17
 Coccothraustes II. 337. 354.
 361. 382. 387. 391
 Cochelirieu 105. 3
 Cochelivier 105. 3
 Cochepierre 109. 2
 Cochevis II. 225
 Cochicat 316
 Cochitenacarl 46. 10
 Cochlearius 946
 Cocho 294
 Cock 101. 1
 Coco 1012
 Coci 974
 Cocorli 104. 34
 Cocorzin 104. 34
 Cocou 57. 1
 Cocu 57. 1
 Codatremula II. 640
 Coddel Kauka 78. 1
 Codinzinzola 114. 11
 Codirosso 114. 34
 Coelipeta II. 210
 Coelmaes 116. 3
 Cojover 872
 Colca 67. 15
 Coleuicuiltic II. 125
 Colemoufe 116. 7
 Colenicui II. 125
 Colgrave 337
 Colherado 941
 Colibri 645. f. 648. f. 660 f.
 721
 Colibri des grands bois 61. 15
 Colibrit f. Calibri
 Colibritchen 656. 664 ff.
 Colin II. 125. 128
 Coliou 334 ff.
 Colius 633. 651. II. 334
 II. Band II. Th.
 Collheirinbo 112. 106
 Collotorto 58. 1
 Collurio 193
 Colma II. 295
 Colnud 371
 Colombade II. 664
 Colubris 676
 Columba II. 139 ff.
 Columbae affinis 490
 Columbarius 120
 Colymbus 868 ff.
 Combattant 1051
 Commendeur 412 f.
 Conca de moru 117. 3
 Condor 2
 Condoro 2
 Conquendle II. 434
 Configliere 114. 45
 Contra II. 240
 Cook - of - the Wood 103. 1
 Coot 91. 2
 Copped - Wreen 114. 48
 Coq II. 47
 Coq d'Inde II. 33
 Coq de Bruyeres II. 85
 Coq de bois 103. 1
 Coq de Limoges 103. 1
 Coq de roche II. 739
 Coquillade II. 226
 Coquu 57. 1
 Coracias 386 f. 390. 409.
 420
 Corax 340
 Coraya II. 293
 Corbeau 348
 Corbin 50. 2
 Cormoran 858
 Cornaechia 50. 3
 Corneia 50. 3
 Corneille 344
 Conerote 43. 4
 Cornice 50. 3
 Cornillon 50. 6
 L11
 Cornix

- Cornix 346. 349. f. 394. 410. 436. 538
 Corn-creek 93. 1
 Corone 340
 Corossalo 114. 34
 Corrira 1014
 Corroya-barza 50. 5
 Corta-pao 59. 2
 Corufa 43. 7
 Corvo 50. 2
 Corvu ambidastu 84. 21
 Corvus 336. ff. 440. II. 121
 Corydalos 105. 9
 Coscoroba 705
 Cosquanthli 5
 Costototl 411
 Cotinga 187. ff. II. 328 f. 330
 Cotta 1129
 Cottonivogel II. 777
 Cottorna II. 110
 Coturnix 381
 Coucou 467 ff.
 Coucouat 57. 1
 Coudiou 57. 1
 Coulacissi 302
 Coulassade 105. 9
 Coulavan 407
 Coulon 1057
 Coulon-chaud 87. 4
 Coureur 1014
 Courier 1014
 Courlew 115 ff.
 Courly 1002. ff. 1015. ff. 1098
 Courlis 86. 3
 Couroucou 453
 Coutrioux 105. 3
 Coux 57. 1
 Covaterra II. 812
 Cowaldrossel II. 322
 Crabedu 67. 34
 Crabier 977 ff.
 Cracker 67. 28
 Cracra 84. 4
 Crapaud-volant II. 810
 Cravant 735
 Crax II. 39. 41
 Crecea 771
 Creeper 618 ff.
 Cresserelle 111
 Crested-Lark 105. 6
 Creutzmeise II. 765
 Creutz-Tale 359
 Creutzvogel II. 340
 Crevechassis 116. 3
 Crex 992. 1040. 1138
 Cristatella 436
 Croace 50. 3
 Croguler 42. 31
 Croque-abeille 116. 3
 Croffenobel II. 156
 Croß-bill 109. 1
 Croße-queue 114. 11
 Crotophaga 329. 332
 Croz-Pescherot 72. 3
 Crouas 50. 3
 Crow 50. 3 ff.
 Cruciata II. 341
 Crucifera II. 341
 Cuaderviz 103. 20
 Cubugi 103. 12
 Cucco 57. 1
 Cuchillo 57. 1
 Cucho 57. 1
 Cuckow 57. 1
 Cucu 57. 1
 Cucula 50. 3
 Cuculo 57. 1
 Cuculo affinis 488
 Cuculus 315. 464. ff. 517
 Cucumiau 43. 12
 Cugniada 105. 1
 Cujelier II. 216
 Cuilliere 946
 Cujovit II. 38
 Cuiriri 205

Cuit 396
 Culbiano 87. 13
 Cul-blanc 1069. II. 651 ff.
 Culicilega II. 640
 Culo-bianco II. 654
 Cul-rosso 59. 17. — 114. 34
 Cuntur 2
 Cuorvo 50. 2
 Cupido II. 100
 Curafoe II. 41
 Curassauer 681
 Curasso II. 40. 43
 Curculeus 112. 36
 Cureu II. 281
 Curiaca 1002
 Curicaca 85. 1
 Curiertaube II. 158
 Curlew 86. 3
 Curquichu 18
 Curforius 1083
 Curuca 664. II. 616. 620
 Curucui 453
 Curvirostra II. 338
 Curwillet 1092
 Curwy 52
 Cusbat 104. 19
 Cuthberts-Ente 738
 Cutrettola 114. 11
 Cutrettola del petto nero 114.
 II
 Cutwater 78. 1
 Cyanopus 96
 Cyhindus 109
 Cygne 67. 1
 Cygnus 694
 Cynchramus II. 407
 Cyprias 114. 10
 Cyranca 67. 32
 Cyranza 67. 33
 Cyz 112. 25
 Czapla 84. 12
 Czarna wietka 116. 3
 Czayka 87. 1

Czerwonyrzytek 114. 34
 Czerwony-ogonok 114. 34
 Czczerzew 103. 2
 Cziesz 112. 25
 Czir-wenka 114. 45
 D.
 Dabussaire 116. 29
 Dachike 355
 Dadi 45
 Dadsz 112. 29
 Daffer 104. 1
 Dagschlap II. 80
 Daina 103. 4
 Daker-Hen 93. 1
 Dalvek 76. 8
 Damascener-Rebhuhn II. 118
 Dame 50. 13. — 116. 11
 Damette 114. 11
 Damier 838
 Danbick II. 504
 Dannenfink II. 484
 Dasypus II. 148
 Dattelsperling II. 509
 Daube II. 143
 Daunenspecht 528
 Daw II. 281
 y Dreiniog 112. 25
 Dea 588
 Deffyt 1122
 Demoiselle 423. — 116. 11
 Dendrofalke 123
 Derbnitschok 42. 23
 Detela 59. 12
 Deten 59. 12
 Deurvogel 945
 Devi-Biele 103. 1
 Dhul 355
 Diabolus 1129
 Diademkranich 749
 Dianenamfel II. 308
 Dickfufs 1097
 Dickkopf 751. 754. II. 744 f.
 L11 2
 Dick:

- Dick Schnabel II. 337. ff. 343.
 368. 372. 386. 389. 391.
 503
 Didus II. 19
 Diestelfink 426. II. 394. 427.
 444. 465. 475. 486 ff. 495 ff.
 Diestelvogel II. 483. 489
Dig - Sulu 117. 4
 Digsvale II. 794
 Dikaja Pikaliza 1087
 Dilaskarfs 853
Dinde sauvage 57. 1
 Dindon II. 31. 37
 Diomedea 839. 840 ff.
Distelvink 112. 7
 Dittchen 1094
 Dittertaube II. 151
 Diuka II. 521
Dix - buit 87. 1
Dlask 114. 18
Dleschk 109. 2
 Dobbelschnepfe 1031
Dobbelt - Kramsfugl 107. 1
Dod - aars 97. 1
Dodo 97. 1
 Doel 355
 Dohle 333. 355. 433 f. 438 f.
 Dohmpfaff II. 351
 Dohnpaap II. 351
 Dolken 1079
 Dolmetscher 1057
 Domherr II. 350. 363. 387
Domberre 109. 4
 Domicella 270
 Dominikeule 176
 Dominikfalk 130
 Dominikanerdroffel II. 318
 Dominikanerente 779
 Dominikanerkardinal II. 357
 Dominikanerkernbeißer II. 358
 Dominikanerwittwe II. 441
 Domino II. 364
Dom - Oxe 109. 3
Dompape 109. 4
 Dompfaffe II. 347. 349. 370
 Domschnepfe 1004
 Doole 357
Doppa 75. 2
 Doppelschnepfe 1017. 1030.
 1042
 Doppelsporn II. 26. 120
Dopping 67. 25
 Dorfschwalbe II. 789
 Dorfsperling II. 549
 Dorling II. 606
 Dorndrechsler 194
 Dorndreher 193. II. 690
 Dornflügel 1100
 Dorngreuel 194. II. 690
 Dornheher 194
 Dornkönig II. 717
 Dornreich 194. II. 622. 689.
 744. 766
 Dorntträger 196
 Dorntreter 194
 Dorpfink II. 478
Dorr - Hawk 118. 1
 Dos bleu 59. 1
 Dotterel 1057
 Doucker 889
 Dove II. 140 ff.
Draaihals 58. 1
 Drachwa II. 3
Draine 107. 1
 Drake 783
 Dreckkrämer 609
 Dreckvogel 6
 Drehhals 496
 Drehvogel 497
 Drepanis II. 794
 Dreyhals 494
 Dreyzee 542
Drofa 95. 1
 Drongo 183
 Dronte II. 19
 Drop 95. 1

Drosch 107. 4
 Droschel II. 263
 Droffel 203. 407. 408. 413.
 416. 423. 435. 439. II. 242.
 248. ff. 329. 579. 683
 Drossig 107. 4
 Drosd 107. 2
 Drozd 107. 4
 Drozd-mniyſſy 107. 3
 Drozd-srzedny 107. 2
 Δρυοκολαπτης 504
 Dſegguse 57. 1
 Dſennis 59. 17
 Dſervis 50. 5
 Dſerwe 84. 4
 Dſnerdk II. 108
 Dſeſe 84. 7
 Dubbellerche II. 233
 Duc 43. 1 ff.
 Düchelein 887
 Duchentlein 887
 Duchipbatb 64. 1
 Duck 140. 712. ff. 766
 Duckchen 889
 Ducker 889
 Ducquet 43. 4
 Dudak II. 3
 Dudek 64. 1
 Dudu II. 19
 Dufwa 104. 1
 Dugo 43. 1
 Dukipbat 103. 1
 Dullerche II. 215
 Dummherr II. 350
 Dumpis 84. 21
 Dun-Diver 68. 1
 Dunlin 1036
 Dünnebein 1099
 Duppelschnepfe 1031
 Duratschok II. 359
 Dur-bee II. 348. — 109. 2
 Durstel II. 263
 Dütchen 1056

Düte 1094
 Dyal 53. 6
 Dyker 757
 Dykere 765
 Dykker 884
 Dymludj 329
 Dzieciot 59. 1
 Dzieciot-modrany 59 1
 Dzieciot-muromy 65. 2
 Dzieki Kur 103. 2
 Dzierlatka II. 226
 Dzierlatka czubata 105. 6
 Dzwoniek 109. 27
 E.
 Eachem 57. 1
 Eardove II. 194
 Eatoas 50. 2
 Ebelvogel II. 19
 Ebeher 958
 Ebiger 958
 Ebourgeonneux II. 352. — 109.
 2. 4. — 112. 4
 Echasse 1099
 Echelette 65. 2
 Ecoſſonneux 109. 4
 Ecouſſe 42. 12
 Ecrecelle 42. 16
 Edder 738
 Edeldame 230
 Edelfalke 79
 Ederfugl 67. 15
 Edolio 471
 Eee-eve 65. 29
 Eelweck 107. 22
 Een-Maes 116. 3
 Effraye 43. 8
 Egde 546
 Egerſte 374
 Egester 374
 Eggenschär 1139
 Egmor 76. 7
 Egretta 974
 Ebrglis 42. 2
 Lll 3
 Eichel-

- Eichelheher 360
 Eichelkrähe 361
 Eichelrabe 361
 Eichvogel 77
 Eider 377
Eiderblicke 67. 15
Eiderduck 67. 15
 Eidergans 736
 Eiderente 738
 Eidervogel 737
 Einsiedler 387. II. 20. 712
 Einsiedler-Drossel II. 311
 Eisammer II. 404
 Eisente 766. 809
 Eiskiebitz 1065
 Eismöwe 834
 Eisstrandläufer 1064
 Eissturmvogel 835. 837
 Eisente 755. 761. 766
 Eisvogel 369
 Eisvogel 569
 Elaeathorax II. 431
 Elatototl II. 706
 Elb 697
Elbs 67. I
 Elbsch 696
Elg 87. 3
Elk 67. I
Elle-Kongens Datter 114. II
 Elle-Krage 392
Elo 42. 39
 Elster 189. 317. 373. f. 417.
 439. II. 242
 Elsteralk 818
 Elsterentchen 809
 Elsterrabe 531. 533
 Elsterstaar II. 241
 Elstertoukan 318
 Elve-Kald II. 244
Elve-Konge 106. 5
Ema 96. I
Embar 75. 4
 Ember 882
 Embergans 882
 Emberiza II. 390. 398. ff. 475
 Embritz II. 413
 Emerillon 127 f.
 Eme II. 15
 Emeu II. 15
 Emmeritze II. 406
 Emmering II. 413
 Emmerling II. 400. 412
 Emmerlingsvogel II. 419
Emoucher 42. 31
 Endrach 740
Engang 46. 3
 Englerche II. 213
Engoulevert 118. I
Engouane-pastre 114. II
 Ente 694. ff. 708. 711. ff. 736.
 738. 782. 785. 802
 Entenadler 42. 57
 Entengeyer 71
 Entenrothkehlchen 779
 Entenstößer 43. 57
 Enter 783
 Entita 116. 8
 Entrich 783
 Entvogel 783
 Enucleator II. 346
Epeiche 59. 17
 Epervier 107
 Episcopus II. 468
 Epops 608
Ερωψ 612
 Epouvantail 930
 Eques II. 162
 Erdbull 984
 Erdfink II. 540
 Erdgans 709
 Erdgeyer II
 Erdgürtelmeve
 Erdschwalbe II. 793
 Eremit 387
 Eremita 386. II. 311
 Eremitrabe 387

- Erithacus II. 698. 714
 Erizchen II. 693
 Erizkins 114. 34
 Erle II. 638
 Erlenfink II. 516
 Eroro 61. 28
 Erpel 783
 Evua 84. 4
 Erythra 1123
 Erythrocyanos 223
 Erythroxantos 225
 Erztaucher 892
 Esarokistok 75. 6
 Esaruktorsok 42. 39
 Esclave 50. 2
 Escorbeau 50. 2
 Eselschreyer 845
 Esquimeauxbrachvogel 1016
 Esquimeauxschnepfe 1016
 Estorino 106. 1
 Estournat 106. 1
 Estourneau II. 239
 Esungak 76. 10
 Ete 289
 Etourneau II. 237
 Etubirga 69. 10
 Eule 138 ff.
 Eutretola 114. 11
 Eveque II. 468
 Excubitor 189
 Eyder-Gans 736
 Eysengart 568. 570
 Eys-Endte 811
 Eysvogel 570
 Eyvogel 919
 F.
 Fächerfchwanz II. 362
 Fademlein II. 502
 Fagerfis II. 726
 Fager Gaas 67. 4
 Fagergans 709
 Fagergiäs 710
 Fagiano 101. 3
 Faifan 1155. II. 36. — 103. 1
 Faifanne 101. 3
 Faifante 101. 3
 Faifanneau 101. 3
 Faifanteau 101. 3
 Faife 101. 3
 Faifeau 101. 3
 Falcata 1004
 Falcinellus 631. 639. 644.
 650. 662. 665. 674. 1003.
 II. 742
 Falco 17
 Falcone 42. 13
 Falconello 44. 12
 Falconellus 127
 Falcula II. 794
 Falk 42. 30. ff. 17. 30 ff.
 Falkeneule 173. 174
 Falkensperling II. 616
 Falkmöve 905
 Falkonirer-Schmierlein 128
 Fallope II. 213
 Fallow Smith 114. 15
 Farlousanne II. 217
 Farlouse II. 212
 Farluzzanne II. 217
 Farzer 1154
 Fasan II. 27. 36. ff. 45. ff. 65.
 66. 100
 Fasanenbastard II. 70
 Fasanenente 762
 Fasanenvogel II. 67
 Fasanenputer II. 71
 Fasavella 95. 3
 Fastenschlier 1017. 1094
 Faucon 73 ff.
 Fauvette II. 615. 619. 623.
 625. ff. 662
 Fauvette d'hiver 114. 3
 Fauvette des haies 114. 3
 Fauvette des roseaux 114. 8
 Fauvette à tete noire 114. 18
 Fazant 101. 3
 L114 Fazyan

- Fazyan* 101. 3
Federfasan II. 84
Federfuß 682
Federkappe 791
Fedoa 1036. 1039
Feigenesser II. 268. 631. 665 ff.
Feigenfresser II. 612. ff. 680.
 ff. 709. ff. 728. 759
Feigenvogel II. 613 ff.
Felddieb II. 536. 548
Feldengel II. 106
Feldflüchter II. 143. 146
Feldhuhn II. 111. 113
Feldkrähe 345. 348
Feldläufer 1093
Feldlerche II. 207. 214. 218
Feldmäher 1018
Feldnachtigall II. 619
Feldpfau 1053
Feldspatz II. 554
Feldsperling II. 509. 553
Feldtaube II. 139. 146
Feldwächter 1139
Feliceps 143
Felsenhahn II. 739
Felsenhuhn II. 100
Felsenlerche II. 632
Felsenrebhuhn II. 119
Felenschwalbe II. 787. 795
Felsentaube II. 146. 175
Felbeck 107. 22
Fenicoptero 79. 1
Felstaube II. 146
Fenerotet 114. 49
Fensterfalken II. 782. 789
Fern-Owl 118. 1
Feroë-Kriechente 766
Festvogel 291
Fettammer II. 408. 467
Fettgans 817. 825 ff.
Fettling II. 669
Feuchtarfch 853
Feuerfink II. 498
Feuerrabe 348. 385
Feuerschwalbe II. 782
Fia - Fia 107. 1
Fialster 110. 1
Fjäreplit 1072
Fiär 69. 3
Ficedula II. 576. 605. ff. 631.
 713
Fichtenammer II. 425
Fichtendickschnabel II. 346
Fichtenfink II. 556
Fichtenhacker II. 343. 346
Fichtenfänger 640
Fieldfare 107. 2
Field-Duck 95. 3
Field-Lark II. 214
Field-Rype 103. 4
Field-Trost 107. 2
Fier-Plister 87. 3
Fierre-Mous 1072
Figogataka 114. 10. 18
Flguier II. 268. 612. ff. 647.
 665. ff. 670. ff. 677. ff. 709.
 f. 728. ff. 759
Filippa 89. 1
Filomele 114. 18
Finet II. 530
Fingah 183
Fink 426. 437. II. 359. 372.
 383. 390. 423. 441. 444.
 454. 458. 465. 474. ff. 539.
 560
Finkenbeißer 193
Finkenfalke 116
Finkenhabicht 116
Finkenpapagey 277
Finkensperber 116
Finkenwürg 198
Finkmeise II. 755. 759
Fiöre 87. 3
Fior-Rancio 114. 48
Fischaar 57. 60. 72
Fischadler 22. f. 29. 31. 43. 56
 Fisch.

- Fischahr 57. 319
 Fischer 315. 901. 923. 926
 Fischerfalk 59. 114
 Fischfresser 316
 Fischermeye 898. 905
 Fischgeyer 22. 67. 72
 Fischjäger 907
 Fischmeiße 923
 Fischerlein 927
 Fischhabicht 56. 58
 Fischmeyer 901. 905. 923. 927
 Fischtreiber 806
 Fischreiger 971
 Fischreiher 970
 Fischhäher 971
 Fischweihe 60
Fisk 114. 49
 Fisk - Aender 804
 Fiske - Gjoe 58
Fiske - Høyer 84. 12
 Fiske - Oernen 24
 Fiskeren 856
Fisk - Litta 87. 8
Fisk lusen 42. 9
Fisk - Måse 76. 3
 Fisktiis 42. 26
 Fisk II. 642
 Fisterlein 1073
 Fitert II. 711
 Fitis II. 725
 Flabellifera II. 362
 Flachslink II. 525. 528. 529
 Flaggspette 535
Flåk - Spærre 59. 18
 Flamant 934
 Flambant 934
Flamenco 79. 1
 Flamengo II. 391
 Flaminge 934
 Flamingo 934
 Flammenreiger 935
 Flammenreiher 935
 Flammenvogel 934
Flaue - Flir 75. 8
 Fleischervogel II. 330
 Fleckkehlein II. 696
 Fliegenente 712. 748
 Fliegenfänger 560 II. 455. ff.
 564. ff. 594. 659. 688. 710.
 732
 Fliegenkolibri 692
 Fliegenschnäpper 411. 560.
 636. II. 564. ff. 575. 631.
 647. 653. 656. 665. 749
 Fliegenstecher 203. II. 455.
 567. 572. 578. 615. 657.
 709. 731
 Fliegenvogel 664. ff. 678. ff.
 685. 687. 690. II. 577. 657
 Florentinermeiße II. 778
 Florus II. 733
 Flöytetyten 1079
 Flüelerche II. 639
 Flügelfleck II. 669
 Flugtaube II. 143
 Flusadler 56
 Flusstenfelchen 1129
Flusterers 91. 2
Fluteur 109. 4
 Fluteux 105. 3
 Flycatcher II. 580 ff.
 Focke 965
Foet 75. 7
Forkeert - Regn - Spove 89. 1
 Formicivorus II. 297
Formique 63. 2
Fornarola 114. 15
 Forstue Svale II. 783
Forie pintacilgo 112. 7
Forzana 93. 2
Fosse - Fald 106. 5
Fosse - Kald 106. 5
 Fottivento 42. 16
 Fou 861
Fou de Bassan 72. 5
 Foudi - jala II. 614
 Lll 5

- Foudis II. 356
 Fouillet 114. 49
 Foulque 1128
 Fourréau 116. 11
 Francolin II. 99. 109
 Francoline blanche 103. 4
 Franquelle - ivernengk 109. 4
 Franquet 109. 2
 Franzente 772
 Franziskaner II. 396
 Frater Gavino 114. 45
 Fratino 116. 5
 Fratzenvogel 322
 Fräulein von Numidien 951
 Fregatta 835
 Fregatte 850
 Fregatvogel 851
 Frelot 114. 49
 Fremdling 81. 841
 Fremdlingsfalke 81
 Fresaye 43. 8
 Freseke 795
 Fretillet 114. 49
 Fringilla 426. 437. II. 327.
 374. 390. 427. 434. 444.
 454. 465. 474. ff. 633
 Fringillae affinis II. 330
 Fringuillago II. 757
 Fringuello 112. 3
 Friquet II. 536
 Frisone 109. 2
 Froschgeyer 69
 Froschgeyerl 70
 Frosone 109. 2
 Frühlingsbachstelze II. 645
 Frühlingspapagey 313
 Frühlingssticherling II. 644
 Fuchseule 148
 Fuchsgans 708
 Fugle - Konge II. 722
 Fuit 114. 49
 Fulaga 91. 2
 Fulebajuh 65. 39
 Fulica 1115. f. 1136
 Fullo II. 326
 Fulmar 834
 Fünffleck II. 330
 Funingo II. 179
 Funingo - maitfu II. 179
 Furfuragi 112. 36
 Fürstenschnepf 1031
 Fuselier 502
 Füt 75. 7
 G.
 Gaalammer II. 413
 Gaas 721
 Gaaseörn 32
 Gaasspon 86. 4
 Gabelgeyer 49
 Gabelschwanz 835. II. 456.
 567
 Gabilan 84. 4
 Gacher 925
 Gacke 355
 Gaddevierusch 1072
 Gadelbusch 764
 Gadiße 765
 Gadrille II. 715
 Gaffaru 112. 16
 Gänseaar 113
 Gänseadler 24. 31. 42
 Gänsehabsicht 76
 Gänsehirt 609
 Gänsefägetaucher 802
 Gaey 50. 6
 Gagl 734
 Gabrnis 84. 12
 Guigula 68
 Gairo 76. 6
 Gaiske 76. 3
 Gaity 50. 7
 Gakatte 75. 3
 Gakkor 75. 3
 Galander II. 230
 Galbero 52. 1
 Galbula 402. 590

- Galerand* 84. 21
Galerita II. 326
Galletto del bosco 108. I
Galgenregel 31
Galgenvogel 337
Galgulus 390. 399
Galka 50. 6
Galla-Mareza 93. 2
Gallina II. 43. ff. 48. ff. 80. 105
Gallina pratajula 95. 3
Gallina di Numidia 103. I
Gallina bianca 103. 4
Gallinae II. I ff.
Gallinache 41. 5
Gallinago 1030
Gallinazo 7
Gallinula 1037. 1070. 1118. 1123. 1145
Gallo 101. I
Gallocedrone 103. I
Gallo d'India 98. I
Gallopavo II. 30. 42
Gallus II. 44. 46. ff. 80. 740
Galskregl 392
Gambetta 1056
Gamberzola 87. 13
Gambettstrandvogel 1056
Gambiakernbeißer II. 382
Gamsengeyer 24
Ganga II. 106
Ganner 803
Gannet 860
Gans 703. 718. 711. 780. 827. 871. 995
Ganss 725
Ganso 67. 9
Garatauk 107. I
Garbella 50. 2
Garbenkrähe 391
Gardena 107. 2
Garde-charrue 114. 10
Garga 50. 10
Garganey 67. 32. — 68. I
Gargoas 886
Gargia 84. 21
Garinello 42. 16
Garnis 84. 12
Garrot 754
Garrula 390
Garrulus 392. II. 323
Garlotte 67. 32
Gartenammer II. 408
Gartensink II. 477
Gartengrasnücke II. 625
Gartenlerche II. 213
Gartenröthling II. 697. 700
Gartenrothschwänzlein II. 693. 699
Gartenschwarzkehlchen II. 696
Gärtner II. 435
Garza 969
Garzetta 973
Gase-Oern 42. 4
Gasuel 96. 2
Gattair 795
Gau 101. I
Gaukler 950
Gaugarza 116. 11
Gaul 734
Gaulammer II. 415.
Gaura 68. I
Gautereau 50. 7
Gavia 907. 1079. 1084. 1088. 1094
Gavi-gavi 87. I
Gavotte II. 438
Gawron 50. 2
Gay 50. 7
Gaye 50. 6
Gaza 44. 12
Gaza verla 50. 7
Gazola 84. 21
Gazza 50. 13
Gazzara 50. 13
Gazzuola 50. 13

Geni de bataille 109. 1

Geau 101. 1

Geay 361. 383

Gebirgspferling II. 554

Gebürggans 727

Gebüschfalke 189

Gedemalter 118. 1

Geeka 57. 1

Geelbeinlein 1123

Geelfußel 1123

Geelgerst II. 413

Gegler II. 482

Geier f. *Geyer*

Geirfugl 68. 1. — 69. 4

Geiskopfschnepfe 1045

Geismelker II. 810

Geist 385

Geisvogel 1017. 1053

Gelbbein 1025

Gelbbeinlein 1123

Gelbbrust 1122. II. 623

Gelbbrüstchen II. 268. 657

Gelbbrüstel 642

Gelbbusch II. 742

Gelbfink II. 515

Gelbflügel 424. II. 666

Gelbgans II. 412

Gelbhals II. 424. 636

Gelbkehlchen II. 268. 634. 657

Gelbkopf 425. 977. II. 371.

379. 643. 678. 729

Gelbling II. 413. 433

Gelbnase 1046

Gelbschnabel 23. 44. 106. 564.

989. 523

Gelbschopf II. 742

Gelbschupps 793. II. 742

Gelbschwanz II. 675. 731

Gelbschwarzkehlein II. 661

Gelbspecht 513

Gelbsteifs 423 II. 769

Gelbvogel 401. 415

Gelinote II. 94. 98. ff. 104

Gelinote blanche 103. 4

Gelsregel 391

Gelve 84. 21

Gemsennadler 23

Gentarubia 79. 1

Gentelmann 861

Gerabib 50. 2

Γερανος 355

Gereuthlerche II. 215. 218.

222

Gerfalke 100

Gerfault 101

Gerschwalbe II. 797

Gerstammer II. 405

Gerstendieb II. 536. 548

Gerstensink II. 365

Gerstenfresser II. 365

Gersthammer II. 407

Gerstling II. 407

Gerstvogel II. 407

Gertraudsvogel 217

Gerzab 84. 4

Ges 67. 9

Gefangdroffel II. 263. 269. 313

Gefanggrasmücke II. 615

Gefangkolibri 637. 639. 646

Gefanglerche II. 208

Gefangschwalbe II. 805

Gefangspferling II. 419

Gestettenschlager II. 657

Gestettenschwalbe II. 794

Geta 50. 7

Gewittervogel 1017. 1021

Geyer I. ff. 55. 59. 104

Geyeradler II. 12. 18

Geyereule 173 f.

Geyerfalke 13. 95. 99

Geverkönig 4

Geyerle 104

Geyerpapagey 295

Geyerschwalbe II. 797

Gheppio 42. 16

Ghiandaia 50. 6

Ghioua

- Gbiouaro* 63. 1
Giaddina d'eva 91. 4
Giaddina di campa 95. 3
Giarola 87. 13. II. 215
Gibitz 1053
Gibraltarschwalbe II. 803
Gickerlein II. 219
Giebelschwalbe II. 782. 789
Gieker II. 350
Gielavaelgo 107. 23
Gierd - Smutte 114. 46
Gierfalk 99
Giertruds - fugl 218
Gil 114. 45
Gilberfchen II. 413
Gilbling II. 413
Gilghero II. 521
Gillit II. 594
Gilloniere 107. 1
Giloch 1017
Gimpel II. 350. 362. 369. 370.
389. 391. 393
Gimpereau 548
Gimpl 109. 4
Gingi - Droßel II. 322
Gintel II. 533
Giög - Kukert 57. 1
Giök 57. 1
Gjöktina 58. 1
Girandello 86. 4
Girardel 86. 10
Girau 50. 7
Girardin 93. 3
Girameckz 107. 3
Girlitz II. 502
Giron 103. 4
Girmeye 928
Giu 43. 22
Gixerlein II. 259
Glada 42. 12
Glandarius 360
Glanzdroßel II. 281
Glareola 1039. f. 1051. 1068. 1071. 1077. 1111. ff. 1123. 1144
Glariana II. 220
Glattkehle II. 121
Glaucion 757
Glaucius 758
Glaucopis 28. 335
Glaumer 112. 3
Glead 42. 12
Glete 42. 12
Glib 90. 1
Glitter 926
Glockenspieler II. 294
Glöckner II. 294
Glottis 1037. 1124
Glowienka 67. 6
Gluch - jemiolucha 107. 2
Gluckente 759
Glücksvogel 219
Gluglu II. 148
Gluth 1097
Glutt 1037. 1124
Gluthahn 1124
Γναφᾶλος II. 327
Gnauts 884
Gneyser II. 156
Goatsucker II. 810 ff.
Gobe - mouche 560. ff. II. 455. 564. ff. 577. 581. ff.
Gobryvogel II. 364
Godwall 67. 20
Gog 101. 1
Gogl 734
Goifugl 69. 3
Goiland 905
Goiran 42. 15
Goifar 1017. 1018
Goisser 1004
Gol 101. 1
Golab 104. 1
Goldadler 31. 33. 38
Goldammer II. 371. 408. 412. 424. 475
Gold-

- Goldammering II. 415
 Goldammerchen II. 722
 Goldamsel 403. II. 287
 Goldäuglein 754
 Golden - crested Wren 114.
 48
 Golden - Eye 67. 23
 Golddroffel 403. 418. 430. II.
 282
 Goldfasan II. 72
 Goldfink II. 350. 485. 488.
 489. 515
 Goldflügel 516. II. 666
 Goldfuss 116. 119
 Goldgeyer 15. 20
 Goldhahn II. 73
 Goldhähnchen II. 720
 Goldhänlein II. 721
 Goldhannel II. 723
 Goldhendlein II. 721
 Goldkehle 450. 676. 595
 Goldkopf II. 379. 683. 744
 Goldkrähe 391
 Goldkrone II. 670
 Goldmeise II. 457
 Goldmerle 403. II. 457
 Goldpapagey 256
 Goldrabe 337
 Goldregenpfeifer 1094
 Goldspecht 516
 Goldvogel 590
 Goldvögelein II. 722
 Golkrabe 337
 Golob 104. 1
 Gomphön II. 52
 Gonambuch - Ammer II. 447
 Gonolock 205
 Goosander 68. 1
 Goose 67. 9
 Gorfou 829
 Gorge - bleue II. 703 f.
 Gorge - rouge II. 715
 Gornaja - Owfsänka II. 556
 Gorse II. 413
 Görtan 526
 Goshawk 77
 Gottesvogel 468
 Göttin 588
 Gouk 57. 1
 Goustarde 95. 1
 Gowry II. 365
 Graab el Sahara 385
 Graae - Trost 107. 2
 Graa - Gaas 67. 9
 Graairisk II. 616
 Graa - Irrisk 114. 3
 Graake 50. 6
 Graa - Meise II. 767
 Graa - Nakke 76. 3
 Graa - Spurv 112. 36
 Graasiken II. 530
 Grabeule 161
 Grabetz 112. 36
 Grabulusk 50. 10
 Gracchio 50. 3
 Gracula 433. 439. II. 468
 Graculus 384. 855. 861
 Graessika 112. 29
 Graes - Smutte 114. 6
 Graio 50. 6
 Gräker II. 482
 Gralla 50. 7
 Grallae 934 ff.
 Granafur 76. 7
 Granatvogel II. 496
 Grandoule II. 107
 Grasel II. 531
 Grasemücke II. 621. f. Gras-
 mücke
 Grasemunke II. 621
 Grasemüsche II. 622
 Grasfink II. 542
 Grashuhu 1144
 Grashüpfer II. 222
 Grasläufer 1139
 Gräselein II. 529. 531
 Gras-

- Grasmücke* 411. II. 285. 566. 575. 578. 612. 615. 619. 620. ff. 625. 632. 647. 651. 661. 664. 687. 708. 725. f. 748. 778
Grasmügg II. 621
Grasrättscher 1139
Grassa 50. 13
Graschnepfe 1031
Grasset 114. 3
Gräsmutte II. 621
Graspatz II. 662
Graspecht 521. 535
Grasvogel II. 542
Gratte-paille 114. 3
Graumammer II. 405
Grauentchen 772
Graufink II. 515. 535
Grauhänfling II. 525
Graukehlchen II. 669
Graukehlein II. 699
Graukopf 111. 527. II. 673
Graula 50. 3
Grauling II. 648
Graulö 61. 1
Graumeise II. 766
Graumeve 901. 905
Grauspecht 497. 544. ff. 756
Grav-Drage 67. 4
Grav-Gaas 67. 4
Graw-Entlein 772
Graw-Eule 162
Graw-Meißlin II. 768
Gray 67. 20
Graye 50. 4
Grebe 884. ff.
Greenfinch II. 373
Greenshank 1037
Greesa 103. 20
Greif 2. 9. 10
Greiff 2. 21
Greifgeyer 2. 21
Greillat 50. 3
Greille 50. 3
Greinerlin II. 220
Greis 824
Grenadier 505. II. 390
Grenadin II. 497
Greae 883
Griegelstter 189
Griel 1097
Grieltrappe II. 6
Grienvögelein II. 219
Griefshennl 1085
Gri-Gri 128
Grilisch 112. 17
Grillenlerche II. 235
Grillvogel 1084 1091. 1094
Grillenlerche II. 734
Grimmer 20. 49
Grimpant 59. 1
Grimparel 59. 1
Grimpereau 626 ff. 640 ff. 646
Grindling 109. 27
Grinson II. 480
Grinzling II. 374
Grifette II. 227
Grifin II. 648
Grifone 109. 2
Grißla 75. 1
Griunik 104. 19
Grive 1060 II. 250. ff. 256. 270. 298
Grive de brou 107. 1
Grive provençale 107. 1
Grive montamarde 107. 3
Grive des Ardennoises 107. 3
Grive de vendage 107. 3
Grive champenoise 107. 3
Grivette 107. 3. 4
Grolle 50. 3 f.
Gronsska 112. 16
Grönspeck 523. 527
Grönspek 59. 12
Gröngjoling 59. 12
Gröönling II. 373

- Gröönfchwanz II. 373
 Gros-beak II. 344 ff.
 Gros-bec II. 344 ff.
Grospillerie 112. 36
Gros-pinçon 109. 2
 Grössel 1139
 Groß-Ente 786
Große-zête 109. 2
Große-zete noire 109. 4
 Großfalk 95
 Großkopf 321
 Großmeiße II. 756
 Großherzog 139
 Großmaul 457
 Großschnäblerfalk 123
 Großschnäblerpapagey 277
 Großziemer II. 253
 Gros-Yeux II. 7
Grotto 72. 1
Groulard 109. 4. II. 661
 Grous II. 90. 94. 99. ff. 106
Gru 84. 4
Grua 84. 4
 Grue 951
Grulla 84. 4
 Grün, das vergoldete 682
 Grünbein 1037. 168
 Grünfink II. 371. 445. 458.
 503. 558
 Grünfuß 1117
 Grünfüßel 1068
 Grünitz II. 338
 Grünkehlchen 639
 Grünkrähe 391
 Grünling II. 292. 368. 371.
 469. 510
 Grünlingsblauspecht 554
 Grünrücken II. 182
 Grünfchling II. 414
 Grünschnabel 993
 Grünschnäbler 1097
 Grünschwanz II. 372
 Grünspecht 521. ff. 617
 Grünsperling 555. 558
 Grünvogel II. 370
 Grünzling II. 374. 408
 Grüper 617
 Grus 949. 959
Gruy 86. 3
Gruz 84. 4
 Grygallus II. 93
 Gry-gry 128
 Grylle 871
Grylle 88. 1
Gryllenrenna 59. 17
Gryllfingroes 109. 1
Gryllivora II. 284. 319
 Grylltaucher 871
 Gryphus 2
Grytan 86. 3
Grzebielucha 117. 4
Grzymacz 104. 19
Guachichil 66
 Guacu-guacu 900
 Guainumbi 670. 672. f. 681 ff.
Gualbedro 52. 1
 Guan II. 37
 Guara 1010
Guaracyaba 66. 12
Guaracygaba 66. 12
 Guarabe 239
 Guarauna 1015
Guas à Sierri Paneuryn 112. 7
 Guaya-Fliegenfänger II. 587
 Guckaug 466
 Guckérlein II. 218
 Guckgu 466
 Guckguck 466
 Guckufer 466
Gudunge 67. 15
 Guépier 598
 Guereira II. 331
Gueule de four 116. 11
Gufo 43. 4
 Gugauh 466
 Gugelfahraus 403. 405
 Gugel- /

- Gugelfhaus 405
 Güger II. 351
 Gugug 466
Guianumbi 66
 Guiffo-Balito II. 395
 Guignard 1090
 Guignette 1073
 Guillemot 870 ff.
Guillrie 112. 36
Guinea-Hen 103. 1
 Guira II. 701
Guira-Acangatara 57. 32
 Guiraba 239
 Guiraberaba II. 702
 Guiracoereba 651
 Guiraguacuberaba II. 702
 Guiraienoia II. 465
 Guira-Guianumbi 321
 Guiranheemgatu II. 420
Guiraru-Nbengeta 44. 7
 Guirapanpa II. 332 f.
 Guira-Tangeima 409
 Guiranhemgeta II. 457
 Guiraperea II. 467
 Guiratinga 974
 Guira-tirica II. 357
 Guirnegat II. 420
 Guit-guit 631. ff. 636. 650
 Gukker 466
 Gulaudente 729
Gulbis 67. 1
Guldenbead 69. 4
Gulföring 76. 7
Gulin 53. 2
 Gull 849
 Gulo 845
 Gulpink II. 645
Gulspurv 110. 5
Gulwesling 110. 5
 Gumbert II. 52
 Gumpel II. 350
 Guorga 971
 Guraundi II. 457
 Gurgelhahn II. 84.
 II. Band II. Th.
 Gurse II. 413
 Gufgastak 1019
 Güs-vogel 1021
 Güh-vogel 1017
 Gutmerle 403
Guulbek 42. 13
Guignot 112. 3
 Gybitz 1055
 Gyfitz 1053. 1055. 1079
Gylfinbratz 109. 1
 Gypfel II. 350
 Gyntel II. 533
 Gyratrix II. 155
 Gyrfalco 99. 101
 Gyrfalk 99
Gyrta-maly 86
Gysfugl 43. 6
 Gywitt 1055
Gzegzodka 57. 1
 H.
Haalla 67. 30
Haan 101. 1
 Haarbull 1035
 Haarschnepfe 1034. 1073
 Haavella 765
 Habereau 124
 Haberlämmchen 1031
 Habesch II. 559
 Habich 77
 Habicht 40. 55. 61. 76. 104.
 115. 116. 129. 130
 Habichtseule 172 ff.
 Hacht 77
 Hackespett 503
Hacotidinen 112. 28
 Haddae 48
 Hädjal II. 116
Haeger 84. 12
 Haematopus 1108
 Haf-Meve 898. 908
Hafs-Orn 42. 39
Hafs-Tjäder 72. 3
Hafstrur 76. 6
 Haf-Sula 861
 Mmm
 Hag.

- Hag-Amsel II. 320
 Hagedash 1014
 Hagelgans 706. 1126
 Hagent 786
 Häger 361
 Hagur 84. 4
 Habaseu 50. 2
 Hähle II. 350
 Hahn 46
 — indianischer II. 41
 Hahnentaupe II. 184
 Haidenpfeifer 1093
 Hakik 70. 1
 Hakardaja 75. 4
 Hakke-Spaet 59. 1
 Halbe Mond II. 233
 Halbente 756. 868. ff. 877. 880
 Halbhuhn II. 57
 Halbmeve 928
 Halbmondstink II. 510
 Halbschnabel 528
 Halbschnepfe 1034
 Halbtrauer II. 773
 Halcon 42. 13
 Halcyon 570
 Halebrand 67. 32
 Half-Schnepf 86. 8
 Haliaetus 56
 Halkion 69. 5
 Halträäf 107. 2
 Halsbaander-Lom 75. 5
 Halsbinde 667. II. 229
 Halsdreher 497
 Halskrausentaube II. 153
 Halskraved-Dykker 75. 7
 Halsregel 391
 Halswinder 496
 Halvkroppert II. 160
 Hämmerling II. 415
 Hämpling II. 527
 Hamp-Meis 116. 8
 Hane II. 48
 Hanefferl II. 527
 Hanfsünke II. 527
 Hänfling II. 371. 373. 426.
 439. 522. ff. 528. 534. f.
 613. 744 ff.
 Hanfmeise II. 767
 Hangnestkernbeisser II. 385
 Hangvogel 301
 Hanik 766
 Hanikens 85. 3
 Hannaquaw II. 65
 Hannekin 50. 6
 Hännelinne 114. 11
 Hardväsrfogel 110. 1
 Ha-Old 67. 30
 Hare-fod 103. 4
 Harekenblatt 1031
 Harfäng 43. 6
 Harfugl 63. 1
 Harle 802
 Harlekin 280. 775
 Harlekinsgrasmücke II. 678
 Harlekinspecht 536
 Harpax 44. 12
 Harpunirer 538
 Harpunreiber 1002
 Harpyia 18
 Harrakas 50. 13
 Hartschnabel II. 347
 Har-Ugglan 43. 7 f.
 Haselhuhn 1036. 1045. II. 88.
 95. 98. f. 103. 109
 Haselwildpret II. 103
 Hasenaar 31
 Hasenadler 26. 31
 Hasenfuß II. 96
 Hasengeyer 13 f.
 Hasenstößer 14
 Haskef 76. 10
 Häster 374
 Hatschen 783
 Hatzler 361
 Hätzler 361
 Hauaar 49
 Haubellerche II. 225
 Haubelmeise II. 753

Hauben-

- Haubenadler 25
 Haubenalk 821
 Haubenblutfink II. 354
 Haubendrossel II. 324
 Haubeneisvogel 576
 Haubenente 791. f. 795
 Haubenfalk 97
 Haubensink II. 354
 Haubengeyer 25
 Haubenheher 364
 Haubenhuhn II. 49
 Haubenkernbeißer II. 359
 Haubenkolibri 661. 687. 690 ff.
 Haubenkönig II. 720
 Haubenkormoran 857
 Haubenlerche II. 223. 226
 Haubenmeise II. 752
 Haubenmerle 436. II. 470
 Haubenpapageytaucher 821
 Haubenspecht 505. 507 ff.
 Haubensteißeßfuß 883
 Haubentaube II. 150
 Haubentaucher 883
 Haubenzeißig II. 741
 Haugelerke II. 223
 Hausammer II. 433
 Hausammerling II. 432
 Hausdieb II. 548
 Hauselster 735
 Hausente 782
 Hauseule 178
 Hausgans 725
 Haushahn II. 46
 Hauskade II. 663
 Hauskrähe 344
 Hausröthele II. 693. 713
 Hausrötelein II. 693
 Hausröthling II. 692
 Hausrothschwänzlein II. 692
 Hausrothschwänzchen II. 697
 Hausrothschweiß II. 697
 Hausfchmätzer II. 600
 Hauspar II. 548
 Hauspatz II. 550
 Hausperling II. 547
 Hausfchwalbe II. 782. 789
 Haustaube II. 143
 Hausteufel 1050
 Hautgrive 107. 1
 Hav-Aare 713
 Hav-Aelder 765
 Haudirdell 69. 5
 Havelda 67. 30
 Havelerke II. 223
 Havellaea 765
 Havgasse 880
 Hav-Hest 70. 3
 Hav-Hymber 75. 5
 Hav-Immer 75. 6
 Hav-Maase 76. 6
 Hav-Old 67. 30
 Hav-Orre 67. 5
 Havre-Fugl 114. 11
 Hav-Simmer 67. 4
 Hav-Skade 114. 18
 Hav-Skiärn 884
 Hav-Skiärre 75. 7
 Hav-Sula 861
 Hawfinch 109. 2
 Hawk 43. 4 ff.
 Hawks-Eye 88. 6
 Hawram 50. 2
 Hayduk II. 666
 Hazel Grouse 103. 9
 Heatototl 802
 Heckenammer II. 432
 Heckenschinatzler II. 620. 689
 Heckenfpringer II. 689
 Heckenf vogel II. 689
 Heckenwenzel II. 619
 Heckenwittwe II. 619
 Heckschnärre II. 639. 39
 Hedge-Sparrow 114. 3
 Hedge-Warbler 114. 3
 Heedelerke II. 216
 Heelkroppert II. 160
 Heelfpove 1019
 Heerdschnepfe 1031
 M m m 2 Heer.

- Heergans 970
 Heerholz 361
 Heerschnepfe 1030
 Heervogel 609
 Hegre 971
 Heher 334. 360. 374. 383. 409
 Heidedrossel II. 259
 Heidehuhn 1050
 Heidelhahn II. 89
 Heidenelster 391
 Heidlerche II. 208. 213. 215.
 222. 225. 226
 Heidenmeise II. 753
 Heideziemer II. 259
 Heiduckenadler 18
 Heiloe 1093
 Heilomer 1092
 Heire 84. 12
 Heister 374
 Heisterschnepfe 1110
 Hekatschitschir 69. 9
 Helegug 69. 4
 Helias 991
 Helkregel 391
 Helmtaube II. 156
 Helmivogel 328
 Helsing 731
 Hemperling II. 526
 Henfling II. 527 f.
 Hennotter 958
 Herbstente 779
 Herbstpapagey 293
 Herfugl 611
 Heringsmeve 908
 Herold 361
 Heron 950. 967. ff. 970 ff.
 Herrenschnepfe 1031
 Herrenvogel 360
 Hesse 374
 Heteropus 8
 Hetz 376
 Hetzle 360
 Hetzler 361
 Heubellerche II. 225
 Heubelmeise II. 754
 Heumäher 595
 Heuschreckenvogel II. 283
 Heuvogel 595
 Heyro tairé 63. 29
 Hemhole 59. 12
 Hexe II. 809
 Heydelerche II. 225. f. Heide-
 lerche
 Heydemeisslein II. 753
 Heyer 360
 Heyle 1093
 Heyloe 88. 6
 Härpe 103. 9
 Hiaticula 1084
 Hibou 43. 4
 Hjeile 88. 6
 Hieilo 88. 6
 Hierengrill 617
 Hierpe 103. 9
 Higboe 59. 12
 Himantopodi 1100
 Himantopus 1081
 Himbrinen 879
 Himmelgeiß 1019. 1031
 Himnellerche II. 207. 213
 Himmelsziege 1030
 Himpulinda 112. 28
 Hinnularia 44
 Hippolais II. 623
 Hippomanucodiata 443
 Hirngrill II. 502
 Hirn. Grillerl II. 503
 Hirondele 922. ff. II. 783 ff.
 Hirschfink II. 347
 Hirschvogel II. 372. 374
 Hirundo 880. 921. II. 781.
 812
 Hito 61. 1
 Hitzor 59. 9
 Hoactli 975
 Hoactzin II. 66
 Hoamy II. 298
 Hoazin II. 66

- Hobby 125
 Hobreau 42. 14
 Hocco II. 40
 Hocbe-queue 114. 11
 Hochschwanz II. 275
 Hoeg 42. 28 ff.
 Hoen 101. 1
 Hoens 101. 1
 Hoffperling II. 549
 Hoftaube II. 143
 Hohlente 754
 Hohlkrähe 501 ff.
 Hohl schnabel II. 140
 Hohl schnäbler 316. 319
 Hohtaube II. 140
 Hohu 975
 Hoilotl II. 175
 Hoitlallotl II. 65
 Hoitzitzel 66
 Hoitzillin 646
 Hoitzin II. 66
 Hokko II. 40
 Hoko II. 39
 Hol Taube II. 142
 Holzeule 162
 Holzhacker 545
 Holzhackerspecht 505
 Holzhäher 360
 Holzheher 360
 Holzhuhn 502. II. 98. 102
 Holz-Krae 394
 Holzkrähe 391. 502
 Holzkrahe 302
 Holzlerche II. 208. 213. 215
 Holzmeise 764. 766
 Holzmuschel II. 555
 Holzschnepe 1026. 1077
 Holzschreyer 361. 368
 Holzsneppe 86. 6
 Holztaube II. 139. 172
 Honigadler 10
 Honigbuffard 69
 Honigkukuk 487
 Honigfauget 556. 660. ff. 681
 Honigweiser 488
 Honigzeiger 487
 Honney-Guide 488
 Höns II. 48
 Hookoo 621
 Hoop 64. 1
 Hoopoe 611
 Hopling 72. 3
 Horbel 1125
 Hordeola II. 407
 Hörnereule 143
 Horneule 139 ff.
 Hornohreule 143
 Horn schnabel 1131
 Hornträger 943
 Hornvogel 323
 Horrevogel 361
 Horsegiag 1032. 1069
 Hortulana II. 408
 Hortulanus II. 402. 431
 Host-Fugl 86. 8
 Horthyel 984
 Hottentot II. 730
 Hottentottenkernbeißer II. 380
 Hottentottenkrähe 337
 Hottentottenrabe 337
 Houbara II. 9
 Houette 43. 5
 Houtarde 95. 1
 Howler 43. 7
 Hoystiert II. 154
 Hozitzanat 380
 Hrafn Oend 793
 Hraukur 857
 Hrossa-Gökr 1032
 Hrota 734
 Huan 44. 12
 Hubara II. 9
 Huda-urnik 117. 3
 Hudjaefa II. 142
 Hudsonsbayfalke 93. 94. 107
 Huet 88. 6
 Huexototl 99. 1
 Huhn II. 46
 M m m 3
 Hühner-

Hühnerartige Vögel II. I

Hühneraar 9. 51

Hühneralk 821

Hühnerdieb 49. 129

Hühnerfalk 66

Hühnergeyer 40. 49. 66. 71

Hühnerhabicht 66. 76. 105

Hühnerschwanz II. 153

Hühnerweihe 9. 53. 66. 71

Huhu 161

Hubu 65. 27

Huhuy 139

Huid-Maase 76. 3

Huit 88. 6

Huitrier 1109

Huitziril 66

Hulote 161

Humming-bird 683

Hundsmeise II. 764

Hüner f. Hühner

Hupe 64. I

Huru 40

Hus-Swala 117. 3

Hutsche 374

Hutmerle II. 471

Huttanager II. 471

Hurri 88. 6

Hutrich 88. 6

Hüting II. 600. 693

Huns-Kald II. 549

Huns-Spurv 112. 36

Huns-Svale 117. 3

Huw 140

Hvidlaaring 853. 856

Hvidside 68. 5

Hvid-Svale 117. 3

Hvidlaaring 72. 3

Hvinand 755

Hvin-Ander 755

Hvit 112. 3

Hydrocorax 323. 326

Hyeiler 1095

Hyldeleerke II. 223

Hymber 879

Hypolais II. 616. 623

Hys-Thomas 69. 5

I.

Iabantan 103. 9

Iabiru 944

Iabiru-guacu 945

Iacacinthli 1119

Iacamaciri 591

Iacamar 589

Iacana 1133 ff.

Iacapa II. 450

Iacapani 411

Iacarini II. 456

Iacauquitototl 496

Iack 42. 118

Iäck 361

Iaco 265

Iacob 69. 5

Iacobin II. 385

Iacobiner II. 363. 365

Iacobinerin 690

Iacobinerortolan II. 405

Iacu II. 38

Iacub 96. I

Iaculator 538

Iacupema II. 37

Iacurutu 143

Iacuta 50. 7

Iadreka 1041

Iägervogel 327

Iagdfalk 81

Iäggelosko 45. 6

Iaguacati-guacu 578

Iaguilma 250

Ia-la 50. 7

Iaik-Obreule 153

Iakdaw 556

Iakobinertaube II. 150

Iaku II. 38

Ialousietaube II. 197

Iamac 424

Ian van Gent 72. 5

Iännefebüüp 43. I

Ian Porragie Eend 67. 33

Ian-

Iupitersfink II. 488
 Iupujuba 416
 Iurar 75. 7
 Iurra 42. 3
 Iurz 117. 6
 Iütvogel 1018. II. 410
 Iuwelenkolibri 680
 Iwolga 52. 7
 Ixlin II. 646
 Iynx 497

K.

Ka 50. 6
 Kaa 356
 Kaath 57. 1
 Kaapwachtel 381
 Kaar 50. 2
 Kaarnbicker II. 344
 Kaatmeisse 116. 8
 Kabure 152
 Kaczka 67. 40
 Kaenne 50. 2
 Käfer-Endtle 888
 Käferentchen 889
 Kaggi 57. 1
 Kaerak 69. 5
 Kaerthuk 67. 40
 Kagaloka 761
 Kahlbacken 435
 Kahlfuß 143
 Kahlhals 4. 371
 Kahlkopf 6. 371. 944
 Kaja 50. 6
 Kaine 42. 15
 Kajordlek 88. 6
 Kajorrovek 88. 6
 Kaiortok 67. 5
 Kaiserfink II. 563
 Kaiservogel 951
 Kajuhrvogel 872
 Kakakew 50. 2
 Kakatoo 261
 Kakatoeha 262
 Kakatoes 262
 Kakatu 260. ff. 263

Kakelik II. 124
 Kakopit Tfioi 644
 Kakordluk 70. 3
 Kakordlungnak 70. 6
 Kakordluvek 70. 3
 Kakugtanak 70. 3
 Kalandlerlerche II. 230
 Kalekut II. 30
 Kalekuter II. 30
 Kalkun II. 31
 Kallakul 76. 2
 Kaloe-Koeroelgoya 42. 13
 Kalotchenfalk 129
 Kalotte II. 155
 Kalv 1110
 Kameelstraufs II. 11
 Kameelvogel II. 11
 Kamichy 943
 Kammadler 18
 Kammmlerche II. 224
 Kaminreiher 970
 Kampfhahn 1050
 Kanarek 112. 23
 Kanarienbastard II. 540
 Kanarienvogel II. 502. 511 ff.
 Kanarienzeischen II. 502
 Kanary 112. 23
 Kanepu putnini 112. 28
 Kania 42. 12
 Kaninchen-Eule 160
 Kannakul 42. 12
 Kanutsvogel 1074
 Kanutsstrandvogel 1074
 Kaphtar 104. 1
 Kappennonne II. 151
 Kappentaube II. 151
 Kappentaucher 801
 Kappenmeise II. 753
 Kap-Racke 390
 Kapsperling II. 494
 Karagatky 67. 46
 Karagusb 42. 5
 Karakara 54. 1155
 Karakka 46

- Kardinal II. 358. f. Cardinal
 Kardinalchen II. 444
 Kardinalfink II. 354
 Karechel 348
 Karminente 793
 Karminhänfling II. 525. 529
 Karminpelikan 935. 940
 Karnellen 772
 Karok 348
Kärrik 59. 1
Karsoak 76. 3
 Kasarka 728
 Kasarken 730
 Käsemeise II. 760
 Kasuar II. 15
Kasuaris 96. 2
 Katondieb 559
Katta 103. 20
 Katreka II. 64
Katugle 43. 13
Kat-Ugl. Hane 43. 1
 Katzeneule 148
 Katzenvogel II. 594
Kauio 103. 4
 Kaularsch II. 52
 Kantkegef 899
 Kantz 156. ff. 170. 177
 Käutchen 146. 178
 Käutzelein 148. 169. 178
 Kautzeule 165
Kaw 50. 6
Kawa 50. 6
Kawka 50. 6
 Kaye 356
 Kayke 355
Kedrowka 50. 10
 Keeask. 917
 Kegelschnabel 334
 Kegelschnäbler 334
Kehwabla 87. 1
 Keichreier 956
 Keilhaken 1010. 1017. 1022.
 f. Keulhaken
 Keilschwanz 590. II. 334
 Kekuschka 769
Keczan Derkacz 93. 1
 Keltreu 1133
Kemperken 87. 1
Kenar 67. 40
Κενχραμος II. 408
 Keptuschka 1061
Kerella 59. 13
Kereu II. 281
Kerkugle 43. 8
 Kernektok 50. 2
 Kernel 770 f.
 Kersienriefe 402
Κερθιος 620
 Kernheisser II. 337. ff. 343.
 383. 391. f. 445. 453
 Kernfresser II. 346
Kerlutokpiarsuk 67. 23
 Kestrel 111
Keugolok 84. 11
 Keulhaken 1094. f. Keilhaken
 Keylhaken 1094
Kjüder 103. 1
Kiankia 41. 5
Kiärnds-And 67. 31
 Kibgeyer 13
 Kibiz 1053
Κιχλαι II. 256
Kidlingaejouk 72. 3
 Kiebitz 1053
 Kiebitz 1043. 1059. ff. 1080.
 1135
 Kieder 168
 Kiefiz 1052
Kield 90. 1
 Kielrabe 337
 Kield 1110
Kierne-Bider 109. 3
 Kievitz 1053
Κιγυλος II. 254. 654
Kibris 76. 2
 Kik 70. 1
Kikkukahsa 86. 7
Kikkuts 86. 6
 Mmm 5
 Kildic

- Kildir 1088
 Killengak 69. 4
 Kindermelker II. 810
 Kingalik 67. 5
 Kingsfisber 63. 1
 Kink 430
 Kinki-Manou II. 585
 Kioe 914
 Kiöd-Meise II. 756
 Kioegelrifare 109. 1
 Kiolo 1152
 Kioven 914
 Kirchenfalke 110
 Kircheule 164. 170
 Kirchschwalb II. 790. 798
 Kirkesvale II. 798
 Kirreule 168
 Kirremeve 928
 Kirschdieb 402
 Kirschdrossel 403
 Kirschfink II. 343. 354. 382
 Kirschhold 402
 Kirschknäpper II. 343
 Kirschleske II. 343
 Kirschschneller II. 343
 Kirschvogel 402
 Kirsebärfugl II. 345
 Kirve 914
 Kiskeman 61. 7
 Kiskemarasue 67. 7
 Kiß-Kiße-Keschisch 116. 6
 Kitawiah II. 107
 Kite 42. 12
 Kittæ 377
 Kittivake 897
 Kiufoa 76. 10
 Kive 914
 Kiwit 87. 1
 Kiwitz 1070. 1100
 Kimulis 112. 25
 Klaas 355
 Klaber 545
 Kladra 107. 3
 Klaeshan 67. 28
 Klage 173
 Klagefrau 173
 Klangente 754
 Klapperente 755
 Klapperralle 1145
 Klashan 765
 Klashanik 766
 Klatschtaube II. 163
 Klauber 547
 Klausrapp 387
 Klavert 44. 12
 Kleberblauspecht 545
 Kleiber 545
 Kleinent 772
 Kleinspecht 617
 Kleinziemer II. 261
 Klektunja 67. 96
 Klener 545. 547
 Klepper II. 343
 Klera 107. 3
 Klesk 50. 10
 Klette 641. 662. f. *Falcinellus*
 Kletter II. 488
 Kletterspecht 626
 Klettervogel 617
 Klinger 754
 Klinger-Gaas 67. 9
 Klippenhahn II. 739
 Klippenvogel 900
 Klosterfräulein II. 637
 Klosterwenzel II. 661
 Klov-Mand 87. 13
 Klub-Alk 819
 Klumbenefu 69. 1
 Kluthuhn II. 52
 Klyde 1106
 Klympe 69. 1
 Knäckente 769
 Knappeule 149. 161
 Knarand 750
 Knarreule 168
 Knarrhuhn 1154. II. 78
 Knecht 1139
 Kneifer 802. 806

- Kniäfcok II. 776
 Kniäfziok II. 776
Knibgas 87. 13
Knipa 67. 23
 Knipper II. 406. 431
 Knokkel-Skade II. 156
 Knorrhuhn II. 78
Knötter 110. 3
 Knurre II. 505
 Knutge-Gef 899
 Koato—o—oo 581
 Kobelente 754. 793
 Kobellerche II. 224
 Kobelregerlein 1084. 1112
 Kobeltaucher 883
Kober 42. 23
 Kobetz 122
Kockok 57. 1
Kockunt 57. 1
Koekkoek 57. 1
Koenai 50. 2
Kogo 63. 18
 Kohlamsel II. 302
 Köhler II. 461
 Kohleule 165
 Kohlfalk 85
 Kohlmeise II. 755
 Kohltaube II. 172
Kohlfrost 107. 22
 Kohlvogelchen II. 656
Kohsa 50. 6
Kokkas 42. 2
Kokxvž 57. 1
 Koko 1012
Kökobyka 59. 1
Kokofz 101. 1
Kokufch 101. 1
 Kolbentaucher 803
 Kolenicui II. 125
 Kolibri 660
 Kolibridiane 690
 Kolibrispecht 645. 650. 663.
 670 ff.
 Kolin II. 125
 Kolkrabe 337
 Kolkraue 337
 Köllje 354
Kolmnieszik 87. 1
Kolpiza 80. 1
 Koltaube II. 142
 Kombara II. 209
Komishark-papanasew 42. 30
 Kommandeur 413
Kongmurajon 67. 40
 Könickerl II. 718
 König II. 725
 Königlein II. 720
 Königsammer II. 442
 König der Vögel II. 721
 Königsdroffel II. 297
 Königsente 715
 Königsfischer 565. 567
 Königsgans 711
 Königsheher 444. 447
 Königsparadiesvogel 446
 Königsplattschnabel 559
 Königsvogel 446. 849
 Königsweihe 49
Koninsken 114. 48
Konopka 109. 27
Konoplenka 112. 28
 Kontra II. 242
Koore-Krey 50. 4
Kopanauarsuk 110. 1
Kopamungarsuk 110. 1
 Köppel 91
 Koppenriegerlein 1084. 1112
 Kopp-Riegerle 1112
Kopxž 50. 2
 Kore 103. 13
 Korkorre 934
 Kormoran 852
Kornknarren 93. 1
Korn-Luerke 110. 3
 Kornlerche II. 207
Kornskrika 50. 7
 Kornspierling II. 548
 Kornvogel II. 413

- Kornwerfer II. 548
 Korp 50. 2
 Korschun 52
 Kors Fugl 109. 1
 Korsnaef 109. 1
 Κορυδαλος II. 210
 Κορυδος II. 210
 Kos 107. 22
 Kositza 86. 7
 Koss 107. 22
 Kostobryz 50. 10
 Kothhahn 609
 Korbantl 67. 33
 Kothahn 622
 Kothlerche II. 219
 Kothmönch II. 225
 Kottler 545
 Kottmeise II. 766
 Κοττιφος II. 304
 Koza. Baranek 86. 7
 Kou kay konn 59. 8
 Koulik 314
 Kourier 1014
 Kowabrna 50. 6
 Kowit 76. 2
 Koyolkos II. 126
 Kozodoy 118. 1
 Kraaispecht 59. 1
 Kraako 352
 Kraakspinte 59. 18
 Kraanvogel 84. 4
 Krabbenfresser 977. 982
 Kräe 344
 Krag 50. 2
 Krage 352
 Kragenente 775
 Kragenhuhn II. 101
 Kragenkolibri 686. 690
 Kragenpapagey 243
 Krähe 342. f. 350. 373. 380.
 f. 392. 410
 Krähendohle 304. 385
 Krähenpelikan 855
 Krähen specht 502
 Krährabe 344
 Kraecka 67. 33
 Krai 50. 5
 Kralitsch 114. 48
 Krakugle 43. 8
 Krametsfugl II. 254
 Krammetsvogel II. 249. ff. 252
 Kramsfugl 107. 2
 Krammsvogel II. 252
 Krammtvogel II. 252
 Kran 350
 Kranabeter II. 255
 Kranabetsvogel II. 255
 Kranch 952
 Kranich 943. f. 949. 951. f.
 956. f. 979
 Kranig 951
 Kranugli 173
 Kranveitl 348
 Kranwetsvogel II. 255
 Krappenfresser II. 346
 Kraska 51. 1
 Krasnye - Ueki 67. 46
 Krauklis 50. 2
 Krauselster 189
 Krausfink II. 560
 Kraushahn II. 51
 Kräutervogel II. 467
 Krauthänfling II. 525. 519
 Krautvögelchen II. 219. 656
 Krautvogl II. 235
 Krebsfresser 946
 Kreifelschnäbler II. 157
 Krekkop 67. 26
 Kremer 1106
 Kreng. Rave 41. 5
 Krepper II. 159
 Kretogtow 58. 1
 Kretzel 42. 37
 Kreuzdohle 359
 Kreuzelster 809
 Kreuzmeise II. 764
 Kreuzschnabel II. 338
 Kreuzvogel II. 339

- Krick 259. 277. 281. ff.
 Krickelster 189
 Kriechelster 391
 Kriechente 770. ff. 774. f. 778 f.
 Kriechentlein 791
 Kriechhuhn II. 53 ff.
 Kriechmeise II. 759
 Kriecke 774
 Krieff. Dove 104. 19
 Kriegernte 770
 Kriegssammer II. 240
 Kriegsschiff 842
 Kriegsschiffsvogel 841
 Kriegstanager II. 465
 Kriia 923
 Krikand 771. 773
 Krikente 772
 Krikke 770
 Krinis II. 341
 Krinitz II. 341
 Kritschäne 1127
 Kritschele 1127
 Krizstela 50. 13
 Krogulek 42. 14
 Kroka 50. 5
 Krokke 899
 Krolík czubaty 114. 48
 Krolík nieczubaty 114. 49
 Krol Myszy 114. 46
 Kronadler 18
 Kronenadler 18. 25
 Kronenfalk 19
 Kronengeyer 19
 Kronenseidenschwanz II. 333
 Kronentaube II. 169
 Kronenvogel II. 169
 Kronschnepfe 1017
 Kronvogel 488
 Krop. Due II. 160
 Kropfgans s. Pelikan
 Kropfelikan 845. 1002
 Kropftaube II. 159
 Kropfkirne 923
 Kröpper II. 159
 Krössler 1052. 1139
 Krückelster 189. 198
 Kruckelster 189
 Krückente 772
 Krückentlein 772
 Krugelhahn II. 84
 Kruk 50. 2
 Kruka 114. 6
 Krukko 757
 Kruk. lesney 50. 19
 Kruk. modny 72. 1
 Krukmorsky 67. 1
 Krullhahn II. 51
 Krumschnabel II. 339
 Krummschnabel 187. 1017.
 1106. II. 338
 Krummschnabel - Ente 781.
 1006
 Krünitz II. 338
 Krüper II. 53
 Kruphahn II. 53. f.
 Krüppel 1137
 Krüütschnabel II. 339
 Krys 952
 Krykkie 899
 Krykie 76. 2
 Krypare 65. 1
 Krzymonos 109. 1
 Kübitz 1053
 Küchenschwalbe II. 782
 Kuckuck 315. 464. ff. 517
 Kuckucksamme II. 620
 Kuckucksköster 609
 Kueronden 42. 71
 Kugelelster 391
 Kugelfishaus 305
 Kuh. Auh II. 72
 Kuhfink II. 506
 Kuhn hahn II. 31
 Kuhscheisse II. 732
 Kuhstelze II. 644. f. 732
 Kujavier II. 587
 Kuk 57. 1
 Kukauza 466 — 57. 1

- Kukawka* 57. 1
Kükendiëff 42. 62
Kukeplück 175
Kukerz 57. 1
Kukkuk f. Kuckuck
Kukkuks-Manden 57. 1
Kuksuk 72. 5
Kukulka 57. 1
Kul 42. 27
Kulik 86. 7
Kulkrabe 337
Kummulis 112. 7
Kunbar II. 209
Kunthur 3
Kuntur 2
Kupfmeise II. 754
Kuppmeise II. 754
Kura 43. 7
Kurassauer 681. II. 40
Kurassovogel II. 41
Kurbukon 105. 4
Kurg 84. 4
Kurka 50. 3
Kurki 951
Kurlik 76. 9
Kurlik czerwonemi nogami 86.
 II
Kuro Patwa 103. 13
Kurrata 103. 13
Kurre II. 89
Kurruku 452
Kurzschwanz 27. 36. 381. 647.
 650
Kusko II. 44
Kuskovogel II. 41
Kussektak 114. 11
Küstenjäger 1070
Kutgegeef 899
Kutberthsente 737
Kuttengeyer 4
Kutte-Rutte 87. 4
Kuttvogel II. 372
Kuyameta 65. 38
Kwakkel 103. 20
Kwartel 103. 20
Kwartel Koning 93. 1
Kwicziela 102. 2
Kwiczoed 107. 2
Kybitz 1052. 1079. 1087. 1101
Kyssektak 114. 15
Kyschuguigalli 69. 10
 L.
Labee 67. 1
Lackschnabel II. 366
Lachfalke 102
Lachgans 716
Lachkukuk 478
Lachmöve 907. 911. 913
Lachtaube II. 194
Lachweyhe 111
Lade-Svale 117. 1
Ladu-Swala 117. 1
Laeniadudra 87. 13
Laf-Uhl 88. 1
Laggel 67. 9
Laggias 67. 9
Lagopede 103. 4
Lagopus II. 83. 89. 92. 94. 95.
 704
Lagsdigalla 114. 1
Lagsdiagalla kalpas 114. 6
Lämmergeyer 20
Lämmerhied II. 645
Lanarius 103
Landadler 33
Landörn 32
Landralle 1149
Landzeiger 838
Lanette 102. 104
Lang 73
Langbein 1099
Langevige 876
Langfuß 1099
Langhals 650. 761. 864
Langivie 875
Langgraien 44. 28
Lang-Neeb 86. 3

- Langschnabel 472. 627. 805. II. 675. 691
 Langschwanz 54. 647. 664. 766. II. 335. 774
 Langvine 75. 2
 Lang-Zunge 498
 Lanier 102
 Lanio 103. 191
 Lanius 182
 Lappmeesen 116. 11
 Lappskata 44. 25
 Lap-izoy 109. 77
 Lapving 87. 1
 Larderiche 116. 3
 Lark II. 211 ff.
 Lärka 105. 1
 Lärmente 750
 Larus 839. 895. ff. 927
 Lasur-Vogel II. 559
 Laubfinke II. 485
 Laubhahn II. 89
 Laubvögelchen II. 725. 736
 Lauditza 105
 Läufer II. 725
 Lauferfalk 69
 Laufogl 1106
 Laufvogel 1014
 Lauhol 88. 5
 Laukuirbe 103. 9. 13
 Lauloräästas 107. 4
 Lauriol 52. 1
 Laufot 52. 1
 Laustaza 117. 1
 Lautedrossel II. 294
 Lavandiere II. 637
 Lavit 117. 2
 Lax-Tite 86. 11
 Lax-Tiring 86. 11
 Layette 105. 1
 Layong-Layong II. 788
 Leech-Owl 43. 9
 Leewaark II. 208
 Leffler 739
 Legled 84. 4
 Lemans-Griis 43. 6
 Leicheneule 178
 Leichenhühnchen 178
 Leichvogel
 Leimschwalbe II. 782. 789
 Leimvogel II. 222
 Leiner 750
 Leinsink II. 525. 528
 Lelok 43. 7
 Lepelgans 746. 757. — 88. 1
 Lepelente 757
 Lepelschnute 746. 757
 Lepera d'arzola 87. 1
 Lepler 939
 Lepturus 866
 Lepus 885
 Lequilla 112. 16
 Lerche II. 206 ff.
 Lerchenammer II. 399
 Lerchenart II. 233
 Lerchenfalk 114. 116. 123
 Lerchensink II. 476
 Lerchengeyer 105
 Lerchenhuhn 1141
 Lerchenhabicht 113
 Lerchenheuschrecke II. 235.
 734
 Lerchenkäutchen 178
 Lerchenschnepe 1016
 Lerchensperber 112
 Lerchenstößer 116
 Lerke 105. 1
 Leske II. 346
 Leucordia 938
 Leucotis II. 495
 Levar-lo 76. 10
 Leversina 86. 10
 Libane 72. 1
 Liebsten 65. 1
 Liebig II. 350
 Lie-Hast 59. 1
 Lie-Rype 103. 4
 Ljesnoi Worabei II. 557
 Lignarius 505

- Lille - Solver* 76. I
Lille - trae - Pikke 58. 19
Limosa 1015. ff. 1037. 1041
Linaria II. 375. 439. 525. 529.
 744
Lin - Erle 114. II
Linota II. 528
Linotte II. 439. 525. 537 ff.
Liom 877
Lita 87. 8
Litorne II. 253
Livane 72. I
Lo 88. 6
Lochgans 708
Lochtaube II. 146
Loculator 1001
Locust - bird II. 284
Locustelle II. 235. 734
Lodola 105. I ff.
Löffelente 745. 749. 757
Löffelgans 846. 938 ff.
Löffelreiher 937
Löffelschnabel 946
Löffler 938 ff.
Lohfink II. 350
Lohong II. 5
Lom 877
Lomben 874
Lom - Imber 75. 5
Lomme 875. 878
Lomvie 75. I
Lomgivie 875
Lomvisvie 875
Looloo 43. 13
Loom 874. 877
Lootensbaumläufer 651
Lootensvogel 651
Lorch 883
Lori 234 ff.
Lorion 52. I
Loriot 406 f.
Lorrind 984
Lorry 269
Lory 234. ff. 272
Lory - Noira 269
Louette II. 329
Lounam 889
Lourion 52. I
Louwa 853
Lowerke II. 212
Loxia II. 337. ff.
Loyca II. 246
Loyelte II. 42. 118
Lucarino 112. 25
Lucre 112. 25
Luderkrähe 501
Luderrabe 6
Luftling II. 747
Luftschiffer 116
Luftvogel 445
Luguarinera 112. 7
Lük 67. I
Lum 875. 877
Lumb 878
Lumbe 878
Lumenpoinca 110. I
Lumer 874
Lumipulmönen 110. I
Lumme 874. 878
Lün 43. I
Lun 79
Lund 816. — 69. 4
Lunde 815
Lund - Talle 816
Lüning II. 547
Lupo dell' Api 63. I
Lürle II. 225
Lurlen 105. I
Luscinia 642. II. 566. 575. 578.
 581. 605. ff. 647. 679. 687.
 694. 708
Lusciniola II. 619
Lutea II. 432
Luteola II. 519
Lutheux 105. 3
Lutronne 52. I
Λυκος 358
Lyng - Larke 105. 3

- Lyfka* 91. 2
Lyfklikker II. 346
Lyfslicker 1076
Lyfter II. 302
 M.
Maafur 910
Maar 910
Maafé - For 76. 10
Maafé - Skit 76. 10
Macao 222. 225
Macao - Krähe 389
Macareux 816
Machallerschnepp 1029
Mackerell 77. 2
Mackukava 1154
Macon 59. 1
Macottu 110. 3
Macreuse 712 ff.
Macroule 1128
Macucagua 1155. II. 137
Madenfresser 332
Madsbarskoy 101. 3
Maefekke II. 153
Maehjentaube II. 163.
Mackergouk 86. 7. — 87. 8.
Mähnenpapagey 822
Mäs 76. 3
Mäse 76. 3
Mäuseaar 42. 53. 65
Mäusefalke 56. 64. 69
Mäusegeyer 65
Mäusegeyerl 70
Mäusehabicht 65. 69. 114
Mäusewächter 65. 69
Mäuser 65
Magnanima II. 617
Magoua II. 136
Magpie 375
Maguari 962
Maja II. 360. 546
Majan II. 360
Majenze 116. 3
Mainate 434
Maipuri 297
 II. Band II. Th.
Maisdieb 438
Maife II. 351 ff.
Maitaslisja 42. 93
Maizi de Miacototl II. 742.
 751
Manastak 86. 7
Makauka 77. 2
Makawuanna 285
Makolagwa 112. 28
Makosch 1144
Makreuser Enten 713
Malacchia 50. 5
Malarosloi - Filin 154
Mala - Sova 43. 4
Mala - Zippa 105. 4
Malkala - Kourla II. 587
Malkoba 57. 40
Mallemugge 834
Mallemucke 834
Mull - Snaeppa 86. 7
Maloidjetel 59. 1
Malouffe 109. 2
Maltheserammer II. 420
Malthesergeyer 8 f.
Malvis 107. 3
Manacus II. 739
Manaki II. 707
Manakin II. 330. 707. 739.
 744 f.
Manchot 827
Mancipium II. 463
Mandelkrähe 390
Mandelkran 394
Mango 673
Mangone 79. 1
Man of - war - bird 72. 2
Manseau 104. 19
Mansfeni 60
Mantelhuhn II. 102
Mantelneve 906
Manucodiata 442 ff. 603. 613
Maparbecusisch 110. 1
Maracana 229. 267
Maracaxao II. 493
 Nnn
 Mara-

- Maragau* 63. 1
Marail II. 38
Maraye II. 38
Marchand 41. 5
Marcolph 360
Mareca 744
Marengo II. 762
Margiäs 734
Maria-capra 114. 33
Marin-Erle II. 638
Mariposa II. 387. 444
Maritjemaat 324
Marklerke II. 219
Markolphus 301. 368
Marksvale II. 783
Markward 361. 368
Marouette 1145
Mar-Skitt 87. 7
Marspitt 90. 1
Martelot 114. 17
Martin 104. 448
Martinet II. 790
Martingans 723
Martin-pecheur 565
Martrig 907
Martlet 117. 3
Märzente 786 f.
Masarino 85. 1
Maschente 786
Maskarin 267
Maskentaube II. 163
Masfhu 42. 14
Masfhubu 43. 9
Materet II. 773
Matkern 1123
Matkneltzell 1123
Matkuillis 1068
Mattolina II. 214. 217
Mattschinsch 107. 1
Matsnings 107. 1
Matuitui 1085
Maubeche 1077
Mauchler 1002
Mauerfalke 114
Mauerklette 626
Mauerklettervogel 626
Mauerläufer 626
Mauernmeise II. 767
Mauernachtigall II. 692. 697
Mauerschwalbe II. 697
Mauerspecht 626
Mausadler 102
Mausard 104. 19
Mauseule 161
Mauskopf II. 662
Mausfittig 255
Mauviette 105. 1. 4
Mauvis II. 259
Mayspecht 545
Mayvogel 925. 930
Mayvögelein 930
Mazurek II. 537
Meadow-Clapper 93. 12
Mebe 927
Meddens 103. 1
Medmis 103. 1
Meelmeise II. 760
Meeradler 31. 57. 59. f. 850
Meeramsel II. 308
Meer-Coot 91. 2
Meerdrehhals 887
Meerelster 1109
Meergans 845
Meerle II. 302
Meerlerche 1076
Meerhaase 885
Meerhuhn 1037. 1115
Meerheher 391. 395
Meerneben 904
Meerpapagey 822
Meerpygmäe 827
Meerrachen 805. 883
Meerrind 984
Meerschwalbe 597. 917 ff.
Meerschwalm 913
Meerschwarzblättchen II. 577
Meerspatz II. 437
Meerstieglitz II. 402

Meer-

- Meerteufel 1128
 Meerzeifig II. 529
 Meerzeiflslein II. 531
 Meerzeifel II. 531
 Mefike II. 153
 Mehlhänfling II. 524
 Mehlmeife 760. 772
 Mehrlabe 350
 Mehlschwalbe II. 789
 Meife 545. 643. II. 461. 469.
 629. 634. f. 646. 728. 744.
 746. 751 f.
 Meifekönig II. 717
 Meifenkönig II. 754. 766
 Meifenköniglein II. 724
 Meifenzeifig II. 740
 Melanaëtos 26
 Melanope II. 731
 Melba II. 493. 803
 Μελαεργιδαι II. 81
 Meleagris II. 29. 77
 Melker 168
 Mellemfpoove 1022
 Mellifuga 660. ff. 677. 680.
 687
 Melliftrads 101. 2
 Melodist II. 270
 Melroa 107. 22
 Melziozallo 52. 1
 Menschennezer 41. 5
 Menschenfrefser 6
 Merch 803. 883
 Merel II. 302
 Merganfer 802
 Mergulus 888
 Mergus 801. ff. 804. 818. 877.
 880
 Meriarfeirfok 76. 10
 Merillus 126
 Merl II. 702
 Merla 107. 22
 Merla acquajuola 106. 5
 Merlaer II. 302
 Merle 216. f. 380. f. 435. 448.
 II. 244. 266. f. 268. 275.
 ff. 301. 312. 426. 449. f. 579
 Merle jaune 52. 1
 — doré 52. 1
 — d'eau 106. 5
 — à collier 107. 23
 — à plafttron 107. 23
 — terrier 107. 23
 — blanc 107. 23
 — d'Espagne 107. 23
 — de Savoye 107. 23
 — gris 107. 23
 Merlin 126. 127
 Merops 593. 627
 Merrehülp 84. 21
 Mersengle 116. 3
 Merula 369. 413. II. 245. 284.
 301. 451 f.
 Merzente 786. 790
 Mefange 640. II. 629. 634.
 674. 752 f.
 Mefcha Ballofcbi 104. 1
 Mefchafobß 67. 9
 Mefe 116. 3
 Meshart 116. 2
 Mefingle 116. 3
 Mefis 103. 1
 Metskask 112. 3
 Metskits 86. 7
 Metstuike 104. 1
 Merzcanaubeli 67. 40
 Meuniere II. 773
 Meufchagatka 823
 Meufekönig II. 718
 Meufevogel II. 531
 Meve 832. 895. ff. 921
 Mevenbüttel 913
 Mevendücker 809
 Mevenschnabel 874
 Mevenschnäbler 875
 Meventaube II. 153
 Meventaucher 809
 Meyspecht 548
 Meyvogel 925
 Nnn 2

- Mezy* 42. 16
Miacatototl II. 742. 751
Microphoenix II. 326
Mierla 107. 22
Miethhuhn 1142
Mignatur-Eule 153
Milan 49 f.
Milchemo 116. 5
Milchfanger II. 810
Milbeira 116. 5
Mil-kulartok 42. 7
Miliaria II. 405. 410. 528
Millouin 767
Millwürger 194
Milvio 42. 12
Milvus 48. 71
Mimus II. 271
Minirer-Eule 160
Minister II. 427
Mino 435
Minor 434
Mirlein 127
Mirhu de rin 106. 5
Missel-bird 107. 1
Mississippi-Tanager II. 454
Misteldrossel II. 249. 263
Mistelfink II. 250
Mistelziemer II. 250
Mistfink II. 482
Mistler II. 249. 268
Mitilene II. 438
Mitschagatka 823
Mittek 67. 15
Mittelente 762. 767
Mittelleule 172
Mittelfalk 99
Mittelkrähe 345
Mittellerche II. 226
Mittelspecht 534
Mitu II. 41
Mituporanga II. 40 f.
Mitwaldlein II. 725
Mocha 43. 1
Mockvogel 414
Moclineo 43. 4
Moderente 712. 717
Mogilnik 46
Mohntaube II. 149
Mohr II. 557
Mohren 803
Mohrenhuhn II. 55
Mohrenkernbeißer II. 380
Mohrenkopf 421
Mohrenköpfchen II. 671
Mohrenkropftaube II. 162
Mohrenmütze 801
Mohrenvogel 801
Mohrenwachtel II. 134
Mohrenwasserhuhn 1129
Maignet 116. 11
Moine 41. 2
Moineau 485. 494. II. 371.
 379. 427. 485. 509. 535. ff.
 540. 542. 550. ff. 617
Moinet 112. 36
Moinier 116. 11
Moktok 67. 96
Moklofchia 67. 97
Mollicept 1033
Molopita II. 291
Momot 321
Monacha 742. II. 281
Monacchia 50. 6
Monachetto 68. 5
Monachino II. 352
Monachus 45
Monathstaube II. 143. 147. 149
Mönch 4. II. 661. 669. 702
Mönchente 742
Mönchmeise II. 766
Mönchsgeyer 4
Mönchschwan II. 19
Mönchstaube II. 151
Mond, der halbe II. 233
Mondtaube II. 147
Monedula 355. 385. 361
Monk 41. 2
Mönnik 1050

- Monstre* 116. 11
Montagasse 44. 12
Montain II. 485
Montan II. 485
Montifringilla II. 482
Montifringillae congener II. 476
Mook 487
Moorente 796
Moorhahn II. 98
Moorhuhn II. 89
Moormeise II. 770
Moor-zitling 114. 17
Moosammerling II. 435
Mooshahn II. 89
Mooskuh 998
Moosochse 984
Moosreiher 984
Moosriegel 984
Mooschnepfe 1031 f.
Moosweiher 44. 57
Moosweyhe 57. 71
Moqueur II. 271 ff.
Morasthuhn II. 96
Morastlerche II. 218
Mordoré-Ammer II. 446
Moreg Zag 103. 20
More-Hen 91. 4
Morcelle 91. 2
Morente 717. 748. 796
Morfex 853
Morgenländer 396
Morillon 757. ff. 796
Morinell 1089
Morinelle 1058
Morio II. 55. 315
Mornell 1081
Mornellehen 1090
Mornellgybitz 1090
Mornellstrandläufer 1057
Morphno congener 43
Morphnos 43
Morskaja-Kasarka 67. 67
Mort-Aender 804
Morie-ferie 75. 6
Mortetter 114. 17
Moscardo 42. 31
Mosch 112. 36
Mosch-Duifge 104. 34
Moschita II. 664
Moschusente 740
Mosendtle 748
Mossemmerling II. 436
Moskuh 984
Mosreigel 984
Motacilla II. 605. ff. 640
Motacille II. 605 ff.
Moterelle 114. 15
Moteux II. 652
Motmot II. 64
Motthünlein 1068
Mörtus 103. 1
Mouchet 42. 31. — 114. 3
Mouette 899. ff. 920
Mountain 103. 1
Moustache II. 774
Moutardier 117. 6
Möventaube II. 153
Möwe 895
Möwchentaube II. 152
Mübefslin 930
Muckendtle 748
Mückenfänger II. 570 ff.
Mückenstecher II. 642. 812
Mückente 748
Mugente 748
Mülane 52
Müllerchen II. 628
Mullet 69. 4
Munacchia 50. 5
Münchlin II. 663
Münchmeise II. 767
Mungul 109. 16
Münsterspyr II. 789
Mur-Endtle 748
Murentlein 772
Mur-Han II. 98
Mur-Meise II. 766
Murre 824.
N n n 3

- Murspecht 626
 Murspyr II. 790
 Musabroder II. 722
 Muscatus 677
 Muschelkönig 805
 Muscicapa II. 564. ff. 617
Muse - Broder 114. 46
 Musette 105. 3
 Muskatringeltaube II. 180
 Muskattaube II. 180
Musträfst 107. 22
 Musvit II. 756
 Mutu II. 41 f.
Muur - Swale 117. 6
 Myceteria 944
 Myrebutte 1033
Myre - Hest 86. 7
Myr - eller 87. 13
 Myreloc 1093
 Myre - Skite 1032
 Myre - Snipe 1033
 Myrle 127. 128
Myrpitta 88. 6
 Myr - Sneppe 1032
Myr - Snipe 86. 7
 Myrstikkel 1074
Myrschagarka 69. 10
 N.
 Naahmah II. 12
 Nabelkraye 358
 Nachtgael 114. 1
 Nacht - Eule 160. 162. 164.
 169. 172
 Nachtfink II. 504
 Nachtigall II. 270. 354. 585.
 605. 612. 646
 Nachtigallsknecht II. 621
 Nachtkopf 1134
 Nachtpilomele II. 611
 Nachtrabe 387. 965. 980. II.
 809
 Nachtrabl II. 812
 Nachträblin II. 812
 Nachtram 966
 Nachtrapp 162
 Nachtreiher 665. 980
 Nachtfänger II. 620
 Nachtschade II. 810
 Nachtschatten II. 811
 Nachtschläger II. 611
 Nachtschnabel 348
 Nachtschwalbe II. 808 ff.
Nachtugle 43. 7
 Nachtyogel II. 810
 Nadelschwanz 761
 Naektergahl 114. 1
Namiba 96. 1
 Napaul II. 36
 Napol II. 36
Narksarmiuzak 112. 1
 Nashornvogel 323. 327
Nasse 75. 7
 Nasutus 313
Natowokey - Omiffew 43. 13
 Natravn II. 811
 Natstkade II. 811
Nattergal 114. 1
 Natterhals 494
 Natterwindel 497
 Natterzwang 496
Nattskärva 118. 1
Nattskräfva 118. 1
Nat - Ugle 43. 9
Nat - Vake 107. 2
Nat - Vakke 59. 1
Nattwaka 109. 1
 Natwacke 546
Naya 76. 8
Nayainak 76. 8
Nayardluk 76. 6
Nayardlurksok 76. 6
Nayavek 76. 8
Nayauarsuk 76. 14
Naywieksky 107. 1
 Nazarovogel II. 21
Neahma 96. 1
Nebbi 42. 13
 Nebelkrähe 350

- Neemka 734
 Negerfink II. 501
 Negermerle II. 462
 Negertanager II. 462
 Nghobarra 65. 34
 Negral 112. 70
 Nektoralik 42. 39
 Nelicourvi II. 385
 Nelle-konge 114. 46
 Nelloumirfortok 87. 8
 Nelloumirfortangoak 87. 8
 Nengeta 186
 Nennamak 112. 29
 Nesselfink II. 657
 Nesselkönig II. 717
 Nettelkönning II. 717
 Nenengländer II. 124
 Neunmörder 189
 Neuntödter 103. 184. ff. 194.
 II. 330
 Neuvogel II. 400
 Nbanda-guacu 96. 3
 Nhanduapoa 945
 Nibbio 42. 12
 Nicksehnepfe 1025
 Nicombar II. 184
 Nicowitz II. 484
 Night-Hawk 118. 1
 Night-larr 118. 1
 Nightingale II. 607
 Nikabitz II. 483
 Nikawitz II. 482
 Nil-Ente 715
 Nilreiher 1006. 1008
 Nimmerfatt 845. 1001
 Nisus 116
 Nissertokoon 25
 Nisserwerk 21
 Niverolle II. 508
 Nocny 50. 19
 Nochotototl 638
 Nochotototl 637
 Noctua 158. 163. 172
 Nodde-Knekker 109. 3
 Nodde-Krige 50. 10
 Nodde-Skriger 50. 10
 Noddy 919
 Noetsfrika 50. 7
 Noira 269
 Noitibo II. 815
 Non 50. 5
 Nonne 809. II. 291
 Nonnéndrossel II. 291
 Nonnenentchen 809
 Nonnengans 733
 Nonnenkernbeisser II. 378
 Nonnenweise II. 766
 Nonnentaube II. 151
 Nonnette II. 257
 Nootekraaker 50. 10
 Nootka 215
 Nordgans 727. 731
 Nordmöve 834
 Nordvogel 914
 Nordwestvogel 1063
 Norks 806
 Norrquint 112. 4
 Norsk-Kalkan 103. 1
 Norsk-Papegoy 109. 3
 Nortonfundfink II. 543
 Nofchita II. 664
 Nofselsinke II. 599. 657
 Not-Kraake 50. 10
 Notckraka 50. 10
 Notpacka 59. 1
 Notweka 50. 10
 Nucifraga 367
 Numenius 1001. ff. 1018. 1042
 Numida II. 17
 Nufsbeisser 360. 367. II. 346
 Nufsbicker II. 344
 Nufsbrecher 367
 Nufsbreischer 360
 Nufshäger II. 344
 Nufshacker 345. 367
 Nufshäher 360
 Nufsheher 360. 366
 Nufshehr 368
 N n n 4
 Nufs-

- Nufsknacker 361. 367. II. 748
 Nufskrähe 368
 Nufskreischer 367
 Nufspicker 367
 Nuthatch 546 ff.
 Nutjabber 59. I
 Nutkracker 368
 Nyalikfak 68. 3
 Nyctea 156
 Nycticorax 965. II. 815
 Nyraca 794

 O.
 Occhio bovino 114. 48
 Occhio di Bue II. 661. — 114.
 45
 Ocha 67. 9
 Ochra 1070
 Ochropus 1124
 Ochsenäuglein II. 721
 Ochsen-Euglein II. 723
 Ochsenhacker 331
 Ocnus 984
 Ococolin 412. II. 331
 Ocotzinitzcan 410
 Ocrophus 1069
 Oedienemus f. Charadrius
 Oelb 697
 Oelbs 67. I
 Oelong - oelong 48
 Oenanthe II. 652
 Oenas II. 139
 Oepitzk 114. I
 Oern 42. 5
 Oerne - Falk 42. 15
 Oert 771
 Oerjälged 59. I
 Offänka 110. 5
 Ogradniczek 110. 4
 Ohnschwanz II. 17
 Ohnvogel 845
 Ohrenkolibri 679
 Ohrentaucher 886
 Ohrenturteltaube II. 194
 Ohrenle 139
 Ohrhahn II. 84
 Ohrkönig 148
 Ohrkutz 150
 Ohrmannisch 114. 35
 Ohrtaube II. 194
 Oie 703
 Oiwav 97 II. 654
 Oiseau - brame 42. 71
 Oiseau Dunette 107. 4
 Oiseau - mouche 664 ff.
 Oiseau - royal 949
 Okaitfok 72. 3
 Okokolin II. 721. 331
 Okudong 51. I
 Olivendrossel II. 266
 Olivenwasserhuhn 1116
 Olor 701
 Olores 701
 Olyksfogel 44. 25
 Ombrette 947
 Omuslew - Arbinetou 43. 26
 Ommer 75. 6
 Onderzutaques 99. I
 Ongalo 50. 10
 Onocrotalus 844
 Oostvogel 1084
 Opernkranich 950
 Opik 43. 6
 Opirksoak 43. 6
 Orangen Manakin II. 749
 Orangenspecht 515
 Oreb 50. 2
 Oresto 44. 12
 Orfruye 42. 4
 Organist II. 750
 Orgiale 110. 13
 Orhan II. 85
 Orböna 103. 2
 Orne 103. 2
 Orrar 103. 2
 Orio 52. I
 Oviolo 52. I ff.
 Oriolus 401

- Oriot 52. I
 Orites II. 772
 Orix II. 390
 Orkanmöwchen 832
 Or-Kautz 150
 Orkiaer 112. 37
 Oropendola 52. I
 Oroyendola 52. I
 Orozd 107. I
 Orpheus II. 272
 Orpingmiutak 112. 29
 Ortolan II. 197. 400. 408. 428.
 430. 434. 436. 438
 Ortelano II. 410
 Ortolanenpivote II. 649
 Ortulan II. 410
 Opruyes II. 133
 Ortygometra 114 I
 Oru 50. 3
 Oryx II. 390
 Oryzivora II. 361. 433
 Orzel-mniyszzy 42. 2
 Orzel-morsky 42. 4
 Orzel-tomignat 42. 4
 Orzemlik 42. 118
 Osprey 42. 4
 Ossifragus 30
 Ostarde 93. I
 Ostralegus 1109
 Ostrich 96. I
 Ostridge 96. I
 Otis II. I
 Ottervogel 190. 199
 Otterwindel 497
 Otus 147 ff.
 Ouasse 50. 13
 Oueta-kee-afke 50. 13
 Ouette 108. 3
 Oueriffia 66
 Ouroua 41. 5
 Outarde II. 3
 Ou-the-quan-nor-ow 59. 9
 Ouyarard. Ouyasson 41. I
 Ouzel II. 244
 Ouevaar 84. 7
 Owl 43. I ff.
 P.
 Paaum 98. I
 Pabst II. 358
 Pabstvogel II. 440
 Pacapao II. 328
 Padda II. 361
 Päfogel 98. I
 Paersfiere folle 112. 37
 Pagati II. 78
 Pageluhn II. 22
 Pago 88. I
 Pagodendrossel II. 278
 Päkla ölk 64. I
 Pakklatraat 50. 10
 Paik 68. 3
 Paikpiarsuk 68. I
 Paille-en-cul 867 ff.
 Paipala 103. 20
 Paiffe 112. 36
 Paiffe buissonniere 114. 3
 Paiffe de bois II. 485
 Paiffe de Saule 112. 37
 Paifforelle 112. 36
 Palamedea 942
 Pale 80. I
 Palikour II. 297
 Palette 339.—80. I
 Palmendrossel II. 291
 Palmenpapagey 258
 Palmiste II. 291
 Paloma 104. 1.—19
 Pakunbarius 76
 Palombe 104. 19
 Palumbus II. 172
 Panicivora II. 362
 Paolino 112. 25
 Paon II. 22
 Paon de mer 105 I
 Paon d'Inde II. 33
 Papa 4
 Papafigo 114. 10
 Papagalezzo 52. I
 Nnn 5
 Papa-

- Papagait* 45
Papagey 221. ff. 391. 392. II. 347
Papageyammer II. 439
Papageysfink II. 486
Papageykernbeißer II. 341
Papageytaube II. 176
Papageytaucher 814
Papagello 45
Papagio 45
Papaverina II. 578
Papazzino 114. 48
Pape II. 444
Papechien 87. 2
Papera 67. 9
Paperl 308
Papilionvogel 631
Pappaufek 45
Pappegacduiken 69. 4
Pappuga 45
Papusfettgans 826
Papuspenguin 826
Paradiesammer II. 439
Paradieseisvogel 589
Paradiesfink II. 462
Paradiesheher 560. 588
Paradies-lacamar 589
Paradieskolibri 661
Paradiesmeise II. 462
Paradiesmerle II. 462
Paradiespapagey 249. 288
Paradiesracker 430
Paradies Sperling II. 360
Paradiestanager II. 462
Paradiesvogel 430. 442. ff. 568
Paradiesvogelkönig 446
Paradieswiedehopf 613
Paradisea 442
Paragua 274
Parakeet 246
Pararsuk 68. I
Parat 112. 36
Pardal de San Jura 63. I
Pardal voyner 112. 37
Pardalus 1019
Pardat 112. 36
Pardel 1053. 1094
Pardelvogel 1094
Parder 1078
Pardwaftomka 86. 6
Pareola II. 740
Pariffola 116. 3
Parisvogel II. 347
Parkini 301
Parkit 245
Paronzino 116. 8. II
Parosolino 116. 12
Parozolino II. 762. 768
Parra 1131. II. 721
Parraka II. 65
Parrot 45
Partridge II. 112 ff.
Paruckentaube II. 151
Parus 634. 671. 723. 751. ff. 757
Paruffola 116. 3
Paruffolin 116. 3
Parykdue II. 151
Pasian II. 67
Paskrat 50. 7
Pafokenne 117. I
Passalirorta 118. I
Passarilante 114. I
Passaros del Sol 54
Passe-buse II. 615
Passe-vert II. 460
Passe-Sourde 114. 3
Passer II. 312. 363. ff. 375. 402. 440. ff. 450. f. 494. 536. f. 626. 718. 741
Passera salvarica 114. 3
Passerat 112. 36
Passere-matto 114. 3
Passerell vermell 112. 28
Passerell dorat 112. 30
Passerculus II. 538. 558. 617
Passeres II. 139
Passerinette II. 623

- Pafferon* 112. 36. 37. — 114. 3
Paffetier 42. 118
Paffiere 112. 36
Pastetentaube II. 143
Patirich Tirich 63. 3
Patron des Marechaux 116. 3
Pau II. 22
Pauwis II. 40 ff.
Pauxi II. 44
Pavedette II. 158
Pavo 949. II. 21
Pavon 98. 1
Pavoncella 87. 2
Pavon de las Indias 98. 1
Pavone 98. 1
Paw II. 22
Pawlun II. 22
Pawuone 250
Paxaco-araneco 65. 2
Peacock 98. 1
Pechietto 114. 45
Pecussisch 42. 21
St. Peders Fugl 70. 1
Peer - Drikker 69. 5
Peerdschwälken II. 798
Pega 50. 13
Pegafrol 66
Pebrloe 88. 5
Peintade 102. 1
Πελαργος 962
Pelecanus 843 ff.
Πελεκανος 848
Πελεκανες 940
Pelican 746. 843. ff. 939. f.
 1002
Pendolino 116. II. 12
Pendulin II. 777
Pendulinmeise II. 778
Pendulino II. 777
Pendulinus II. 777
Penelope 759. 768. II. 36
Penguin 817. 825. ff. 840 ff.
Penkewa 112. 3
Penyellmyu 107. 1
Pennants Avosette 1107
Penquin 63. 3
Pepatzka 67. 33
Pequen 160
Percepor 59. 1
Percbia chagvia 114. 46
Percussor II. 163
Perdez 103. 13
Perdezornados 963
Perdice 103. 13
Περδινες II. 116
Perdix II. 113 ff.
Perdrix 1155. II. 106. 113 ff.
 1112. 107
Perd sa queue II. 773
Perdykker 69. 5
Pere - noir II. 504
Peres 42. 4
Peringleo 114. 11
Περισσραι 145
Perkohnkaffe 86. 7
Perkohnuoffis 86. 7
Perlberghuhn II. 119
Perlemaage 910
Perlente 164
Perlhuhn II. 77
Perlin II. 78
Perlrebhuhn II. 119
Perlreihher 988
Pernice II. 111
Pernise 110
Perpelitza 103. 20
Perroquet 45
Perroquet de terre 60. 1
Perroquet de France 109. 4
Persuper 69. 5
Peruche 232 ff.
Perükentaube II. 151
Peruquetl 308
Pestilenzvogel II. 599
Petel 101. 1
Peter - Ronsmad 114. 45
Petersmannsmad 114. 46
St. Petersvogel 832

- Peteschenfliegenfänger II. 598
Petit-rat 114. 46
Petive 43. 1
Petra 112. 37
Petragnola 114. 15
Petrar 112. 37
 Petrel 832
 Petronella II. 627
 Pettiroffo II. 715
Pettuff 114. 45
Petuschok 101. 3
 Pfäffchen II. 350. 625
 Pfaffe 340. 1125. II. 810
 Pfannenstiel II. 770
 Pfannenstielein II. 771
 Pfannentlieglitz II. 771
 Pfau II. 21 ff.
 Pfauenfasan II. 27. 41. 77
 Pfauenpfefferfraks 314
 Pfauenreiher 948
 Pfauentaube II. 153
 Pfefferfraks 313
 Pfefferfresser 314
 Pfeffervogel 314. II. 324
 Pfeifammer II. 431
 Pfeifdroffel II. 259. 299
 Pfeif-Endtlein 761
 Pfeifente 759. 795
 Pfeifer 431. 1072
Pfeiffaul 67. 33
 Pfeiflerche II. 222
 Pfeilschwanz 761. 812
 Pfingstvogel 402
 Pfisterlein 1073
 Pflanzenmäher II. 563
 Pflanzenfäger II. 563
 Pfulschnepfe 1031. 1036. 1037
 1040. 1041. 1044
 Phaeopus 1021
 Phaëton 828. 867
 Phalacorax 844. 933
 Phalaris 1127
 Phalarope 1063
 Phalaropus 1049 ff.
 Pharaohuhn II. 79
 Phasan II. 67. 102
 Phasanenpfau II. 27
 Phascades 772
 Phasianellus II. 88
 Phasianus II. 45. 170
 Phau II. 22
Phasant 101. 3
 Philomachus 1052
 Philomele II. 606
 Phöbusfliegenfänger II. 595
Phoeby bird 113. 80
 Phoenicopterus 934
 Phoenicurus II. 692. 700
Φοινικουρος II. 695
 Phytotoma II. 563
Piana 63. 1
Pianet 50. 13. — 59. 19
 Piauhau II. 571
 Pibilerke II. 216
 Pic 502. ff. 560. 627
 Pica 367. 374. 408. 538. 827.
 1110 f.
 Picae 222 ff.
Picata 50. 13
 Picaveret II. 533
Picchio 59. 1. — 65. 1. 2
Pichor 112. 3
 Pickmeise II. 755
 Piciciti II. 742. 750
Pico 59. 1. — 65. 2
Picotella 59. 1
Pic-bleu 59. 1
Pic-noir 502
Pic-verd 523
Pictarne 77. 2
Picu-grossu 109. 2
 Picuipinima II. 198
 Picus 405. 497. 500. ff. 547.
 ff. 592. 627. II. 271
Pidrascia 95. 3
Pie 375. 439
Pie-encrouells 44. 12
Pie-escrayere 44. 12

Pie-griechen 184 f. 437 f.

Piegza 114. 6

Pienige 114. 6

Pienkawa 112. 3

Pienken II. 484

Pienu 105. 3

Pieplerche II. 222

Pievrot 112. 36

Pierschwalbe II. 798

Piette 68. 5

Piga 50. 7

Pigazza 50. 13

Pigeon II. 140 ff.

Piglia-mocbe 114. 17

Piguccio 59. 1 ff.

Pilard 109. 4

Pillieborra 55. 7

Pillu 1012

Pilorior 52. 1

Pimpelmeise II. 760

Pinca 109. 2. 112. 3

Pincard 112. 3

Pinchard 112. 3

Pinçon II. 346. 387. 394. 422.

475. ff. 506. ff. 560

Pingoin 817 ff.

Pinkawa 112. 3

Pinosch 112. 4

Pinquin II. 10

Pinsel 919

Pinson f. Pinçon

Pint 59. 9

Pintaden 838

Pintado II. 79

Pin-tail 67. 28

Piombino 61. 3

Pione 109. 4

Pior 50. 13

Pipe II. 31

Piphuhn II. 33

Pipiri 201

Pipit II. 702. 707. 709

Pipit-bleu II. 706. 709

Pipit-verd II. 707

Pip-Lerche II. 223

Pipoletta 105. 4

Pipra II. 739. — 59. 19

Pique-boeuf 332

Pirol 401 f.

Pirol 403

Pirouat 105. 3

Pisangdohle 436

Pisangazeldohle 436

Pisangdroffel 421

Pisangfink II. 539

Pisangpirol 422

Pisangvogel 421

Piscator 114

Pischik 1087

Pispanti 105. 1

Pitangua 204

Pitarotti 114. 45

Pitchou II. 633

Pithyornus II. 425

Pitirozo 114. 25

Pitiu 521

Pitri 42. 16

Pirion 42. 16

Pitschal 65. 2

Pitschard 65. 2

Pitschou II. 633

Pittara 95. 3

Piula 67. 27

Piuli 105. 4

Pive 109. 4

Pivinello 87. 13

Pivoine 109. 4

Pivote II. 649

Pizzardella 86. 6

Plancus 845. 855

Planga 42

Planot 59. 1

Plapperer 435

Platalea 937

Platea 937

Plattenmeise II. 766

Plattschabel 555. ff. II. 578

Plauderer 266. 435

Plau-

- Plauderrackervogel 391
 Plautus 815. 824. 827. 836.
 841. 872. 901. 910. 913
 Pliska-pastariza 114. 11
 Pliszka 114. 11
 Plongeon 877
 Plotus 864. 1106
 Plougeller 87. 13
 Plover 1086
 Pluiero 86. 10
 Plünnagenente 791
 Plumente 715. 791
 Pluvialis 1038. 1083. 1094
 Pluvier 1088 ff.
 Poana 42. 15
 Poche 80. 1
 Poeliceps 870 ff.
 Podlesk 10. 3. 9
 Podobe II. 316
 Podoroshink 110. 1
 Poello-Tilder 86. 6
 Poe-Vogel 83. 18
 Pokerl 86. 8
 Pokrzywka 114. 46
 Pola 50. 6
 Polarente 815. 820. 878
 Polarhalbente 878
 Polarmeve 913
 Polartaucher 878
 Pöldpii 103. 9. 13
 Poligola 116. 3
 Poliopus 1122
 Polmeve 913
 Polsk-Edelmand 87. 8
 Polsyk 59. 1
 Polyglotta II. 272
 Polyglottus II. 270
 Polytmus 660 ff.
 Pomeranzvogel 1090
 Pompadour II. 328
 Pompadurtaube II. 171
 Ponnandutzy 50. 13
 Ponnunky-pitta 50. 13
 Poopoo 581
 Popek 109. 4
 Popinjay 45
 Porphyrio 1115. ff. 1119
 Port-Jackson-Drossel II. 320
 Porzana 1144 f.
 Porzane 91. 4
 Porzanone 1118
 Possenreisser 1089 f.
 Postoka 42. 16
 Postoina 42. 39
 Posttaube II. 158
 Potamida 114. 6
 Pouacre 997
 Pouchari 44. 12
 Pouillot II. 725. 726. 728
 Poul II. 724
 Poule d'eau 1117
 Poule d'Inde II. 33
 Poule de neige 103. 4
 Poule Sultane 1120 ff. 1141
 Povodni Kof 106. 5
 Poyana 42. 12
 Praka 344
 Praest 69. 4
 Praestekratte 1085
 Praestekrave 88. 1
 Pratincola 1111
 Predicatore 110. 3
 Prediger 318
 Preneur des Mulots 42. 16
 Preneur des Passes 42. 118
 Presaire 43. 8
 Prib 108. 1
 Priestergürtel II. 233
 Prihkschke 67. 33
 Prip II. 327
 Procellaria 830
 Promerops 608. ff. 612 ff.
 Protonotar II. 668
 Proyer II. 406
 Prunelle II. 615
 Prunellerl II. 617
 Prunell-Grasmücke II. 615
 Przedney 42. 5

- Przepiórka* 103. 20
Ψαρ II. 239
Ψαρος II. 239
Pfittacula 822
Pfittacus 222
Pfophia 1154
Pstry - Kulyk 87. 13
Ptak - bitny 87. 1
Ptakrasky 109. 3
Ptarmigan II. 96
Pterophoeniceus 413
Ptynx 865
Pudda campana 95. 3
Pudda d'aba 91. 4
Pudda de matta 86. 6
Pudda de maleja 86. 6
Puddighina de matta 92. 2
Pudelschnepfe 1035. 1042
Puder II. 30
Puffin 815. 839
Puffinmöwe 834
Puffinvogel 839
Puffinus 830. 839
Puglietta 91. 4
Pubacz 43. 1
Puhi 139
Puhlschnepfe 1043
Puhuy 139
Puhze 43. 7
Pu - Kornstaja 59. 1
Pukzeralik 76. 8
Puliga 91. 2
Pullagak 50. 2
Pulmu 110. 1
Pulmuinen 110. 1
Pulrofs 1078. 1094
Pulzonzino 116. 11
Pulvier 1094
Pumilio II. 53
Pümpelmeise II. 761
Punsch - Eule 162
Pupin 839
Puppukis 64. 1
Pupusa 64. 1
Pupur 64. 1
Purpurazeldohle 438
Purpurdohle 438
Purpurdrossel 412. 437
Purpurfink II. 544
Purpurhänfling II. 539
Purpurhuhn 1119
Purpurkehle II. 463
Purpurklette 639
Purpurklepper II. 391
Purpurköpfchen 637. 751
Purpureiher 968. 992. 1010
Purpurschwalbe II. 795
Purpurvogel 639. 1120
Purrhöns II. 51
Purzeltaube II. 151
Pustolka 42. 16
Puszyk 43. 4
Puszyk 43. 7
Putchen II. 31
Puter II. 30
Puterhahn II. 30
Puthe II. 31
Putzpassarat 103. 20
Putta 50. 13
Putzer 112. 7
Putwista 43. 7
Puzzone di Sante Martinu 61. 3
Pye 50. 13
Pygargus 105
Pygmaeus 857
Pylsteert 762
Pyrol 403
Pyrrhocorax 383. 561
Pyrrhula II. 337. 349

Q

Quachilton 1119
Quackel II. 131
Quackente 754
Quäcker II. 482
Quäckfink II. 482
Quackreiher 965
Quaderviz 103. 20
Quaglia II. 133

Quail 103. 20
Quakel II. 129
Quakkel 103. 20
Qualea II. 130
Quällknarren 118. 1
Quan II. 37
Quan 107. 3
Quapachtototl 478
Quaquila II. 130
Quärn-Kald 106. 5
Quatotomomi 506
Quatoztli II. 466
Quattr' Ochi 67. 23
Quauhtzonecolin II. 128
Quecker II. 483
Quecksterz II. 637
Queckstaart II. 638
Quellje 767
Quercerelle 42. 16
Quereiva 332
Querquedula 769. 773. 778. 797
Querula II. 531
Quezele 102. 1
Quethu 829
Quetranabueffos 42. 4
Quetsch II. 351
Quetschfinke II. 485
Queue de Poitou 116. 11
Quicastiirt II. 653
Quidvogel 42. 15
Quiin-Ander 755
Quijubatui 239
Quikketiold 86. 11
Quina 105. 4
Quinçon de montagne 112. 4
Quinde 66
Quinson II. 480
Quintli 66
Quion-quion 114. 46
Quirizui 100. 1
Quiscula 438. II. 130
Quisquila II. 130
Quitmaase 910
Quittenhänfling II. 533

R.

Raab 340
Raabe 391
Raaf 50. 2
Raage 349. 356
Rääst 107. 1
Raatgaas 334
Rab 337
Rabaillet 42. 16
Rabatino 103. 4
Rabe 222. 307. 326. 336. ff.
 344. 351. 391. 396. 1125
Rabenkrähe 340
Räbhuhn II. 113
Räbhun II. 112
Rabiborcado 72. 2
Raboforcado 72. 3
Rachaeme 41. 5
Rachamah 12
Rache 390
Rackelhaner II. 93
Racker 391
Rackervogel 391
Rädbeener 1040
Radgans 734
Ragazza 50. 13
Ragazzvia 44. 12
Rähn 50. 17
Raia Allia 43. 14
Rail 93. 1
Rainfowl 59. 12
Rake 391
Rakettenkolibri 688
Rakettenfliegenvogel 688
Rakkelhanar II. 93
Rale d'eau 93. 2
Rale de genet 93. 1
Rall 928
Ralle 1138 ff.
Rallus 928. 1117. 1136.
 1138 ff.
Ramphastos 313
Rantvan-kondea 55. 7
Ranun 114. 1

- Ranzeule 148
 Ranzugle 43. 8
 Raphöne 103. 13
 Raphus II. 19
 Rapischkin II. 675
 Raporino 59. 1
 Rappe 341
 Rappfink II. 372
 Rapp-boena 103. 13
 Rara II. 563
 Räsgenkopf 746
 Ratereau 114. 46
 Rätschen 283
 Ratschente 789
 Rathsherr 900
 Ratier 42. 16
 Razillon 114. 46
 Ratza 67. 40
 Räuber 18
 Raubfalk 99
 Raubkrähe 345
 Raubvögel 1
 Rauch 348
 Rauchfuß 47. II. 93. 148 ff.
 Rauchfußadler 42
 Rauchfußfalke 47
 Rauchfußgeyer 84
 Rauchkopf 576 f.
 Rauchschwalbe II. 781
 Rauchsperling II. 549
 Raudawa 67. 31
 Raudewitz 67. 31
 Raudbristling 1080
 Raudrofa 58. 18
 Raupentödter 438
 Raven 50. 2
 Raverin 112. 7
 Ravn 50. 2
 Ravn-Kaare 50. 6
 Ray-Gaas 734
 Razor-bill 820
 Reatin 114. 49
 Reatino 114. 45
 Rebêtre 114. 46
 II. Band II. Th.
 Rebhuhn 1046. II. 99. f. 109.
 ff. 113
 Rebhuhnschnepfe 1044
 Recurvirostra 1105
 Re d'alipinri 109. 2
 Re di Siepe 114. 45
 Re di Macchia 114. 45
 Re di Quaglia 93. 1
 Redpole II. 526. 530
 Redstarr 114. 34
 Redrail 114. 35
 Redwing 107. 3
 Regaliohus II. 724
 Regenbogenspecht 674
 Regenbogenvogel 680
 Regenkatze 403
 Regenkuckuck 473
 Regenpfeiffer 1078. 1083
 Regenschnepfe 1037
 Regenvogel 1021
 Regenwölp 1018
 Regenworp 1017. 1021
 Regenwulp 1017. 1021
 Regeyo 52. 1
 Regillus II. 724
 Regina aurarum 5
 Regn-Spaar 86. 3
 Regulus II. 720. 728
 Rehlein II. 493
 Rehufak II. 100
 Reigalbero 52. 1
 Reigel 972
 Reiger 969. 985
 Reiger-Ente 796
 Reigerfalk 99
 Reihel 970
 Reiher 945. 948. ff. 963. ff.
 969. ff.
 Reinschwalbe II. 794
 Reissammer II. 433
 Reissdieb II. 433
 Reissfink II. 361. 434
 Reissfresser II. 361
 Reisskernbeißer II. 362
 Reiss-

- Reifsmäher II. 361
 Reifsortolan II. 434
 Reifspirol 414
 Reifsvogel II. 361. 434
 Reitenmeiſs II. 767
 Rekholtz 107. 2
 Remaffoff 116. 12
 Remes II. 778
 Remez 116. 12
 Remezamyptak 116. 12
 Remicz 116. 12
 Remiſch 116. 12
 Remiſch 116. 12
 Remitz II. 777
 Rendeſteens - Snager 114. 11
 Renomiſt 1050
 Repphuhn II. 113
 Reuter 1056. 1070. 1134
 Reutervogel 444
 Revezal 114. 34
 Rexavium II. 724
 Rex Warwouwarum 4
 Reyger 965
 Reyhengans 734
 Rhaad II. 9
 Rhea II. 17
 Rheinente 810
 Rheinreihher 972
 Rheinschwalbe II. 793
 Rheintaucher 809
 Rheinvogel 1123. II. 793
 Rhinoceros 327
 Rhyndace 615
 Ribitw 76. 2
 Richau 50. 7
 Riche - prieur 112. 3
 Ried - Meiſſlein II. 768
 Riedſchnepfe 1027. 1031. 1042
 Riemenbein 1099
 Riefe 673. 975
 Riefengans 706
 Riefenlerche II. 233
 Riefenpelikan 845
 Riefenreihher 975
 Riefenvogel 836
 Riethahn II. 84
 Rietmeiſe II. 774
 Rietmeiſs II. 767
 Rietſchnepfe 1027. 1031
 Rieufak 103. 4
 Rigogalo 52. 1
 Rindenkleber 617
 Rinderſtaar II. 237
 Rinderſtelze II. 732
 Rindmeiſlein II. 766
 Ringamſel II. 233. 707
 Ringdroffel II. 307
 Ringduiſf 104. 19
 Ringel - Duc 104. 19
 Ringelfalk 98. 105. 107
 Ringelfink II. 481. 546
 Ringelgans 710. 732
 Ringelkönig II. 719
 Ringelkuckuck 517
 Ringelmeve 900
 Ringelrabe 326
 Ringelralle 1146
 Ringelſchwanz II. 168
 Ringelſpatz II. 537
 Ringelſperling II. 537
 Ringeltaube II. 168. 172. 179 ff.
 Ringente 757
 Ring - Gaas 67. 4
 Ring - Giäs 710
 Ringkragen II. 593
 Ringlerche II. 230
 Ringmerle II. 308
 Ring - Oie 67. 23
 Ring - Ouzel 107. 23
 Ringpapagey 252
 Ring - pigeon 104. 19
 Ring - Sparrow II. 535
 Ringsperling II. 535
 Ringtaube II. 173
 Ringtroſt II. 309
 Ringvia 874
 Rinnenschnabel 840
 Ripariola II. 794

- Rifet II. 523
 Riffa 896
 Riffa 76. I
 Rittelgeyer III. 111
 Rittertaube II. 162
 Rittlweyer III. 113
 Riupa II. 96
 Roc 41. I
 Rocheraie II. 146
 Röd-Baëlle 67. 4
 Rödbeen 86. 12
 Röd-Hals 114. 45
 Röd-Kielke 114. 43
 Röd-Finke 114. 45
 Rodler II. 148
 Röd-Nakker 768
 Röd-tiuxa 44. 25
 Rock 348
 Roep-Eand 67. 20
 Roerdomp 84. 21
 Roedstjert 114. 34
 Roeteln II. 713
 Rohrammer II. 435
 Rohrammering II. 437
 Rohrbrüller 948
 Rohrdommel 982. 983. 997
 Rohrdrossel II. 314. 435
 Rohrfalke 57. 59
 Rohrgeyer 71. 73. 107
 Rohrgrasmücke II. 627
 Rohrhahn 1125
 Rohrhenne 1125
 Rohrhennl 1118
 Rohrhühnlein 1117
 Rohrmeise II. 778
 Rohrmeve 922. 927
 Rohrmotacille II. 711
 Rohrpompe 984
 Rohrfänger II. 626
 Rohrschliffer II. 627
 Rohrschnepfe 1034
 Rohrschwalm 922. 927
 Rohrspar II. 437
 Rohrspatz II. 436. 555. 775
 Rohrspatzlin II. 437
 Rohrsperling 922. II. 314. 435.
 626
 Rohrtrumm 984
 Rohrtrummel 984
 Rohrwrangel 194
 Rohrwürger 194
 Rohrzeisig II. 746
 Roi bedelet 114. 46
 Roi bertaud II. 719
 Roi berry 114. 46
 Roi boati 114. 46
 Roi de Cailles 1140
 Roi de froidure 114. 46
 Roi des Vautours 5
 Roitelet II. 717
 Roka 50. 4
 Roller 391. 392
 Rollier 379. 392. ff. II. 122
 Romisch 116. 12
 Rondine 117. I ff.
 Rondinella 117. I
 Rondone II. 784 ff.
 Rondola 117. I
 Ronkalv 90. I
 Ronkje 670
 Ronscha 50. 7
 Rooche 348
 Rook 50. 4
 Rooke 348
 Roper 43. I
 Ror-Drum 85. 12
 Rordrumb 985
 Ror-Höne 91. 2
 Rorreigel 984. 987
 Ror-Sneppe 86. 8
 Rör-Spurv II. 436
 Rortrumm 984
 Roselle 107. 3
 Rosenkehlchen II. 386
 Ros-Gouge 87. 13
 Rospedino 116. 3
 Rosdrossel II. 308
 Rosente 790

- Rossgeyer 13
 Rossignol II. 607. 693
Rossignol moner 109. 4
Rossignol d'hiver 112. 3
 Rossbüzel II. 425
 Rossflügel II. 224
 Rossweihe 71
Rostz 93. 1
Rotborstje 114. 45
 Rötelein II. 713
 Rötcl - Geyer 112
 Rötcl - Weyh 51. 111
 Rotfüßcl 1039
 Rotgansen 735
 Rotgel 114. 45
 Rothauge II. 422. 581. 631
 Rothbacken 520
 Rothbart 779. II. 712
 Rothbauch 316. 518
 Rothbäuchlein II. 693
 Rothbein 904. 1038. 1055
 Rothbläfschen 1117
 Rothbüster II. 526
 Rothbrust 1025
 Rothbrüstlein 677
 Rothbrüstchen II. 712
 Rothdroschel II. 260
 Rothdrofchl II. 261
 Rothdroffel II. 259
 Rothgeyerlein 112
 Rötchelgeyerlein 112
 Rötchelweihe 111
 Rothfalke 126
 Rothfink II. 350. 477
 Rothfuß 1038
 Rothfußgans 730
 Rothfüßler 1039
 Rothgans 733
 Rothhals 669. 741. 760. 767.
 891. 1046
 Rothhalsgans 727
 Rothhälslein
 Rothhänfling II. 519
 Rothhuhn II. 103. 110
 Rothkappe 689
 Rothkehlchen II. 692. 705. 712
 Rothkehle II. 705
 Rothkehle II. 714
 Rothknillis 1114
 Rothnussel 1114
 Rothkopf 767. II. 359. 525.
 529. 684. 744
 Rothkröpfchen II. 712
 Rothkröpplein II. 712
 Rothlerche II. 218
 Rötling II. 692
 Rothschenkel 1039 f.
 Rothschnegel II. 350
 Rothschnabel 247. 911. 366.
 II. 741
 Rothschwanz 264. 680. II. 347.
 388. 466. 692. 698. 700. f.
 704
 Rothschwänzchen II. 692
 Rothschwänzlein II. 388. 577.
 700
 Rothspecht 530. 535
 Rothsperling II. 555
 Rothstierz II. 692
 Rothstiert II. 693
 Rothvogel II. 329. 355. 606
 Rothvögelchen II. 488
 Rotges 733
 Rotjes 733
 Rotkropff II. 713
 Rotte - Finke II. 480
 Rott - Endtle 794
Rotteke 69. 5
Rötteren 76. 1
 Rott - Hals 794
 Rott - Hun II. 104
 Rott - Kopf 794
 Rottrostel II. 259
 Rottvogel II. 350. 490
 Rottzägel II. 693
 Rotzägel II. 693
 Rouch 348
 Roucherolle II. 314

Rouck 348
 Rouge-bourse II. 715
 Rouge-gorge II. 705. 713
 Rouge-queue II. 700
 Rough-footed Dove 104. I. s
 Rouloul II. 170
 Roupie II. 715
 Roufette 110. 5
 Rouffalan 112. I
 Roufferolle II. 314
 Rouffette II. 618
 Rouffignol II. 610
 Rouverdin II. 559
 Rowert II. 482
 Rubbens 103. 2
 Rubecula II. 697. 705. 712
 Rubeline II. 715
 Rubetra II. 605. 742
 Rubicilla II. 352. 387. 694
 Rubicola II. 660
 Rubienne 114. 45
 Rubiette 114. 45
 Rubin 677. II. 528
 Rubinkrone II. 719
 Ruch 41. I
 Ruche 114. 45
 Ruck 348
 Ruderente 749
 Ruffhuhn II. 113
 Ruhrdrump 985
 Ruhrspärbling II. 314. 436
 Ruigpooren 104. I. s
 Ruiffenot 114. I
 Ruliffar 105. 2
 Rund-pigeon 104. I. s
 Rundschnabel II. 387. 393
 Rupicola II. 739
 Rufes innocentes 112. 4
 Rusgenkopf 796
 Ruffignuolo 114. I
 Rusticola 1028
 Ruticilla II. 694. 704
 Rutte 86. 6
 Rüttel-Weyh 51. 64

Ryle 1004
 Rynchops 932
 Rypen II. 95
 Rytfa 897
 Rzecholka 117. I
 S.
 Saatkrähe 347
 Saatlerche II. 207
 Saatrabe 348
 Saatvögel 1021
 Säbelschnabel 1006
 Säbelschnabler 1105
 Sach 20
 Sacre 95
 Sacker 94
 Sackgans 845
 Süd-Giek 58. I
 Safran-bacha 45. 7
 Sagan 90. I
 Säger 801. 806
 Sägeschnäbler 801. ff. 806. 808
 Sägetaucher 801. ff. 808
 Sazyfer 1004
 Suisl 112. 25
 Sakerfalk 94
 Sakvia 101. I
 Salaczac 565
 Salangane II. 786
 Salbakke II. 794
 Salicaria II. 627
 Sallian 96. 3
 Sälfort 107. 22
 Samarmar II. 284. 319
 Sammetente 712
 Sammethosen II. 58
 Sammethuhn 1142
 Sammethünlein 1143
 Sammetvogel 712
 Sandhuhn 1111. II. 108
 Sandläufer 1068. 1073. 1075
 Sandläuferl 1074
 Sandlo 1085
 Sandloe 88. I
 Sandmartin 117. 4
 Sand-

- Sandmuling 1084
 Sandpfeifer 1063. 1073
 Sandreger 997
 Sandregerlein 1084
 Sand-Rönne 88. 1. — 117. 4
 Sandschwalbe II. 793
 Sand-Sneppe 88. 1
 Sandstrandläufer 1111
 Sand-Sulu 117. 4
 Sandtal 923
 Sandtärne 923
 Sandvogel 1084. 1112
 Sandvrifter 1085
 Sandwachtel II. 134
 Sangdrossel II. 263. 267
 Sangdruschel II. 263
 Sänger II. 268. 272. 605. ff.
 634. 668. f. 671. 678. f.
 688. f. 710. 726. 728
 Sangkernbeißer II. 382
 Sanglarke 105. 1
 Sanglerche II. 207
 Sangschwalbe II. 805
 Sanfonnet II. 239
 Saogouk 58. 1
 Saphirkolibri 684
 Sarbarsuk 87. 3
 Sarcelle 752. ff. 770
 Sare 112. 16
 Sarguarsuk 87. 3
 Saroi-bura 117. 2
 Saron-baeron 117. 2
 Sarpak 75. 1
 Sarsir 106. 1
 Sascharei 50. 13
 Saschuga 50. 13
 Sashabe 298
 Sattelkrähe 351
 Satyra II. 36
 Sauler 112. 37
 Saulocker II. 692
 Savigala II. 287
 Sauer. And 67. 32
 Savannenfliegenfänger II. 567
 Sau-Sarai 67. 121
 Sav-Orre 75. 8
 Sayacu II. 468 f.
 Scalucher 853
 Scaluer 853
 Scarchir 67. 120
 Scarino 112. 7
 Scarzerin 112. 17
 Scauz 69. 1
 Schabbelschnabel 1106
 Schach 204
 Schäckchen 774
 Schackruthgen II. 625
 Schagguta 50. 13
 Schaeghagha 63. 1
 Schakarnel II. 39
 Schaker II. 254
 Schalach 84. 12
 Schalac 57. 1
 Schalaster 374
 Schallente 746. 757
 Schaluchorn 852
 Scharbe 852
 Scharbege 806
 Scharlachfink II. 541
 Scharlachsperrling II. 453
 Scharlachvogel 270
 Scharlatkehlein 556
 Scharlatvogel 270
 Scharlattaube II. 187
 Schartenschnäbler 935
 Schaschaph 57. 1
 Schattenvogel 947
 Schättgen II. 531
 Schaufelente 947
 Scheck 1079
 Scheckente 809
 Scheerenfalk 55
 Scheerengeyer 47
 Scheerke 928
 Scheermesserschnäbler 819
 Scheerschnabel 819
 Scheerschnäbler 820
 Scheerschwänzel 49
 Scheer-

- Scheerschwanz 183
 Scheidenschnabel 1131
 Scheidenvogel 1131
 Scheissfalk 914
 Schelladler 42. 57
 Schellente 757
 Schellentenadler 42
 Scheller 387
 Scheriau 84. 4
 Scherr-Endtlin 752
 Schet II. 565
 Schet-all II. 565
 Schet-be 44. 17
 Schet-Vululu II. 565
 Scheuneule 178
 Schiebgen II. 436
 Schieldrake 709
 Schiffschwanz 436
 Schiffsvogel 840
 Schiguris 84. 4
 Schild II. 129
 Schildamsel II. 308
 Schildente 745. 790
 Schildfink II. 478
 Schildhahn II. 89
 Schildkrähe 350
 Schildnachtigall II. 704
 Schildreiher 965
 Schilfdornreich II. 627
 Schilfdrossel II. 314
 Schilfmeise II. 774
 Schilffschmätzer II. 436. 626
 Schilfftaar II. 246
 Schillerdrossel II. 282
 Schillermerle II. 459
 Schilochwostka 67. 28
 Schiltkrahe 353
 Schimmel 717
 Schindelkriecher 617
 Schingau II. 116
 Schinkenmeise II. 755
 Schirley II. 466
 Schitscherling II. 531
 Schittreiher 969
 Schlachter 102
 Schläcke II. 228
 Schlaghan 883
 Schlagtaube II. 143. 172
 Schlagwachtel II. 129
 Schlangenfresser 18
 Schlangenhabsicht 55
 Schlangenhals 865
 Schlangenkopf 864
 Schlangenvogel 864
 Schleuer-Auffe 167
 Schleyer-Auffe 165
 Schleyereule 161. 164
 Schleyersperling II. 746
 Schleyertaube II. 150
 Schlicht-Endte 807
 Schluchent 806
 Schlucker 852
 Schlupfkönig II. 716
 Schmakowaja-Urka 67. 118
 Schmalente 790
 Schmarotzermieve 913
 Schmelichen 790
 Schmelvogel II. 235
 Schmerl 125. 126
 Schmerling 127
 Schmervogel II. 215
 Schmetterling 631
 Schmiering 1123
 Schmierlein 126. 128
 Schmil-Endte 790
 Schmirring 1123
 Schmittel II. 725
 Schmüntzen 760
 Schnarchhuhn II. 92
 Schnarf 1139
 Schnarrdrossel II. 249
 Schnarre II. 249
 Schnarrente 750
 Schnarrgans 803
 Schnarrichen 1139
 Schnarker 1139
 Schnarrkormoran 858
 Schnarrs 1139

- Schnarrwachtel II. 1139
 Schnärz II. 1139
 Schnarrziemer II. 251
 Schnatterente 749
 Schnatterer 783
 Schneck 314
 Schneeammer II. 399
 Schneedohle 355
 Schneedrossel II. 308
 Schneeeule 156
 Schneefink II. 482. 508
 Schneegacke 355
 Schneegans 706. 845
 Schneegeyer 137
 Schneehase 96
 Schneehuhn II. 94. 95. 99
 Schneekönig II. 716
 Schneekrähe 357
 Schneelerche II. 231. 400
 Schneelefche II. 327
 Schneemeise II. 770
 Schneemeve 931
 Schneemerkur II. 100
 Schneeortolan II. 399
 Schneesperling II. 399
 Schnee-Vogel II. 327. 399. 405
Schneffa 86. 6
 Schneiderbachstelze II. 730
 Schneidervogel II. 730
 Schnepf 1004. 1011. 1107
 Schnepfe 1015. ff. 1026. 1057.
 1070. 1080
 Schnepfchen 1031
 Schnepfenkuckuck 480
 Schnepfenreiher 999
 Schnepfensandläufer 1067
 Schnepff 1027
 Schneppe 1026
 Schnepphuhn 1026
 Schnerre II. 251
 Schnerz 1139
 Schnibbe 1031
 Schnid II. 351
 Schniegel II. 350
 Schnippentaube II. 163
 Schnirring 922
 Schöbbeje 803
 Schoenobenus II. 618
 Schoeniclus 1076. II. 435
Schoffelaar 80. 1
 Schoia 361
 Schollenhüpfer II. 660
 Scholucher 853
Schondokon 59. 1
 Schonhudrossel II. 274
 Schopfente 796
 Schopfdrossel II. 571
 Schopfheher 364
 Schopflerche II. 225
 Schopfmeise II. 752
 Schopftaube II. 151
 Schorsteinfeger II. 387
 Schöfflerle II. 531
 Schöffzerlein II. 530
 Schöffzlein II. 528
 Schottengans 861
 Schottische Gans 733. 860
 Schreckvogel 806
Schreech-Owl 43. 8
 Schreyer 42. 1088
 Schreydrossel II. 269
 Schreyfalk 136
 Schreykibiz 1088
 Schreyvogel II. 39
 Schryck 1139
Schrye 86. 3
Schrschura 63. 1
Schrschurka 63. 1
Schubbe 112. 3
 Schubut 139
 Schubuteule 139
 Schuffel 80. 1
 Schuffler 939
 Schufut 139
 Schuhu 139 f.
Schuisfuit 43. 1
 Schuluer 853
 Schulz von Bülau 405

- Schulz von Milo 403
Schuna 59. I
 Schuppdrossel II. 571
 Schuppenente II. 778
 Schupkönig II. 717
 Schups 796
 Schüttelkopf II. 153
 Schwäderlein II. 502
 Schwalbe II. 781
 Schwalbenfalke 51. 116
 Schwalbengeyer 23. 116
 Schwalbenmeve 923
 Schwalbenschwanz 49. 54.
 588 ff.
 Schwalbensecht 509
 Schwalbenstieglitz II. 491
 Schwalm II. 782
 Schwan 694. ff. 705
 Schwanentaucher 845
 Schwangans 696. 703 f.
 Schwanzzeisvogel 595
 Schwanzente 764
 Schwanzkiwiz 1088
 Schwanzmeise II. 770
 Schwanzsperling II. 440
 Schwanztaube II. 201. 203
 Schwanzwiedhopf 613
 Schwarzbart 252
 Schwarzbärtchen II. 529
 Schwarzdrossel II. 301
 Schwarzflügel 104
 Schwarzflügler II. 356
 Schwarzkamm 613
 Schwarzkäppchen II. 662
 Schwarzkappe II. 662
 Schwarzkehle 453
 Schwarzkehlchen 631. II. 692.
 709
 Schwarzkehle II. 637
 Schwarzkopf 186. 408. 549.
 796. 921. 1095. II. 382.
 566. 662
 Schwarzköpfchen II. 763
 Schwarzkragen 1089
 Schwarzmeise II. 768
 Schwarzplatte II. 663
 SchwarZRücken 705
 Schwarzsehnabel 818. 1057 f.
 Schwarzschwanz II. 651
 Schwarzspecht 501. 509 ff.
 Schwarztaucher 1126
 Schwätzer II. 324. 579
Schwederle 112. 17
 Schweimer 103
 Schweitzereinsiedler 387
 Schweitzereremit 387
 Schweitzerkiebitz 1067
 Schweitzerkrähe 385
 Schweitzerrabe 385
 Schwemmerfalke 103
 Schweymer 102
 Schwienhierd II. 658
 Schwimmer 49. 102. 114. 116
 Schwimmschnepfe 1025
 Schwimmvögel 694
 Schwoinz II. 372
Schwonez 109. 27
Schyf. Taling 67. 33
Scolopax 1015 ff.
 Scops 154. 951
 Scopus 947
Scrage 77. 2
Scricciolo 114. 45
Scythe bill d'Heron 84. 21
 Scythrops 322
Sczygiel 112. 7
Sea-Crow 78. I
Sea-Lark 88. I
Sea-Pheasant 67. 28
Sea-pie 90. I
 Secretair 17
 Sedge-bird 114. 8
 Seeadler 30
 Seeamsel II. 243
 Seeelster 815
 Seeente 712. 794. 796
 Seefalk 59
 Seefasan 855
 0005 See-

- Seeflunder 882
 Seegler II. 670. 835
 Seehahn 878. 883
 Seehahntaucher 879
 Seeheher 855
 Seekrähse 855. 901
 Seelerche 1058. 1083
 Seemeve 901. 906 f.
 Seemornell 1058
 Seemöve 907
 See-Orre 713
 Seepapagey 283. 815
 Seeparkit 822
 Seepfau 949. 1050
 Seepferd 834
 Seerabe 802. 851. 861
 Seerache 802
 Seerebhuhn IIII
 Seerothkehlchen 876
 Seeschwalbe 599. 905. 913.
 921. 930
 Seeschwalm 913
 Seestaar II. 283
 Seetaube 824. 871. 875. 1096
 Seetaucher 570. 879
 Seetenfel 883
 Seewasserrabe 853
 Sef-Oend 884
 Segler 670. 835
Schmalis 87. I
 Seidenbracher 1007
 Seidenschwanz II. 323 ff.
 Seidenschwanzdroffel 561
 Seidenschweif II. 324
 Seidenstaar II. 247
 Seidenvogel II. 331
 Seidenvögelchen II. 726
 Sekeep 75. 19
 Sekretairvogel 17
Selenoi-Klest 109. I
 Seleucis II. 284. 319
 Selningur 1072
 Selfort II. 303
Semala-Kiviris 87. I
 Semetro 114. 17
 Semeur 114. 11
 Senator 901. II. 724
 Senegali II. 367. f. 503
 Sengo 382
 Senicle II. 503
Sep-Popielaty 41. 12
 Septicolor II. 462
Serbak 75. I
Serce 114. 48
 Serin II. 502
 Serinus II. 502
 Serrant II. 515
 Serrator 801. 806. 809
 Serre-fine II. 757
Serre-montagnarde 107. 2
 Serrurier 116. 3
Shag 72. 4
 Shagareg 393. 396
 Shanhü II. 274
Sharzek 106. I
 Shearwater 837. 839
Shelaw 103. 20
Sheld-appli 109. I
Sheldrake 67. 4
She-pecuni-memewuok 50. 13
 Sheregrig 395
Shipomas-push 43. 12
Shore-bird 117. 4.
Shoveler 67. 19
Shraekke 68. I
Shrite 107. I
Shul-fall 112. 3
Shwapulis 109. 4
 Sialis II. 705
 Sichelente 751
 Sichelreihcr 1001 ff.
 Sichelschnabel 822. 1003
 Sichelschnepfe 1007
 Sichler 1004
Sidensvands 108. I
Sidenswanz 108. I
Sidse-Rönnike 112. 28
Siele-colore 112. 7

- Siffleur* 107. 3
Sigba 95. 1
Sigurtok 86. 7
Sibdeast 108. 1
Sible 116. 3. 5
Siisgen II. 517
Sikora - Zdtugim - ogonem 116.
 II
Sikora - czarna - mniesza 116. 7
Sikora - czubata 116. 2
Sikora - mod'ra 116. 3
Sikora - popielata 116. 8
Sikorna 116. 3
Sikvi 101
Silberfasan II. 70. 74
Silberreiher 973
Silberschnabel II. 450
Sildemaage 909
Sildeperris 873
Sild - Maage 76. 7
Sillawabrns 50. 7
Siltane - räästas 63. 1
Simmeren 107. 2
Simmerfnarre II. 251
Simon II. 681
Sincialo 247
Singdroffel II. 259. 263
Singkernbeißer II. 382
Singschwan 694
Singvogel II. 139
Sino - Tyrlingur 110. 1
Sinfonte II. 270
Sioelaerka 110. 1
Siokakistok 67. 5
Sirguerito 112. 7
Sirkfariarsungoak 87. 3
Sirli II. 218
Sirfair 795
Sisben 112. 25
Sifelle 107. 4
Siferre II. 352
Sisgen II. 517
Sisiken 112. 25
Siska 112. 25
Siskin II. 517
Sifferönnike 112. 29
Sitta 544. ff. 548
Sittich f. Sittig
Sittich - Lori 231
Sittig 222
Sittvogel 222
Siu II. 521
Siuitok 43. 3
Siutut 104. 19
Sivigio 114. 48
Sizerin 112. 29
Skade 376. II. 156
Skajite 76. 10
Skallefluger 805
Skära 50. 13
Skarfur 72. 4
Skartsen 853
Skarv 72. 3
Skaft 31
Skata 50. 10
Skate 50. 13
Skegea - Ritur 897
Skiarre 378
Skid - Heyre 84. 12
Skierro 76. 2
Skiör 376
Skiorand 804
Skiör - Vünge 42. 15
Skiurra 50. 13
Sklav II. 463
Skoarra 749
Skodde - Fugl 87. 8
Skode - Fole 87. 13
Skoetsch 42. 16
Skoppia 42. 26
Skorsteensfvale II. 790
Skovlarke 105. 3
Skovl. Neb 80. 1
Skovskade 50. 7
Skovfnarre 1140
Skovspurre 112. 37
Skovspurv II. 555
Skovronek 105. 1

- Skozzetta* 105. 2
Skraap 70. 6
Skrabe 839
Skräkan 68. I
Skräke 307
Skrake 68. I
Skred - H-yre 84. 12
Skrig 72. 3
Skrug - Kield 1040
Skrzwan 105. I
Skua 915
Skude 104. 19
Skur 110. 5
Skure 76. 7
Skworez 106. I
Sky lark 105. I
Slaetfalk 42. 13
Slaghön 42. 28
Slangen - Vreeter 42. I
Slaufz 114. I
Slawick 114. I
Sleepuschka 59. I
Slowik - Wiekszy 114. I
Sma 72. 4
Smalle - Bot 1063
Small green hanging - bird 113.
 81
Smaragdkolibri 684
Smaragdparkit 246
Smarnza 114. 45
Sma - Spue 86. 4
Smerda - Kaura 64. I
Smerduch 64. I
Smerillus 126
Smew 68. 5
Smilges 109. 4
Smirle 103
Smirlein 127
Smittl II. 726 f.
Smoritu 107. 2
Smyrle 127
Smyrlin 127
Snake - Hawk 42. 25
Sneedse 116. 3
Sneefugl II. 401
Sneekok II. 401
Snee - Rype 103. 4
Sneppe 86. 6
Sneppert II. 163
Sneespurre 110. I
Snee - Titing 110. I
Snetuppa 108. I
Sniegula 110. I
Sniozniczka 110. I
Snio - Tytling II. 401
Snio - Tytlingur II. 401
Snipe 1015
Snippert II. 164
Snirza 116. 5
Snöfparf 110. I
Snov - Bunting 110. I
Snow - fleck 112. 3
Snoripa 103. 4
Snöskata 107. 2
Snovogel 110. 2
Snow - Bunting II. 400
So 103. 4
Sobmer 909
Societätsfliegenfänger II. 597
Soco 388
Soë - Höne 75. 8
Soë Horve 75. 8
Soë - Konge 69. 5
Soelskin - Szöd 86. II
Soelskrigger 110. I
Soel - Skrikia 110. I
Soë - Orre 67. 5
Soestierne 813
Soesvale 926
Soke 772
Sokol 42. 13
Solandgänse 861
Sol Bakke 117. 4
Solend 861
Solitaire II. 311 f.
Solvat 897
Sommerdroffel 403. II. 263
Sommèrente 791

- Sommerhalbente 772. 774
 Sommerhämling II. 28
 Sommerkönig II. 726
 Sommermerle II. 455
 Sommermotacille II. 729
 Sommerrötele II. 694
 Sommertanager II. 455
 Sommertyrannchen II. 726
 Sommervogel II. 332. 455
 Sommerzaunkönig II. 720
Sondenvinds - Fugl 70. I
 Songtrush II. 263
 Sonnengeyer 4
 Sonnenreiger 991
 Soolfoort II. 303
Sopazil 87. 13
 Sordonne II. 633
 Soren - Jacob 69. 5
 Soren - Peder 70. I
 Sorentlein 772
Soroka 50. 13
 Sortbag 907
 Sorte 67. 6
 Sortkirre 926
Sort - Spaet 59. I
Sort - Tärne 77. 2
Sort - Trost 107. 22
 Sofove 305
 Souchet 746
 Soucie II. 724
Soudagua 42. 4
 Soui II. 137
 Souimanga 622. 633. ff. 637.
 640. 647 f.
 Soulcie II. 724
 Sourcicle II. 724
Sova 431. I
Sovalezna 43. I
Sova - urfata 43. 4
 Sovi II. 137
 Sovimanga 622
Sowka 43. 5. 7
 Soyka 50. 7
 Spaarling II. 548
Spacshoek 42. 31
Spacziek 106. I
Spadderi 42. 31
Spaet 59. I ff.
Spaet Meyffe 59. I
 Spaltfufs 329
Spansk - kräka 51. I
Sparling - Fowl 68. I
 Sparrow II. 535
 Sparrow - Hawk 117
 Sparverius 129
Sparviero 42. 31
 Spasvogel 216
 Spatel - Ente 745. 757
 Spatelgans 939
 Spatule 939
 Spatz 677. II. 494. f. 539. 548.
 775
Spatzek 106. I
 Spatzeule 178
 Specht 222. 500. 591
 Spechtkrähe 502
 Spechtmeise 544
 Spechtpirol 408
 Speckente 760
 Speckmeise II. 755. 760
 Speicherdieb II. 548
 Speralster 189
 Sperber 54. 111. 116. 126
 Sperberfalk 55. 116
 Sperberschwalbe 54
 Sperbereule 174
 Sperck II. 548
 Sperg II. 550
Sperga 75. 7
 Sperling 556. II. 313. 348. 358.
 360. 363. 379. 383. 422.
 427. f. 440. 442. 451. 458.
 460. 504. ff. 510. 535. ff.
 542. 545. 547. 560. 562.
 615. 617. 741. 746. 774
 Sperlingsartige Vögel II. 139
 Sperlingsammer II. 416
 Sperlingshabicht 111

- Sperlingspapagey 289
 Sperlingspecht 510
 Sperlingstaube II. 197
Spernuzzola 116. 2
 Sperrmeise II. 764
Sperviera 44. 12
 Sperwer 116
 Spettmeise 546
 Speyer II. 799
 Speyerl II. 789
 Spheniscus 825
 Spiegelente 771. 786. 790
 Spiegelmeise II. 772
 Spiegelvögelchen II. 702
 Spielhahn II. 88
 Spiesente 762. 764
 Spiesgans 880
Spikke 114. 18
 Spießlerche II. 219 f.
 Spillhahn II. 84
Spillkräka 59. 1
 Spinoletta II. 220
 Spinus II. 407. 515
 Spipola II. 214. 715
 Spipolette II. 219
 Spirer 922
 Spirkfchwalbe II. 789
 Spirfchwalbe II. 797
 Spitzgeyer 104. 107
 Spitzkopf II. 736
 Spitzlerke II. 631
 Spitzschwanz 762. 764. 766.
 II. 88
Σπιζιας 42. 31
Splinza 42. 16
 Spoe 1019
 Sponfa 791
Spoon-bill 80. 1
Spoon-bill-Duck 67. 26
 Sporengans 705
 Spornfink II. 475
 Spornflügel 1131
 Spornhenne II. 59
 Spornvogel II. 27
 Spottdroffel II. 270. f. 272
 Spötter 102. 913. II. 271
Spotte-Io 76. 10
 Spottvogel 216. II. 272. 620.
 625
 Spov 1019
 Spreedrossel II. 312
 Sprech II. 206
 Spreu II. 237
 Sprenzchen 116. 127
Spreuwe 106. 1
 Sprinz 96. 116
 Sprinzi 119
 Sprossenhuhn II. 94
 Sprosser II. 611
 Sprossvogel II. 611
Spue 86. 3
 Spurre II. 549—77. 2
 Spurrehonge II. 726
 Spürfchwalbe II. 797. f. Spyr-
 fchwalbe
 Spurv II. 549
 Spyrfchwalbe II. 789. 791. 796
 Squaiotta 981
 Squakko-Reiher 979
Squaprield 86. 11
 Srakoper 44. 12
Staal-Sneppe 87. 1
 Staar 406. 409. 412. 425. 431.
 435. 437. II. 236 ff.
 Stachelschnabel 1106
 Stachelschwalbe II. 782 ff.
 Stachelschwanz 752. II. 801
 Stadtrothschwänzlein II. 692
 Stadtschwalbe II. 782
Stalzo 103. 1
Stanchel 42. 16
Stannel 42. 16
 Stär II. 238
Starda 95. 1
 Stare II. 233. 236 ff.
 Starik 821
 Starl II. 239
 Starna II. 116. — 103. 12
 Statt-

- Stauden-Ragerl 998
 Stecklick II. 488
 Stechlitz II. 488
 Steenbicker II. 656
 Steendolp II. 653
 Steendulp II. 653
 Steengall III
 Steengylp 114. 15
 Steenpikker II. 638
 Steen-Sneppe 86. 7
 Steensquette II. 653
 Steensvale II. 798
 Steen-Swalm 117. 6
 Steenugle 43. 1
 Steglik 112. 7
 Stebrsts 110. 5
 Steinadler 27. 33. 42. 62. 65
 Steinamfel 218. f. II. 313. 320
 Steinauffe 170. 178
 Steinbeißer II. 342. 354. 654
 Steindpill II. 653
 Steindohle 385
 Steindreher 1057. 1097
 Steindrossel 218. II. 310. 313
 Steinemmerling II. 431
 Steineule 169. 172
 Steinfalk 108. 109
 Steinfletsche II. 627. 656
 Steingället 1068
 Steingeyer 23. 43. 49. 107
 Steinhänfling II. 525. 532
 Steinheher 367
 Steinhetz 384
 Steinhuhn II. 96. 98. 110
 Steinhuhntaube II. 166
 Steinkautz 170
 Steinkletsche II. 652
 Steinkrähe 385
 Steinlerche II. 215. 226
 Steinmerle 217
 Steinpardel 1097
 Steinpatsche II. 656
 Steinpicker 1076. II. 660
 Steinquacker II. 653
 Steinrabe 337
 Steinrappen 385
 Steinröthel 217. 219
 Steinröte II. 313
 Steinschmack III
 Steinschmacker II. 654
 Steinschmätzer III. II. 649 ff.
 706
 Steinschnapperl II. 654
 Steinschnepfe 1025
 Steinschöflein II. 519
 Steinschwacker II. 652
 Steinschwalbe II. 797. 804
 Steinschwatzer II. 654
 Steintaube II. 198
 Steintohle 385
 Steintule 385
 Steinvogel II. 44
 Steinwälzer 1097. 1057
 Steinzeißig II. 739
 Steißfuß 669. 883 ff.
 Stelkr 1056
 Stellers Ente 745
 Stellers Krähe 365
 Stelzenläufer 934. 1099
 Stenkneck 109. 1
 Stepowron 84. 9
 Steppenfalke 103
 Steppenralle 1112
 Steppenhuhn II. 7. 108
 Steppenlerche II. 221
 Sterbevogel II. 324
 Sterch 959
 Sterchy 84. 7
 Stercoraire 914
 Stercorarius 896
 Sterling 106. 1
 Sterna 917
 Sternadler 315
 Sternardt 110. 5
 Sternente 811 ff.
 Sterzente 789
 Sticherling II. 641. ff. 660.
 677. 732

- Stickup 1041
 Stieglitz II. 486. ff. 495. 498
 Stiftsfräulein II. 637
 Stiglitz II. 487
Stilk 86. 111
 Stillitz II. 489
 Stinkhahn 609
 Stinkvogel 435
 St. Iohnsfalk 94
 Stockadler 27
 Stockente 746
 Stockerfalk 94
 Stöckeneule 154. 168. 178
 Stockfalk 76. 95. 116
 Stockhänfling II. 525. 531
 Stocktaube II. 146
 Stokziemer II. 308
 Stolucherez 853
Stone-chatter 114. 17
Stonegall 42. 16
Stonefinch 114. 17
 Stopparola II. 220. 600. 627
 Stöpling II. 220
 Stoppelvogel II. 220
 Storch 945. 957. f. 1007
 Störente 789
 Storfuglen 875
Stork 84. 4
Stormfinch 70. 1
Storm-Fugl 70. 3
Storm-Stär 106. 5
Stormwaders-Fugl 70. 1
Stornell 106. 1
 Storno II. 239
Stoerschebek 114. 46
 Storzello 103. 2
 Stofsadler 18
 Stöfser 49. 116
 Stofsalk 123
 Stofsgeyer 49
 Stofsmeve 915
 Stofsvogel 49
 Straber 803
Stragazzina 44. 12
Strakavel 50. 13
 Strandbachstelze II. 674
 Strandbekassin 1070
Strand-Elg 88. 1
 Strandelster 1110
 Strandhäster 1110
 Strandheister 1110
 Strandhühnlein 1070
 Strandjäger 913
Strand-Kield 86. 11
 Strandläufer 1049. 1059. ff.
 1075. 1114. 1155
 Strandläuferlein 1073
 Strandmotacille II. 674
 Strandpfeifer 1083
Strand-Pipaare 88. 1
Strand-Piper 88. 1
 Strand-Ravn 720
 Strandreuter 1099
Strand-Rixe 93. 2
 Strand-Schnepfe 1039
 Strandschwalbe II. 793
 Strandskade 1110
Strand-Skur 90. 1
Strand-Snarre 93. 2
Strand-Sneppe 87. 13
Strand-Svale 117. 4
Strand-Swala 117. 4
 Strandvogel 1057. 1078
 Straßburger Taucher 809
 Straubhahn II. 51. 56
 Strauchgrasmiücke II. 616
Straule 76. 3
 Strauß II. 10
 Straußbastard II. 17
 Straußente 754. 795
 Straußfink II. 327
 Straußkasuar II. 17. 19
 Straußmeise II. 753
 Straußrabe II. 122
 Straußtaucher 803. 883
 Straußvogel II. 12. 14
 Strea 43. 8
 Streithuhn 1050

Streitschnepfe 1052
 Streitvogel 1050
 Strepet II. 6
 Strefch 114. 46
 Streuſſlein II. 721
 Strichdroffel II. 268
 Strichtaube II. 146. 200
 Strietvogel II. 400
 Strilozzo II. 407
 Strix 138
 Strnad 110. 5
 Strobeltaube II. 152
 Stvoka 50. 13
 Strokos 44. 12
 Strömstaar II. 244
 Strontjäger 914
 Στρονδογ II. 15
 Strumpfwirker II. 405
 Strunkvit 70. 1
 Struntjäger 913
 Strupptaube II. 152
 Strupphuhn II. 51
 Struthio II. 10
 Struthiocamelus II. 12
 Strurza 96. 1
 Struntjager 76. 10
 Struufshahn 1050
 Strzyzyk 114. 46
 Student 72. 3
 Sturino 106. 1
 Sturmſink 834
 Sturmneve 834
 Sturmſeegler 1063
 Sturmſchwalbe 831
 Sturmtaucher 831
 Sturmverkündiger 834. 839
 Sturmvogel 830
 Sturnus 407. 431. 435. 437.
 II. 236 ff.
 Stuttneſia 876
 Subbuteo 123
 Sucet II. 724
 Südmeerſchwalbe 926
 Südſeerabe 340
 II. Band II. Th.

Suedes-aerla 114. 11
 Suenmoodra Cavky 78. 1
 Suet II. 724
 Sufflator 101
 Suglam 101. 3
 Suguntu 41. 5
 Sula 844. 861
 Sula 72. 5
 Sulcie 112. 30
 Sultan 1119
 Sultanshuhn 1119
 Summvögelein 677
 Sumpfbuſſard 71
 Sumpfeule 181
 Sumpffalk 103
 Sumpfhacht 108
 Sumpflerche II. 218
 Sumpſmeiſe II. 766. 778
 Sumpffſchnepfe 1029
 Sumpffſchnerze 1153
 Sumpſvögel 934
 Sumpſweihe 64
 Sunkſur 67
 Surglum 101. 3
 Suri II. 17
 Surisprakul 43. 7
 Suſcitator II. 126
 Suſſu 117. 3
 Svaerta 67. 6
 Svale II. 783
 Svale 117. 1 ff.
 Svan 696. — 67. 1
 Svane 67. 1
 Svart-And 67. 6
 Svarbag 874
 Svartbach 906
 Svartbakur 874
 Svart-Orre 67. 6
 Svarttrut 76. 6
 Svenske II. 713
 Swalu 117. 1 ff.
 Swallow II. 783 ff.
 Swänſk-papoja 109. 3
 Svebrelis 84. 7

- Swehispurus* 84. 7
Swenfka 109. 27
Swihpuris 112. 36
Swimmern 102
Swinepipe 107. 3
Swirbulis 112. 36
Swirpis 109. 2
Swunsch II. 372
Sylvia 556. 632. 635. 646. ff.
 II. 313. 481. 599. 605. ff.
 628. 697. ff. 705. 713. 732
Sziast 84. 8
Szpak 106. 1
 T.
Taade - Hest 87. 13
Tabaduru 53. 2
Tacab - Mife 85. 1
Tacco 472
Tachmas 114. 1
Tadorna 709. ff.
Tafelente 767
Tageule 156
Tagerl 357
Tag - und Nacht - Drossel II.
 242
Tagphilomele II. 606
Tagschläfer II. 808
Tagschläger II. 606
Tahe 355
Tailleur 72. 3. II. 730
Talbit II. 347
Talg - Oxe II. 756
Tal - trast 107. 3
Tamatia 458. 946
Tanager II. 449. ff.
Tanagra II. 449. ff.
Tanaombé II. 289
Tanas 114
Tangara II. 456. ff. 745
Tan - Meislin II. 723
Tannenbaumhacker 640
Tannenbaumläufer 640
Tannenelster 367
Tannensink II. 482
Tannenheher 366
Tannenkriecher 640
Tannenmäuslein II. 723
Tannenmeise II. 763
Tannenpapagai II. 339
Tannenvogel II. 339
Tannhäger II. 344
Tann - Meisse II. 365
Tantalus 1001. ff.
Tapera II. 801
Tawg II. 25
Taparana 61. 26
Tape - bois 59. 1
Tapon 109. 4
Taraba 292
Tarabuso 84. 21
Tarangalo 86. 4
Tarier II. 656
Tarin II. 502. 517
Tarna 77. 2
Tarne 923
Tarrain II. 522
Tarrok 898
Tartarlerche II. 221
Taschenmaul 746
Taschirza 114. 45
Taschirza 114. 45
Tatao II. 462
Tattarak 67. 1. ff.
Tattula 50. 6
Taube 823. 838. 871. II. 139
Taubendrossel II. 317
Taubenfalke 49. 76. 120
Taubengeyer 76
Taubenhabicht 76. 121
Taubensperber 120
Taubenstößer 116
Tauchente 795. 801. 809
Tauchentchen 889
Taucher 801. 819. 870. 876.
 ff. 1095
Taucherchen 889
Täucherlein 894
Täuchermeve 909

- Tauchergans 802
 Taucherhuhn 870
 Taucherhühner 870 ff.
 Taucherkiebitz 802
 Tauchermöve 874
 Tauchersäge 803
 Tauchertaube 871
 Tauchgans 802
 Taumeltaube II. 155
 Taumler II. 155
 Tauza 98. 1
 Tavoua 291
 Taya 78. 1
 Tchachert 211
 Tchachert-Be 211
 Tche-con 103. 36
 Tchi-perdrix 110. 3
 Tchirmubo 116. 3
 Tchouet 112. 37
 Teal 772
 Tectec II. 586
 Tecurmasbisb 112. 1
 Tedder 103. 2
 Teer II. 85
 Teherik II. 680
 Tebil 42. 71
 Teist 812
 Teista 872
 Teitei II. 457
 Teitei 110. 3
 Ten 923
 Tendelöh 923
 Ten-ru-julon 585
 Tepetototl II. 43
 Tepnys 42. 4
 Tequixquiactzanatl 53. 7
 Terek 1023
 Terin 112. 25
 Tern 929 ff.
 Ternatanheher 588
 Ternier 65. 2
 Terfinne II. 333
 Terrerfoak 42. 9
 Terzuolo 42. 31
 Tessacourbé II. 589
 Testa-nera 116. 3
 Testo-russo 114. 18
 Tetaru 104. 32
 Tetema II. 296
 Tetrao II. 83. ff. 91. 131
 Tetras 102. 3
 Tetrax II. 6. 230
 Tetrez 103. 1
 Tetrix II. 88. 429
 Tetta-vache 118. 1
 Tette-chevre II. 810
 Tettera mahre 103. 2
 Tetteris 103. 2
 Teublin II. 196
 Teucher 807
 Teufelsbolzen II. 772
 Textor 421
 Thage 859
 Thale 355
 Thalk 355
 Thär-ed-Sjammel 96. 1
 Tharier II. 661
 Tharu 26
 Thaumantias 680
 Thauschnarre 1117. 1142
 Thecau 290
 Theghel 1133
 Thença II. 273
 Therete II. 420
 Therna 923
 Thi-kbi 101. 3
 Thili II. 274
 Thifsonis 101. 3
 Thistlefinch 112. 4
 St. Thomastaucher 890
 Thomas im Zaune II. 717
 Thomas Gierdet 114. 45
 Thornkrafer 189
 Thornkrätzer 189
 Thorose causew 43. 4
 Thouyou II. 17
 Thouyouyou 96. 3
 Threguel 1133

- Thufu - Tytlinger II. 235
 Thula 980
 Thunherr II. 350
 Thumpfaffe II. 349
 Thurmeule 165
 Thurm Falk 110
 Thurmſchwalbe II. 797
 Thurmwiedehopf 387
 Thütvogel 1094
 Thyon II. 661
Tinadur 90. 1
 Tialderen 1110
Tia - Tia 107. 2
 Tic - Tic 556
 Tjeklik II. 116
Tield 90. 1
 Tigerméve 931
 Tigersperling II. 365
 Tije II. 741
 Tije guacu Paroara II. 358
 Tijepiranga II. 451
Tiglits 112. 7
 Tilger 805
Tilibriccu 42. 16
Tilibriu 42. 16
 Tilly II. 275
 Timphahn 1129
 Tinamus II. 135
Tingmiarlurkſoak 42. 39
 Tinnunculus 110
Tintarello 42. 16
 Tintilaum 116. 3
 Tinus 813
Tioquet 112. 4
 Tiphia II. 647
 Tirica 305
 Tirin 112. 25
 Titiri 201
Tizit 114 3
Tizlark 105. 2
 Titmouse II. 767 ff.
Tittinculo 42. 16
 Titys II. 696
Tiuſva 76. 10
 Tiur II. 85
Tlalacozl 67. 9
Tlapolcoeatli 104. 35
 Tlahquechul 941
 Tlahquechultototl 580
Tlorli 42. 13
Tobaque 112. 70
 Toccadorza 59. 17
 Tock 46. 4
 Toco 320
 Toco II. 135
 Tocototl 147
 Tödder II. 84
 Todier 556
 Todteneule 165. 178
 Todtenvogel 165. 178. 627.
 II. 531. 599. 655
 Todtenvögelein II. 656
 Todus 555 ff.
Toekan 59. 40
Tofs - Myſſa 116. 2
Toborkey 61. 1
Toile 59. 1
 Tok 328
 Tolchiquatli 176
 Tole 355
Tolfan y mynydd 112. 37
 Tolocatzanatl II. 246
Toli Tolo 114. 49
 Tölpel II. 19
 Tolu 493
Tomineios 66
Tomlinge 116. 8
Tomme - Liden 114. 46
Tommi Liden 114. 45
Tonekurg 84. 7
 Topaskolibri 662
 Topasrubin 681
 Topau 327
 Topfkarfr 857
Toplarke 105. 6
 Topmeiſe II. 754
 Töppellerch II. 225
 Töppelmeefken II. 754

- Topp - Oend* 68. 5
Topperije 67. 45
Top - Skero 75. 7
Tor 104. 32
Torche - pot 548 ff.
Torciollo 58. 1
Torcol 497
Torcol noir 107. 22
Torcollo 58. 1
Tord 69. 1
Tord - Alk 819
Tordella 107. 1
Tordello II. 265
Tordino 110. 4
Tordmule 69. 1
Tordo 57. 27. — II. 252 ff.
Tordo mezzano 107. 2. 4
Tordo Saffello 107. 3
Tordo viscado 107. 1
Torn - Irrisk 112. 28
Tornoviarfuk 776
Tornskade 199
Torquato 86. 3
Torquilla 496
Tort - alaroity 107. 3
Tortel - Duif 104. 32
Tortola 104. 32
Tortora 104. 32
Tortorella 104. 32
Tosse - Fugl 72. 5
Totanus 1039
Tottler 545
Tottovilla 105. 3
Toucnam - Courvi II. 384
Toudre 107. 4
Toukan 493
Toulu 493
Touraco 488
Tourd 107. 4
Tourdelle II. 253
Tournel 106. 1
Tourne - matte 114. 15
Tourre - buiffon 114. 46
Tourterelle II. 172. ff. 178
Toute - vive 114. 49
Touyou II. 17
Tovi 304
Tracas 114. 17
Trachelia 1112
Trae - Kloppe 59. 1
Trae - Pikke 59. 1. — 65. 1
Trage 107. 1
Tragopan 327
Traine 107. 1
Traine - buiffon 114. 3
Traine - charrue 114. 15
Trakawke 104. 32
Trana 84. 4
Trane 64. 4
Trappe II. 1
Trappenzwerg II. 6
Trappgans II. 2
Traquet II. 575. 656. 659. f.
 671. 691. 735. 706. 711
Trauerammer II. 423
Trauerente 714
Trauerreule 172
Trauerpirol 426
Trauervogel 322. II. 424
Traupis II. 519
Treiche 107. 1
Trembleur 43. 7
Trenka II. 273
Trespodres 103. 20
Trichas 255. 268
Trick 1097
Trictrac 107. 1
Tride - Prele 110. 3
Trie 107. 1
Triel 1098
Trieltrappe II. 6
Trillkräka 59. 1
Tringa 1049. ff. II. 245
Tris 107. 3
Trochilus 660. II. 724. 725
Troeförer 67. 30
Troglodyt II. 717

- Troglodytae adfinis 638. 639.
 646. 671. 675
 Troglodytes 670. II. 605. ff.
 717
 Trogon 452 ff.
 Troill 874
 Troiltaucher 874
 Trolldrücke 86. 7
 Trombotto 84. 21
 Trommeltaube II. 148
 Trompeter 1155
 Trompetero 1155
 Trompetervogel 325. 1154
 Tronfo 104. I. 8
 Trop 95. I
 Tropikente 867
 Tropiker 866
 Tropikmeve 868
 Tropikvogel 828. 866 ff.
 Tröfel 772
 Trost 107. 22
 Trostel II. 262
 Trostle 107. 4
 Trozze - chemin 114. 15
 Troze 107. I
 Troupial 401. 560. II. 242
 Truble 80. I
 Truen 76. 10
 Trulls 88. I
 Trummeltaube II. 148
 Truns II. 488
 Truo 848
 Trupial 401. 408. f. Troupial
 Trush II. 266 ff.
 Truthahn II. 29. ff. 36 ff.
 Trzesiogonek - biaty 114. 11
 Trznadel 110. 5
 Trzonek 76. 2
 Trzonek mniejszy 76. 3
 Tschagrawi 918
 Tschagu 67. 67
 Tschagwoi 67. 67
 Tshanahoei 380
 Tschakwoi Alsja 728
 Tschättchke II. 530
 Tschauka 50. 6
 Tschekantschik II. 661. 731
 Tschelaaza 69. 10
 Tscheraui - Drost 107. 22
 Tscherna 59. I
 Tschetschanka 112. 29
 Tschetschewinza II. 359
 Tschetzschke II. 530
 Tschezke II. 529
 Tschiaivitle 170
 Tschiavitl 180
 Tschischk 112. 25
 Tschokerl 357
 Tschoket 86. 10
 Tschötscherl II. 531
 Tschudesch 58. I
 Tschuk 43. 22
 Tschuri 956
 Tschurkste 117. 6
 Tschüttcherlein II. 530
 Tucan 317. f. Toucan
 Tuch - Endte 807
 Tuchim 98. I
 Tucnam - Courvi II. 384
 Tuddokanna 103. 4
 Tudlik 75. 5
 Tuglok 75. 3
 Tühane 114. 48
 Tui 305
 Tui - Aputejuba 45. 15
 Tuidara 43. 8
 Tuiete 289
 Tuipara 299
 Tuite II. 508
 Tuitirica 305
 Tuju II. 17
 Tukogonjok 88. I
 Tul 355
 Tulkop 69. 5
 Tullaek 329
 Tullfisch 1113
 Tulpendrossel 419
 Tummeltaube II. 155

Tümmler II. 155
 Tun 50. 6
 Tunsfugl 50. 13
 Tunnudliorbik 43. 3
 Tupt 101. 1
 Turdus 203. 403. 408. 413.
 561. II. 245. 248. ff. 327.
 571. 579. 683
Turdu Suerino 107. 1
Tureka Caczka 67. 16
 Turkey II. 36
 Türckl II. 155
 Turlak 355
Turluz 105. 3
Turlutoir 105. 3
 Turnstone 1057
 Turoko II. 203
 Turpane 712
Turtle 104. 32
 Turteltaube II. 172. 177. 188.
 195. 197 ff.
Turris 117. 3
 Turtur II. 188
 Turvert II. 181 ff.
 Tutter II. 372
 Tuunkonning II. 717
Tuzok 95. 1
Tuzzenu 45
Tya - jo 76. 10
Tyerzoy 61. 9
 Tylas II. 259
 Tympanistoe II. 145
 Tyrann 202. ff. II. 567.
 572 ff.
 Tyrannchen II. 725 f.
 Tyrannensiegenfänger II. 572
 Tyrannus 415. II. 567
 Tyrk II. 157
 Tytlingr II. 770
Tytlings - Blicke II. 401
Tzinirzcuw 55. 2
Tzinziboba 67. 28
 Tzonpan II. 273
 Tzopilotl 41. 5

U.
Uanfeta 105. 1
Ucelli di Cypro 114. 10
Ucello del mondo novo 108. 1
 Uet - Uet 1133
Uf 43. 1
 Uferlerche 1083. II. 231
 Uferschnepfe 1041. 1046
 Uferschwalbe II. 792
 Uferstrandläufer 1070
Ugla 43. 4 ff.
Uhdenis 72. 3
 Uhr - Eule 150
 Uhu 139. 144
 Urubu 6
 Ul 161
 Ule 162
Ulluagolik 67. 26
 Ultramarinfink II. 559
Ulu 83. 8
Ulin 43. 1
 Ulula 139. 162. 169
 Umbellus II. 101
 Umbrette 947
 Ungewittervogel 831
 Ungle 765
 Unglücksrabe 218
 Unglücksvogel 216 ff.
Ungula - Chorenj 67. 54
 Unkenfresser 64
Unniska - Apezhaybisb 59. 1
Upuba 64. 1
 Upupa 387. 607. ff. II. 740
Urachon Trogoi 112. 29
 Uraleule 175
 Urana 351
Urgaas 67. 4
 Urgiis 710
 Urhahn II. 84
 Uria 870. ff. 872
 Uril 858
 Urinator 892
 Urinatrix 831. 889
Urineglia de rin 88. 1
 Ppp 4

Uro-

Urogallus II. 84
 Urona 50. 5
 Uroyang II. 317
 Urrind 984
 Urubitinga 62
 Urutaura 18
Urutaurana 42. 34
 Urutavi 18
 Uspis 43. I
 Usrind 984
 Ussatsch 116. 12
 Ussignuolo 114. I
Utlugan 112. 25
Uveyrs - Fugl 70. I
Uzana 50. 5

V.

Vachette 114. II
 Vachtel II. 131
 Vachtelkonge 1143
Vagel Struis 96. I
 Vaginalis 1131
Vagtel 103. 20
 Valeria 28
Vale Savane 44. 12
 Vandhöne 1118
 Vandrixe 1143
 Vanellus 1052. 1101
 Vanga 187
 Vangoline II. 534
 Vanneau 1053. 1079. 1132 f.
Vard - Höne 91. 2
Vargia 117. 6
Varuar 63. I
Vas - Hymber 75. 5
Vatus - Ond 68. 3
 Vautour 6 ff.
 Vautrot 50. 7
 Vaza 275
 Vberschnabel 1106
Veigezizatzh 107. 3
Velch 44. 12
Welch - Oru 50. 2
Vendagette 107. 4
Vendebals 58. I

Venetore 61. 15
 Venustaubc II. 151
Verdale 110. 5
Verdan 110. 5
Verdange 105. 6
Verdelat 110. 5
Verdeelham 109. 27
 Verdere II. 375
 Verdereule II. 375
Verderol 109. 27
Verdiere des près 110. 3
 Verdier II. 373. 375. 444. ff.
 510. 559
Verdoie 110. 5
 Verdone II. 375
 Verkehrt schnabel 932
Verla 44. 12
Verquette 107. I
Verricella 58. I
Vermontant 110. 5
 Verturon II. 502
 Verzellino II. 502
Vestenvinds - Are 70. I
Vetti - vetto 114. 49
 Vetula 472
 Veuve II. 440 ff.
Veyda - Bialla 76. 7
 Veydetite 1057
Veylarcke 105. 6
 Vibe 1054
Vicicilin 66
 Vidarino 112. 16
 Viduel 402
 Vielfraß 805. 845
 Vieräuglein 754
 Vierhundertzunge II. 270
 Viguier II. 585 ff.
Vilgiäs 67. 9
 Vinago II. 142
Vinette 114. 10
 Vinterfugl II. 401
 Vintsi 564
 Violettfleck 651
 Violettreiber 976

- Vipstiert* 114. II
Vira ombé II. 585
Virginianer 514
Virien 1074
Viscivorus II. 249
Vitifera II. 654
Vitiflora II. 654
Vitrec II. 652
Vogel 367. 405. 411. 639.
 646. 1039. II. 21. 445. 454.
 466. 742
Vogelfalke 116
Vogelgeyer 14
Vogelgeyerle 69
Vogelheine 845
Vogelneftjes 117. 2
Vulpanfer 709
Vultur 1
Vuthamaria 69. 2
 W.
Waalja II. 204
Wäankal 58. I
Wäbke 772
Wacholderdroffel II. 252
Wacholderschnepfe 1029
Wachtel 355. II. 122 ff.
Wachtelgeyer 103
Wachtelhabicht 116
Wachtelkönig 1138. 1149
Wachtellerche II. 214
Wächter 189
Wackelstört II. 637
Wackstört II. 637
Wagtail II. 638. 732
Wablod 52. 2
Wahnkrenzel 196
Wähpstierten II. 645
Wabrna 50. 5. — 50. 7
Walathee 189
Walcerono 114. II
Waldauffe 163
Waldauffel 161
Walddröfcherl II. 261
Walddroffel II. 259
Waldeule 153. 178
Waldfink II. 477. 480. 482.
 535. 557
Waldgeyer 55. 64. 66
Waldgrasmücke II. 618
Waldhahn II. 84. 88
Waldherr 192
Waldhoff 387
Waldböher 192
Waldbuhn II. 83. 99
Waldjäger 1071
Waldkatze 198
Waldkautz 165
Waldlerche II. 215. 226
Waldmeiße II. 764. 766
Waldnachtigall II. 610
Waldpelikan 1001
Waldrabe 384
Waldrebhuhn II. 94
Waldröthlein II. 712
Waldrothschwänzlein II. 693.
 700
Waldrothschweiff II. 694
Waldfänger II. 628
Waldschnepfe 1026. 1077
Waldsperling II. 536. 555. 557
Waldstael 368
Walddtaube II. 140. 173
Waldvogel II. 610
Waldzeislein II. 723
Waldzinslein II. 723
Waled 117. 2
Wallop 86. 3
Walghvogel II. 19
Wälscher Hahn II. 31
Wallubora 50. 11
Wanderdroffel II. 267
Wanderfalk 81. 92
Wandertaube II. 199
Wandwäher 111
Wandwehe 111
Wannags 42. 12. — 37
Wannenweher 110

- Wan-Krengel 192. 194. 196. 200
 Wapacuthn 159
Wapau. Whiski. John 44. 12
Wapow. Estequan-Mickesue 42. 3
 Warblane 112. 36
 Warbler II. 687 ff.
Wardioe 60. 11
Warfogel 44. 12
 Warkrengel 194. 200
 Warte 783
 Warten 783
 Warvogel 190
 Wasserramsel II. 243
 Wasserblisser 932
 Wasserdrossel 1063. f. II. 243
 Wasserfalke 64
 Wasserhenne 1117
 Wasserhennl 1118
 Wasserhuhn 801. 889. 1045. 1147. 1056. 1068. 1093. 1101. 1115. 1134 ff.
 Wasserhühnchen 1031. 1034. 1142. 1153
 Wasserhühnlein 570. 1069
 Wasserläufer 1117. 1143
 Wassermörlle II. 243
 Wassermotacille II. 617
 Wassernachtigall II. 702
 Wasserochs 984
 Wasserpfaue 949
 Wasserrabe 325. f. 852
 Wasserralle 1142. 1144
 Wasserrebhuhn 1026
 Wasserfabel 1106
 Wasserfäbler 1105
 Wasserscherer 839. 932
 Wasserschnarel 819
 Wasserschnaider 932
 Wasserschnepfe 1031. 1041. 1047. 1073. 1149
 Wasserschwabe II. 793
 Wassersperling II. 436
 Wasserstaar 412. II. 243
 Wasserstelze 1142. 1147. II. 637. 644. 647
 Wassersterz II. 636
 Wassertreter 1117. 1142
 Wasservielfraß 845
 Wasservogel 694
 Wasservogel 64
Wästrik 112. 28 f.
Wazer. Hen 91. 4
Wazer. Ouzel 106. 5
Water-rail 93. 2
Water-Witcb 75. 19
Warnstare 106. 5
Wattadraganca 72. 1
Waygeboe 60. 11
 Weberammer II. 428
 Weberpirol 421
Wechbolter 107. 2
 Wecker II. 126
 Wedelschwanz II. 605 ff.
Wedknarr 59. 12
 Weepstirten II. 638
 Wegtaube II. 189
 Wegsterz II. 637
 Wegstecklein II. 702
 Weglerche II. 207. 215
Wchja. wannags 42. 31
 Weichmilane 49
 Weidendrossel II. 314
 Weidengucker II. 626
 Weidengückerlein II. 626. 702
 Weidenlerche II. 235
 Weidenmeise II. 723
 Weidenmücke II. 626
 Weidensperling II. 536. 555
 Weidenzeisig II. 620. 626. 725
 Weidenzeislein II. 723
 Weiderich II. 626
 Weidewall 402
 Weihe 48. 64. 72. 104
 Weihfalke 49
 Weihrauchvogel 403
 Weindrossel II. 258. 263
 Weingartvogel II. 259

- Weinlerche II. 225
 Weinzapfer II. 770
 Weisarsch 1064
 Weissback 764. 766. 815
 Weissbäckchen 723
 Weissbartl II. 690
 Weissbauchadler 39
 Weissbürrzel II. 653
 Weissbläse 1125
 Weissdrossel II. 258. 263
 Weissflügel II. 167
 Weissfussadler 46
 Weisshahn II. 97
 Weisshängling II. 524
 Weisskehlchen 645. II. 575.
 628. 652. 658. 660. 711.
 735. 747
 Weisskehle II. 652
 Weisskopf 20. 23. 29. 44. 107.
 251. 278. 584. 920. 166.
 II. 360. 403. 423. 677. 746
 Weisskragen 74
 Weissnacken II. 404. 747
 Weisschnabel 505. 575. 635.
 II. 463
 Weisschwänzel 38
 Weisschwanz 23. 44. 667. II.
 650. ff. 652
 Weisspecht 533
 Weisspyr II. 790
 Weissstirn 743
 Weissrostel II. 263
 Weisszopf 809. 811
 Wendehals 496
 Wendetaube II. 163
 Wenzel 635. ff. 646. ff. II.
 272. 705
 Wespenfalk 68
 Wespenfresser 69
 Wetterrabe 836
 Wettervogel 1017. 1021
 Wey 51
 Weygehoe 560
 Weyhe f. Weihe
 Weyrauch 405
 Wheat-ear 114. 11
 Wheber 67. 27
 Whilka 714
 Whimbrel 86. 4
 Whippoorwill II. 812
 Whip-Tom-Kelly 113. 14
 Whiskijack 50. 16
 Whiskijohn 50. 16
 Whistling 67. 27
 White-Game 103. 4
 White-Whiski-Iohn 44. 12
 Whourao-roa 581
 Widgeon 67. 27
 Widhavogel II. 440
 Widhopff 609
 Wiedehopf 608. II. 739 f.
 Wiedehoppe 609
 Wiedewall 502
 Wiedhopf 264. 607 ff.
 Wiegwehen 111
 Wiekszy 44. 12
 Wierzbowniozka 114. 8
 Wieselchen 807
 Wiesenammer II. 430
 Wiesen-Ammering II. 431
 Wiesenammerling II. 431
 Wiesenknarrer 1139
 Wiesenläufer 1139
 Wiesenlerche II. 212. 215. 234
 Wiesenchnarcher 1139
 WiesenSchwalbe 1111
 Wiesenperling II. 540
 Wiesenstaar II. 237
 Wigga 67. 45
 Wilma-kul 42. 31
 Wildelster 191
 Wildentle 747
 Wildente 767
 Wildetul 384
 Wildhuhn II. 113
 Wildtaube II. 175
 Wildwald 189
 Wilga 52. 1

- Wilwol* 52. I
Wimbrell 1022
Wind trush 107. 3
Windvogel 1017
Windwahl 111
Winkernell 1144
Winsel II. 259
Wintepzker 116. 11
Winterammer II. 421
Winterdroffel II. 259
Winteremmerling II. 421
Winterente 764. 766. 809
Winterfalk 97
Winterfink II. 482. 543
Wintergrasmücke II. 615
Winterhalbente 769
Winterkönig II. 716. 725
Winterkrähe 351
Winterlerche II. 232. 400
Winterling II. 400
Winterrötelein II. 713
Winterrücke 803
Wintermeve 897. 900
Winternachtigall II. 611. 614
Wintersperling II. 400
Wintervogel II. 404
Winterzaunkönig II. 716
Wintze II. 259
Wipstaart II. 638
Wippstört II. 637
Wippstertz II. 327
Wipsteert II. 638
Wistling II. 692. 699. f. Wüst-
 ling
Wittewalch 402
Wittewall 402. 421. II.
 329 f.
Wittwe II. 439
Wittwall 402
Woaestraekia 114. II
Wohnütz II. 372
Wollenträmper II. 615
Wollhuhn II. 56
Wood-Cock 86. 6
Wood-Crow from Switzerland
 50. 19
Wood-lark 105. 3
Woodpecker 503 ff.
Wood-Pelikan 85. I
Wood-Titmoufe II. 724
Woodchack 199
Woodspite 59. 12
Worabé II. 559
Worobin 112. 36
Woron 50. 2
Worona 50. 5
Wotowe oczko 114. 46
Wou 42. 12
Woupawchou-chuckitkow 414
Wowe 42. 12
Wrakfogel 68. I
Wrangengel 423
Wren 114. 45 ff.
Wriand 67. 27
Wrobel domowy 112. 36
Wrobel gorny 112. 37
Wrobel lesny II. 537
Wrobel zroistego koluro 112.
 74
Wrynek 497
Wullah 723
Wundarzt 1136
Wunderkolibri 670
Würgengel 189. 194
Würger 112. 182. ff. 423. II.
 331. 335
Würgvogel 189
Wurmfresser II. 613
Wuscanithow 109. 3
Wüstling II. 631. 694. f. Wist-
 ling
Wuwe 51
Wy 51
Wyderle II. 627
Wynkernell 1144
Wyt 783
Wywielga 52. I

X.

Xanthornus 409. 423. f. 432
 Xaxabes 298
 Xiuhtototl II. 467
 Xiuxerra 114. 48
 Xochitenacatl 320
 Xochitototl 411. 421
 Xomotl II. 327
 Xura 43. 7

Y.

Yacapitzahoac 890
 Yaku II. 38
 Yandu 96. 3
 Yapou 52. 4
 Yardu 96. 3
 Yayaquiritotl 66. 25
 Yayk - Ohreule 153
 Yellow - hammer 110. 5
 Yohualcuachili 1134
 Yohualtototl II. 504
 Yr - aderyndu 107. 22
 Yrung - Cbaß 67. 54
 Ysvogel 61. 3
 Yunx 496
 Ytzquaurli 42. 34
 Yztactzonyayaubqui 67. 43

Z.

Zagan - Goruchun 43. 1
 Zagan - Schubo 43. 1
 Zagelmeise II. 770
 Zahlmeise II. 771
 Zakid 84. 4
 Zamuro 41. 5
 Zanoë 380
 Zapfenbeißer II. 339
 Zapfennager II. 339
 Zapp 1126
 Zarer II. 250
 Zaritzer II. 249
 Zartschnabel II. 545. 613. 619
 Zätschker II. 555
 Zaunammer II. 431
 Zaunemmeritze II. 432
 Zaunhüpfer II. 691

II. Band II. Th.

Zaunkönig II. 716. 725

Zaunschlüpfer II. 716

Zaunschlüpferl II. 718

Zaunschliefer II. 716

Zaunschlipflein II. 716

Zaunsperling II. 616

Zdzoto II. 220

Zeelawa 114. 11

Zeemala 114. 11

Zeezwallow 77. 2

Zeglotka 109. 27

Zegzolka 50. 6

Zehrer II. 250

Zehrling II. 483

Zeischen II. 516

Zeiselein II. 517

Zeischen II. 516

Zeisig II. 515. 739

Zeislein II. 516

Zeissig II. 516

Zena II. 490. 499

Zephibs 114. 48

Zepste 114. 8

Zerrer II. 250

Zer - wenka 114. 45

Zetscher II. 482

Zeuner II. 255

Zezir 106. 1

Zezula 57. 1

Zbiaelkes 75. 1

Zbiacna 59. 12

Zbierrek 77. 2

Zieba 112. 3

Ziegenmelker II. 808 ff.

Ziegenfanger II. 809

Ziemer II. 249. 252. 253. 267.

278

Ziepammer II. 430

Ziepdrossel II. 260

Zierdrossel II. 265

Ziering II. 250

d'Zierzba 44. 12

Ziesel II. 516

Ziesgen II. 516

Q99

Ziebs.

- Ziesschen II. 516
 Ziez gale 57. 1
 Zifitz 1053
 Ziglis 102. 7
 Zigolo 110. 5
 Zibhuri 105. 1
 Zihluris 105. 6
 Zimmermann 505. 522
 Zimmetvogel II. 690
 Zimorodek 61. 3
 Zinsle II. 516
 Zinslein II. 517
 Zinzerelle II. 324
 Zipdroffel II. 258. 263
 Zipbur 112. 36
 Zippdroffel II. 261
 Zippa 105. 3
 Zippammer II. 431
 Zippe II. 258. 263
 Ziriolu 88. 1
 Zirlammer II. 431
 Zirzente 774
 Zischen II. 516
 Zischer II. 711. 737
 Zischeule 168
 Ziserinchen II. 529
 Zising II. 516
 Zitrinchen II. 502
 Zitskens 112. 16
 Zittertaube II. 153
 Zitzcherlein II. 530
 Zitzil 669
 Ziufzbia 103. 1
 Zivetta 43. 5
 Zivola 110. 5
 Zobböse-Räuf 107. 1
 Zolna 59. 12
 Zonca 157
 Zonocolin II. 128
 Zopflerche II. 225. 226 ff.
 Zoram 84. 4
 Zorca 152
 Zorch 883
 Zorkol 107. 2
 Zorzal 107. 4
 Zötscher II. 531
 Zschokrell 355
 Zuckerfresser 641 f.
 Zuckerspatz II. 511
 Zuckervogel 641. 648
 Zuckervögelein II. 511
 Zugdroffel II. 267
 Zugtaube II. 200
 Zubku 59. 18
 Zuserl II. 326
 Zwerg II. 393. 617
 Zwergente 776
 Zwerggeule 177
 Zwergfalke 126. 130
 Zwergfliegenfänger II. 570
 Zwerghuhn II. 52
 Zwergkernbeißer II. 392
 Zwerglöffler 942
 Zwergpapagey 259. 299
 Zwergpapageytaucher 825
 Zwergpelikan 857
 Zwergreuter 1078
 Zwergtaube II. 198
 Zwergtrappe II. 6
 Zwergzeifig II. 748
 Zwitscherling II. 529
 Zwitterauerhahn II. 92
 Zwitterfalk 110
 Zwittertaube II. 196
 Zwuntsche II. 372
 Zya II. 735
 Zymmer II. 255
 Zyste II. 627

Einige Verbesserungen.

Im ersten Theile.

S. 73. Z. 7. l. Austr. — Z. 11. l. F. Aeruginosus. —
S. 187. nach Z. 21. setze: Latham Syst. ornith. l. p. 667. n. 1.
Ampelis cinerea. — S. 191. Z. 4. l. Harpax. — S. 229.
Z. 5. von unten, für *Maracana*, l. der grüne blau gescheitelte
Aras. — S. 259. Z. 13. l. der langschwänzige Zwergpapa-
gey. — S. 299. Z. 25. l. der kurzschwänzige Zwergpapagey. —
S. 964. Z. 27. und 28. sind ganz wegzustreichen. — S. 1153.
Z. 6. l. daurische.

Im zweyten Theile.

S. 284. Z. 19. l. Samarinar? — Z. 23. l. fuscis? — S. 499.
Z. 26. l. der pomeranzengelbe Fink. — Z. 31. l. p. 346.
n. 161. der orangengelbe Fink. — S. 620. Z. 4. von unten
l. Kukkuksamme. — S. 742. letzte Zeile. l. führt? — S. 734.
letzte Zeile, nach *nachlesen*, setze: cf. p. 235. n. 4.





SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01038 4113